

|                                                         |          |          |        |                  |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|--------|------------------|
| 中山醫學大學附設醫院<br>Chung Shan Medical University<br>Hospital | 名稱       | 泌尿道感染評核表 | 編號     | A31000-Q07-F-023 |
|                                                         |          |          | 版本     | 第 1.8 版          |
|                                                         | 制定<br>單位 | 護理部      | 修正日期   | 115 年 04 月 14 日  |
|                                                         |          |          | 頁數/總頁數 | 1/1              |

一、評核對象：各單位護理人員（含中興分院）。

（不適用單位：OR、PICU、NICU、IR、BR、R10、R11）。

二、評核方式：

1. 詢問單位護理人員回答相關問題（口述）。

2. 查核護理記錄

三、評核內容：

1. 護理人員能說出「泌尿道感染患者注意事項」至少三項。

(1) 鼓勵病人攝取充足的水份，每天 2000-3000ml，除非病人有其他的禁忌。

(2) 避免飲用咖啡、酒，以防刺激膀胱。禁食食物：碳酸飲料、發酵粉或蘇打製的食品，醃漬物。

(3) 多攝取酸性食物可降低細菌繁殖速度。如：食用肉類、蛋類、乳酪、梅子、穀類、李子及葡萄乾、蔓越莓、小紅莓錠，亦可補充維生素 C。

(4) 對女性病人強調維持良好會陰清潔的必要性，並教導他們如廁後由前向後擦拭會陰部。

(5) 女性建議使用清潔的衛生用品，至少兩小時更換一次，應穿棉質的內褲，以淋浴取代盆浴。

(6) 鼓勵女性病人於性交後，立即排空膀胱，並喝下 2 杯水（每杯約 250 cc-300 cc），有尿意感時，應立即如廁勿憋尿。

(7) 依處方服藥並至門診追蹤。

(8) 必要時可參考泌尿道感染手冊。

(9) 發燒的處理。

(10) 教導以 0.1% 的水溶性 chlorhexidine 溶液降低導尿管相關泌尿道感染的發生。

(11) 女性病人洗澡避免盆浴，應盡量採用淋浴方式，以減少病菌經尿道感染。

2. 查核護理記錄：泌尿道感染病人應有相關衛教紀錄。

單位：\_\_\_\_\_

評核者：\_\_\_\_\_

| 日期 | 被評核者 | 床 號 | 評 核 內 容 |   | 正確率<br>(%) | 備註 |
|----|------|-----|---------|---|------------|----|
|    |      |     | 1       | 2 |            |    |
|    |      |     |         |   |            |    |
|    |      |     |         |   |            |    |
|    |      |     |         |   |            |    |
|    |      |     |         |   |            |    |
|    |      |     |         |   |            |    |
|    |      |     |         |   |            |    |

註： 1.正確：以 V 表示                      2.不正確：以 X 表示                      3.不適用：以一表示

4.正確率(%)：【正確項數(V)/實際評核總項數(V+X)】×100%