

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	高警訊藥品使用評核表	編 號	A31000-Q07-F-040
	制定 單位	護理部	版 本	第 1.6 版
			修正日期	114 年 10 月 14 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：護理人員（含中興分院）（不適用單位：OPD、OR）。

二、評核方式：

1. 實地查核或詢問護理人員。
2. 查核護理記錄。

三、評核內容：

1. 實地查核或詢問護理人員：高警訊一級藥物、管制藥一～二級針劑 Morphine 10mg/ml/amp、Demerol 50mg/amp inj、Fentanyl Fresenius 500mcg/10ml inj (Fentanyl-Fresenius 100mcg/2cc inj)、管四 Midazolam 5mg/1ml/amp 針劑及化療藥物(含口服及注射劑)「核對」覆核方式（醫囑開立後由兩位護理同仁完成核對覆核）。
 - a. 由兩位護理人員攜藥至病人單位辨識病人、若使用輸液幫浦須核對滴管(IV set)及輸液滴數之設定與醫囑劑量一致，再至 HIS 系統「執行」覆核。
 - b. KCL 領回但未立即使用之保存方式（一般病房放置麻管抽屜並註明病人基本資料，每班交班時應確實交接對點及紀錄於高警訊藥物點交紀錄表，加護單位則有 KCL 對點紀錄）如有轉床請原單位將高警訊藥物點交紀錄表及患者離開單位藥品移交總表帶至轉入單位並進行雙人簽核後，留存於原單位，轉入單位請重新書寫並雙人簽核
 - c. 高警訊一級藥物、管制藥及化療藥物之剩餘量丟棄流程（主護與原雙重核對護理人員確認品項與餘量，除化療藥物外將藥物抽出打入感染可燃廢棄物垃圾桶丟棄）。並將空瓶丟棄至 Amp、Vial 回收桶（Morphine、Demerol，空瓶需回收至藥局）。
2. 查核護理記錄：
 - a. 護理記錄呈現病人接受注射之高警訊藥品及靜脈滴注幫浦流速。
 - b. 每兩小時確認其班內輸液累積量，並於紀錄呈現以確保劑量正確。
 - c. 護理記錄呈現病人用藥後反應及處理情形：
 - c-1 Insulin(actrapid、novorapid)、Propofol 兩項高警訊藥品，若為臨時醫囑依其藥品特性以資訊系統輔助跳出提示視窗之時間進行監測評值。Insulin(actrapid、novorapid) 在給藥後 2 小時需觀察是否有低血糖症狀（頭暈、冒冷汗、無力、心跳加快、嘴唇發麻）、Propofol 給藥當下及給藥後 5 分鐘監測血壓及呼吸。
 - c-2 靜脈給藥為 15 分鐘監測評值，其他途徑給藥皆為 30 分鐘監測評值。

