

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	嗜中性白血球低下照護評核表	編號	A31000-Q07-F-044
	制定單位	護理部	版本	第 1.6 版
			修正日期	113 年 07 月 09 日
			頁數/總頁數	1/2

一、評核對象：護理人員或照顧者。

（適用癌症相關病房：N10、N11、N14、N15、N17、R09、R11、M08）

二、評核方式：

1. 請護理人員或照顧者回答相關問題。
2. 查核紀錄。

三、評核內容：

1. 詢問護理人員嗜中性白血球低下定義。

「嗜中性白血球低下」(neutropenia)：每 1 mm^3 的血液中，絕對嗜中性白血球的數量不正常減少至低於 500 個以下稱之。

2. 護理人員能說出嗜中性白血球低下防護措施至少兩項。

- a. 運用適當隔離技術，包括口罩、手套或隔離衣。
- b. 避免與傳染性疾病或多重抗藥性細菌移生或感染之病人置於同一病室為原則，並明確的以告示牌標示，隨時監測保護性隔離措施之正確性。
- c. 限制訪客及勿擺鮮花及盆栽。
- d. 避免侵入性治療，如有必要採無菌技術執行。

3. 護理人員或照顧者能說出兩項炎症症狀或徵象：

- a. 發燒（腋溫 $\geq 37.8^{\circ}\text{C}$ 、口溫 $\geq 38^{\circ}\text{C}$ 或顳溫 $\geq 38^{\circ}\text{C}$ ，並持續 24 小時）、發冷或寒顫。
- b. 呼吸道感染症狀：如咳嗽、流鼻水或喉嚨痛。
- c. 24 小時內排便次數增加 3 次以上，且性狀改變之急性腹瀉
- d. 解尿疼痛灼熱，尿液性狀改變。
- e. 皮膚黏膜，特別是口腔、肛門或注射部位有紅腫、疼痛或灼熱感。

4. 護理人員或照顧者能說出兩項嗜中性白血球下疾病飲食衛教：

- a. 所有飲食應當餐食用完畢，吃不完亦應將剩餘食物完整封好，妥善保存。
- b. 食物煮熟，勿食生食，如：生菜或生魚片，含酵母菌類奶製品（優酪乳、優格、養樂多），生奶製品（生食起司、乳酪、奶油）。
- c. 水果必須有完整果皮，果皮以清水刷洗，削皮後才能食用。
- d. 生熟食砧板、菜刀等器具不可混用

5. 護理人員或照顧者能說出兩項居家照護注意事項：

- a. 保持口鼻之完整性：每天檢查口鼻有無紅腫潰瘍或白斑，使用軟毛牙刷或口腔棉棒清潔口腔，活動性假牙用餐後取下避免刺激口腔等。
- b. 保持皮膚及黏膜完整：勤洗手修平指甲採用電動刮鬍刀等。
- c. 會陰、生殖器及肛門照護：，女性經期勤換衛生棉，避免使用衛生棉條，如廁後衛生紙由前往後擦拭，勿來回。避免塞劑、灌腸、測肛溫等。
- d. 飲食原則：以熟食為主，飲用蒸餾水或煮開的水等。
- e. 返院尋求醫師協助時機：如發燒、發冷、寒顫、咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、呼吸困難或喘、小便不順或有灼熱感、24 小時內排便次數增加 3 次以上，且性狀改變之急性腹瀉等。
- f. 室內不宜放鮮花、盆栽，垃圾桶加蓋，減少出入公共場所，人多的環境最好戴口罩，施打疫苗時需詢問醫師等。

6. 查核 HIS 系統有嗜中性白血球低下相關衛教紀錄。

