

中山醫學大學附設醫院 Chung Shan Medical University Hospital	名稱	失禁性皮膚炎照護評核表	編號	A31000-Q07-F-049
			版本	第 1.1 版
	制定 單位	護理部	修正日期	112 年 10 月 19 日
			頁數/總頁數	1/1

一、評核對象：病人或照顧者、護理人員（含中興分院）。

（不適用單位：OPD）。

二、評核方式：

1. 實地查核。
2. 請護理人員回答相關問題。
3. 查核護理紀錄。

三、評核內容：

1. 實地查核：

- a. 詢問照顧者或病人多久檢查尿布一次（2 小時）。
- b. 詢問照顧者或病人多久需給予皮膚清潔及防護措施(每次排泄後需給予，未解便者則至少每六小時執行一次)。
- c. 照顧者或病人能說失禁性皮膚炎皮膚清潔照護方法至少 2 項，如：每次排泄後，使用中性或弱酸性皮膚清潔劑(PH=4-7)清潔、以棉質毛巾輕壓拭乾、避免用力擦拭或來回摩擦刷洗方式、勿使用肥皂..等等。

2. 護理人員：

- a. 說出至少 5 種預防失禁性皮膚炎的危險因子，如：大小便失禁、腹瀉、壓傷評估量表（Beaden scale） ≤ 16 分、皮膚水腫、營養不良、皮膚濕度增加、皮膚老化、清潔方式不正確、知覺降低及活動障礙、藥物使用（包括：多種/長期抗生素、瀉劑、免疫抑制劑）..等等。
- b. 能說出失禁性皮膚炎嚴重度分級，0 級：皮膚完整且無發紅（但有發生 IAD 的風險）；一級：皮膚完整但有發紅情形；二級：皮膚破損合併有發紅情形，嚴重度分級越高，損傷程度越嚴重，若病人無失禁或腹瀉情形，則不屬於失禁性皮膚炎。
- c. 能依嚴重度分級選擇合適的皮膚防護品。0 級：長效保膚霜、無痛保護膜，皮膚乾燥處可使用含凡士林基底產品，皮膚潮濕處不建議使用。一級：皮膚發紅可選擇長效保膚霜、無痛保護膜，皮膚發紅且潮濕可選擇氧化鋅；二級：皮膚破損可使用無痛保護膜、含氧化鋅成分的保護膏。

3. 查核護理紀錄：

- a. HIS 系統「壓傷與 IAD 通報」之每日評估完整
- b. 呈現失禁性皮膚炎相關護理措施及評值。
- c. HIS 系統護理衛教呈現失禁性皮膚炎相關衛教之紀錄。

單位：_____

評核者：_____

日期	被評核者	床號	評核內容									正確率 (%)	備註
			1a	1b	1c	2a	2b	2c	3a	3b	3c		

註： 1.正確：以 V 表示 2.不正確：以 X 表示 3.不適用：以一表示

4.正確率(%)：【正確項數(V)/實際評核總項數(V+X)】 $\times 100\%$