

Docetaxel(Tynen, 鈦能注射劑)(Taxotere, 剋癌易注射劑)

用於治療癌症。

使用這個藥物前，若有下列情況請立即告知您的照護者

- 您對此藥物過敏
- 告訴您的醫生和藥劑師所有藥物（處方藥或非處方藥，天然產品，維生素）和健康問題。未經醫生許可，請勿開始，停止或更改任何藥物的劑量。
- 如果您正在服用抗黴菌藥 voriconazole，metronidazole

使用這個藥物後可能會出現的副作用

所有藥物都可能引起副作用。但是，許多人沒有副作用，或者只有很小的副作用

副作用	處理方式
注射部位疼痛	冰敷 15 分鐘，一天可以數次
噁心及嘔吐	飲食方面，宜少量多餐，避免刺激性食物
腹瀉	多喝水，補充電解質
在接受治療之後 1 星期，您的白血球細胞會減少。您較容易感染疾病。	完成最後療程 2-3 星期後，通常它們便會回復正常。經常洗手。遠離感染，感冒或流感的人。若有感染症狀，如發燒，需立刻就醫
接受治療數日之後，可能出現口腔疼痛或口腔潰瘍	進食後及睡覺前，使用非常柔軟的牙刷潔淨牙齒。用半茶匙蘇打粉或鹽，加入一杯溫水中，作成嗽口水，每日嗽口數次
感到疲倦或虛弱	注意不要駕駛車輛或操作機器
落髮(常見，數天內)	在大多數情況下，無論採取何種護理措施，都無法預防由於化學療法引起的脫髮。一旦停用之後，頭髮便會回復生長，但髮色和髮質可能會變。選擇一種溫和的洗髮乳。避免染、燙、捲髮。使用帽子保護頭皮免受陽光照射。
治療期間可能會發生手足皮膚反應。手掌和腳掌可能會發麻，變紅，發麻，疼痛或腫脹。皮膚也可能變乾或發癢。	避免穿太緊的鞋子，用溫水清洗手和腳，避免熱水，可塗抹一些乳液。外出時使用至少 30 防曬係數 (SPF) 的防曬乳。情況嚴重請告知醫生

- 指甲改變。
- 味覺異常。
- 飢餓感消失。
- 肌肉或關節疼痛。



- 臉部潮紅。
- 眼睛發紅。
- 眼淚變多。
- 體重下降。
- 這種藥物常有便秘，腹瀉，嘔吐和胃部不適。

使用這個藥物後，若有下列情況請立即告知您的照護者

儘管這種情況很少見，但有些人在服藥時可能會有非常嚴重的副作用。如果您有以下任何跡像或症狀可能與非常嚴重的副作用有關，請立即告訴醫生或尋求醫療幫助：

- **過敏反應**的跡象，如皮疹；搔癢；呼吸困難；嘴，臉，舌頭或喉嚨腫脹。
- **感染的跡象**，例如發燒，咳嗽，痰多，解尿疼痛，口腔潰瘍等
- **出血的跡象**，例如看起來像咖啡渣的嘔吐物；尿中有血；牙齦出血；陰道異常出血；沒有原因或更大的瘀傷。
- 出現肺部或**呼吸問題**的跡象，例如呼吸急促或呼吸困難，咳嗽或發燒。
- **皮膚反應**，如皮膚發紅，腫脹，起泡或脫皮（有或沒有發燒）或**任何皮膚反應**。
- 頭暈或昏倒。
- 快速或異常心跳。
- 不正常的灼熱，麻木或刺痛感。
- 肌肉無力。
- 使用這種藥物時，如果視力發生變化（例如視力模糊或失去視力），請立即聯絡醫生。

使用這個藥物後應該注意的事項

- 膽紅素水平高，肝病的人不得服用此藥。
- 該藥物可能會使您腫脹或使體內積水。告訴醫生您是否有腫脹，體重增加或呼吸困難。
- 您可能更容易流血。注意並避免受傷。使用軟牙刷和電動剃須刀。
- 如果您有胃痛或不發燒，胃痛或腹瀉，請立即聯絡醫生。
- 在接受治療期間，最好**進行避孕**

