

大腸鏡檢查預約及注意事項



(Niflec-內科)

姓名：_____

病歷號：_____

一、檢查時間：____年____月____日（星期____）____午____點____分

※若無法前來檢查，請於前一日電話聯絡：(04) 24739595-38319、38321

二、檢查前飲食注意事項：

1. 檢查前兩日宜進食低渣、低纖維飲食(稀飯、麵條、白吐司等)，不能吃任何高纖、高蛋白食物(青菜、水果、魚肉、豆腐...等)，忌服牛奶、燕麥奶、豆米奶及其他乳製品，可飲用運動飲料。
2. 檢查前一日晚餐宜進食清流質飲食(粥湯、魚湯、去渣柳橙汁)。

三、方法：耐福利散(Niflec)服用方式

1. 檢查前一天(____日)晚上____點先將 1 包 Niflec 泡 2000ml 開水稀釋溶解，將 1000ml 耐福利散的藥水於一小時內喝完，把剩下的 1000ml 耐福利散的藥水放置冰箱冷藏保存，(請先併服 2 顆____)，之後於一小時內再喝下 1000ml 的運動飲料或開水，直到大便呈清徹狀。
 2. 檢查當天(____日)早上____點將剩下的 1000ml 耐福利散藥水於一小時內喝完，之後於一小時內再喝下 1000ml 的運動飲料或開水，直到大便呈清徹狀。
- ※服藥後大約 30~60 分鐘左右開始瀉下，作用時間約 4 小時。

四、注意事項：

1. 糖尿病患者檢查當日須停用胰島素注射及停用降血糖藥物，以免發生低血糖；仍然可服用 500C.C.的含糖飲料。
2. 高血壓患者檢查當日請照常服用您平日的高血壓用藥。
3. 若有施打麻醉性止痛劑，可能有頭暈、口乾舌燥的情形，屬正常藥性反應。
4. 如有使用抗血小板藥物如: Aspirin、Plavix、Brilinta，或有使用抗凝血藥物如:Coumadin 應依醫師指示停藥。

生效日期：98/02/20

修正日期：114/06/05

檢閱日期：114/06/05

編號：E-Adult-081



低 渣 飲 食

定義

低渣飲食是減少食物經消化後在腸胃道留下殘渣的一種飲食，在腸鏡檢查之前使用低渣飲食，將可以使清腸藥的效果大增，以避免病灶因為糞便覆蓋而無法仔細觀察，同時也會讓腸鏡的檢查過程順利。

注意事項

1. 於檢查前三天，食物即應開始以清淡為主，選擇嫩肉、精緻的五穀類、過濾的果汁及過濾蔬菜汁，避免刺激性的食物、牛奶及奶製品。
2. 請盡量採用可以使食物質軟的烹調方式，盡量避免油炸、油煎。

食 物 選 擇 表

食物類別	O 可食	X 不可食
奶類及奶製品	無	各種奶類及其製品
肉魚類	去皮、去筋的嫩肉、如絞碎、剁碎、煮爛瘦肉、魚、家禽等。	未去皮筋之肉魚類及油炸、油煎的肉、魚類、雞胗、鴨胗、牛筋。
蛋類	除油炸、煎外其他各種烹調法製作之各類蛋類。	煎蛋、荷包蛋、滷製過久的硬蛋。
豆類及豆製品	無	油炸過的豆製品及未加工的豆類，例如：黃豆、綠豆、紅豆等。



食 物 選 擇 表

食物類別	O 可食	X 不可食
五穀根莖類	饅頭、吐司。精緻的穀類及其製品，如米飯、麵條。	全穀類及其製品。如：米糠、糙米、麥麩、燕麥、玉米、全麥麵包、黑麵包、麩皮麵包等。根莖類食物，如甘藷芋等。
蔬菜類	各種過濾蔬菜汁	粗纖維多的蔬菜，如：竹筍、芹菜等。蔬菜的梗、莖及莖葉、未烹調的蔬菜。
水果類	罐裝或瓶裝果汁	未過濾果汁及含高纖維的水果。棗子、黑棗、番石榴。
油脂類	各種植物油及其製品。	乾果類，如：腰果、花生、核桃、杏仁等。
點心類	清蛋糕、餅乾。	加水果、核桃、椰子粉、芝麻及忌食食物做成的餅乾、蛋糕及派。油膩過甜的點心，如沙琪瑪、綠豆糕、八寶飯等。
其他		刺激性調味品，如：辣椒、大蒜、胡椒等，油膩，調味太重的湯。加果粒的果醬，蜜餞，棗子。

中山醫學大學附設醫院-護理部

♥♥♥♥♥♥♥真誠的關心您♥♥♥♥♥♥♥

諮詢電話：

大慶院區 04-24739595 轉分機_____

中興分院 04-22621652 轉分機_____

生效日期：98/02/20

修正日期：114/06/05

檢閱日期：114/06/05

編號：E-Adult-081

