


脊髓鞘內注射化學藥物



生效日期：112/06/01
檢閱日期：114/12/04

修正日期：114/12/04
編號：E-Ped-025



什麼是脊髓鞘內注射化學藥物(intrathecal injection，簡稱 IT)?

將抗癌藥物打入脊髓鞘內(背針)，消滅躲在中樞神經系統的癌細胞。

治療前準備

1. 醫師會向您及家屬解釋檢查、治療及鎮靜過程之內容及合併症，請您填寫同意書。
2. 簽立同意書：特殊檢查鎮靜、腰椎穿刺、抗癌藥物治療同意書。
3. 依醫囑禁食：視情況禁食 4~8 小時(母乳 4 小時，配方奶 6 小時，固體食物 8 小時)。

治療過程說明

1. 做腰椎注射治療時，醫師會使用鎮靜藥物讓病人睡著，以利執行治療。



2. 做腰椎注射治療時，會讓病人採抱膝拱背姿勢，呈蝦米狀。

治療後要躺多久？

打完脊髓鞘內注射化學藥物(IT)後：需維持頭低腳高俯臥 1 小時，讓藥物可以流向腦部，同時於注射處加壓止血 30 分鐘，之後再翻身平躺 6 小時，避免藥物回流。

何時可以開始進食？

鎮靜結束至少 1 小時後，護理人員會告訴您何時可以開始吃東西，在此之前請勿擅自進食，待病人完全清醒，每間隔 5 分鐘視情況飲用少量水(如：10c.c.)3 次後，若沒有噎咳問題，可以進食少量軟質食物，如：稀飯、蒸蛋、豆腐..等，平躺 6 小時結束後，則可以正常飲食。



傷口怎麼照顧？

1. 注射部位保持清潔乾燥。
2. 穿刺後前 3 天每日換藥一次，觀察傷口外觀有無紅腫情形。以 3 支生理食鹽水棉籤擦拭，乾紗覆蓋。

還要注意什麼？

1. 注意意識狀況，維持呼吸順暢。
2. 如果嘔吐，立刻將頭部轉側睡，預防嗆到。
3. 如有突然意識改變、抽搐、頭痛、持續噁心嘔吐、雙腳的活動跟感覺異常...等不適情形或病人鎮靜結束 60 分鐘未甦醒，請立即通知醫護人員。
4. 病人清醒後，生命徵象監視器就可以移除。

中山醫學大學附設醫院-護理部

♥♥♥♥♥♥♥真誠的關心您♥♥♥♥♥♥♥

諮詢電話：

大慶院區 04-24739595 轉分機_____

中興分院 04-22621652 轉分機_____

