

恙蟲病



什麼是恙蟲

恙蟲俗稱紅蟲，因成蟲體色而得名，成蟲體長約 1 毫米(mm)，不具感染性。傳病多者為幼蟲，體型更小，故不易察覺，通常隱藏在草上，當哺乳動物經過時移至其上，將螫肢插入皮膚，注入消化液，吸取溶解的組織。被咬後傷口形成紅暈，中央潰瘍，數日後形成焦痂(eschar)。

如何被傳染

被具傳染性的恙幼蟲叮咬，經由其唾液使被咬者感染立克次體，恙蟲最常寄生在老鼠身上，再傳染給人，不會直接由人傳染給人。潛伏期為 6 ~21 天，通常為 9~12 天。

被叮咬後的症狀有那些

- 發高燒 39℃-40.5℃，若未治療高燒可持續約 14 天。
- 叮咬處有焦痂。
- 局部淋巴腺發炎腫大。
- 自發病日起 4-5 天開始，軀幹出現紅疹繼而擴散至四肢及臉。
- 常伴有頭痛、出汗、結膜充血。
- 如未治療嚴重時會有血壓下降、意識不清、肺炎、心肌炎、肝功能異常、脾臟腫大。

如何預防

1. 利用個人防禦方法，避免被具感染性的恙蟲附著叮咬：若至郊區、戶外活動或工作必須接觸草叢環境時，應做好個人防護措施，包括穿長袖衣褲、靴子、手套等；每日沐浴換洗全部衣物；如發現手、足等



生效日期：95/08/16
檢閱日期：114/08/07

修正日期：108/08/08
編號：T-Adult-020



部位有被咬的傷口，可塗抹含有抗生素物質的軟膏，減低發病。

2. 消滅恙蟎：在特殊地區如營地周圍的地面、植物、礦坑建築物和地方性疾病的流行區，使用有效的環境衛生用藥。
3. 剷除雜草，尤其在住宅附近，道路兩旁以及田埂等人群接觸頻繁的草地。如情況容許，可用焚燒法減低恙蟎密度。
4. 實施滅鼠工作，以降低人類暴露於恙蟎的感染機會。
5. 身體不適有發燒現象時立即就醫，並抽血檢驗。

中山醫學大學附設醫院-護理部

♥♥♥♥♥真誠的關心您♥♥♥♥♥

諮詢電話：

大慶院區 04-24739595 轉分機_____

中興分院 04-22621652 轉分機_____

恙蟲病病媒

台閩地區恙蟲病的主要病媒為地里恙蟎 *Leptotrombidium deliense* (Walch) 又名德里恙蟎。生活史分為卵、次卵、幼蟲、前若蟲、次若蟲、三若蟲及成蟲 7 個時期。只有幼蟲為寄生性會叮咬人傳播恙蟲病。


地里恙蟎的卵



圖為吸飽之幼蟲



地里恙蟎實際大小比較(圖中細小紅點為恙蟲)



地里恙蟎成蟲

