

止痛貼片 (Durogesic) 使用須知



一、什麼是止痛貼片：

它內含Fentanyl成分，貼在平坦皮膚表面，經皮膚吸收至全身血液循環，最後到達中樞神經系統而緩解疼痛，本院有三種劑型為12.5 mcg/hr、25 mcg/hr及50 mcg/hr。

50 mcg/hr	25 mcg/hr	12.5 mcg/hr

二、止痛貼片使用方法及步驟：

步驟 1： 使用前才撕開包裝袋及移去透明背膜。	步驟 2： 記錄使用日期、時間及使用之劑量。	步驟 3： 選擇適當部位，清潔後待乾燥才可貼上貼片且需按壓 30 秒。(如會脫落可用透氣膠袋左右邊加強固定)	步驟 4： 依醫師指示 2-3 天後撕下對折放入回收袋內，於回診時交回藥局。

三、止痛貼片使用的注意事項：

(一) 疼痛貼片適合位置為：前胸、後背、上半臂、大腿等平坦位置，並不需要



特別貼在疼痛部位，因為此藥會經皮膚吸收至全身血液循環，最後到達中樞神經系統而緩解疼痛。

- (二) 黏貼部位需以清水清潔後擦乾再貼上貼片，並用力按壓黏貼處30秒使其服貼。
- (三) 應避免黏貼在毛髮濃密處，以免導致止痛貼片服貼度不夠，而降低止痛貼片的效果。
- (四) 應避免黏貼在傷口或放射線照射位置。
- (五) 依醫師指示每2-3天更換一次，每次換貼不同部位且填寫於記錄表使用日期，而使用過的廢片應放入回收袋，下次領藥時一起繳回給藥師（記錄表及廢片）。
- (六) 避免泡熱水澡，或將貼片直接接觸熱源(如：熱水袋、電毯等)，因為上述行為都會使貼片的釋放藥量改變。
- (七) 第一次使用不可馬上停用原本已在使用的止痛藥，請依醫護人員指示慢慢停用，因為止痛貼片約在6-12小時開始作用，並在12-24小時達到長期穩定之止痛效果。
- (八) 如在使用止痛貼片後有突發疼痛的情形，再加貼片不會馬上止痛，應加服其它需要時使用之止痛藥，此時請尋求您的醫護人員協助。
- (九) 少數病人在剛開始使用疼痛貼片時會產生想睡、昏眩、呼吸不順等情形，待身體適應藥物濃度後，此情形可緩解，但有上述情況時，您在上下床、爬樓梯、或拿重物時要特別小心。
- (十) 如有噁心、嘔吐、便秘、嗜睡、呼吸減少或困難等不適之副作用，請立即通知醫護人員。

中山醫學大學附設醫院-護理部

♥♥♥♥♥♥♥♥真誠的關心您♥♥♥♥♥♥♥♥

諮詢電話：

大慶院區 04-24739595 轉分機_____

中興分院 04-22621652 轉分機_____

生效日期：99/07/01
檢閱日期：114/12/04

修正日期：108/08/08
編號：T-Adult-140

