

翻滾吧！ 耳石 暈～很～大



生效日期：104/05/08
檢閱日期：114/06/05

修正日期：108/08/08
編號：T-Adult-171



什麼是耳石症？

良性陣發性姿勢性暈眩症(俗稱耳石症)，內耳橢圓囊管壁上有許多微小的鈣質結晶（耳石），因為某些原因（頭部外傷、脫水、壓力大、失眠、感冒、氣壓改變）導致結晶脫落，掉到內耳的三條半規管中。



耳石症的症狀

耳石在半規管中滾動，造成眼震及天旋地轉的錯覺，持續幾秒鐘的暈眩，彎腰、後仰、躺下，起床、翻身及突然轉頭等動作會引起眩暈，並引發自主神經反應，造成心悸、冒冷汗、步態不穩、無力感，以及噁心甚至嘔吐等症狀。

耳石復位術

耳石症最有效的治療方法，就是藉由『耳石復位術』將耳石移出半規管外，有兩種方式可以完成治療。

第一種復位方法：

必須在醫院由專業醫師協助下完成(如下圖)，因為復位時必須配合角度翻轉，角度不正確會造成耳石症狀更明顯。






第二種復位方法：

1. 身體坐於床上，雙腳垂於床緣，身體側躺向一邊傾斜 90 度(右圖 1、3 步驟傾斜)，靜待 15-20 秒，看是否暈眩發生(暈眩代表耳石正在翻滾)，等暈眩感覺消失後，再快速坐起(圖 2、4 步驟)。
2. 眩暈仍無改善，可以反覆右圖 1、2、3、4 步驟，直到暈眩停止。
3. 病人可以在舒適環境自行完成即可，操作簡單又容易。



小秘訣：

每一個動作都要等待約 15-20 秒看是否有暈眩，若無暈眩，就立即換下一個姿勢；若有暈眩，保持姿勢不動，靜待耳石停止滾動暈眩停止，再換至下一個姿勢。



本圖節錄自 UPTODATE

中山醫學大學附設醫院-護理部

♥♥♥♥♥♥♥♥真誠的關心您♥♥♥♥♥♥♥♥

諮詢電話：

大慶院區 04-24739595

轉分機_____

中興分院 04-22621652

轉分機_____

