

Subfam. Ithycerinae.

Auct. K. W. v. Dalla Torre (†) et E. Voß.

- J. L. Leconte, Smiths. Misc. Col. XXVI, nr. 507, 1883, p. 459, 462.
Ithycerides Schoenherr, Gen. et Spec. Curc. I, 1, 1833, p. 5, 6, 246; l. c. V, 1839, p. 360.
Ithycerides Lacordaire, Gen. Col. VI, 1863, p. 380, 405.
Ithycerini J. L. Leconte, Amer. Natural. VIII, 1874.
Curculionidae subfam. *Ithyceridae* J. L. Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 113, 120.
Curculionidae subfam. *Ithycerinae* J. L. Leconte, Smiths. Misc. Col. XXVI, nr. 507, 1883, p. 459, 462. — Blatchley and Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 91.

Ithycerus Schoenh.

- Schoenh. Disp. meth. 1829, p. 55; Gen. et Spec. Curc. I, 1, 1833, p. 246; l. c. V, 1839, p. 360. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 97, 116. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 406. — J. L. Leconte, Smiths. Misc. Coll. XXVI, nr. 507, 1883, p. 462. — Blatchley and Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 92. — Sharp, Journ. New York Ent. Soc. XXVI, 1918, p. 215 (♂ Genitalien).
Ithusycerus Dalm. in Castelnau, Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 291.
Pachyrhynchus W. Kirby, Fn. Bor.-Amer. IV, 1837, p. 203 [non Germ. 1824].

- novoboracensis* Forster, Nov. Spec. Ins. 1771, p. 35 (*Curculio*). — Gmel. in Linné, Syst. Nat. ed.. 13, I, 4, 1790, p. 1798. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 553. — G. H. Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XIII, nr. 91, 1873, p. 447 (*Ithycerus*). — J. L. Leconte, l. c. XV, 1876, nr. 96, p. 121. — Prov. Petit. Fn. Canada I, 1877, p. 512. — Harrington, Canad. Ent. XXVIII, 1896, p. 109 (Fundorte). — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 92, f. 41.
curculionoides Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VII, 1797, p. 136, t. 105, f. 1 (*Rhynchites*). — Gyll. in Schoenherr, Gen. et Spec. Curc. I, 1, 1833, p. 246 (*Ithycerus*); l. c. V, 1, 1839, p. 360. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 291. — Say, Descr. North Amer. Curc. 1831, p. 8; ed. Leconte I, 1859, p. 266. — Heyne & Taschenb. Exot. Käfer 1903—1908 (1908), p. 228, t. 30, f. 53.

Canada bis
 Texas, Lake
 Superior,
 Michigan

- punctatulus* F. Spec. Ins. I, 1781, p. 187 (*Curculio*); Mant. Ins. I, 1787, p. 115; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 461; Syst. El. II, 1801, p. 518. — Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 402, t. 10, f. 119.
- Schoenherri* W. Kirby, Fn. Bor.-Amer. IV, 1837, p. (Pachyrhynchus). — Schoenh. Gen. et Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 369 (*Rhinaria*).
- Biologie: Harris, Journ. Agric. III, 1853, p. 11—16; Trans. New York Agric. Soc. XIII, p. 188. — Walsh & Riley, Amer. Entomol. I, 1869, p. 221—222, fig.; l. c. II, 1869, p. 176, 246; Pract. Ent. II, 1867, p. 82, 107; Trans. New York State Agric. Soc. XVI, p. 331. — Riley, Rep. Ins. Missouri III, 1871, p. 57, fig. — Beutenmüller, Journ. New York Ent. Soc. I, 1893, p. 39.

i

Index Ithycerinorum.

Subfamilia, Genus.

<i>Ithusycerus</i> 1	Ithycerini 1
Ithyceridae 1	Ithycerus 1
Ithycerides 1	
Ithycerinae 1	<i>Pachyrhynchus</i> 1

Species, Varietates.

<i>curculionoides</i> Hbst. 1	<i>punctatulus</i> F. 2
<i>novoboracensis</i> H. 1	<i>Schoenherri</i> Kirby 2