Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 148:

C. Lona

Curculionidae:

Otiorrhynchinae I.



Dr. W. Junk
Verlag für Naturwissenschaften
's-Gravenhage
1936.

Subfam. Otiorrhynchinae.

Auct. **C. Lona.**

Brachyrhynchi div. *Otiorhynchides* Schönherr, Gen. Spec. Curc. I, 1, 1833, p. 17; l. c. II, 2, 1834, p. 551; l. c. VII, I, 1843, p. 257.
Brachyrhynchi: Otiorhynchides Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 150, 155.
Curculionidae subfam. *Curculionides* trib. *Otiorhynchina* C. G. Thomson, Skand. Col. I, 1859, p. 132; l. c. VII, 1865, p. 117; l. c. X, 1868, pp. 162, 171 (pars).
Otiorhynchides Lacordaire, Gen. Col. VI, 1863, p. 144.
Otiorhynchidae Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 271; Diss. Dorpat 1868, 1.
Otiorhynchides Gr. *Otiorhynchides vrais* Seidlitz, Die Otiorhynchiden, Beih. Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 153.
Otiorhynchinae Pascoe, Ent. Monthly Mag. VI, 1869—70 (1869), p. 99—105, fig. (Australien).
Otiorhynchinae Redtenbacher, Fn. Austr. ed. 3, I, 1874, p. CXXVIII, CXXXI; l. c. II, 1874, p. 206.
Otiorhynchides Marseul, Abeille X, 1872—74, p. 1—452 (I); l. c. XI, 1874—75, p. 453—816 (II).
Otiorhynchini J. L. Leconte, Amer. Natural. VIII, 1874, p. 453.
Otiorhynchidae J. L. Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, Nr. 96, 1876, p. XV, 13.
Otiorhynchidae Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, Nr. 507, 1883, p. 433.
Otiorhynchidae trib. *Otiorhynchini* J. L. Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, Nr. 96, 1876, p. 15, 58; Smiths. Misc. Coll. XXVI, Nr. 507, 1883, p. 435, 445.
Otiorhynchini Gr. *Otiorhynchi* J. L. Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, Nr. 96, 1876, p. 58, 59; Smiths. Misc. Coll. XXVI, Nr. 507, 1883, p. 446.
Otiorhynchidae Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 83 (Genera).
Otiorhynchini Sharp, Trans. Roy. Soc. Dublin (2) III, 1886, p. 415—426 (Neuseeland).
Otiorhynchinae Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—91 (1891), p. 87 (Flügel).
Otiorhynchidae Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 81—112 (Japan).
Otiorrhynchines Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1890, p. 475, 524.
Otiorrhynchiens Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1890, p. 525, 534.
Otiorhynchiden Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni 1898; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 775—794 (Balkanhalbinsel).
Brachyrhinidae Lesne, Bull. Soc. Ent. France 1899, p. 143—144 (Mandibularanhänge).

Brachyrhinae trib. *Otiorhynchina* Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 171, 172.
Otiorhynchini Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), Gatt. p. 153, 154; Arten p. 569; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 153, 154, Arten p. 614.
Otiorhynchini Stierlin, Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 206, 208.
Otiorrhynchinae Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 920.
Otiorrhynchinae Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn II, 1912 (1913), (Best.-Tab. 68), p. 3, 7; Fn. Germ. V, 1916, p. 12, 13.
Otiorrhynchini Wagner & Schaufuss in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1915), p. 1033, 1034.
Otiorhynchinae Blatchley & Leng, Rhynchoph. or Weevils North-East America 1916, p. 98, 108; Gatt. Taf. p. 135—137. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 13; Gatt. p. 14, 78.
Curculionidae sousfam. *Brachyrrhinidae* Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1883—88 (1883), p. 20, 32, (1886), p. 228.
Brachyrrhinidae trib. *Brachyrrhininae* Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1883—88 (1883), p. 31, 32, (1886), p. 228.
Brachyrhinae Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 116, 170.
Brachyrhinae Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 546, 551, 566.
Brachyrrhinae trib. *Brachyrrhini* Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 546, 551, 566.

1. Tribus: **Otiorrhynchini.**

Otiorhynchini trib. *Agraphi* J. L. Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, Nr. 96, 1876, p. 958; Smiths. Misc. Coll. XXVI, Nr. 507, 1883, p. 446.
Otiorhynchides Gr. *Otiorhynchides vrais* Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 145, 154.
Otiorrhynchinae trib. *Otiorrhynchini* Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 8, 10; Fauna Germ. V, 1916, p. 14, 15. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 1. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 14.

Gen. **Otiorrhynchus** Germ.

Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 343. — Latr. Règne Anim. ed. 2, 1829, p. 80. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 5, 113; Man. Brit. Col. 1839, p. 214. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 329. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 106. — Redtb. Gatt. Deutsch. Käferfn. 1845, p. 39; Fn. Austr. 1849, p. 39, 421; l. c. ed. 2, 1858, p. CXXI, 742; l. c. ed. 3, I, 1874, p. CXXXII; l. c. II, 1874, p. 208. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XIX, 1847, p. 445—453; Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 341, 359. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 270—272. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 250—310 (Schweiz); Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 344; Beilage Berl. Ent. Zeitschr. V, 1861; Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 358—378 (I); l. c. X, 1866, p. 129—135 (II); l. c. XVI, 1872, p. 321—368 (III); l. c. XVII, 1873, p. 261—292 (Anal. Tabelle); Deutsche Ent.

Zeitschr. XIX, 1875, Heft II, p. 337—354 (IV); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, Nr. 8, 1875 (1876), p. 495; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9, 1883, p. 407, 413, 421 (Best.-Tab. 9, 1883, p. 5, 11); Fn. Col. Helvet. 1869—70, p. 243—248; Neue Deutsch. Schweiz. Ges. Naturwiss. XXVIII, Nr. 3, 1883, p. 363; Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 372—379 (Griechenland, Kleinasien); l. c. 1889, p. 225—231; Fn. Col. Hevet. II, 1886—98 (1891), p. 208; Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 73—74 (Dejeans Sammlung). — Gerst. Arch. f. Nat. XXV, 2, 1859, p. 408. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 451, 500. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 132; l. c. VII, 1865, p. 118; l. c. X, 1868, p. 171. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 185, 625. — Baer, Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 159—160. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 284, Die Otiorhynchen s. str. etc. Berlin 1868, 1 (Beilage Berl. Ent. Zeitschr.); Fn. Balt. ed. 2, 1887—1891 (1890), Gatt. p. 155, Arten p. 569; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 155, Arten p. 615; Ent. Nachr. XX, 1894, p. 73—74 (Nomenklatur). — Marseul, Abeille X, 1873, p. 99—452; Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1891, p. 247. — Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, Nr. 96, 1876, p. 60. — Prov. Petite Fn. Canada I, 1877, p. 506. — Des Gozis, Rev. d'Ent. IV, 1885, p. 126 (Subgenera); Recherch. espèce typ. 1886, p. 29, Nr. LXXIII. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 172; l. c. VI, 1913, p. 304. — Apfelb. Bull. Soc. Zool. France XX, 1895, p. 79—80 (Alpine Region); Glasnik zem. muz. XXXII, 1920, p. 13—28 (Addenda u. Korrekturen); Neue Beitr. syst. Insektenk. 1928—29, p. 36—113. — Daniel, Col.-Studien II, 1898, (1899), p. 35; Münch. Col. Zeitschr. I, 1903, p. 258—260. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 534, 536. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 921. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 45—67 (Best.-Tab. 66, p. 1—23); (Best.-Tab. 67, p. 109—154); XXXII, 1913, (Best.-Tab. 69, p. 25—118); XXXIII, 1914, p. 43—44 (Addenda u. Korrekturen); Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 10; l. c. II, 1913 (1914), p. 129—251 (Best.-Tab. 70, p. 1—123); Fn. Germ. V, 1916, p. 16. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1916), p. 1035. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 1—148. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 14, Arten p. 15—55.

Brachyrhinus Latr. Hist. Nat. Crust. & Ins. III, 1802, p. 200; l. c. XI, 1804, p. 157; Gen. Crust. & Ins. II, 1807, p. 254; Règne anim. ed. II, 1829, p. 80. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Curc. 1854, t. 14, f. 67, t. 15, f. 72. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 33, (1886), p. 228, (1888), p. 423 *(Brachyrhinus)*; Ann. Soc. Ent. Fr. 1887, p. CIX. — Des Gozis, Recherch. espèce typ. 1886, p. 29, Nr. LXXIII. — Seidlitz, Ent. Nachr. XX, 1894, p. 73—74 (Nomenklatur). — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 551, 566. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 1.

Biologie: Keifer (H. H.), Mon. Bull. Dept. Agric. California XX, nr. 7, 1931, p. 470—472. — Essig, Bull. Dep. Agric. California 22, 1933, p. 398—403.

Subgen. **Dodecastichus** Stierl.

Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynch. 1861, p. 14, 15, 18, 29; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 261; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 8—9, 1883, p. 414, 415; Best.-Tab. 9, 1883, p. 18, 19; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 208, 209; in Calwer, Naturgesch. Käf. Europ. 1893, p. 423. — Marseul, Abeille 1872, p. 105. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 569; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 615. — Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895,

p. 624—656, Taf. 15, 16 (Revision); Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 267; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 775; Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 15, 16; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1828, p. 78—84. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 921. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 46—47; Best.-Tab. 66, 1912, p. 2, 3; Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69) p. 25; Fauna Germ. V, 1916, p. 16. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 7. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1832, p. 15—16.

atripes Apfelb. Sitz.-Ber. Akad. Wien. math.-naturwiss. Kl., 127, 1918, p. 168 *(Dodecastichus)*. — Nordalban. Alpen

aurosignatus Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni I, 1889, p. 518; l. c. VI, 1894, p. 219, Note; Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 653, p. 656. — Reitter, Wien Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 33 (Subg. *Dodecastichus*). — Süd-Bosnien, Herzegovina

ab. *obscuripes* Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 653, 656. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 33.

subsp. *vlasuljensis* Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni VI, 1894, p. 219; Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 653, 654, 656; Glasnik zem. Muzeja Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 17; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1929, 9—12, p. 84. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 33. — Montenegro: Volujak, Vlasulja

subsp. *rhodopensis* Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 653, 654, 656. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 33. — Bulgarien: Rhodope (Demir-Kapus), Vitoschaplanina

subsp. *mokragorensis* Apfelb. Glasnik zem. Muzeja Bosn. Herzeg. XL, 1928, p. 58. — S.W.-Serbien

brevipes Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 635, 636, 655 ♂ ♀, t. 15, f. 9; Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. 1920, p. 16; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1928, p. 78. — J. Müller, Ent. Blätt. XII, 1916, p. 104—106. — Süd-Dalmatien, Herzegovina, Montenegro, N.-Albanien

var. *bilekensis* Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 635, 636 ♂ ♀, 655; Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 16; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1928, 5/8, p. 79. — Zentral-Dalmatien, S.-Herzegovina: Bilek

sinjanus Penecke, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 17 ♂ ♀ *(Dodecastichus)*. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 26 ♂. — J. Müller, Ent. Blätt. XII, 1916, p. 104, 106. — Apfelb. Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1928, p. 79.

cirrogaster Apfelb. Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XL, 1928, p. 57. — Mazedonien

consentaneus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 278. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 34, ♂ ♀ *(Dodecastichus)*; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 265; Abeille XI, 1873, p. 772; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 2, 1880, p. 61; l. c. VI, 1880— — Krain, Illyrien

1883, Nr. 8—9, 1883, p. 422, ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 20. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 114, ♂ ♀. — Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 632, 646, ♂ ♀, 656; Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. 1921, p. 43, 44; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1929, p. 81. — Ganglb. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 255. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 30 (Subg. *Dodecastichus*). — Solari, Annali Museo Civ. Stor. Natur. Genova 1915, p. 281—286. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 17.

subsp. *lauri* Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 35, ♂ ♀ (Subg. *Dodecastichus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 264; Abeille XI, 1873, p. 772; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9, 1883, p. 422 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 20 ♂ ♀. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 116. — Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosn. III, 1895, p. 644, 645, 656; Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. 1920, p. 16; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1929, p. 80. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1914 (Best.-Teb. 69), p. 29. — Solari, Annali Museo Civ. Stor. Natur. Genova 1915, p. 283. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 17. — Italien: Toskana

ab. *florentinus* Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 638, 639, 655. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, Best.-Tab. 69, p. 28. — Solari, Annali Museo Civ. Storia Nat. Genova 1915, p. 283. — Porta, Fauna Col. Ital., V, 1932, p. 17.

subsp. *alticola* Solari, Ann. Museo Civ. Storia Nat. Genova 1915, p. 284. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 18. — Italien: Abruzzen (Majella, Gran Sasso, Monte Greco, Monte Amaro)

subsp. *latialis* Solari, Annali Museo Civico Stor. Natur. Genova 1915, p. 283. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 18. — Italien: Rom

subsp. *dimorphus* Solari, Annali Museo Civ. Stor. Natur. Genova 1915, p. 283. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 18. — Italien: Salerno

subsp. *troglavensis* Apfelb. Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1921, p. 45. — Dinarische Alpen

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 41; l. c. XVIII, 1886, p. 285 (Futterpflanzen).

contractus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 32 ♂ ♀ (Subg. *Dodecastichus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 265; Abeille XI, 1873, p. 772; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9, 1883, p. 423; Best.-Tab. 9, 1883, p. 21. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 112 ♂ ♀; l. c. XI, 1873, p. 772. — Südkarpathen

Seidlitz, Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 616 (Subg. *Dodecastichus*). — Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 632, 650 ♂ ♀, 656. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 32 ♂ ♀, (Subg. *Dodecastichus*).

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 39; l. c. XVIII, 1886, p. 284 (Futterpflanzen).

corallipes Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 4, 1890, p. 164 ♂ ♀. — Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien IV, 1896, p. 542. — Daniel, Coleopt.-Studien II, 1898 (1899), p. 49. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 33. — Süd-Bosnien, Herzegovina, Montenegro: Volujak

crivoscianus Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 646, 647, 656; Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 16; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1929, Nr. 9-12, p. 82. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 30. — Montenegro: Krivoščie

subsp. *preslicensis* Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 646, 647, 656. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 30. — Herzegovina: Preslica-planina

subsp. *metkovicensis* Apfelb. Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1921, p. 46. — Dalmatien

dolichocephalus Apfelb. Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1921, p. 46. — Nordalban. Alpen

dolomitae Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 368 ♂ ♀ (Subg. *Dodecastichus*); Deutsche Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 265; Abeille XI, 1873, p. 772; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9, 1883, p. 423; Best.-Tab. 9, 1883, p. 21. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 115 ♂ ♀. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 215 (Subg. *Dodecastichus*). — Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 632, 651 ♂ ♀, 656. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 30 ♂ ♀ (Subg. *Dodecastichus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 18. — Tridentinische Alpen

dryadis Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni VI, 1894, p. 218; Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 646, 647, 656; l. c. IV, 1896, p. 357; Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 16; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1929, Nr. 9-12, p. 81. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 30. — Südbosnien: Volujak

Ephialtes Apfelb. Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXIII, 1911, p. 220; Wiss. Mittheil. Bosn. Herzeg. XIII, 1916, p. 347; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1928, Nr. 5-8, p. 79. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 27, Note. — Westbosnien: Troglav, Dinarische Alpen

Eppelsheimi Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosn. Herzeg. II, 1894, p. 519; l. c., III, 1895, p. 641; Glasnik. zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 17; Neue Beitr. zur syst. Insek- — Südbosnien

tenk. 1929, 9-12, p. 83. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 32. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 18.

subsp. *herbiphagus* Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosn. Herzeg. II, 1894, p. 519; l. c. III, 1895, p. 641; Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 17; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1929, Nr. 9-12, p. 84. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 32. — Bosnien: Treskavica

geniculatus Germ. Reise Dalmatien 1817, p. 240 *(Curculio)*; in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 569 ♂ ♀; l. c. VII, I. 1843, p. 277, ♂ ♀ *(Otiorrhynchus)*. — Rdtb. Fn. Austr. 1849, p. 422; l. c. ed. 2, 1858, p. 743; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 208 (Subg. *Dodecastichus*). — Bach, Käfer-Fn. II, 1854, p. 270, 273. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 503. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 46, ♂ ♀ (Subg. *Dodecastichus*); Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 371; l. c. XVII, 1873, p. 264; Abeille XI, 1873, p. 772; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9, 1883, p. 423 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 21; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 209. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 116. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 616 ♂ ♀, (Subg. *Dodecastichus*). — Calwer, Käferbuch, ed. 5, 1893, p. 423. — Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosn. III, 1895, p. 632, 639, ♂ ♀, 655. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 923, fig. 109 a (Subg. *Dodecastichus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 32 ♂ ♀ (Subg. *Dodecastichus*); Fauna Germ. V, 1916, p. 17, t. 153, f. 13. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 18. — Mitteleuropa: Mähren, Böhmen, Nieder-, Ober-Österreich, Bayern, Alpengebiet, Kroatien, Herzegovina

conspurcatus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9, 1883, p. 422; Best.-Tab. 9, 1883, p. 20. — Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 642, 643, 656.

capellae Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 640, 641, 655.

subsp. *aurotomentosus* Csiki, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 16. — Apfelb. Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 17; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1929, p. 83. — Bosnien

Ganglbaueri Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni I, 1889, p. 519; Wiss. Mittheil. Bosnien II, 1894, p. 519; l. c. III, 1895, p. 640; l. c. VI, 1899, p. 783. — Csiki, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 16.

subsp. *szörenyensis* Csiki, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 16. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 32. — Apfelb. Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 17; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 83. — Banat, Südungarn: Nemét-Bogsán, Serbien

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 40; l. c. XVIII, 1886, p. 285 (Futterpflanzen).

Heydeni Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 39 ♂ ♀ (Subg. *Dodecastichus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 264; Abeille XI, 1873, p. 772, Nr. 10; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9, 1883, p. 422; Best.-Tab. 9, 1883, p. 20. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 119, Nr. 9. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 615 (Subg. *Dodecastichus*). — Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 631, 633 ♂ ♀, p. 655. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 26 ♂ ♀ (Gr. *Dodecastichus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 16. — Italien, Ungarn?, Kroatien, Bosnien, Herzegovina

subsp. *ovoideus* (Solari) Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 26. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 16. — Monte Gargano

inflatus Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 566 ♂ ♀; l. c. VII, 1, 1843, p. 273 ♂ ♀. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 270, 274. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 502. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynch. 1861, p. 37 ♂ ♀ (Subg. *Dodecastichus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 264; Abeille XI, 1873, p. 772; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9, 1883, p. 421; Best.-Tab. 9, 1883, p. 19. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 117. — Rdtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 215 (Subg. *Dodecastichus*). — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 615 (Subg. *Dodecastichus*). — Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 632, 638 ♂ ♀, 655; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1928, p. 80; Mittheil. Königl. Wissenschaftl. Institut Sofia V, 1932, p. 153. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 923, fig. 109 (Subg. *Dodecastichus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 28 ♂ ♀ (Subg. *Dodecastichus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 17. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 17. — Mitteleuropa: Bayern, Schlesien, Böhmen bis Italien und Bulgarien

ab. *inflatoides* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 29 ♂ ♀ (Subg. *Dodecastichus*). — Apfelb. Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 16; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1928, Nr. 5—8, p. 80.

var. *salebrosus* Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 299. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 38; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 421; Best.-Tab. 9, 1883, p. 19. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 117. — Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 638, 639, 655. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 923. — Reitter, — Österreich, Ungarn, Dalmatien

Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 28. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 17.

picipennis Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9, 1883, p. 421; Best.-Tab. 9, 1883, p. 19. — Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 638, 639, 655.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 41; l. c. XVIII, 1886, p. 285 (Futterpflanzen).

mastix Ol. Entom. V, 1807, Nr. 83, p. 376, t. 25, f. 351 *(Curculio)*. — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 569 ♂ ♀; l. c. VII, 1, 1843, p. 275 ♂ ♀ *(Otiorrhynchus)*. — Küster, Käfer Eur. XI, 1847, Nr. 57. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 422; ed. 2, 1858, p. 743; ed. 3. II, 1874, p. 208 (Subg. *Dodecastichus*). — Bach, Käferfauna II, 1854, p. 270, 272. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 501. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 42 ♂ ♀ (Subg. *Dodecastichus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 265; Abeille XI, 1873, p. 773; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9, 1883, p. 424 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 22. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 122. — Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 631, 634 ♂ ♀, 655. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 923, fig. 109 a, (Subg. *Dodecastichus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 27 ♂ ♀ (Subg. *Dodecastichus*); Fauna Germ. V, 1916, p. 17. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 16. — Württemberg, Österreich, Alpengebiet, Krain, Kroatien, Nord-Italien

Ambrosii Bertolini, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXV, p. 221. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119. — Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. 1931, p. 172. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 16.

subsp. *pruinosus* Germ. Reise Dalmatien 1817, p. 237 *(Curculio)*. — Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 634; l. c. VII, I, 1843, p. 276 *(Otiorrhynchus)*. — Stierl. Revis. Eur. Otiorr. 1861, p. 40 ♂ ♀ (Subg. *Dodecastichus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 265; Abeille XI, 1873, p. 773; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9, 1883, p. 424 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 22. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 120. — Rdtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 215 (Subg. *Dodecastichus*). — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 616 (Subg. *Dodecastichus*). — Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 634, 635 ♂ ♀, 655. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 27. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 16. — Istrien: Fiume, Arbe

ab. *scabricollis* Germ. Reise Dalmatien 1817, p. 239 *(Curculio)*. — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 569 ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 277 ♀ *(Otiorrhynchus)*. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhyn. 1861, p. 40; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9, 1883, p. 424; Best.-Tab. 9, 1883, p. 22. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 120. — Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosn. III, 1895, p. 634, 635, 655. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 44. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 16.

ab. *nigrociliatus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 26. — Solari, Annali Museo Civ. Genova 1915, p. 288. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 16.

subsp. *scabrior* (Solari) Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 27. — Solari, Annali Museo Civ. Genova 1915, p. 288. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 16. — Mittel-Italien: Apuaneralpen, Umbrien, Abruzzen

subsp. *perlongus* Solari, Annali Museo Civ. Genova 1915, p. 287. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 17. — Süd-Italien: Campanien (Vallo Lucano, Monte Scuro, M. Centaurino)

moldovensis Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 633, 654 ♂ ♀, 656; Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 16; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 82. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 32, Note. — Banat: Moldava

obsoletus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 31 ♂ ♀ (Subg. *Dodecastichus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 265; Abeille XI, 1873, p. 772; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9, 1883, p. 423; Best.-Tab. 9, 1883, p. 21. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 111. — Rdtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 215 (Subg. *Dodecastichus*). — Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 633, 649 ♂ ♀, 656. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 31 ♂ ♀ (Subg. *Dodecastichus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 18. — Österreich, Krain, Illyrien, Süd-Ungarn

subsp. *versipellis* Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosn. III, 1895, p. 649, 650, 656; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 82. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 31. — N.-W. Bosnien: Klekovaca

subsp. *aethiops* Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 649, 650, 656; Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 16; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 82. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 31. — Bosnien: Vranica

subsp. *vicinus* Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 649, 650, 656. — Reitter, — Süd-Bosnien: Bjelasnica

Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 31. — planina, Treskavica planina, Visočica

subsp. *bulgaricus* Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 649, 650, 656. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 31. — Bulgarien: Vitoša planina

pulverulentus Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 352. — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 559; l. c. VII, I, 1843, p. 264 ♂ ♀. — Küster, Käfer Eur. XXVIII, 1854 ♂. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrh. 1861, p. 29 ♂ ♀ (Subg. *Dodecastichus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 264; Abeille XI, 1873, p. 772; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9, 1883, p. 422 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 20 ♂ ♀. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 109. — Rdtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 215 (Subg. *Dodecastichus*). — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 616 ♂ ♀ (Subg. *Dodecastichus*). — Calwer, Käferbuch, ed. 5, 1893, p. 423. — Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 632, 641 ♂ ♀, 656; Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. 1920, p. 20; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1929, p. 81. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 31 (Subg. *Dodecastichus*); l. c. XXX, 1914, p. 44. — Josef Müller, Ent. Blätter XII, 1916, p. 105; Boll. Soc. Ent. Ital. 1922, p. 35. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 18. — Östliches Mitteleuropa: Niederösterreich, Tirol, Steiermark, Kärnten, Krain, Julische Alpen, Kroatien, Istrien

♀ *interstitialis* Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 353. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 29.

periscelis Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 570 ♂; l. c. VII, 1, 1843, p. 279 ♂. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrh. 1861, p. 29; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 422; Best.-Tab. 9, 1883, p. 20. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 109. — Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 642, 643, 656. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 31.

? *pinetorum* Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 124 *(Curculio)*.

subsp. *dalmatinus* Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 559 ♂ ♀; l. c. VII, 1, 1843, p. 262 ♂ ♀. — Stierl. Revis. Eur. Otior. 1861, p. 33 ♂ ♀ (Subg. *Dodecastichus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 265; Abeille XI, 1873 p. 772; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 423 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 21. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 112. — Rdtb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 215. (Subg. *Dodecastichus*). — Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 632, 644, 656. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 — Montenegro, Dalmatien, Süd-Italien: Calabrien

(Best.-Tab. 69), p. 29 ♂ ♀ (Subg. *Dodecastichus*). — Josef Müller, Ent. Blätter 1916, p. 35; Boll. Soc. Ent. Ital. 1922, p. 35. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 17.

ab. *adumbratus* Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 29; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 422; Best.-Tab. 9, 1883, p. 20. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 111. — Apfelb. Wiss. Mitt. Bosnien III, 1895, p. 642, 643, 656. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 31. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 18.

var. *rumicis* Apfelb. Wiss. Mittheil. Ges. Bosnien III, 1895, p. 642, 643, 656; Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 16; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1929, p. 82. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 31. — Transsylvanische Alpen, Siebenbürgen

? *Hopfgarteni* (Tourn.) Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 422; Best.-Tab. 9, 1883, p. 20. — Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 642, 643, 656. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 31. — Moldau

subsp. *orni* Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 642, 643, 656; Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. 1920, p. 16; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1929, p. 82. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 31. — Josef Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. 1922, p. 35. — Südbosnien, Nord-Herzegovina

subsp. *velezianus* Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 644, 645, 656; Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. 1920, p. 16; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1928, p. 80. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, (Best.-Tab. 69), p. 29. — Mostar, Herzegovina, Velezgeb.

var. *maculosus* Solari, Annali Museo Civ. Genova 1915, p. 289. — Porta, Fauna Col. Ital. 1932 V, p. 17. — Zentral-Italien: Lazio, Elba

var. *rubripes* Solari, Annali Museo Civico Genova 1915, p. 281. — Josef Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. 1922, p. 34. — Apfelb. Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1929, p. 81. — Süddalmatien, S.-West Montenegro

sutomorensis Apfelb. Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 16. — Josef Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. 1922, p. 34.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 44; l. c. XVIII, 1886, p. 286 (Futterpflanzen).

Reiseri Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 631, 636 ♂ ♀, 655; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1929, Nr. 5—8, p. 79. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 27 ♂ ♀ (Subg. *Dodecastichus*). — W. Bosnien: Troglav; Herzegovina: Cozstnica-planina

Speiseri Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni VI, 1894, p. 219; Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 632, 648 ♂ ♀, 656. — Reitter, Wien. — Süd-Herz. Volujak, Morine-

Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 29 (Subg. *Dodecastichus*). — planina, Montenegro

turgidus Germ. Reise Dalmatien 1817, p. 236 *(Curculio)*. — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 269 ♂ ♀; l. c. VII, 1, 1843, p. 277 ♂ ♀ *(Otiorrhynchus)*. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 40; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 424; Best.-Tab. 9, 1883, p. 22. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 120. — Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 631, 635 ♂ ♀, 655; Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 16; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1928, 5—8, p. 79. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 26 (Subg. *Dodecastichus*). — Solari, Annali Museo Civ. Genova 1915, p. 288. — Josef Müller, Ent. Blätter XII, 1916, p. 104, 106; Boll. Soc. Ent. Ital. 1922, p. 35. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 16. — Herzegovina, Zentral-Süd-Dalmatien, Montenegro, Nord-Albanien

subsp. *dulcis* Germ. Reise Dalmatien 1817, p. 238 *(Curculio)*. — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 585 ♂ ♀; Boh. l. c. VII, 1, 1843, p. 310 ♂ ♀. — Stierl. Rev. eur. Otiorrhynchus 1861, p. 41 ♂ ♀ (Subg. *Dodecastichus*); Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 371; l. c. XVII, 1873, p. 265; Abeille XI, 1873, p. 772; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 423; Best.-Tab. 9, 1883, p. 21. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 121. — Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 635; Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 16; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1928, 5—8, p. 79. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 26. — Josef Müller, Entom. Blätter XII, 1916, p. 105. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 16. — Kroatisch- u. norddalmat.-Küsten-Gebiet u. vorgelagerte Inseln

subsp. *velebiticola* Winkler, Cat. Col. Wien 1925, p. 1403. — Velebit: (Lika)

velebiticus Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien III, 1895, p. 635, 636; Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 15; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1928, 5—8, p. 78. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 26.

subsp. *tarentinus* Solari, Annali Museo Civ. Genova 1915, p. 288. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 16. — Süd-Italien: Grottaglie (Taranto),

subsp. *Müllerianus* Winkler, Cat. Col. Wien 1925, p. 1403. — Zentral-Dalmatien:

dinaricus Josef Müller, Ent. Blätter 1916, p. 106. — Apfelb. Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1928, 5—8, p. 79. — Prologgeb.

vranensis Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni VI, 1894, p. 218; Wiss. Mittheil. Bosnien V, 1895, p. — Südbosnien, Herzegovina

637. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 27 ♂ ♀ (Subg. *Dodecastichus*). Vran-planina

Subg. **Otiorrhynchus** Stierlin.

Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 14, 15, 18, 44; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 261; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 8—9, 1883, p. 414, 424; Best.-Tab. 9, 1883, p. 6, 22; Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 209, 210. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1866, p. 232. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 569; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 615. — Calwer, Käferbuch 1893, p. 423. — Apfelb. Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. X, 1898, p. 268; l. c. XXXII, 1920, p. 17; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1928, p. 54—87. — Kuhnt, Illustr. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 907—921. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 47, 48; Best.-Tab. 66, 1912, p. 2, 3; Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 33; Fauna Germ. V, 1916, p. 15, 16, 17. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 7; Arten p. 34—102. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 15; Arten p. 19—36.

Artengruppen.

Aranihus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 52; Best.-Tab. 66, 1912, p. 8 (*Otiorrh. squamifer* Boh.); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab 69), p. 109.

Asphaerorrhynchus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 50; Best.-Tab. 66, 1912, p. 6 (O. *raucus* F.); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 78; Fn. Germ. V, 1916, p. 21.

Cerdelcus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 52; Best.-Tab. 66, 1912, p. 8 (O. *ligneus* Ol.); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 111.

Choilisanus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 50; Best.-Tab. 66, 1912, p. 6 (O. *balcanicus*); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 82.

Delhandus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 52; Best.-Tab. 66, 1912, p. 8 (O. *guttula* Fairm.); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 111.

Dibredus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 49; Best.-Tab. 66, 1912, p. 5 (O. *foveicollis* Hochh.); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 68.

Egydelenus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 52; Best.-Tab. 66, 1912, p. 8 (O. *punctifrons* Stierl.); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 113.

Elechranus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 51; Best.-Tab. 66, 1912, p. 7 (O. *chrysomus* Boh.); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 92.

Eunihus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 52; Best.-Tab. 66, 1912, p. 8 (O. *proximus* Stierl.); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 107.

Fondajenus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 51; Best.-Tab. 66, 1912, p. 7 (O. *Stierlini* Germ.); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 91.

Harpinorrhynchus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 48; Best.-Tab. 66, 1912, p. 4 (O. *dentipes* Graëlls); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 56.

Homorhythmus Bedel, Faune Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 38; (1886), p. 232. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 49; Best.-Tab. 66, 1912, p. 5 (O. *hirticornis* Herbst); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 72.

Jelenantus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 50; Best.-Tab. 66, 1912, p. 6 (O. *affaber* Boh.); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 87.

Lolatismus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 52; Best.-Tab. 66, 1912, p. 8 (O. *porcatus* Herbst); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 102.

Microphalantus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, Best.-Tab. 69, p. 62.

Motilacanus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 96 (O. *calcaratus* Stierl.).

Neobudemus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 51; Best.-Tab. 66, 1912, p. 7 (O. *mandibularis* Rdtb.); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 88.

Nihus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 52; Best.-Tab. 66, 1912, p. 8 (O. *scaber* L.); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 105.

Nilepolenis Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 52; Best.-Tab. 66, 1912, p. 8 (O. *foraminosus* Boh.); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 98.

Otiomimus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 51; Best.-Tab. 66. 1912, p. 7 (O. *Carceli* Gyll.); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 90.

Otiorrhynchus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 48; Best.-Tab. 66, 1912, p. 4 (O. *rhacusensis* Germ.); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 37.

Otismotilus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 51; Best.-Tab. 66, 1912, p. 7 (O. *granulatostriatus* Stierl.); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 96.

Petalorrhynchus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 48, Best.-Tab. 66, 1912, p. 4 (O. *validus* Stierl.); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 55.

Phalantorrhynchus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 49; Best.-Tab. 66, 1912, p. 5 (O. *morio* F.); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 57.

Postaremus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 50; Best.-Tab. 66, 1912, p. 6 (O. *dubius* Ström); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 84.

Rusnepranus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 51; Best.-Tab. 66, 1912, p. 7 (O. *arenosus* Stierl.); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 95.

Stierlinellus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913. Best.-Tab. 69, p. 78, Note (O. *rotundicollis* Stierl.).

Thalycrynchus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 48; Best.-Tab. 66, 1912, p. 4 (O. *Sturanyi* Apfelb.); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 33.

Urorrhynchus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 48; Best.-Tab. 66, 1912, p. 4 (O. *truncatus* Stierl.); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 36.

Zustalestus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 51; Best.-Tab. 66, 1912, p. 7 (O. *rugosostriatus* Goeze); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 91.

Adonis Apfelb. Sitzber. Akad. Wiss. Wien. CXV, 1, Albanien: 1906, p. 1673 ♂ ♀; Neue Beitr. zur syst. Maranai Geb. Insektenk. IV, 1928, Nr. 5—8, p. 60. —

Pic, Echange XXII, 1907, p. 123. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 36 (Gr. *Thalycrynchus*).

affaber Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 315. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrh. 1861, p. 143 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 273; Abeille XI, 1873, p. 780; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 450 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 48 ♂ ♀. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 227 ♂ ♀. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 88 (Gr. *Jelenantus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 30. — Spanien, Sizilien, Algerien, Marokko

albensis Petri, Siebenb. Käferf. 1912, p. 292 *(Lolatismus* Reitter). — Penecke, Col. Centralblatt 1927, p. 321, 322. — Siebenbürgen: Zalatna bei Karlsburg (Alba Giulia)

var. *obductus* Petri, Siebenbürg. Käferf. 1912, p. 292. — Siebenbürgisch. Erzgebirge

alemdaghensis Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 91 (Gr. *Otiomimus*). — Kleinasien: Alem-Dagh

Alluaudi Peyerimhoff, Bull. Soc. Ent. France 1925, p. 104 (Gr. *Cerdelcus*). — Grand Atlas

alutaceus Germ. Reise Dalmatien 1817, p. 235 *(Curculio)*. — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 579 ♂ ♀ *(Otiorrhynchus)*. — Küster, Käfer Eur. XI, 1847, Nr. 59. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 95 ♂ ♀; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 535; Best.-Tab. 9, 1883, p. 133; Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 228 (Subg. *Cryphiphorus*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 175 ♂ ♀. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 632 (Subg. *Cryphiphorus*). — Schneider, Ent. Nachricht. XXII, 1896, p. 321 (var.). — Apfelb. Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 531, 535; Glasnik Muzeja Bosni IX, 1897, p. 452, 454, 455; l. c. X, 1898, p. 268; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 776. — C. & J. Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 107, Note ♂ ♀. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 41 (Gr. *Otiorrhynchus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 21. — Nord-Ost-Italien, Krain

? *coriaceus* Panz. Ent. Germ. 1795, p. 330 *(Curculio)*.

var. *punctatissimus* Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 579 ♂ ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 294 ♂ ♀. — Küster, Käfer Eur. XI, 1847, Nr. 60. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 95; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 535; Best.-Tab. 9, 1883, p. 133. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 175. — O. Schneider, Ent. Nachr. XXII, 1896, p. 322. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, — Dalmatien, Griechenland

1913 (Best.-Tab. 69), p. 41. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 21.

rufofemoratus O. Schneider, Ent. Nachr. XXXII, 1896, p. 323. — Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 610.

var. *vittatus* Germ. Fn. Ins. Eur. XVIII, 1836, tab. 18. — Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 294 ♂ ♀. — Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 95; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 8—9, 1883, p. 535; Best.-Tab. 9, 1883, p. 133. — Reitter, Wien. Ent. Ges. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 41. — Apfelb. Neue Beitr. zur syst. Insektenk. IV, 1929, Nr. 9—12, p. 85. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 21. — Banat, Kroatien, Herzegovina, Dalmatien, Italien?

var. *Kummeri* O. Schneider, Ent. Nachr. XXII, 1896, p. 322. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 41. — Dalmatien

var. *angustior* J. Müller, Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 116 ♂ ♀; l. c. XXIII, 1904, p. 175. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 41. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 21. — Dalmatien: Starigrad, Canale della Montagna, Metkovich

var. *coarcticornis* A. & F. Solari, Riv. Col. Ital. V, 1907, p. 117. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 41, Note. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 21. — Italien: S. Vito, S. Basilio

var. *parcestriatus* Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 610. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 41. — Dalmatien

var. *minor* Stiller, Rovart. Lap. XXVI, 1926, p. 139. — Kroatien

Biologie: Marseul, Abeille X, 1872, p. 175. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 38; l. c. XVIII, 1886, p. 283.

ambigener Penecke, Wien. Ent. Zeit. XXXIX, 1922, p. 172. — Styrien

amissus Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 150; Best.-Tab. 70 (1914), p. 22 (Gr. *Lixorhynchus*). — Apfelb. Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 20; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 90. — Griechenland

amplipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, Bull. p. CLXXXV. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrh. 1861, p. 78 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 266; Abeille XI, 1873, p. 774; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9, 1883, p. 429; Best.-Tab. 9, 1883, p. 27; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 211 ♂ ♀. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 156 ♂ ♀. — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosn. IX, 1897, p. 451, 456; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 533. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 42 (Gr. *Otiorrhynchus*). — Südschweiz: Wallis; Nord-Italien: Piemont, Monte Rosa

Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 14, 34. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 21.

? *amabilis* Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 85 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 267; Abeille XI, 1873, p. 774; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 430 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 28; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 211, Note. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 164 ♂ ♀. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914) (Best.-Tab. 69), p. 42 (Gr. *Otiorrhynchus*). — Piemont

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 38; l. c. XVIII, 1886, p. 283 (Futterpflanzen).

analis Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 30. — Zumpt, Bolet. Soc. Españ. Hist. Nat. 1934, p. 268, 290. — Spanien: Asturien (S. Isidro)

ę **andarensis** Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII (Best.-Tab. 69), 1913, p. 60 ♂ ♀ (Gr. *Phalantorrhynchus*). — Zumpt, Bolet. Soc. Españ. Hist. Nat. 1934, p. 268, 290. — Andara: Picos de Europa

antennatus Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 156 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 274; Abeille XI, 1873, p. 781; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 165 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 63. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 243 ♂ ♀. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 622 ♂ ♀ (Subg. *Otiorrhynchus*). — Daniel, Col.-Studien II, 1898 (1899), p. 39, 41. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 104 (Gr. *Lolatismus*). — Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. LV, Nr. 6, 1923, p. 82. — Siebenbürgen, Transsylvanische Alpen

ab. *Rosenhaueri* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 465; Best.-Tab. 9, 1883, p. 63. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 104.

aratus Daniel, Col.-Studien II, 1898 (1899), p. 37 ♂ ♀. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 103 (Gr. *Lolatismus*). — Transsylvanische Alpen

arcticus O. Fabr. Fn. Groenland. 1780, p. 188 (*Curculio*). — Gerhard, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 424 ♂. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 928, fig. 119 a, b (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 66 (Gr. *Microphalanthus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 20. — Zumpt, Bolet. Soc. Españ. Hist. Nat. 1934, p. 266, 286. — Nord- u. Mittel-Europa: Lappland, Karpathen, Schlesien, Sudeten, Österr. Alpen

alpinus Richter, Suppl. Ins. Eur. 1721, p. 4. — Sharp, Ent. Montly Mag. IX, 1873, p. 290. — Rye, l. c. XII, 1875, p. 82. — Champ. Ent. Monthly Mag. XII, 1875, p. 134, f. — Rye, l. c. p. 134—135. — Bergroth, Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 227. — Fauvel, Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 114

(Brachyrhinus). — Daniel, Col.-Studien II, 1898 (1899), p. 50. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 66.

laevigatus Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1913, p. 292 (non F.). — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 334; Ins. Lapp. I, 1838 (1840), col. 187. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 66.

monticola Dufour, Bull. Soc. Sc. Pau III, 1843, p. 79.

f. *blandus* Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 603; l. c. VII, I. 1843, p. 343 *(Otiorrhynchus)*. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1835, p. 124 *(Curculio)*. — Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 174; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 276; Abeille XI, 1873, p. 783; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 472; Best.-Tab. 9, 1883, p. 70. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 121 ♂ ♀; l. c. X, 1868, p. 172, 174. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 261. — D. Sharp, Ent. Monthly Mag. IX, p. 290. — Rye, Ent. Monthly Mag. XII, 1875, p. 134. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 174, 177 ♂ ♀, t. 157, f. 3; l. c. VI, 1913, p. 304. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2. 1887—91 (1890), Arten p. 574 ♂ ♀; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 623 ♂ ♀ (Subg. *Otiorrhynchus*). — Bally, Ent. Monthly Mag. XXXVIII, 1902, p. 219. — Beare, l. c. XLII, 1906, p. 77—78. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, (Best.-Tab. 69), p. 66.

monticola Champion, Ent. Monthly Mag. XII, 1875, p. 82 (non Germ.); l. c. p. 134.

subsp. *monticola* Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 361. — Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 242. — Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 603 ♂ ♀; l. c. VII, 1, 1843, p. 343 ♂ ♀. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1835), p. 124 *(Curculio)*. — Küster, Käfer Eur. XXIV, 1852, p. 97. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 172 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 276; Abeille XI, 1873, p. 783; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 472 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 70. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 259. — Rdtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 219 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Rye, Ent. Monthly Mag. XII, 1875, p. 134. — G. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 62. — Letzner, Jahresber. Schles. Ges. vaterl. Kultur LXI, 1883 (1884), p. 306. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 574 ♂ ♀; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 623, ♂ ♀ (Subg. *Otiorrhynchus*). — Daniel, Col.-Studien II, 1899, p. 50 ♂ ♀. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 61 ♂ ♀ (Gr. *Phalantor-* Pyrenäen

rhynchus). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 78. — Zumpt, Bolet. Soc. Españ. Hist. Natur. 1934, p. 286. — Horion, Nachtr. zu Fn. Germ. 1935, p. 306.
Biologie: Letzner, Jahresber. Schles. Ges. vaterl. Kultur LXI, 1883 (1884), p. 306. — Xambeu, Moeurs Métam. Ins. VI, 1896, p. 92 (Larve, Puppe). — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 51 (Futterpflanzen). — Reh in Sorauer, Handb. d. Pflanzenkrankh. III, 1906—13 (1912), p. 542 (Schädling an Rhabarber).

ardelaicus Penecke, Col. Centralblatt I, 1927, p. 321 (*proximus*-Gruppe). — Transsylvanien, Siebenbürgen: Trecker-Gebirge

arenosus Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 139 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 272; Abeille XI, 1873, p. 779; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 p. 452; Best.-Tab. 9, 1883, p. 50. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 223. — Daniel, Col.-Studien I, 1891, p. 59. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 96 (Gr. *Rusnepranus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 32. — Ober-Italien: Westalpen
var. *valtellinus* Daniel, Col.-Studien I, 1891, p. 59. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 95. — Veltliner Alpen: Val Aringna
var. (?) *bergamascus* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1893—97, Nr. 3 (1894), p. 110. — Daniel, Col.-Studien II, 1898 (1899), p. 50. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 95. — Bergamasker Alpen: M. Grigna

armadillo Rossi, Mant. Fn. Etr. I, 1792, p. 43; ed. Hellwig I, 1795, p. 381 (*Curculio*). — Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 347 (*Otiorrhynchus*). — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 565 ♂ ♀; l. c. VII, 1, 1843, p. 271 ♂ ♀. — Ghiliani, Ann. Soc. Ent. France 1847, p. 106. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 270, 273. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854, p. 38. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 266; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 76 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 266; Abeille XI, 1873, p. 773; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 429 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 29; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 210. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 502. — Marseul, Abeille X. 1872, p. 154. — Rdtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 217 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni IX, 1897, p. 447, 455; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 532, Note, p. 535, 539. — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 194. — Kuhnt, Ill. — Süd-Deutschland; Ostfrankreich: Strasbourg; Nordschweiz, Nord-Zentral-Italien; Steiermark, Kärnten, Krain

Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 926. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 44 (Gr. *Otiorrhynchus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 18. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCII, 1923, p. 37. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 22.

? *nigrita* Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 133; ed. Hellwig I, 1795, p. 141 *(Curculio)*.

sulphurifer Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VII, 1797, p. 62, t. 98, f. 12 *(Curculio)*.

orbicularis Ol. Entom. V, 1807, Nr. 83, p. 371, t. 31, f. 463 *(Curculio)*. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 77.

scabripennis Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 565; l. c. VII, 1, 1843, p. 271. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 266; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 82 ♂ ♀ (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 266; Abeille XI, 1873, p. 773; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 429; Best.-Tab. 9, 1883, p. 24; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 211 ♂ ♀. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 161. — Rdtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 209 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni IX, 1897, p. 449; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 532. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 44.

rhaeticus Stierl. ~~Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 3;~~ Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 272; Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 358; l. c. XVI, 1872, p. 364; l. c. XVII, 1873, p. 266; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 8—9, 1883, p. 429 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 27; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 211 ♂ ♀. — Marseul, Abeille X, 1872 (1873), p. 155; l. c. XI, 1873, p. 773, 774. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 926 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 44.

multipunctatus Stierl. Berl. Ent. Zeitschrift XVI, 1872, p. 340.

ventricola Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 249.

var. *obsitus* Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 567 ♂ ♀; l. c. VII, 1843, p. 274 ♂ ♀. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 81; Berl. Ent. Zeitschrift XVII, 1873, p. 266; Abeille XI, 1873, p. 774; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 428 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 26. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 160. — Rdtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 217 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 44. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCII, 1923, p. 38. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 22. Süd-Tirol, Krain, Illyrien

latissimus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 79 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 266; Abeille XI, 1871, p. 774; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 427; Best.-Tab. 9, 1883, p. 25. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 158. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 617 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 44.

collinus Gredler, Käfer Tirol II, 1866, p. 329.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 38; l. c. p. 44 *(rhaeticus)*; l. c. p. 44 *(scabripennis)*; l. c. XVIII, 1886, p. 283; l. c. p. 286 *(scabripennis)*; l. c. p. 286 *(rhaeticus)*.

articulatus Daniel, Col.-Studien II, 1898 (1899), p. 45. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 99 (Gr. *Nilepolemis*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 32. — Tirol, Lombardei, Monte Grigna, Monte Codeno

athosiensis (Daniel) Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, Best.-Tab. 69, p. 83 (Gr. *Asphaerorrhynchus*). — Mazedonien: Athos

aurifer Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 262 ♂ ♀. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 57 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 266; Abeille XI, 1873, p. 773; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 427; Best.-Tab. 9, 1883, p. 25 .— Marseul, Abeille X, 1872, p. 135. — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni IX, 1897, p. 455. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 45 (Gr. *Otiorrhynchus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCII, 1923, p. 39. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 22. — Italien: Korsika, Sardinien, Sizilien, Istrien; Herzegovinische Küste, Dalmatien, Montenegrinische Küste, Jonische Inseln, Türkei

Lefebvrei Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 263 ♂ ♀. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 58 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 340; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 427; Best.-Tab. 9, 1883, p. 25. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 136. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 45. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCII, 1923, p. 39.

var. *morulus* Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 274. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 57 ♂ ♀; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 428; Best.-Tab. 9, 1883, p. 26. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 135. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 45. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCII, 1923, p. 39. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 22. — Sizilien

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 39; l. c. XVIII, 1886, p. 284 (Futterpflanzen).

auropunctatus Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 564 ♂ ♀; l. c. VII, 1, 1843, p. 269 ♂ ♀. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Curc. 1854, t. 15, f. 70. — Stierl. Revis. Otiorrhynchus 1861, p. 89 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 266; Abeille XI, 1873, p. 773; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 8—9, 1883, p. 430; Best.-Tab. 9, 1883, p. 28. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 169 ♂ ♀. — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni IX, 1897, p. 456; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 531. — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 194. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, (Best.-Tab. 69), p. 45 (Gr. *Otiorrhynchus*). — Fowler, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 184. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCII, 1923, p. 40. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 23. — Irland, Schottland, Südfrankreich, Pyrenaeen

obsimulatus Dufour, Bull. Soc. Sc. Pau III, 1843, p. 80; Act. Soc. Linn. Bordeaux XVII, 1851, p. 343.

var. *rufipes* Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 269 ♀. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 89; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 430; Best.-Tab. 9, 1883, p. 28. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 169. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 45. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCII, 1923, p. 40. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 23. — Central- u. Ost-Pyrenaeen

coryli Chevr. in Grenier, Cat. Col. France 1863, p. 107. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 349; Abeille XI, 1873, p. 774; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 431; Best.-Tab. 9, 1883, p. 29. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 170. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 45. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCII, 1923, p. 40.

var. *fossor* Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 280. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1816, p. 89. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 45. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCII, 1923, p. 41. — Pyrenaeen: Val d'Aran

Lafertei Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. 1861, p. 90. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 45. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCII, 1923, p. 41.

var. *tumefactus* Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 90 ♂ ♀ (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 269; Abeille XI, 1873, p. 776; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 430; Best.-Tab. 9, 1883, p. 28. — Ost-Pyrenaeen

Marseul, Abeille X, 1872, p. 170. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 45. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCII, 1923, p. 40.

Biologie: Grenier, Cat. Col. France 1867, p. 107 *(coryli)*. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 170 *(coryli)*. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 39; l. c. XVIII, 1886, p. 284 (Futterpflanzen). — Champion, Ent. Monthly Mag. XXXI, 1895, p. 133, 134. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon XLIX, 1902 (1903), p. 32 (Larve, Puppe). — Champion & Lloyd, Ent. Monthly Mag. XXI, 1910, p. 2, t. 1, f. 2. — W. E. Sharp, Ent. Monthly Mag. XLVII, 1910, p. 33—34 (Futterpflanzen).

auropupillatus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 47 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 267; Abeille XI, 1873, p. 774; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 432; Best.-Tab. 9, 1883, p. 30. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 126 ♂ ♀. — A. & F. Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. XL, 1908, p. 261. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 47 (Gr. *Otiorrhynchus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 20, 23. — Italien

azaleae Penecke, Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 17 ♂ ♀. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 106 (Gr. *Nihus*). — Horion, Nachtr. zu Fn. Germ. 1935, p. 307. — Steiermark: Stabalpe; Kärnten: Koralpe

claviger Penecke, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 17.

subsp. *Gredleri* Daniel, Col.-Studien II, 1898 (1899), p. 46. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 106. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 35. — Tridentinische Alpen: Judicarien

subsp. *Spaethi* (Ganglb.) Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 107. — Tridentinische Alpen: Pasubio; Venetianeralpen: M. Cavallo

balcanicus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 305 (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschrift XVII, 1873, p. 289; Abeille XI, 1873, p. 797; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 554; Best.-Tab. 9, 1883, p. 152. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 412. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 83 (Gr. *Choilisanus*). — Kaukasus: Araxestal, Kleinasien, Syrien, Griechenland

Beauprei A. & F. Solari, Ann. Museo Civ. Genova XLI, 1904, p. 536. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 88 (Gr. *Jelenantus*). — Tunis: Bizerta

Vaulogeri A. & F. Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXV, 1903, p. 163 (non Pic).

Bertarinii Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1893—97, Nr. 3 (1894), p. 109 ♂ ♀. — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni IX, 1897, p. 456; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 533, 535. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 43 (Gr. *Otiorrhynchus*). — Porta ,Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 21. — Lombardei: Monte Grigna (Bergamasker Alpen)

bisulcatus F. Spec. Ins. I, 1781, p. 198; Mant. Ins. I, 1787, p. 122; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 486; Syst. El. II, 1801, p. 540 *(Curculio)*. — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 206; l. c. IV, 1789, p. 276. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1776. — Ol. Encycl. méthod. V, 1790, p. 557. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 516. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 333. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 181 *(Brachyrhinus)*. — Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 346 *(Otiorrhynchus)*. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 49 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 267; Abeille XI, 1873, p. 775; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 431; Best.-Tab. 9, 1883, p. 29. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 128. — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 269; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 776. — Lomnicki, Bull. internat. Akad. Sc. Krakau 1903 (1904), p. 166. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 927. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 46 (Gr. *Otiorrhynchus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 23. — Ostgalizien, Nord-Italien: Karstgebiete; Kroatien, Bosnien, Herzegovina, Serbien, Bulgarien

carinthiacus Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 181 *(Brachyrhinus)*. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 46.

carinthiacus Germ. Reise Dalmatien 1817, p. 246 *(Curculio)*; Ins. Spec. novae I, 1824, p. 349 *(Otiorrhynchus)*. — Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 557 ♂ ♀; l. c. VII, 1843, p. 261. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 422; l. c. ed. 2, 1858, p. 743; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 209 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Küster, Käfer Eur. XXVIII, 1854, Nr. 74. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 501.

cinifer Germ. Reise in Dalmatien 1817, p. 245; Mag. Ent. III, p. 415 *(Curculio)*. — Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 49.

longicollis Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 557 ♂; l. c. VII, I, 1843, p. 262 ♂ ♀. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 422; l. c. ed. 2, 1858, p. 743; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 209 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Küster, Käfer Eur. XXVIII, 1854, Nr. 75. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 501. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 49; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI,

1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 431; Best.-Tab. 9, 1883, p. 29. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 618. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 46.

vochinensis Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 49; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 8—9, 1883, p. 431; Best.-Tab. 9, 1883, p. 29. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 46.

ab. *bisulcatoides* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 46. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 23.

ab. *subauriculus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 46.

subsp. (?) *istriensis* Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 350. — Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 633; Boh. l. c. VII, I, 1843, p. 261. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 49; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 431; Best.-Tab. 9, 1883, p. 29. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 128. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 46. — Apfelb. Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1929, p. 86. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 23. — Istrien

var. *margaritifer* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 46. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 23. — Süditalien

Biologie: Redtb. Fn. Austr. ed. 3, 1874, II, p. 209 (v. *longicollis*). — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, p. 38 (v. *longicollis*). — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 39 (*bisulcatus* u. var. *longicollis*); l. c. XVIII, 1886, p. 284 (Futterpflanzen).

Blanchardi Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien IV, 1896, p. 540, ♂ ♀, 543; Glasnik zem. Muz. XXXII, 1920, p. 18; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1929, p. 86. — J. Müller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 13. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 65 (G. *Microphalantus*). — Herzegovina: Babaplanina, (Bilek), Velez

Bohemani Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 184; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 467; Best.-Tab. 9, 1883, p. 65. — Daniel, Col.-Studien II, 1898 (1899), p. 42. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 105 (Gr. *Lolatismus*); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 141; Best.-Tab. 70, 1914, p. 13. — Rhodope-Gebirge, Rhilo Dagh; Kaukasus

brevipilis Apfelb. Akad. Wien. Anz. Nr. 9, 1918, p. 4 (*rugosostriatus*-Gruppe). — Süd-Albanien

brutius (Baudi) Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 34, ♀. — Apfelb. Neue Beitr. zur syst. Insektenk. IV, 1928, p. 63. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, — Italien: Abruzzen, Lazio, West-Albanien:

	p. 19. — Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. 1932, p. 128.	Mal i Sheit, Munela-gebirge
Bugnioni	Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 10 (1893), p. 410. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 72 (Gr. *Homorythmus*).	Tunis
cadoricus	Daniel, Col.-Studien I, 1891, p. 57 ♂ ♀. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 102 (Gr. *Nilepolemis*). — Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. 1921, p. 117. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 34.	Tridentinische Alpen: Rollepass, Cima Dodici
caesipes	Rey, Opusc. Ent. IX, 1859, p. 21. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 73; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 268; Abeille XI, 1873, p. 775; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 438. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 150. — Desbr. Frelon III, 1894, p. 86 ♂ ♀. — Sainte-Claire Deville, Abeille XXX, 1904, p. 195; Bull. Soc. Sc. Nat. Haute-Marne II, 1905, p. 127. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 57 ♂ ♀ (Gr. *Harpinorhynchus*). — Hustache, Bull. Soc. Ent. France 1917, p. 280; l. c. 1923, p. 71. — Planet, Bull. Soc. Ent. France 1918, p. 226.	Französische Alpen: Provence
cancasanus	Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 62 ♂ ♀ (Gr. *Phalantorrhynchus*). — Zumpt, Bolet. Soc. Españ. Hist. Natur. XXXIV, Nr. 4—5, 1934, p. 265, 267.	Asturien: Cancas
Carceli	Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 355. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 128 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 272; Abeille XI, 1873, p. 779; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 457; Best.-Tab. 9, 1883, p. 55; Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 372. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 216 ♂ ♀. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 90 (Gr. *Otiomimus*). — Apfelb. Glasnik zem. Muz. Bosni Herzeg. XXXII, 1920, p. 26; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1929, p. 110.	Kleinasien, Anatolien (Ismir), Syrien, Griechenland, Keos, Mykonos, Chios
	Desbrochersi Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 457; Best.-Tab. 9, 1883, p. 55. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 90.	
	? *graniger* Reiche et Saulcy, Ann. Soc. Ent. France 1857, p. 694. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 90 (Gr. *Otiomimus*). — Apfelb. Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 26; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. Nr. 9—12, 1929, p. 111.	
carcelioides	Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 376 — Reitter, Wien.. Ent. Zeit.	Griechenland: Korax-

XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 90 (Gr. *Neobudemus*). — Gebirge

cardiniger Host in Jacquin, Collect. bot. III, 1789, p. 295, Nr. 3, t. 23, f. 3 *(Curculio)*. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 425; Best.-Tab. 9, 1883, p. 23 *(Otiorrhynchus)*. — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni IX, 1897, p. 455; l. c. X, 1898, p. 268; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 776. — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschrift 1898, p. 352, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 39 ♂ ♀ (Gr. *Otiorrhynchus*). — J. Müller, Ent. Blätter 1916, p. 107. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 20. — Istrien: Illyrien, Kroatien. Küstenland, Bosnisch-Herzegovinisches Karstgebiet: Ojeceniča planina, Livno, Dreznica, Mostar, Velez, Dalmatien

goerzensis Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VII, 1797, p. 52, t. 98, f. 9 *(Curculio)*. — F. Syst. El. II, 1801, p. 522. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1803, p. 165 *(Brachyrhinus)*. — Panz. Fn. Ins. Germ. IX, 1809, Heft 104, t. 6 *(Curculio)*. — Germ. Reise Dalmatien 1817, p. 246. — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 552, ♂ ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 257 ♂ ♀ *(Otiorrhynchus)*. — Küster, Käfer Eur. XI, 1847, Nr. 54. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 45 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 265; Abeille XI, 1873, p. 773; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 425; Best.-Tab. 9, 1883, p. 23. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 124. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 216 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni IX, 1897, p. 452, 454; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 537. — Dalmatien

ab. *pseudogoerzensis* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 39. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 20.

subsp. *cattarvensis* (Ziegler) Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 45. — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 268; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 776; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1929, p. 85. — Süd-Dalmatien: Bocche di Cattaro, Orien

catharvensis Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 39. — (Vucijeb.), Montenegro

subsp. *metokianus* Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien IV, 1896, p. 543 ♂ ♀; Glasnik Muzeja Bosni IX, 1897, p. 455. — J. Müller, Münch. Kol. Zeitschr. VI, 1904—06, p. 210; Ent. Blätter 1916, p. 108. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 40 (Gr. *Otiorrhynchus*). — Bosnien, Herzegovina, Montenegro: Gacko (Metokin), Bilek Durgapass (Bukovioch)

methohiensis J. Müller, Ent. Blätter 1916, p. 108.

subsp. *brattiensis* J. Müller, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 209; Ent. Blätter 1916, p. 108. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 40 (Gr. *Otiorrhynchus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 20. — Dalmatien: Brazza (Bezmekstan), Lesina

lesinicus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 40. — J. Müller, Ent. Blätter 1916, p. 108. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 20.

subsp. *issensis* J. Müller, Ent. Blätter 1916, p. 108. — Insel Lissa

subsp. *brevitarsis* Apfelb. Glasnik d. Kroat. Natur. Ges. Zagr. XXXIV, 1922, p. 21. — S. W. Bosnien (alp. Reg.)

Biologie: Erber, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XV, 1865, p. 945 b *(goerzensis)*.

Caroli Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 10 (1893), p. 408; l. c. IX, 3, 1894, p. 114 (Subg. *Tournieria*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 73, 82 (Gr. *Choilisanus*). — Kaukasus: Abchasien, Pontische Alpen.

carpathicus Daniel, Col.-Studien II, 1898 (1899), p. 42. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1903, p. 229; l. c. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 107 (Gr. *Eunihus*). — Transsylvanische Alpen: Buczes Negoi; Rosenauergebirge

carpathorum Csiki, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 16. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 34. — Apfelb. Glasnik zem. Muz. XXX, 1918, p. 61; l. c. XXXII, 1920, p. 17; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. IV, 1928, p. 61; l. c. 1929, Nr. 9—12, p. 84 — Ungarn: Südkarpathen, Herkulesfurdo, Malomdiz, Götzenberg, Lotriora-völgy, Girku, Nagy-Arpas, Siebenbürgen, Kerzegebirge; Bosnien: Bjelaschnitzer Planina Albanien

caucasicus Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 321 ♂ ♀; l. c. XVII, 1873, p. 271; Abeille XI, 1873, p. 778; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 557; Best.-Tab. 9, 1883, p. 155. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 84 (Gr. *Choilisanus*). — Kaukasus

Schoenherri Stierl. Deutsche Ent. Zeitschrift XXI, 1877, p. 180 (Subg. *Tournieria*); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1883, Nr. 8—9, p. 558; Best.-Tab. 1883, p. 156.

kubanensis Reitter, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 235 ♂ ♀.

ab. *semigranulosus* Retowski, Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 134. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 43. — Westkaukasien

ab. *viridisetosus* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. XI, 1903—09, Nr. 1 (1903), p. 56.

— Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 84.

caudatus Rossi, Mant. Fn. Etr. I, 1792, p. 40, t. 2, f. 3; ed. Hellwig I, 1795, p. 379 *(Curculio)*. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VII, 1797, p. 66, t. 98, f. 15. — Ol. Entom. V, 1807, Nr. 83, p. 369, t. 19, f. 236. — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 554 ♂ ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 258 ♂ ♀ *(Otiorrhynchus)*. — Küster, Käfer Eur. XI, 1847. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. Brit. Ins. Fam. Curc. 1844—52, p. 90. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 48 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 265; Abeille XI, 1873, p. 773; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 425; Best.-Tab. 9, 1883, p. 23; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 210. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 127 ♂ ♀. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 216 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni IX, 1897, p. 455. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 7; l. c. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 42 (Gr. *Otiorrhynchus*). — Gortani, Riv. Col. Ital. I, 1903, p. 123. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 926, fig. 117 b, c. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 21. — Italien: Emilia, Toskana, Lazio

bisulcus Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 242.

ab. *albomaculatus* Gortani, Riv. Col. Ital. I, 1903, p. 127. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 42. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 21. — Toskana

subsp. *transpadanus* Gortani, Riv. Col. Ital. I, 1903, p. 128. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1903, p. 21. — Südlich. Alpenzug

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 39; l. c. XVIII, 1886, p. 284 (Futterpflanzen).

caunicus Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 336 ♂ ♀; l. c. XVII, 1873, p. 267; Abeille XI, 1873, p. 775; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 433 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 31 ♂ ♀. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 749. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, Best.-Tab. 69, p. 49 ♂ ♀ (Gr. *Otiorrhynchus*). — Spanien: Moncayo

amputatus Chevr. Abeille X, 1872, p. 174; Nouv. et Faits 1872, p. CXXXII.

cephalonicus Pic, Echange XXVIII, 1902, p. 57. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 36 (Gr. *Thalycrynchus*). — Apfelb. Neue Beitr. zur syst. Insektenk. IV, 1928, p. 70. — Griechenland, Cephalonia, Samos?

chalceus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 127 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 272; Abeille XI, 1873, p. 779; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 459; Best.-Tab. 9, 1883, p. 57; Fn. — Tirol, Salzburg, Tridentin. u. Venetianer-Alpen.

Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 217. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 215 ♂ ♀. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 218 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 86, 95 (Gr. *Elechranus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 30, 32. — Horion, Nachtr. zu Fn. Germ. 1935, p. 307. — Steiermark, Kärnten, Krain, Julische Alpen

spoliatus Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 322; l. c. XVII, 1873, p. 272; Abeille XI, 1873, p. 779; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 459; Best.-Tab. 9, 1883, p. 57. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 752. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 622 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 929 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 95, Note; Fn. Germ. V, 1916, p. 23, Note. — Steiermark, Kärnten, Krain

Chaudoiri Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XXIV, I, 1851, p. 77. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 342 ♂ ♀; l. c. XVII, 1873, p. 274; Abeille XI, 1873, p. 781; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 463; Best.-Tab. 9, 1883, p. 61. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 212 ♂ ♀. — Daniel, Col.-Studien II, 1898 (1899), p. 41. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 103 (Gr. *Lolatismus*). — Zentraler Kaukasus, Russisch-Armenische Gebirge

Chobauti Hustache, Bull. Soc. Ent. France 1920, p. 18. — France: Vaucluse (Mont Ventoux)

chrysomus Boh. in Schönherr, Gen. et Spec. Curc. VII, 1843, p. 304, Nr. 96. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 129 ♂ ♀; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 449; Best.-Tab. 9, 1883, p. 47. — Friv. A. Király Magy. 1866, p. 208, t. 11, f. 12. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 217. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 620 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 94 (Gr. *Elechranus*). — Ungarn, Banat

banaticus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 121; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 272; Abeille XI, 1873, p. 779; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 449; Best.-Tab. 9, 1883, p. 47. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 207. — Friv. A. Király magyar 1866, p. 206, t. 11, f. 9. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 620 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 70), p. 94.

? *Ludyi* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87, Nr. 1 (1884), p. 37. — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 266; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 774. — Ungarn

civis Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 59 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 276; Abeille XI, 1873, p. 774; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 428; Best.-Tab. 9, 1883, p. 26. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 137 ♂ ♀. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 44 (Gr. *Otiorrhynchus*). Südfrankreich: Seealpen

clavalis Apfelb. Glasnik A. Kroat. Natur. Ges. Zagr. XXXIV, 1922, p. 21 (*piliger*-Gruppe). Griechenland

clavipes Bonsd. Hist. Nat. Curc. Suec. II, 1785, p. 40, fig. 36 *(Curculio)*. — Ol. Encycl. méthod. V, 1790, p. 554; Entom. V, 1807, Nr. 83, p. 368, t. 18, f. 229. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1796. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1803, p. 176 *(Brachyrhinus)*. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 927. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 50 ♂ ♀ (Gr. *Otiorrhynchus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 19. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 49. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 24. — Horion, Nachtr. zu Fn. Germ. 1935, p. 306. — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXVI, 1933, p. 218—276. Schweden, England, Deutschland, Frankreich, Schweiz, Lombardei? Piemont?

morio Payk. Monogr. Curc. Suec. 1782, p. 99 u. 96; Fn. Suec. III, 1800, p. 294 *(Curculio)*.

tenebricosus Ol. Encycl. Méthod. V, 1790, p. 552; Entom. V, 1807, Nr. 83, p. 370 *(Curculio)*. — ? Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 174 *(Brachyrhinus)*. — Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 295 *(Otiorrhynchus)*.

♂ *niger* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 297 *(Curculio)*.

tenebricosus Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 288 *(Curculio)*; in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 562 ♂; Boh. l. c. VII, I, 1843, p. 268 ♂ ♀ *(Otiorrhynchus)* (non Herbst, nec Ol.). — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 270, 272. — Küster, Käfer Eur. XXVIII, 1854, Nr. 79. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 749; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 216 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Stierl. Berl. Ent. Ztschr. II, 1858, p. 263; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 70 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 269; Abeille XI, 1873, p. 776; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 435, ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 33; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 212 ♂ ♀. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 501. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 119 ♂ ♀; l. c. X, 1868, p. 171, 173. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 147 (excl. synon.). — Rye, Ent. Monthly Mag. IX, 1873, p. 269. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 35 ♂ ♀ *(Brachyrhinus)*; (1886), p. 228 (Subg. *Otiorrhyn-*

chus). — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 127. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 571 ♂ ♀; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 618 ♂ ♀ (Subg. *Otiorrhynchus*). — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 174, 175 ♂ ♀. — Everts, Tijdschr. Ent. XXXIII, 1890, p. 354, t. 15, f. 2 (Prosternum); Col. Neerl. II, 1903, p. 537, fig. 115, 567, fig. 115 *(Brachyrhinus)*. — Desbr. Frelon III, 1894, p. 91 ♂, 93 ♀.— Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 537. — Edwards, Ent. Monthly Mag. XXXVIII, 1902, p. 240. — Sharp, Proc. Cambr. Nat. Hist. Soc. XII, 1903, p. 199—200

? *Walloni* Smith, Ent. Monthly Mag. VI, 1869, p. 136.

? *rufipes* Sturm, Ins. Cab. IV, f. 18.

var. *fuscipes* Ol. Entom. V, 1807, Nr. 83, p. 372, t. 31, f. 464 *(Curculio)*. — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 562 ♂ ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 266 ♂ ♀ *(Otiorrhynchus)*. — Küster, Käfer Eur. XXVIII, 1854, p. 78. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 270, 272. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 749; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 216 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 430. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 501. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 261; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 66 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 269; Abeille XI, 1873, p. 776; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 8, 1879, p. 433; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 437 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 35; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 213 ♂ ♀. — Crotch, Entomol. III, 1866, p. 136. — Rye, Ent. Monthly, Mag. II, 1866, p. 181, 234; l. c. VI, 1869, p. 108, 233. — F. Smith, l. c. II, 1866, p. 232; l. c. VI, 1869, p. 135. — Sharp, l. c. VI, 1869, p. 107. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 144. — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschrift 1888, p. 127. — Seidlitz, Fauna Transsylvanica 1888—1891 (1891), Arten p. 619 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Desbr. Frelon III, 1893—94, Nr. 12 (1894), p. 90 ♂, 93 ♀. — J. Edwards, Ent. Monthly Mag. XXXVIII, 1902, p. 240. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 567 *(Brachyrhinus)*. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 927. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 54 ♂ ♀ (Gr. *Otiorrhynchus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 19, t. 153, f. 16. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 47. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 26. — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXVI, 1933, p. 218—276. — Horion, Nachtr. zu Fn. Germ. 1935, p. 306. Mitteleuropa

ater Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 118; Man. Brit. Col. 1839, p. 242 *(Otior-*

rhynchus). — Stierl. Rev. Europ. Otiorrhynchus 1861, p. 66.

ab. *bavaricus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 54. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 48. — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXVI, 1933, p. 218—276.

ab. *Heynei* Voss, Deutsche Ent. Zeitschr. 1919, p. 405. — Cl. Müller, Ent. Blätter XXXI, 1935, p. 75.

var. (?) *substriatus* Silberm. Revue Ent. I, 1833, Descr. Nr. 7, p. 2. — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 563 ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 269 ♀. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 270, 273. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 502. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 265; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 71 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 269; Abeille XI, 1873, p. 776; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 434 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 32; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 212. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 148. — Fauvel, Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 247; l. c. XIV, 1895, p. 113 *(Brachyrhinus)*. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 927 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 50. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 49. — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXVI, 1933, p. 229—230. — Elsaß, Jura

alsaticus Silberm. Rev. Ent. I, 1833, t. 5.

var. *fagi* Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 563 ♂ ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 269 ♂ ♀. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 24, Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 66; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 437; Best.-Tab. 9, 1883, p. 35; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 213. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 144. — Smith, Ent. Monthly Mag. VI, 1869, p. 135. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 619. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 927. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 50. — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXIV, 1931, p. 295. — Südfrankreich, Lothringen

var. *erythropus* Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 267. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 68 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 371; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 437 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 35; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 214. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 146. — Desbr. Frelon III, 1893—94, Nr. 12 (1894), p. 90 ♂. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 927. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 50. —

Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXVI, 1933, p. 218—276.

var. *lugdunensis* Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 268 ♂ ♀. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 69 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 269; Abeille XI, 1873, p. 775; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 433 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 31; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 212, ♂ ♀. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 147. — Fauvel, Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 247. — Desbr. Frelon III, 1894, p. 91 ♂. — Reh, Ins.-Börse XIX, 1902, p. 77. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 49. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 52. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 24. — Horion, Nachtr. zu Fn. Germ. 1935, p. 305. — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXVI, 1933, p. 218—276. Frankreich

var. *sanguinipes* Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 296. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 72 ♂ ♀ (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 269; Abeille XI, 1873, p. 776; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 437 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 35. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 150. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 54 (Gr. *Otiorrhynchus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 19. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 48. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 26. — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXVI, 1933, p. 218—276. — Horion, Nachtr. zu Fn. Germ. 1935, p. 306. Frankreich, Westalpen, Italien: Appennin

haematopus Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 263 (non Boh.); Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 67 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 268; Abeille XI, 1873, p. 775; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 436; Best.-Tab. 9, 1883, p. 34; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 213. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 145 ♂ ♀. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 216 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 618 (Subg. *Otiorrhynchus*). — ? Desbr. Frelon III, 1893—94, Nr. 12 (1894), p. 86 ♂, 92 ♀. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 54, Note. — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXVI, 1933, p. 218—276.

var. *francolinus* Schauf. Col. Hefte II, 1867, p. 22. — Harold, l. c. X, 1872, p. 214, 220. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 364; Abeille XI, 1873, p. 775; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 8, 1879, p. 433; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 437

♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 35; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 213, Note ♂ ♀. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 816. — Desbr. Frelon III, 1894, p. 89 ♂. — Fauvel, Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 113 *(Brachyrhinus)*. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 927. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 50. — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXVI, 1933, p. 218—276.

elongatus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 65; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 341. — Schauf. Col. Hefte II, 1867, p. 22. — Fauvel, Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 114. — Harold, Col. Hefte X, 1872, p. 214, 220. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 50.

longulus Marseul, Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 247; Abeille X, 1872, p. 143; l. c. XI, 1873, p. 816.

var. *dilatipes* Guilleb. Echange I, 1885, Nr. 8, p. 2. — Fauvel, Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 247; l. c. XIV, 1895, p. 113 *(Brachyrhinus)*. — Desbr. Frelon III, 1893—94, Nr. 12 (1894), p. 90 ♂ ♀, 93 ♀ *(Otiorrhynchus)*. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 49 (Gr. *Otiorrhynchus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 52. — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXVI, 1933, p. 219—276. Frankreich: zwischen Vals-les-Bains u. Entraigues

Guillebeaui Desbr. Frelon III, 1893—94, Nr. 12 (1894), p. 89 ♂, 93 ♀. — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXVI, 1933, p. 219.

var. *subglaber* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 50. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 49. — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXVI, 1933, p. 218—276. Frankreich

var. *Evertsi* Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXIV, 1931, p. 292; l. c. LXXVI, 1933, p. 218—276.

var. *Stierlinianus* Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXVI, 1933, p. 229, 269.

Stierlini Uyttenboogaart, l. c. LXXIV, 1931, p. 295.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 46 (Futterpflanzen); l. c. XVIII, 1886, p. 287. — Ormerod, Handb. of Orchards and Bush, Fruct. Ins . 1, p. 213. — Duncan, Insect pests of the farm and garden 1901, p. 59—61. — Board Agric. Fish. Leafl. 2. Rev. 1902, p. 4. — Reh in Sorauer, Handb. d. Pflanzenkrankh. III, 1906—1913 (1912), p. 541 (Schädling an Aprikosen und and. Pflanzen).

Pro *fuscipes* Ol.-Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—80, Nr. 8, 1879, p. 433. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 40; l. c. XVIII, 1886, p. 285 (Futter-

pflanzen). — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 49 (Futterpflanzen). — Reh in Sorauer, Handb. d. Pflanzenkrankh. III, 1906—13 (1912), p. 542 (Schädling an Fichten).

Pro *lugdunensis* Boh. Sourat, Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, Bull. p. XLVIII. — Reh, Jahrb. Hamburg, Wiss. Anstalt. XIX, 1901, 3. Beih. p. 149—151; Gartenwelt 1904, Nr. 14, p. 24 (O. *tenebricosus*). — Journ. Board Agric. London XII, 1906, p. 681 *(tenebricosus)*. — Bail, Naturwiss. Wochenschr. V, 1906, p. 618—619. — Reh in Sorauer, Handb. d. Pflanzenkrankh. III, 1906—13 (1912), p. 541 (Schädling an Obstbäumen). — Van Poeteren, Versl. Meded. Plantenziektend. Dienst No. 58, 1929, p. 99.

collectivus Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 153 ♂ ♀; Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 58 (Gr. *Phalantorrhynchus*). — Zumpt, Bolet. Soc. Esp. Hist. Nat. 1934, p. 283. — Nord-Spanien: Picos de Europa

compressus Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 150; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 274; Abeille XI, 1873, p. 781; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), 453; Best.-Tab. 9, 1883, p .51. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 236. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 219 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 81 (Gr. *Asphaerorrhynchus*). — Südrußland, Kaukasus, Armenische Gebirge, Pontinische Alpen

concinnus Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 573 ♂; l. c. VII, 1, 1843, p. 282. — Gebler, Bull. Soc. Nat. Moscou 1848, p. 361. — Kol. l. c. XXXI, 2, 1858, p. 431, Nr. 544. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 76 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 269; Abeille XI, 1873, p. 776; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 438; Best.-Tab. 9, 1883, p. 36. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 153. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXII, 1888, p. 149. —Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 55 (Gr. *Otiorrhynchus*). — Ungarn, Südrußland, Samara, Kaukasus, Sibirien, Orenburg, Baschkirensteppe

steppensis Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXII, 1888, p. 147.

coniceps Daniel, Col.-Studien II, 1898 (1899), p. 44 ♂ ♀. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 99 (Gr. *Nilepolemis*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 33. — Italien: Lombardei; Trident. Alpen: Judicarien, Val di Ledro, Val di Leno, Val Sorim, M. Columbin

conjungens Apfelb. Sitz.-Ber. Akad. Wien, math.-natur. Kl. 1918, p. 169; Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. 1919, p. 147; Neue Beitr. — Nord-Albanien: Buni Jezerce

zur syst. Insektenk. IV, 1928, p. 59 (*perdix*-Gruppe).

consobrinus (Daniel) Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 92 (Gr. *Zustalestus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 31. — Velebit: Ostaria

conspiciabilis Falderm. Fn. Ent. Transcauc. III in Nouv. Mem. Soc. Nat. Moscou VI, 1838, p. 193. — Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 353 ♂ ♀. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 447. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 124, Note; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 271; Abeille XI, 1873, p. 778; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 457; Best.-Tab. 9, 1883, p. 55. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 210. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 96 (Gr. *Motilacanus*). — Bulgarien, Kaukasus, Kleinasien, Persien

calcaratus Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 337 ♂ ♀ (pro 417); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 8 (1876), p. 483 ♂ ♀; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 443 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 41. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 71, Note, p. 96.

corsicus Fairm. Ann. Soc. Ent. France (3) VI, 1859, p. 280. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 143 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 273; Abeille XI, 1873, p. 780; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 473; Best.-Tab. 9, 1883, p. 71. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 228 ♂ ♀. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 63 ♂ ♀ (Gr. *Microphalantus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 79. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 27. — Corsica

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 39; l. c. XVIII, 1886, p. 284 (Vorkommen).

corvulus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 68 (Gr. *Microphalantus*). — ?Siebenbürgen

cosmopterus Daniel, Col.-Studien II, 1898 (1899), p. 38 ♂ ♀. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 104 (Gr. *Lolatismus*). — Siebenbürgen: Zernester-Gebirge

costipennis Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 264, Note. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 219 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Daniel, Col.-Studien II, 1898 (1899), p. 35, 41. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 104 (Gr. *Lolatismus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 29. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 34. — Bayr. Alpen, Tirol, Steiermark, Kärnten, Kroatien

Troyeri Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 464; Best.-Tab. 9, 1883, p. 62.

costulatus Formanek, Wien. Ent. Zeit. XXXIX, 1922, p. 73 (Gr. *Lolatismus*). — K. Hänel, Kol. Rundschau XX, 1934, p. 37. — Kaukasus

Cremieri Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 363. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 132. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 51 *(Peritelus)*. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 73 (Gr. *Homorhythmus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1823, p. 82. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 28. — Frankreich: Seealpen, Italien: Piemont, Toskana, Lazio, Campanien, Sizilien; Balearen

cupreosparsus Fairm. Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, Bull. p. CL. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 111 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 271; Abeille XI, 1873, p. 778; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 445 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 43; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 215 ♂ ♀. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 195. — J. Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 195. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 55 (Gr. *Petalorrhynchus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 69. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 26. — Seealpen, Ligurische Alpen, Piemont

subsp. *crinitarsus* Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 100 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 270; Abeille XI, 1873, p. 777; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 439; Best.-Tab. 9, 1883, p. 37. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 182. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 55. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 69. — Südfrankreich

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 39; l. c. XVIII, 1886, p. 284.

cylindricus Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 177 (Subg. *Tournieria*); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 558; Best.-Tab. 9, 1883, p. 156. — Schneider & Leder, Verh. Nat. Ver. Brünn XVII, 1878 (1879), p. 10, t. 5, f. 43. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 84 ♂ ♀ (Gr. *Choilisanus*). — West- u. Zentral-Kaukasus

ab. *subparallelus* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 10 (1893), p. 409 (Subg. *Tournieria*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 84 ♂ ♀. — West- u. Zentral-Kaukasus: Abchasien

dacicus Daniel, Col.-Studien II, 1898, p. 39 ♂ ♀, p. 41. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1912 (Best.-Tab. 69), p. 103 ♂ ♀ (Gr. (Gr. *Lolatismus*). — Siebenbürgen, Transylvanische Alpen

costipennis Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 155 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 274; Abeille XI, 1873, p. 781; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 465 ♂ ♀; Best.-Tab.

9, 1883, p. 63 (non Rosenh.). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 242; l. c. XI, 1873, p. 781. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 622 ♂ ♀ (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 103 ♂ ♀.

decorus Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 341 (pro 421); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 8, 1875 (1876), p. 485; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 448; Best.-Tab. 9, 1883, p. 46. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 110 (Gr. *Aranihus*). — Pyrenaeen; Spanien: Jaen

densatus Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 300. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschrift II, 1858, p. 275; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 135 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 272; Abeille XI, 1873, p. 779; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 458; Best.-Tab. 9, 1883, p. 56; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 216. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 219 ♂ ♀. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 94 (Gr. *Elechranus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 89. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 32. — Zentral-Alpenkette; Schweiz. Seealpen, Bernina bis Mt. Blanc, Mt. Rosa

? *grisescens* Muls. Opusc. Ent. IX, 1859, p. 28. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 90. — Pyrenaeen

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 40; l. c. XVIII, 1886, p. 284.

dentipes Graëlls, Mem. Comis. Mapa geol. Españ. 1855 (1858), Zool. p. 94, t. 5, f. 1. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 101 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 270; Abeille XI, 1873, p. 777; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 440 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 38. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 182. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 56 ♂ ♀ (Gr. *Harpinorrhynchus*). — Zumpt, Bol. Soc. Españ. Hist. Nat. 1934, p. 271. — Spanien: Sierra de Guadarrama, Sierra de Bejar

subsp. *asturiensis* Chevr. Col. Hefte V, 1869, p. 74. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 350; l. c. XVII, 1873, p. 270; Abeille XI, 1873, p. 777; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 441; Best.-Tab. 9, 1883, p. 39. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 750. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 56 (Gr. *Harpinorrhynchus*). — Zumpt, Bolet. Soc. Españ. Hist. Nat. 1934, p. 272. — Asturien: Umgeb. des Puerto de Pajares

subsp. *areolatus* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 441 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 39. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 56. — Zumpt, Bol. Españ. Hist. Nat. 1934, p. 272. — Asturien: Umgeb. des Picos de Europa

areolatoides Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 56. — Zumpt, Bol. Soc. Españ. Hist. Nat. 1934, p. 271.

dinaricus Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 272 ♂; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 779 ♂. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119. — Westbosnien, Dinarische Alpen: Gujat planina

distincticornis Rosenh. Beitr. Ins.-Fn. Eur. I, 1847, p. 45. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 147 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 273; Abeille XI, 1873, p. 780; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 458; Best.-Tab. 9, 1883, p. 56. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 233. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 218 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 98 (Gr. *Nilepolemis*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 32. — Tridentinische Alpen: M. Baldo; Judikarien, Monte Pari

diversesculptus Pic, Echange XXXVI, 1920, p. 22. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 75. — Zumpt, Bol. Soc. Españ. Hist. Nat. 1934, p. 281. — Pyrenaen: St. Jean de Luz

Dorotkanus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 35 ♂ ♀ (Gr. *Thalycrynchus*). — Apfelb. Neue Beitr. zur syst. Insektenk. IV, 1928, p. 67. — Ragusa

dukatiensis Apfelb. Glasnik zem. Muz. XXX, 1918, p. 154; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. IV, 1928, p. 69. — Süd-Albanien

echinatoides Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 77 (Gr. *Homorhythmus*). — Westkaukasus: Zirkassien

echinatus Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 2, 1847, p. 523. — Kol. l. c. XXXI, 2, 1858, p. 449. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 162; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 275; Abeille XI, 1873, p. 782; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 461; Best.-Tab. 9, 1883, p. 59. — Schauf. Col. Hefte II, 1867, p. 21. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 77 (Gr. *Homorhythmus*). — Kaukasus: Talyschgebirge, Lenkoran

Hochhuthi Marseul, Abeille X, 1872, p. 248.

sus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1893—97, Nr. 3 (1894), p. 114.

lenkoranus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 128.

edelenginus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 114 (Gr. *Egydelenus*). — ?Spanien, Algier

Ehlersi Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 3 (1881), p. 135 ♂ ♀; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 438, 440 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 36, 38 ♂ ♀. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 56 ♂ ♀ (Gr. *Harpinor-* — Asturien

rhynchus). — Zumpt, Bol. Soc. Españ. Hist. Nat. 1934, p. 272.

evanescens Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 28. — Spanien

Fausti Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 352 (pro 336 (Subg. *Tournieria*); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 8, 1875 (1876), p. 492; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 553; Best.-Tab. 9, 1883, p. 151. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 69 (Gr. *Dibredus*). — Lezhava (V. V.), Khlopkovoe Delo VI, No. 5—6, Moscow. Mag. 1927, p. 392—393. — Kaukasus, Daghestan, Kurutsch, Araxestal

fontanensis Zumpt, Mitteil. Deutsch. Ent. Ges. 1913, p. 82 (*Formaneki*-Gr.). — Suchoj Fontan

foraminosus Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 366. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 746; ed. 3, II, 1874, p. 211 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 295; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 146 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 273; Abeille XI, 1873, p. 780; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 457; Best.-Tab. 9, 1883, p. 55; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 219. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 304. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 232. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 929. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 100 (Gr. *Nilepolemis*); Fn. Germ. V, 1916, p. 22. — Horion, Nachtr. zu Fn. Germ. 1935, p. 306. — Schweizer-, Bergamasker-, Tridentinische-, Venetianer Alpen, Kärnten

insculptus Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 295; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 147.

subsp. *alpestris* Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 296; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 146; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 273; Abeille XI, 1873, p. 780; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 458; Best.-Tab. 9, 1883, p. 56; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 219. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 231. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 100. — Alpengebiet: Splügen

Formaneki Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 79 (Gr. *Asphaerorrhynchus*). — Türkei: Konstantinopel; Kleinasien: Gock-Dagh

bosphoranus auct. nec Stierl.

forticornis Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1893—97, Nr. 7 (1896), p. 329. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 91 (Gr. *Fondajenus*). — Griechenland, Samos: Berg Kerki

crassicornis Stierl. Deutsche Ent. Zeitschrift XXXII, 1888, p. 378 ♂.

fortis Rosenh. Beitr. Ins.-Fn. Eur. I, 1847, p. 43. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 60 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, — Trident.-, Venetian.-Alpen

p. 267; Abeille XI, 1873, p. 775; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 432; Best.-Tab. 9, 1883, p. 30; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 212. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 139; Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 216 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 47 ♂ ♀ (Gr. *Otiorrhynchus*). — Breit, Col. Rundschau 1928—29, p. 207. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 23.

var. *valarsae* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 47. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 23. — Tridentin. Alpen: Valarsa-Tal

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 40; l. c. XVIII, 1886, p. 284.

foveicollis Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 1847, p. 521. — Kol. l. c. XXXI, 2, 1858, p. 441. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 182, 170 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 343, 347 (Subg. *Eurychirus*); Abeille XI, 1873, p. 797; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 552; Best.-Tab. 9, 1883, p. 150. — Schauf. Col. Hefte II, 1867, p. 21. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 404. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 69 ♂ ♀ (Gr. *Dibredus*). — Kaukasus, Armenisches Gebirge

Frescati Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 384. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 138; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 272; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 456; Best.-Tab. 9, 1883, p. 54; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 218. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 221. — Fauvel, Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 113 *(Brachyrhinus)*. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 112 (Gr. *Cerdelcus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 36. — Italien: Istrien, Lombardei, Piemont, Emilia, Toskana, Lazio, Abruzzen, Neapel; Krain, Bosnien

tuberculatus Stierl. Deutsche Ent. Zeitschrift XXIX, 1885, p. 272. — Fauvel, Rev. d'Ent. XIX, 1895, p. 114 *(Brachyrhinus)*. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 248; Best.-Tab. 70, 1914, p. 120.

fulvipes Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 611; l. c. VII, 1, 1843, p. 352. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 171 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 276; Abeille XI, 1873, p. 783; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 473; Best.-Tab. 9, 1883, p. 71. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 258. — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 197. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 64 (Gr. *Microphalantus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 80. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 27. — Französ. Gebirge, Italien: Seealpen, Piemont (M. Viso)

Georgii Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 133. — Albania mer.: Tomor (Abax-Ali)

Gertrudae Zumpt, Bol. Soc. Españ. Hist. Nat. 1934, p. 264, 291. — Asturien

Getschmanni Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 300 ♂ ♀; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—80, Nr. 10 (1880), p. 560 ♂ ♀; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 441 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 39. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 55 ♂ ♀ (Gr. *Petalorrhynchus*). — Zumpt, Bol. Soc. Españ. Hist. Nat. 1934, p. 268. — Asturien: Puerto Pajares

subsp. *Kricheldorffi* Zumpt, Bol. Soc. Españ. Hist. Nat. 1934, p. 269. — Asturien: Umgeb. des

f. *nigrofemoralis* Zumpt, Bol. Soc. Españ. Hist. Nat. 1934, p. 270. — Picos de Europa

subsp. *validus* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 3 (1881), p. 139 ♂ ♀; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 441, ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 39. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 55. — Zumpt, Bol. Soc. Españ. Hist. Nat. 1934, p. 270. — Spanien: Sierra Guadarrama

Ghilianii Fairm. Ann. Soc. Ent. France 1856, p. 540. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 81 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 266; Abeille XI, 1873, p. 774; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 429; Best.-Tab. 9, 1883, p. 27. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 159. — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni IX, 1897, p. 451, 456; Ver. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 531, 535. — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 194. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 70), p. 43 (Gr. *Otiorrhynchus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 38. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 22. — Italien: Seealpen, Piemont

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 40 (Futterpflanzen); l. c. XVIII, 1886, p. 285.

glabratus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 183, 171 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 277; Abeille XI, 1873, p. 784; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 476; Best.-Tab. 9, 1883, p. 74 (non Krynicki). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 443. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 623 (Gr. *Otiorrhynchus*). — Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien IV, 1896, p. 542. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 69 (Gr. *Dibredus*). — Wilhelm Székessy, Col. Rundschau 1934, p. 36. — Siebenbürgen, Serbien, Krain, Zentral- u. Süd-Bosnien bis Volujak, Herzegovina: Vran-planina

glabricollis Boh. in Schönherr. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 282. — Stierl. Revis. Eur. Otior- — Ural, Uralsk,

rhynchus 1861, p. 174; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 342; l. c. XVII, 1873, p. 276; Abeille XI, 1873, p. 783; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 473; Best.-Tab. 9, 1883, p. 71. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 262. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 67 (Gr. *Microphalantus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 21, Note. — Guberli, Kirghisensteppe

globulus Gredler, Käfer Tirol II, 1866, p. 333. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 354; l. c. XVII, 1873, p. 275; Abeille XI, 1873, p. 782; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 461; Best.-Tab. 9, 1883, p. 59. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 229, Note; l. c. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 108 (Gr. *Eunihus*). — Penecke, Col. Centralbl. 1927, p. 317. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 35. — Tirol. Trident.-Alpen

globatus Marseul, Abeille X, 1872, p. 250.

Gobanzi Gredler, Col. Hefte III, 1868, p. 74. — Crotch, Synops. Col. Eur. 1871, p. 39. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 355; l. c. XVII, 1873, p. 275; Abeille XI, 1873, p. 782; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 470; Best.-Tab .9, 1883, p. 68. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 754. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 85 (Gr. *Postaremus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 30. — Trident. Alpen: Monte Pasubio

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 40; l. c. XVIII, 1886, p. 285.

grandicollis Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 312. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 302 (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 289; Abeille XI, 1873, p. 797; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 553; Best.-Tab. 9, 1883, p. 151. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 409. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 82 (Gr. *Choilisanus*). — Bulgarien, Kleinasien

granulatostriatus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 9 (1876), p. 495 ♂; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 452; Best.-Tab. 9, 1883, p. 50. — O. Schneider & Leder, Verh. Nat. Ver. Brünn XVII, 1878 (1879), p. 3, t. 5, f. 45. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 97 (Gr. *Otismotilus*). — Kaukasus

granulipennis Formanek, Wien. Ent. Zeit. XLIII, 1926, p. 144 (Gr. *Lolatismus*). — Polen

guttula Fairm. Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 281. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 114; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 271; Abeille XI, 1873, p. 778; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 446; Best.-Tab. 9, 1883, p. 44. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 201. — Corsica, Sardinien

— Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 111. — S.-Claire Deville, Cat. crit. Col. Corse 1913, p. 408. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 96. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 35.

affinis Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 115 ♂ ♀ (non Hochh. 1847).

assimilis Gemm. Col. Hefte VII, 1871, p. 118. — Marseul, Ann. Soc. Ent. France (5) I, 1871, p. 247; Abeille X, 1872, p. 201. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 341; l. c. XVII, 1873, p. 270; Abeille XI, 1873, p. 778; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 447; Best.-Tab. 9, 1883, p. 45. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 111.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 40 (Futterpflanzen); l. c. XVIII, 1886, p. 285.

hadrocerus Daniel, Col.-Studien II, 1898, p. 50. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 99 (Gr. *Nilepolemis*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 33. — Tridentin.-, Kadorische Alpen

validicornis Daniel, Col.-Studien I, 1891, p. 56.

Halbherri Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 6 (1890), p. 243 ♂. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 43 ♂ ♀ (Gr. *Otiorrhynchus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 21. — Nord-Italien: Monte Baldo (Altissimo)

Heeri Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 289; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 126; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 272; Abeille XI, 1873, p. 779; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 454; Best.-Tab. 9, 1883, p. 52; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 216. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 214. — Daniel, Col.-Studien II, 1898, p. 49. — Breit, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 257. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 98 (Gr. *Otismotilus*). — Schweiz. Alpen, Nord-Italien: Bergamasker-Alpen, Lombardei

auroguttatus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, Nr. 9, 1879, p. 512; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 452; Best.-Tab. 9, 1883, p. 50. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 98. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 90. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 32.

Henoni Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 410. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 351; l. c. XVII, 1873, p. 273; Abeille XI, 1873, p. 780; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 579; Best.-Tab. 9, 1883, p. 177. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 228. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 240; Best.-Tab. 70, 1914, p. 113 (Subg. *Troglorrhynchus*). — Peyerimhoff. Bull. Soc. Ent. France 1913, p. 475. — Algier: Oran, Constantine

hipponensis Pic, Echange XXV, 1909, p. 121 ♂. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 241; Best.-Tab. 70, 1914, p. 113.

hungaricus Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 351. — Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 633; l. c. VII, 1 ,1843, p. 260. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 63 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 269; Abeille XI, 1873, p. 775; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 435; Best.-Tab. 9, 1883, p. 33; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 7, 1886, p. 284. — Friv. A. Királyi magyar 1865, p. 206, t. 11, f. 8. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 142. — Royer, Petit. Nouv. Ent. II, 8, 1876, p. 5. Fauvel, Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 247; l. c. XIV, 1895, p. 113 *(Brachyrhinus)*. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 618 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Apfelb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 531, Note. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 49 (Gr. *Otiorrhynchus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 19. — Horion, Nachtr. zu Fn. Germ. 1935, p. 305. — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. XXVI, 1933, p. 218—276. — West-Deutschland: Hamburg, Frankfurt; Süd-Ungarn, Rumänien

subsp. *hospitellensis* (St.-Claire Deville i. litt.) Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCII, 1923, p. 54. — Seealpen: Sospel, Thorene, Vallon de Meras (Nice); Basses-Alpen: Annot

Biologie: Van Poeteren, Versl. Meded. Plantenziektend. Dienst No. 58, 1929, p. 99.

hypocrita Rosenh. Beitr. Ins. Eur. I, 1847, p. 46. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 161; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 275; Abeille XI, 1873, p. 782; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 460; Best.-Tab. 9, 1883, p. 58. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 247. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 229 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 196. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 107 (Gr. *Nihus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 95. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 35. — Tridentin. Alpen

var. *venustus* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—80, Nr. 10 (1880), p. 563; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 460; Best.-Tab. 9, 1883, p. 58. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 107. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 96. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 35. — Seealpen: Mentone, Valle di Cogne, Monte Viso

hypsibatus Ganglb. Ann. Nat. Hofmus. Wien XI, 1896, p. 184. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 229; l. c. XXXII, 1913, p. — Nord-Siebenbürgen, Rodnagebirge

108 (Gr. *Eunihus*). — Penecke, Col. Centralbl. 1927, p. 318.

incivilis Falderm. Fn. Ent. Transauc. III in Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou VI, 1838, p. 193. — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 365. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 342; l. c. XVII, 1873, p. 273; Abeille XI, 1873, p. 786; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 558; Best.-Tab. 9, 1883, p. 156. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 236. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 81 (Gr. *Asphaerorrhynchus*). — Zumpt, Mitteil. Deutsch. Ent. Ges. 1933, p. 83, 88. — K. Hänel, Kol. Rundschau XX, 1934, p. 38. — West-Persien

affinis Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 1, 1847, p. 517. — Kol. l. c. XXXI, 2, 1858, p. 455. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 343; l. c. XVII, 1873, p. 279; Abeille XI, 1873, p. 786; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 449; Best.-Tab. 9, 1883, p. 47. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 292. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 81.

inclivis Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 1858, p. 450 (err.). — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 334.

subsp. *radschensis* Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1893—97, Nr. 3 (1894), p. 112. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 81. — Zumpt, Mitteil. Deutsch. Ent. Ges. 1933, p. 87. — Transkaukasus: Kutais; Östlich.- u. Zentral.-Kaukasus: Radscha, Tscherek

subsp. *Hackeri* Zumpt, Mitteil. Deutsch. Ent. Ges. 1933, p. 87. — Kartschchal-Gebirge

subsp. *Reclairei* Zumpt, Mitteil. Deutsch. Ent. Ges. 1933, p. 87. — Zentral-Kaukasus: Dolomisis-Zweri

subsp. *somjlae* Zumpt, Mitteil. Deutsch. Ent. Ges. 1933, p. 86. — Somjla (bei Batum)

infensus Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXII, 1888, p. 149. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 63 ♂ ♀ (Gr. *Microphalantus*). — Krim

iratus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 76, 77 ♂ ♀ (Gr. *Homorythmus*). — Griechenland: Insel Cerigo

jaënensis Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 268, Note ♂ ♀; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 434; Best.-Tab. 9, 1883, p. 32. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 52. — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXVI, 1933, p. 253—276. — Süd-Spanien: Andalusien, Sierra de Jaen

jaltensis Formanek, Wien. Ent. Zeit. XLIII, 1926, p. 145 (*Egydelenus* Gr.). — Krim: Jalta

Johannis Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 3 (1881), p. 137; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 469; Best.-Tab. 9, 1883, p. 67. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 61, 63 ♂ ♀ (Gr. *Phalantorrhynchus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 79. — Zumpt, Bol. Soc. Españ. Hist. Nat. 1934, p. 291. Asturien

jugicola Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 175; Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 373; l. c. XVII, 1873, p. 276; Abeille XI, 1873, p. 783; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 472 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 70. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 262. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 60 ♂ ♀ (Gr. *Phalantorhynchus*). — Zumpt, Bol. Soc. Españ. Hist. Nat. 1934, p. 287. Asturien, Andora, Puerto Pajares

? *gossypiipes* Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) II, 1872, p. 410. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 472 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 70. — Heyden, Deutsche Ent. Zeitschrift 1909, p. 609. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 60, Note (Gr. *Phalantorhynchus*). — Zumpt, Bol. Soc. Españ. Hist. Nat. 1934, p. 288. Nordspanien: Arvas, Tajares

? *silvestris* Chevr. Rev. Mag. Zool. 1866, p. 26. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 350. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 186. — Zumpt, Bol. Soc. Españ. Hist. Nat. 1934, p. 288. Reinosa

subg. *pseudandarensis* Zumpt, Bol. Soc. Españ. Hist. Nat. 1934, p. 289. Santander: Reinosa

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 46 *(sylvestris)*; l. c. XVIII, 1886, p. 287 (Fagus silvatica).

Kaci Peyerimh. Bull. Soc. Ent. France 1908, p. 124 *(Brachyrrhinus)*. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 111 (Gr. *Aranihus*). Nordafrika: Kabilia, Djurdjura

Kirschi Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 9 (1876), p. 505; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 558; Best.-Tab. 9, 1883, p. 156. — O. Schneider & Leder, Verh. Nat. Ver. Brünn XVII, 1878 (1879), p. 12. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 75 (Gr. *Homorhythmus*). Kaukasus, Armenisches Gebirge, Araxestal, Pontische Alpen

caucasicus Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 182. — O. Schneider & Leder, Verh. Nat. Ver. Brünn XVII, 1878 (1879), p. 22 *(Peritelus)*. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. II, 1883, p. 96.

aemulus Marseul, Abeille XVI, 1878, p. 43. — Reitter, Best.-Tab. 69, p. 75.

parameiroides Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 21; l. c. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 75.

Kuennemanni Reitter, Col. Rundschau VI, 1917, p. 7. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 33. — Bergamask. Alpen: Arera Berg

laevigatus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 473; Syst. El. II, 1801, p. 531 *(Curculio)*. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 347, t. 87, f. 6. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 330. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1803, p. 173 *(Brachyrhinus)*. — ? Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 118; Man. Brit. Col. 1839, p. —. — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 572 ♂ ♀. — Boh. l. c. VII, 1, 1843, p. 281 ♂ ♀ *(Otiorrhynchus)*. — Küster, Käfer Eur. XIV, 1848, Nr. 96. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 422; ed. 2, 1858, p. 743; ed. 3, II, 1874, p. 209 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 270, 274. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 431. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 269; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 75 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 269; Abeille XI, 1873, p. 776; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 437; Best.-Tab. 9, 1883, p. 35; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 214. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 502. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 152. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXII, 1888, p. 148 ♂ ♀. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 572; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 619 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Desbr. Frelon III, 1894, p. 86 ♂, 91 ♀. — Penecke, Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 253 ♂ (var.). — Apfelb. Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. 1898, p. 269. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 367 *(Brachyrhinus)*. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 54 ♂ ♀ (Gr. *Otiorrhynchus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 20, t. 153, f. 20. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 68. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 26. — Mitteleuropa: Deutschland, (Holstein, Thüringen), Frankreich, Schweiz, Österreich, Rußland, Orenburg, Baschkirenberg, Ungarn, Siebenbürgen, Nordbosnien, Dervent

cornicinus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 75. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 153. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 927.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 41; l. c. XVIII, 1886, p. 285 (Futterpflanzen). — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 50 (Futterpflanzen). — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkrankh. III, 1906—13 (1912), p. 542 (Schädling an Pflaumenbäumen).

lanuginosus Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 301. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 112 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 271; Abeille XI, 1873, p. 778; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 445 ♂ ♀; Schweiz, Seealpen

Best.-Tab. 9, 1883, p. 43; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 7, 1886, p. 283, 284; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 215 ♂ ♀. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 196. — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 196. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 47 (Gr. *Otiorrhynchus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 45. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 24.

subsp. *neglectus* Stierl. Berl. Ent. Zeitschrift II, 1858, p. 276; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 112; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 445; Best.-Tab. 9 1883, p. 43; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 215. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 196. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 47. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 46. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 24. — Piemont; Monte Rosa: Macugnaga

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 41; l. c. XVIII, 1886, p. 285.

lasius Germ. Reise Dalmatien 1817, p. 232 *(Curculio)*; Ins. Spec. novae I, 1824, p. 349 *(Otiorrhynchus)*. — Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 634; Boh. l. c. VII, I, 1843, p. 305, 387. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 152 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 274; Abeille XI, 1873, p. 781; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 467; Best.-Tab. 9, 1883, p. 65. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 238. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 219 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 102 (Gr. *Lolatismus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 34. — Kärnten, Julische Alpen, Illyrien, Dalmatien

ligneoides Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. X, 1898—903, Nr. 9 (1902), p. 426. — Fiori, Riv. Col. Ital. II, 1904, p. 228. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 89 (Gr. *Neobudemus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 31. — Calabrien: M. Cocuzzo

ligneus Ol. Entom. V, 1807, Nr. 83, p. 378, t. 31, f. 473 *(Curculio)*. — Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 243. — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 617; Boh. l. c. VII, 1, 1843, p. 364. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 270; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 137 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 272; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 456; Best.-Tab. 9, 1883, p. 54; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 218. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 501. — C. G. Thoms, Skand. Col. VII, 1865, p. 122; l. c. X, 1868, p. 172, 174. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 218 — Mittel- u. West-Europa: Schweden, Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien: Tridentin. Alpen; Seealpen, Piemont, Corsica, Sardegna

(Subg. *Otiorrhynchus*). — G. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, Nr. 96, 1876, p. 61. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 36 *(Brachyrhinus)* (1886), p. 229 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 175, 178, t. 157, f. 7. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 573; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 521 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 538. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 569 *(Brachyrhinus)*. — Varendorff, Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 210—212. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 929, fig. 119 d. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 112 (Gr. *Cerdelcus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 97. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 36.

scabridus Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 119, 405; Man. Brit. Col. 1839, p. 243. — Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 320.

gallicanus Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 616; Boh. l. c. VII, 1, 1843, p. 364.

hispidulus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1816, p. 137.

var. *setosus* Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 137. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 221. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 112. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 98. — Frankreich, Borkum

frisius O. Schneider, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 178 ♂ ♀.

? *riguus* (Fairm.) Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 456; Best.-Tab. 9, 1883, p. 54. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 112, Note. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 98. — Seealpen, Pyrenäen

Biologie: Weed in Cook, Pract. Ent. 1884, p. 6—10, f. 7—9.

liliputanus Apfelbeck, Sitz.-Ber. Ak. Wiss. Wien 1908, p. 4; Glasnik zem. Muz. XXXII, 1920, p. 18; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1923, p. 86. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 43. — Albanien: Schar Dagh

lombardus Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 129; l. c. XVII, 1873, p. 273; Abeille XI, 1873, p. 780; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 458; Best.-Tab. 9, 1883, p. 56; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 217. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 234. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 99 (Gr. *Nilepolemis*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 32. — Italien: Como-See, Monte Bisbino, Monte Generoso

longiusculus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 2 (1888), p. 49. — Reitter, — Spanien: Andalusien

Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 111; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 186; Best.-Tab. 70, 1914, p. 58.

Luigionii A. & F. Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. XL, 1908, p. 259 ♂ ♀. — Porta, Riv. Col. Ital. VIII, 1910, p. 62; Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 21. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 41 (Gr. *Otiorrhynchus*). — Italien: Abruzzen (Majella, Monte Greco)

macedonicus (Apfelb.) Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 68 ♂ ♀ (Gr. *Microphalantus*). — Colešnica, Jesero

magnicollis Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 374. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 78 (Gr. *Asphaerorhynchus*). — Griechenland, Südliche Sporaden: Nikaria

malefidus Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 601 ♂; l. c. VII, I, 1843, p. 295 ♂. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 103 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 341; l. c. XVII, 1873, p. 276; Abeille XI, 1873, p. 783; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI ,1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 468 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 66. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 185. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 59 (Gr. *Phalantorrhynchus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1926, p. 76. — Zumpt, Bol. Soc. Españ. Hist. Nat. 1934, p. 289. — Südfrankreich, Pyrenäen

planidorsis Fairm. Ann. Soc. Ent. France (3) IV, 1856, p. 541; Rev. Mag. Zool. VIII, p. 180.

praelongus Fairm. in Grenier, Mat. Col. France 1866, p. 108. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 185. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 468; Best.-Tab. 9, 1883, p. 66.

Biologie: Xambeu, Naturaliste 1894, p. 53; Ann. Soc. Linn. Lyon (N. S.) XLIII, 1896, p. 142—146; Moeurs et Métam. Ins. V, 1896, p. 120—124 *(praelongus)*.

mandibularis F.W. Redtb. Quaed. Gen. et Spec. Col. 1842, p. 20. — L. Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 425; ed. 2, 1858, p. 746; ed. 3, II, 1874, p. 211 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 304. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 144; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 460; Best.-Tab. 9, 1883, p. 58. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 230. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 622 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 89 (Gr. *Neobudemus*). — Österreich: Wien; Ungarn, Moldau, Dobrudscha, Serbien: Pozarevac

granulosus Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 367. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 145; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9

(1883), p. 460; Best.-Tab. 9, 1883, p. 58. — Friv. A Királyi Magyar 1865, p. 209. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 231. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 622 (Subg. *Otiorrhynchus*).

dobrudschae Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 5 (1882), p. 250; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 455; Best.-Tab. 9, 1883, p. 53.

subsp. *echidna* Daniel, Col.-Studien II, 1898 (1899), p. 43. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 128—129, Note; l. c. 1913 (Best.-Tab. 69), p. 89. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 31. — Gran Sasso

megareus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 79 (Gr. *Asphaerrorrhynchus*). — Anatolien: Ak-Chehir

meledanus Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 288; Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 80 (Gr. *Asphaerrorrhynchus*). — Dalmatien: Insel Meleda

merditanus Apfelb. Sitzber. Ak. Wien CXVI, I, 1907, p. 522 ♂ ♀. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 64 (Gr. *Microphalantus*). — Albanien: Merdita (Munela-Gebirge)

meridionalis Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 571 ♂ ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 280 ♂ ♀. — Küster, Käfer Eur. XXVIII, 1854, Nr. 80. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1859, p. 430. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 91 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII. 1873, p. 267; Abeille XI, 1873, p. 774; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 428; Best.-Tab. 9, 1883, p. 26. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 171. — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni IX, 1897, p. 456; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 531. — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 194. — Vitale, Natural. Sicil. XVII, 1904, p. 77. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 44 (Gr. *Otiorrhynchus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 42. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 22. — Frankreich, Nord-Spanien

oleae Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 60; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 267; Abeille XI, 1873, p. 774; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 428; Best.-Tab. 9, 1883, p. 26. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 138. — Fauvel, Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 247; l. c. XIV, 1895, p. 113 *(Brachyrhinus)*.

ab. *Peyrissaci* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87, Nr. 7, 1886, p. 282. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 44. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 43.

subsp. *corticalis* Lucas, Explor. sc. Algérie, Col. 1849, p. 432, t. 36, f. 9. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 59; Berl. Ent. — Algier

Zeitschr. XVII, 1873, p. 267; Abeille XI, 1873, p. 774; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 428; Best.-Tab. 9, 1883, p. 26. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 137. — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni IX, 1897, p. 456. — A. & F. Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. XL, 1908, p. 463. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 44. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 43. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 22.

subsp. *subvestitus* (Solari) Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 44. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 43. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 22. — Sizilien

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 42; l. c. XVIII, 1886, p. 286. — Cépide, Feuille jeun. Natural. XXXVII, 1907, p. 234. — Pagliano, IX. Congrès international d'oléiculture Tunis, Direc. gen. Agric. Colon. II, 1929, p. 274, 307. — Keifer, Mon. Bull. Dept. Agric. California XX, Nr. 7, 1931, p. 470—472, 2 figs; Ent. Amer. (n. s.) XIII, 1932, no. 21 (1933), p. 45—84.

mesatlanticus Peyrimhoff. Bull. Soc. Ent. Fr. 1928, p. 42. — Nord-Afrika

misellus Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 139; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 342; l. c. XVII, 1873, p. 273; Abeille XI, 1873, p. 780; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9, (1883), p. 453; Best.-Tab. 9, 1883, p. 51. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 223. — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 196. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 113 (Gr. *Cerdelcus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 101. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 36. — Südfrankreich: Seealpen, Basses Alpes, Cheval Blanc, Hautes-Alpes, Italien: Piemont?

morio F. Spec. Ins. I, 1781, p. 198; Mant. Ins. I, 1787, p. 122; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 486; Syst. El. II, 1801, p. 540 *(Curculio)*. — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 205; l. c. IV, 1789, p. 276. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1776. — Ol. Encycl. Méthod. V, 1790, p. 557; Entom. V, 1807, Nr. 83, p. 410, t. 3, f. 26. — ? Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 368, t. 89, f. 3. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 382. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 180 *(Brachyrhinus)*. — Ill. Mag. Ins.-Kunde IV, 1805, p. 160 *(Curculio)*. — Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 348 *(Otiorhynchus)*. — Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 634; l. c. VII, I, 1843, p. 295, 388 *(Otiorrhynchus)*. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 271, 278. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 426; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 747. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 505. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, — Oestliche Pyrenäen (sonst ganz Mitteleuropa)

1882—1888 (1883), p. 35 *(Brachyrhinus)*; (1886), p. 229 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—91 (1891), p. 214. — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 195. — Taylor, Ent. Monthly Mag. XLII, 1906, p. 272 (England). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 927. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 57 ♂ ♀ (Gr. *Phalantorrhynchus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 20, t. 153, f. 18. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCII, 1923, p. 72. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 32. — Zumpt, Bol. Soc. Español. Hist. Nat. 1934, p. 276.

f. *ebeninus* Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 581 ♂; l. c. VII, I, 1843, p. 295 ♂ ♀. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 424; ed. 2, 1858, p. 744; ed. 3, II, 1874, p. 210 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 270, 274. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 503. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 309; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 98; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 6—8 (1883), p. 439; Best.-Tab. 9, 1883, p. 37; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 214. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 177. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 175, 176; l. c. VI, 1913, p. 304. — Taylor, Ent. Monthly Mag. XLII, 1906, p. 272. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 927. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 57. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 26. — Zumpt, Bol. Soc. Español. Hist. Nat. 1934, p. 294.

morio Bonsd. Hist. Nat. Curc. Suec. II, 1785, p. 36, fig. 29 *(Curculio)*.

unicolor Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 334, t. 86, f. 6 *(Curculio)*. — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 581 ♂ ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 295 ♂ ♀ *(Otiorrhynchus)*. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 424; ed. 2, 1858, p. 744; ed. 3, 1874, p. 210 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 270, 274, — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 272 (Subg. *Otiorrhynchus*); Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 97 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 269; Abeille XI, 1873, p. 776; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 439 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 37. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 503. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 177. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 572; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 619 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 568 *(Brachyrhinus)*..

memnonius Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834. p. 580 ♀; l. c. VII, I,

1843, p. 294 ♀. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 272; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 98; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 439 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 37; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 214 ♂ ♀. — Marseul, Abeille X, 1871, p. 177.

imus Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 295 ♂. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 274; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 98; Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 372. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 178.

subsp. *navaricus* Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 600 ♂ ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 339 ♂ ♀. — Dufour, Bull. Soc. Sc. Pau III, 1843, p. 79. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 99 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 372; l. c. X, 1866, p. 135; l. c. XVII, 1873, p. 269; Abeille XI, 1873, p. 776; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 438; Best.-Tab. 9, 1883, p. 36. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 180. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 58 ♂ ♀. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 75. — Zumpt, Bol. Soc. Españ. Hist. Nat. 1934, p. 275, 277, 294. — Hoch-Pyrenäen

nitidicollis Dufour, Act. Soc. Linn. Bordeaux XVII, 1851, p. 343.

intricatus Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 135; l. c. XVI, 1872, p. 341.

sparsiridis Reitter, Deutsche Ent. Zeitschrift 1890, p. 154; Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 58 ♂ ♀ (Gr. *Phalantorrhynchus*). — Zumpt, Bol. Soc. Españ. Hist. Nat. 1934, p. 273, 294.

subsp. *hispanicus* Stierl. Berl. Ent. Zeitschrift VI, 1862, p. 360; l. c. X, 1866, p. 410; l. c. XVI, 1872, p. 347; l. c. XVII, 1873, p. 290; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 8—9, 1883, p. 439 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 37. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 180. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 58. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 74. — Zumpt, Bol. Soc. Españ. Hist. Nat. 1934, p. 263, 278, 294. — Umgeb. v. Bilbao; Nordspanien

hispanus Heyd. Reitter, Weise, Cat. 1906 (Druckfehler). — Winkler, Cat. 1932, p. 1408.

subsp. *reynosae* Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 410. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 349; l. c. XVII, 1873, p. 270; Abeille XI, 1873, p. 777; Mittheil. Schweiz .Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 438; Best.-Tab. 9, 1883, p. 36. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 178. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, — Asturien: Picos de Europa; Santander: Reinosa

(Best.-Tab. 69), p. 58 ♂ ♀ (Gr. *Phalantorrhynchus*). — Zumpt, Bol. Soc. Español. Hist. Nat. 1934, p. 263, 280, 294.

subsp. *sublaevigatus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 58. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 74. — Zumpt, Bol. Soc. Español. Hist. Nat. 1934, p. 263, 275, 278, 294. — Niederpyrenäen

subsp. *diversesculptus* Pic, Echange XXXVI, 1920, p. 22 (var. von *navaricus*). — Zumpt, Bol. Soc. Español. Hist. Nat. 1934, p. 281, 294 (eigene Art?). — Niederpyrenäen: St.-Jean de Luz

subsp. *melanopus* (Solari in litt.) Zumpt, Bol. Soc. Español. Hist. Nat. 1934, p. 275, 279, 294. — Asturien

f. *rufomorio* Zumpt, Bol. Soc. Español. Hist. Nat. 1934, p. 275, 276, 280, 294.

subsp. *estrellaiensis* Zumpt, Bol. Soc. Español. Hist. Nat. 1934, p. 276, 281, 294. — Spanien: Sierra de Estrella

Biologie: Isnard, Observ. Ins. olivier 1772, t. 1, f. 10. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 42; l. c. XVIII, 1886, p. 286. — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 52.

Mülleri Rosenh. Thiere Andalus. 1857, p. 265. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 147; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 274; Abeille XI, 1873, p. 780; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 460; Best.-Tab. 9, 1883, p. 58. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 232. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 218 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 101 (Gr. *Nilepolemis*). — Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. 1921, p. 114. 114. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 34. — Nord-Italien: Monte Baldo

multipunctatus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 471; Syst. El. II, 1801, p. 529 *(Curculio)*. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 503. — Panz, Ent. Germ. 1795, p. 239. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 171 *(Brachyrhinus)*. — Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 347 *(Otiorrhynchus)*. — Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 566; l. c. VII, I, 1843, p. 272 ♀. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 423; l. c. ed. 2, 1858, p. 743; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 209 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 270, 273. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 268; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 83 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 340; l. c. XVII, 1873, p. 266; Abeille XI, 1873, p. 773; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 430; Best.-Tab. 9, 1883, p. 28. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 501. — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 127. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 618 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Apfelb. Glasnik Muzeja — Alpen, Karpathen, Südungarn, Serbien

Bosni IX, 1897, p. 456. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 45, 47 ♂ ♀ (Gr. *Otiorrhynchus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 19. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 23.

irritans Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 363, t. 88, f. 9 *(Curculio)*. — Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 347 *(Otiorrhynchus)*. — Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 568 ♂ ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 275 ♂ ♀. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 423; l. c. ed. 2, 1858, p. 743; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 209 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 270, 271. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 430. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 502. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 269, Note; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 83; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 340; l. c. XVII, 1873, p. 269; Abeille XI, 1873, p. 776; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 434; Best.-Tab. 9, 1883, p. 32. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 162. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 571; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 618 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Apfelb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 531. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 927.

ab. *hoverlanus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 45.

subsp. *Schwiegeri* Reitter, Ent. Blätter IV, 1908, p. 65 ♂ ♀; Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 45, 47. — Slavonien: Ruma

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 42; l. c. XVIII, 1886, p. 286. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkrankh. III, 1906—13 (1912), p. 542 *(irritans)*. — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 49, 50 (Futterpflanzen) *(irritans* u. *multipunctatus)*.

necessarius Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 141 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 273; Abeille XI, 1873, p. 779; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 450; Best.-Tab. 9, 1883, p. 48. — Friv. A. Királyi Magyar. 1865, p. 208. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—1891 (1891), Arten p. 620 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 87 (Gr. *Postaremus*). — Ungarn: Banat

necessus Marseul, Abeille X, 1872, p. 225.

negoiensis Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. LV, 1923, p. 82. — Transsylvanien: Negoy-Gebirge

nevadensis Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 9 (1892), p. 367. — Reitter, — Spanien: Sierra

Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914) (Best.-Tab. 69), p. 110 (Gr. *Aranihus*). Nevada

niger F. Syst. Ent. 1775, p. 150; Spec. Ins. I, 1781, p. 191; Mant. Ins. I, 1787, p. 118; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 473; Syst. El. II, 1801, p. 530 *(Curculio)*. — Herbst, Arch. Ins.-Gesch. IV—V, 1784—85, p. 168. — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 213; l. c. IV, 1789, p. 279. — Gmel. in L. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 178. — Ol. Encycl. méthod. V, 1790, p. 541. — Payk. Monogr. Curc. Suec. 1792, p. 101; Fn. Suec. III, 1800, p. 295. — Preyssler in Meyer, Samml. physik. Aufs. III, 1793, p. 347. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 239. — Clairv. Ent. Helvet. I, 1798, p. 88, t. 8, f. 1, 2. — Schrank, Fn. Boica I, 1798, p. 490. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 172 *(Brachyrhinus)*. — Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 348 *(Otiorrhynchus)*. — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 560 ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 265 ♂ ♀. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 329. — Schmidt, Stett. Ent. Zeit. III, 1842, p. 110—113. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 422; l. c. ed. 2, 1858, p. 742; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 209 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 270, 272. — Küster, Käfer Eur. XXVIII, 1854, p. 77. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 260; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 87 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 269; Abeille XI, 1873, p. 776; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 435; Best.-Tab. 9, 1883, p. 33; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 212. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 501. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—1891 (1890), Arten p. 571; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 618 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Desbr. Frelon III, 1894, p. 87 ♂, 92 ♀. — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 195. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 567 *(Brachyrhinus)*. — Leisewitz, Chitin. Fortbewegungsapp. Ins. 1906, p. 108—110 (Larven). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 927. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 50 ♂ ♀ (Gr. *Otiorrhynchus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 19, t. 153, f. 15. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 67. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 24. — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXXVI, 1933, p. 218—276. Mitteleuropa bis Sizilien

ater Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 332, t. 86, f. 4 *(Curculio)*. — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 291.

multipunctatus Ol. Entom. V, 1807, Nr. 83, p. 372, t. 25, f. 361 (non F.).

perlatus Richter, Suppl. Ins. Eur. 1821, p. 3.

scrobiculatus Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 561 ♂; l. c. VII, I, 1843, p. 265 ♂.

ab. *coecus* Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 351, 483. — Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 562 ♀; Boh. l. c. VII, I, 1843, p. 260. — Küster, Käfer Eur. XXVIII, 1854, Nr. 73. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 86 ♀; Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 371; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 436; Best.-Tab. 9, 1883, p. 34. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 165. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 50. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 24. — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXVI, 1933, p. 233, 269.

ab. *villosopunctatus* Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 560 ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 265 ♂ ♀. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 422; l. c. ed. 2, 1858, p. 743; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 209 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 260; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 87; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 436; Best.-Tab. 9, 1883, p. 34; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 213. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 165. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 927. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 50. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 68. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 24. — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXVI, 1933, p. 233, 269.

haematopus Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 266 ♂. — ?Desbr. Frelon III, 1893—94, Nr. 12 (1894), p. 86 ♂, 92 ♀. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 50, Note.

ab. *rugipennis* Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 265 ♀. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 88; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 436; Best.-Tab. 9, 1883, p. 34; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 213. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 165. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 927. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 50. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 24. — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXVI, 1933, p. 235, 269.

ab. *montanus* Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 306. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 92, Note; Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 372; l. c. XVI, 1872, p. 358; l. c. XVII, 1873, p. 288; Abeille XI, 1873, p. 794; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 436;

Best.-Tab. 9, 1883, p. 34; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 212. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 165. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), Arten p. 571; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 518 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 927 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 68. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 24. — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXVI, 1933, p. 234, 269.

angustatus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 88; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 335; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9, (1883), p. 436; Best.-Tab. 9, 1883, p. 34. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 167. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 24.

Biologie: Ratzeburg, Forstins. I, 1837, p. 116—117, t. 4, f. 8 (Metamorphose). — Matzek, Arbeit. Schles. Ges. Vaterl. Kultur 1842, p. 157. — Ratzeburg, Krit. Blätter XXIX, 1851, p. 221—225. — Chapuis & Candèze, Cat. Larv. Col. 1853, p. 210. — Schaal, Allg. Forst- u. Jagdzeit. XXXVIII, 1862, p. 320. — Kühn, Tharand. Forstl. Jahrb. XXIX, 1869, p. 49—52. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (N. S.) XXIII, 1876 (1877), p. 213. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1879, p. 433. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 42; l. c. XVIII, 1886, p. 286 (Futterpflanzen). — Baudisch, Centralbl. ges. Forstwes. XIII, 1887, p. 456—458 (Metamorphose). — Beling, Tharandt. Forstl. Jahrb. XXXVII, 1887, p. 86—92. — Judeich, Forstins. II, 1, 1889, p. 370—373, 403. — Heinz, Allg. Forst- u. Jagdzeit. LXVI, 1890, p. 72—79; l. c. LXVII, 1891, p. 150—152. — Schenkling, Ins.-Börse XIX, 1902, p. 147 (Metamorphose). — Eckstein, Deutsche Jägerzeitung 1908, p. 121 (Schädling). — Kleine, Ent. Blätter VI, 1810, p. 50 (Futterpflanzen). — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkrankh. III, 1906—13 (1912), p. 542 (Schädling).

nobilis Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 357. — Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 583 ♀; Boh. l. c. VII, I, 1843, p. 281 ♂ ♀. — Küster, Käfer Eur. XI, 1847, — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 74 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 269; Abeille XI, 1873, p. 776; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 438; Best.-Tab. 9, 1883, p. 36. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 152. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 217 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 70), p. 37 ♂ ♀ *(Urorrhynchus)*. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 25. — Kärnten, Krain, Kroatien

nocturnus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 100 ♂ ♀ (Gr. *Nipolemis*). Tirol

nodosus O. Müller, Fn. Ins. Fridrichsdal. 1764, p. 118; Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 86. — O. Fabr. Fn. Groenland. 1780, p. 187 *(Curculio)*. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 3, I, 4, 1790, p. 1803. — I. L. Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, Nr. 96, 1876, p. 62. — Maeklin, Svensk. Ac. Handl. (2) XVIII, 1880, Nr. 4, 1880, p. 14 (var.) *(Otiorrhynchus)*. — J. Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 197; Bull. Soc. Nat. Haute Marne II, 1905, p. 127. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 86. Nordeuropa, Grönland und Lappland; Mittel-Süd-Osteuropa

dubius Ström, Danske Selsk. Skrift. 1765, p. 43. — Bergroth, Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 227. — Weise, Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 249. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 928. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 84 (Gr. *Postaremus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 22, t. 153, f. 22. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 86. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 30. — W. Székessy, Koleopt. Rundschau 1934, p. 35.

maurus Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 293 *(Curculio)*; in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 601 ♂ ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 342 ♂ ♀ *(Otiorrhynchus)*. — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 333; Ins. Lapp. I, 1838 (1840), p. 187. — Stephens, Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 120; Man. Brit. Col. 1839, p. 243. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1835), p. 125 *(Curculio)*. — Curtis, Brit. Ent. XV, 1838, p. 690. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 271, 278. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 745; ed. 3, II, 1874, p. 210 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 439. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 284; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 165; Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 373; l. c. XVII, 1873, p. 275; Abeille XI, 1873, p. 782; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9, (1883), p. 469; Best.-Tab. 9, 1883, p. 67; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 216. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 504. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 120; l. c. X, 1868, p. 172. — Marseul, Abeille X, 1871, p. 253. — Rye, Ent. Annual 1874, p. 101 (var.). — G. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, Nr. 96, 1876, p. 62. — Schöyen, Ent. Tidskr. I, 1880, p. 182, 212. — Letzner, Jahresber. Schles. Ges. Vaterl. Kultur LXI, 1883, (1884), p. 306. — Bergroth, Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 227. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 573; Fn. Transsylv. 1888

—91 (1891), Arten p. 623 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 174, 177, t. 157, f. 4; l. c. VI, 1913, p. 304. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 569 (*Brachyrhinus*).

adscitus Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 358. — Bach, Käferfn. II, 1852—1854 (1854), p. 278. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 745. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 284.

Wiesuri (Dahl) Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 285; Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 165.

capreae (Megerle) Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 166.

♀ *pertusus* Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 173.

ab. *Bructeri* Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 360. — Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 602; l. c. VII, I, 1843, p. 347. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 165; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 469; Best.-Tab. 9, 1883, p. 67; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 217. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 929. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 85, Note. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 87.

demotus Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 347. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 745; ed. 3, II, 1874, p. 210 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 284; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 165. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 304. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 253.

ab. ? *comosellus* Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 340. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 284; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 165; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 469; Best.-Tab. 9, 1883, p. 67; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 216. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 253. — ? Letzner, Jahresber. Schles. Ges. Vaterl. Kultur LXI, 1883 (1884), p. 306. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 929. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 85. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 87.

ab. (?) *pauper* Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 341. — Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 166; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 469; Best.-Tab. 9, 1883, p. 67; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 217. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 253. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 85. — Hustache, Ann.

Soc. Ent. France 1923, p. 87.

ab. (?) *aurosus* Rey, Opusc. IX, 1859, p. 26. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 165; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 469; Best.-Tab. 9, 1883, p. 67; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 217. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschlands 1912, p. 929. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 85. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 86.

ab. (?) *Tournieri* ~~Stierl. Berl. Ent. Ztschr. XVII, 1873, p. 264~~; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 342 (pro 422) ♂ ♀; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 8, 1875 (1876), p. 485 ♂ ♀; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 469 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 67; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 217, Note ♂ ♀. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 929. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 85 ♂ ♀. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 87. ← Autor

ab. *pseudopauper* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 85. — Alpen

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 42; l. c. XVIII, 1886, p. 285. — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 51 (Futterpflanzen). — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkrankh. III, 1906—13 (1912), p. 542 (Schädling an Rhabarber, Norwegen). — Székessy, Kol. Rundschau 1934, p. 35.

Noesskei Apfelb. Glasnik d. Kroat. Naturwiss. Ges. Zagr. XXXIV, 1922, p. 22 (Gr. *granulosus*). — Süd.O.-Bosnien

Noui Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) II, 1862, p. 556; l. c. (5) X, 1880, p. 243. — Reitter, Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 369; l. c. XVI, 1872, p. 341; l. c. XVII, 1873, p. 276; Abeille XI, 1873, p. 783; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 468; Best.-Tab. 9, 1883, p. 66. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 185. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 59 (Gr. *Phalantorrhynchus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 76. — Zumpt, Bol. Soc. Españ. Hist. Nat. 1934, p. 285. — Ost-Pyrenäen

pajarensis Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 49 ♂ ♀ (Gr. *Otiorrhynchus*). — A. & F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. 1922, p. 29. — Asturien: Puerto Pajares, Oseja, Picos de S. Isidoro, Vengara

paralleliceps Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 86 (Gr. *Postaremus*). — Kaukasus: Teberda

parvicollis Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 576; l. c. 1843, p. 281. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 158; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 275; Abeille — Portugal, Algier, Marokko

XI, 1873, p. 782; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 447; Best.-Tab. 9, 1883, p. 45. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 245. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 109 (Gr. *Aranihus*).

squamifer Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 157 (non Boh.); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 274; Abeille XI, 1873, p. 782; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 8—9, 1883, p. 447; Best.-Tab. 9, 1883, p. 45.

pascuorum Peyerimh. Abeille XXX, 1901, p. 60. — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 195. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 59 (Gr. *Phalantorrhynchus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 64. — Französ. Alpen: Basses Alpes (Cheval blanc), Berge von Boule

patruelis Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 175 ♂; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 276; Abeille XI, 1873, p. 783; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 472; Best.-Tab. 9, 1883, p. 70. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 263. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 66 (Gr. *Microphalantus*). — Algier (nicht Ungarn)

Paulinoi Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1880—83, Nr. 7 (1886), p. 282. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 109, Note (Gr. *Aranihus*). — Portugal

pedinorrhynchus Petri, Kol. Rundschau XIV, 1928, p. 172 *(Lolatismus)*. — Griechenland: Thessalien (Olymp)

pelliceus Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 362. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 307; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 289; Abeille XI, 1873, p. 797; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 554; Best.-Tab. 9, 1883, p. 152. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 414. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 81 (Gr. *Asphaerorrhynchus*). — Kleinasien, ? Türkei

bosphoranus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—80, Nr. 10 (1880), p. 568; l. c. VI, Nr. 8—9, 1883, p. 555; Best.-Tab. 9, 1883, p. 153. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 81.

perdix Ol. Entom. V, 1807, Nr. 83, p. 375, 446, t. 31, f. 468 *(Curculio)*. — Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 359 *(Otiorrhynchus)*. — Sturm, Cat. Ins.-Samml. 1826, p. 181 *(Curculio)*. — Stevens, Mus. Mosq. II, 1829, p. 96. — Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 589; l .c. VII, I, 1843, p. 314 *(Otiorrhynchus)*. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 424; ed. 2, 1858, p. 744; ed. 3, II, 1874, p. 210 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Bach, Kä- — Nieder-Österreich, Steiermark, Kärnten, Italien, Kroatien, Bosnien, Herzegovina, Dalmatien, Montenegro,

ferfn. II, 1852—54, (1854), p. 270, 275. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 502. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 117 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 271; Abeille XI, 1873, p. 778; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 447; Best.-Tab. 9, 1883, p. 45. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 203. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 620 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 929, fig. 120. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 33 ♀ (Gr. *Thalycrynchus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 17, t. 153, f. 20. — Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1928, p. 62. — Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. 1932, p. 129. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 19. — Albanien, Serbien, Mazedonien

var. *excelsior* Apfelb. Glasnik Bosn. Herzegov. XXX, 1918 (1919), p. 149; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. IV, 1928, p. 63. — Süd-Albanien: Valona

subsp. *eugibinus* Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. 1932, p. 129. — Italien: Umbrien (Gubbio)

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 43; l. c. XVIII, 1886, p. 286 (Futterpflanzen). — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 49. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkrankh. III, 1906—13 (1912), p. 542 (Schädling an Fichten). — Lona, Rendiconto Unione Zool. Ital. 1932, p. 27—29.

peristericus Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni XIII, 1901, p. 434; Wiss. Mittheil. Bosnien VIII, 1901, p. 466. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119. — Albanien, Epirus: Janina (Peristeri)

permundus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 98 (Gr. *Otismotilus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 32. — Nord-Italien: Valtellina

Peyerimhoffi Hustache, Bull. Soc. Ent. France 1920, p. 17; Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 61. — Frankreich: Basses-Alpes, Cheval-Blanc, Montagne del Boules

pigrans Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 148 (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschrift XVII, 1873, p. 274; Abeille XI, 1873, p. 780; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 460; Best.-Tab. 9, 1883, p. 58. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 234. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 218 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 101 (Gr. *Nilepolemis*). — Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. 1921, p. 116. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 3. — Horion, Nachtr. zu Fn. Germ. 1935, p. 307. — Österreich: Schneeberg, Steiermark

piliger	Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien IV, 1896, p. 539 ♂ ♀, 542. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 64 (Gr. *Microphalantus*).	Bosnien: Volujak, Vlasulja; Montenegro: Durmitor
pilosulus	Penecke, Col. Centralbl. II, 1928, p. 37.	Thessalien
plebejus	Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 142 (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschrift XVII, 1873, p. 273; Abeille XI, 1873, p. 780; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 451; Best.-Tab. 9, 1883, p. 49. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 87 (Gr. *Postaremus*).	Krain, Julische Alpen, Kroatien: Velebit
	vulgaris Marseul, Abeille X, 1872, p. 226.	
poianae	Penecke, Col. Centralblatt I, 1927, p. 319 (*proximus*-Gr.).	Süd-Bucovina (Poiane Stampei)
politus	Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 606; l. c. VII, 1, 1843, p. 347. — Gebler, Bull. Soc. Nat. Moscou 1848, p. 364. — Kol. l. c. XXXII, 2, 1858, p. 442. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 181, Note; Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 374; l. c. XVI, 1872, p. 342; l. c. XVII, 1873, p. 277; Abeille XI, 1873, p. 784; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 476; Best.-Tab. 9, 1883, p. 74. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 9), p. 67 (Gr. *Microphalantus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 21. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 27. — W. Székessy, Kol. Rundschau 1934, p. 36.	Lappland, West-Sibirien
	borealis Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 342; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 476; Best.-Tab. 9, 1883, p. 74. — Faust, Finska Vet.-Soc. Förh. XXXII, 1890, p. 64. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 574 ♂ ♀; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 623 ♂ ♀ (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 67 (Gr. *Microphalantus*). — Horion, Nachtr. zu Fn. Germ. 1935, p. 306 (*politus* Gyll. nec Boh.).	
ponticus	Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 333, 347 (Subg. *Eurychirus*); Abeille XI, 1873, p. 797; Mittheilung Schweizer Entomologische Gesellsch. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 553; Best.-Tab. 9, 1883, p. 151. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 762. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 69 (Gr. *Dibredus*).	Kaukasus, Pontische Alpen
porcatus	Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 358, t. 88, f. 4 (*Curculio*). — Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 349 (*Otiorrhynchus*). — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 616; l. c. VII, 1, 1843, p. 364. — Küster, Käfer Eur. XI, 1847, Nr. 72. —	Mitteleuropa

Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 425; ed. 2, 1858, p. 747; ed. 3, II, 1874, p. 212 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 270, 276. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 304. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 294; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 153 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschrift XVII, 1873, p. 274; Abeille XI, 1873, p. 781; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 467; Best.-Tab. 9, 1883, p. 65; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 219. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 239. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—1888 (1883), p. 35 *(Brachyrhinus)*; (1886), p. 230 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 573; Fn. Transsylv. 1888—1891 (1891), Arten p. 622 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 538. — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 196. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 569 *(Brachyrhinus)*. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 928. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 103 (Gr. *Lolatismus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 23. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 91. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 34.

costatus F. Syst. El. II, 1801, p. 530 *(Curculio)*.

sexcostatus Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 172.

senex Ol. Entom. V, 1807, Nr. 83, p. 358, t. 25, f. 358 *(Curculio)*.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 43; l. c. XVIII, 1886, p. 286. — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 49.

praecellens Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87, Nr. 7 (1886), p. 282 ♂ ♀. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 65 ♂ ♀ (Gr. *Microphalantus*). — Apfelb. Glasnik zem. Muz. XXXII, 1920, p. 18; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, p. 86. — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. 1922, p. 39—43. — Biocovo, Mossor, Orliac

mossorensis Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 65. — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. 1922, p. 39—43. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 27.

subsp. *bosnarum* Csiki in Reitter, Cat. Col. Eur. ed. 2, 1906, col. 599 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 69 (Gr. *Dibredus*). — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. 1922, p. 41, 42. — Süd-Bosnien, Volujak, Bielasnica

puncticollis Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 8 (1891), p. 322 ♂ ♀. — Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien IV, 1896, p. 542. — J. Müller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXVII, 1907, p. 12.

var. *leliensis* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 65. — Südbosnien: Lelija

subsp. *Pentheri* (Apfelb.) Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 66 ♂ ♀ (Gr. *Microphalantus*). — Apfelb. Glasnik zem. Muz. XXXII, 1920, p. 18; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, p. 86. — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 43. — Montenegro: Durmitor

subsp. *Lonae* J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 42. — Dalmatien: Dinara

subsp. *pseudobosnarum* J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 41. — Montenegro: Krivosije

prokletiensis Apfelb. Akad. Wiss. Wien, math. naturw. Kl. 127, 1918, p. 171 (*perdix*-Gruppe); Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1928, p. 69. — Nord-Alban. Alpen

proximus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 163 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 275; Abeille XI, 1873, p. 782; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 10 (1876), p. 12; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 466; Best.-Tab. 9, 1883, p. 64. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 251. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 622 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Daniel, Col.-Studien II, 1898, p. 42. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 54; l. c. XXII, 1903, p. 228; l. c. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 108 (Gr. *Eunihus*). — Karpathische Waldgebirge, Nord-Siebenbürgen: Rodnagebirge

Brancsiki Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 340 (pro 420); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, 1875 (1876), p. 484; cf. p. XII, Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 186 (non 1883).

tatricus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 105, Nr. 7; l. c. XVII, 1898, p. 54.

pseudaffaber Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 88 (Gr. *Jelenantus*). — Tunis

puncticornis Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 605; l. c. VII, I, 1843, p. 346. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 442. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 170 ♂; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 278; Abeille XI, 1873, p. 783; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 471 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 69. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 258. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 68 ♂ ♀ (Gr. *Microphalantus*). — Krim, Kaukasus

puncticollis Marseul, Cat. Col. Eur. XXV, 1888, p. 371.

punctifrons Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 2 (1888), p. 50. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 113 (Gr. *Egydelenus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 24. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 36. — Steiermark, Tirol: Innsbruck

Putoni Stierl. Rev. d'Ent. X, 1891, p. 143 ♂ ♀. — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 195. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 58 ♂ ♀ (Gr. *Phalantorrhynchus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 63. — Französ. Alpen: Gap, Vaucluse, Mont Ventous

pyrenaeus Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 554 ♂; l. c. VII, I, 1843, p. 259 ♂. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 84 ♂ ♀ (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 267; Abeille XI, 1873, p. 774; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 430; Best.-Tab. 9, 1883, p. 28. — Marseul, Abeille XI, 1872, p. 163. — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni IX, 1897, p. 449, 451, 456; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 533, 535. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 43 (Gr. *Otiorrhynchus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 35. — Südfrankreich, Pyrenäen, Embrun

♀ *femoralis* Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 272.

granuliger Dufour, Bull. Soc. Sc. Pau III, 1843, p. 79; Act. Soc. Linn. Bordeaux XVII, 1851, p. 343.

travnikanus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 8 (1891), p. 322 ♂ ♀. — Apfelb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 533; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9/12, p. 95.

var. *occidentalis* Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 36. — Pyrenäen: Ariège, Santander, l'Andore, Iriberg

Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon (N. S.) XLVI, 1909, p. 19, 21.

quadratopunctatus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. II, 1866—68 p. 92; l. c. VII, 1884—87, Nr. 1 (1884), p. 39. — Daniel, Col.-Studien II, 1898, p. 41. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 105 (Gr. *Lolatismus*). — Kaukasus: Swanetien

foveolatostriatus Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1893—97, Nr. 7 (1896), p. 326.

luridus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1893—97, Nr. 1 (1893), p. 57.

raucus F. Gen. Ins. 1776, p. 226; Spec. Ins. I, 1781, p. 188; Mant. Ins. I, 1787, p. 115; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 472; Syst. El. II, 1801, p. 529 (*Curculio*). — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 212; l. c. IV, 1789, p. 278. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1785. — Ol. Encycl. méthod. V, 1790, p. 536, Nr. 287; Entom. V, 1807, Nr. 83, p. 360, t. 31, f. 466. — Payk. Monogr. Curc. Suec. 1792, p. 97; Fn. Suec. III, 1800, p. 291. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 343, t. 87, f. 2. — Panz, Ent. Germ. 1795, p. 239. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, — Nord- u. Mitteleuropa, Westsibirien, Nord- u. Mittel-Italien, Kroatien, Bosnien, Serbien, S.W.-Bulgarien

p. 300. — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 297 *(Curculio)*; in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 614; l. c. VII, I, 1843, p. 364 *(Otiorrhynchus)*. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 120; Man. Brit. Col. 1839, p. 243. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 329. — Gebler, Bull. Soc. Nat. Moscou 1848, p. 365. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 425; l. c. ed. 2, 1858, p. 747; l. c. ed. 3, III, 1874, p. 212 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Küster, Käfer Eur. XXIV, 1852, p. 99. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 271, 277. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXII, 2, 1858, p. 449. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 292; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 116 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschrift XVII, 1873, p. 271; Abeille XI, 1873, p. 778; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 446; Best.-Tab. 9, 1883, p. 44; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 216. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 505. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 124; l. c. X, 1868, p. 173, 174. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 202. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 35 *(Brachyrhinus)*, (1886), p. 229 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 174, 177. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 572; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 619 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 537. — Poppius, Meddel. Soc. Fn. et Fl. fenn. XXVI, 1900, p. 218 (Finnland). — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 568 *(Brachyrhinus)*. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 929 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 79 (Gr. *Asphaerorrhynchus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 22, t. 153, f. 19. — Apfelb. Akad. d. Wiss. Anz. Nr. 9, 1918, p. 3. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 88. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 29.

arenarius Herbst, Arch. Ins.-Gesch. IV—V, 1784—85, p. 82 *(Curculio)*. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 10, I, 1790, p. 1799. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 326.

luctuosus Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 171 *(Brachyrhinus)*.

tristis Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 171 *(Brachyrhinus)*.

ab. *tristis* F. Syst. Ent. 1775, p. 149; Spec. Ins. I, 1781, p. 190; Mant. Ins. I, 1787, p. 117; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 471; Syst. El. II, 1801, p. 529 *(Curculio)*. — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 213; l. c. IV, 1789, p. 279. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 3, I, 4, 1790, p. 1786. — Ol. Encycl. méthod. V, 1790, p. 540. — Bonsd. Hist. Nat. Curc. Suec. II,

1792, p. 36, fig. 28. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 504. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 239. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 117; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 446; Best.-Tab. 9, 1883, p. 44. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 929. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 79. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 29.

ab. *fulvus* F. Mant. Ins. I, 1787, p. 113; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 455; Syst. El. II, 1801, p. 513 *(Curculio)*. — Vill. Entom. Linn. IV, 1789, p. 291. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 3, I, 4, 1790, p. 1782. — Ol. Encycl. méthod. V, 1790, p. 529. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 483. — Ill. Mag. Ins. VI, 1807, p. 153. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 117; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 446; Best.-Tab. 9, 1883, p. 44. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 202. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 929. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 79. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 29.

Bettinii Fiori, Ann. Soc. Nat. Modena XXII, 1849, p. 109; Riv. Col. Ital. VI, 1908, p. 237. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 79. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 29.

Biologie: Rouzet, Ann. Soc. Ent. France (2) X, 1852, Bull. p. XXXIV (Metamorphose). — Glaser, Zeitschr. Landw. Ver. Großherzogt. Hessen XLVIII, 1878, p. 190 (Schädling an Reben). — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 44; l. c. XVIII, 1886, p. 286. — Zimmermann, Blätter für Obst-, Wein- und Gartenbau 1905, p. 172 (Schädling an Obstbäumen). — Jablonowski, Tier. Fainde d. Zuckerrüben 1909, p. 35—36, fig. 2 (Schädling an Zuckerrüben). — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkrankh. III, 1906—13 (1912). — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 50.

relictus Apfelb. Akad. Wiss. Wien. Anz. Nr. 1, 1908, p. 3. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 95 (Gr. *Elechranus*). — Albanien: Schar-Dagh, Ljuboten

remotegranulatus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 7 (1891), p. 270. — Mallász, Rovart. Lapok X, 1903, p. 83, fig. 2. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 93 (Gr. *Elechranus*). — Ungarn: Bihara Komitat, Ponvrul; Siebenbürgen, Detonata, Bihar-Gebirge

Petersi Mallasz, Rovart. Lapok X, 1903, p. 83, fig. 1.

repletus Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 302 ♂ ♀. — Stierl. Revis. Eur. — West-Rußland,

Otiorrhynchus 1861, p. 114 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 271; Abeille XI, 1873, p. 778; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 446; Best.-Tab. 9, 1883, p. 44. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 200. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 572; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 619 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 48 (Gr. *Otiorrhynchus*). — Polen, Galizien, Karpathen

rhacusensis Germ. Fn. Ins. Eur. VII, 1822, t. 12 *(Curculio)*; Ins. Spec. novae I, 1824, p. 346, Nr. 1 *(Otiorrhynchus)*. — Küster, Käfer Eur. XI, 1847, Nr. 53. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 44 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 265; Abeille XI, 1873, p. 773; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 424; Best.-Tab. 9, 1883, p. 22. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 123. — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni IX, 1897, p. 455; l. c. X, 1898, p. 4. — A. & F. Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. XL, 1908, p. 258. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 39 ♂ ♀ (Gr. *Otiorrhynchus*). — J. Müller, Entom. Blätter 1916, Heft 4—6, p. 107. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 20. — Süd-Herzegovina: Trebinje, Bilek, Stolac, Dolugi Hrasna; Dalmatien, Sizilien

ragusensis Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 552 ♂ ♀; l. c. VII, 1, 1843, p. 257 ♂ ♀.

ab. *siculus* Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 44; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 424; Best.-Tab. 9, 1883, p. 22. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 123. — A. & F. Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. XL, 1908, p. 258. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 39. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 20.

ab. *nigripes* Ragusa, Natural. Sicil. XVII, 1904, p. 21. — Porta, Riv. Col. Ital. III, 1905, p. 149. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 39. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 20.

var. *minutesquamosus* A. & F. Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. XL, 1908, p. 258. — Porta, Riv. Col. Ital. VIII, 1910, p. 61; Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 20. — Süd-Italien: Monte Cervaro (Salerno), Valle Lucano

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 44; l. c. XVIII, 1886, p. 286 (Futterpflanzen).

rhilensis Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 2 (1888), p. 50. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (1914), p. 108 (Gr. *Eunihus*). — Herzegovina: Bjelasnica; Dalmatien; Rhilo-Dagh, Kaukasus?, Jura, Italien (Abruzzen)

? *setifer* Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 368. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 296; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 163; Berl. Ent. Zeitschrift XVI, 1872, p. 341; l. c. XVII, 1873,

p. 275; Abeille XI, 1873, p. 782; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 462; Best.-Tab. 9, 1883, p. 60. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 249. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXII, 1913 (Best.-Tab. p. 108, Note.

Eduardi Pic, Echange XVII, 1901 (Subg. *Tournieria*).

abruzzensis Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93 (1893), p. XXVII, (1892), p. 412. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 455 (Addenda).

latifrons Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 9 (1892), p. 358 (Subg. *Arammichnus*) (non Stierl. 1890, p. 164). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1912 (1913), p. 247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119.

Leonhardi Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 108.

ronchettinus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 304; l. c. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 67), p. 97 (Gr. *Otismotilus*). — Kaukasus: Valle Ceja, Trsi-Paß,

rotundicollis Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 9 (1876), p. 513; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 560; Best.-Tab. 9, 1883, p. 158. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 78, Note. — Antiochia

rubiginosus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 140; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 273; Abeille XI, 1873, p. 780; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 451; Best.-Tab. 9, 1883, p. 49. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 224. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 120. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 103 (Gr. *misellus*). — Lyon

rudis (Chevr.) Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 136; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1872, p. 273; Abeille XI, 1873, p. 780; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 456; Best.-Tab. 9, 1883, p. 54. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 220. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 112 (Gr. *Cerdelcus*). — Oran

rodus Marseul, Abeille X, 1872, p. 220.

rugosostriatus Goeze, Ent. Beitr. I, 1877, p. 395. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 929. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 92; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 190, Note; Best.-Tab. 70, 1914, p. 62, Note; Fn. Germ. V, 1916, p. 22. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 88. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 31. — Westliches Mitteleuropa: Britannien, Holland, Frankreich, Pyrenäen, Alpengebiet, Italien, Kroatien, Bosnien,

rugosissimus Villers, Ent. Linn. I, 1789, p. 207; l. c. IV, 1789, p. 277 *(Curculio)*.

corrugatus Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13,

I, 4, 1790, p. 1778 *(Curculio)*. — Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 636 *(Otiorrhynchus)*; l. c. VII, I, 1843, p. 388. — Herzegovina, Dalmatien, Bulgarien, Kaukasus, Nord-Afrika

scabrosus Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 298 *(Curculio)*. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 119; Man. Brit. Col. 1839, p. 242 *(Otiorrhynchus)*. — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 570 ♂ ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 279 ♂ ♀. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 423; ed. 2, 1858, p. 743; ed. 3, II, 1874, p. 209 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 269 (Subg. *Otiorrhynchus*); Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 136 ♂; Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 373; l. c. XVII, 1873, p. 272; Abeille XI, 1873, p. 779; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 455; Best.-Tab. 9, 1883, p. 53; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 218. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 219. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 36 *(Brachyrhinus)*; (1886), p. 229 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 175, 177, t. 157, f. 6. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 538. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 569, Nr. 4 *(Brachyrhinus)*.

Nord-Amerika

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 44; l. c. XVIII, 1886, p. 286 *(scabrosus)*. — Buchanan, Canad. Ent. LIX, 1927, p. 183—189. — Browne et Keifer (H. H.), Mon. Bull. Dep. Agric. California XIX, no. 8, 1930, p. 591-95, 5 figs. — Barrett, Univ. Cal. Pub. Ent. V, 1930, p. 96. — Smith, Bull. California Agric. Expt. Sta. Nr. 505, Berkeley 1930. — Hardouin, Bull. Soc. Ent. France 1931, XI, p. 179. — A. Hoffmann, Bull. Soc. Ent. France 1931, XI, p. 183. — Keifer, Mon. Bull. Dept. Agric. California XX, Nr. 7, 1931, Sacramento, p. 470—472, 2 figs. — Essig, Bull. Dep. Agr. California XX, 1933, p. 398—403.

sabulosus Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 555 ♂; l. c. VII, I, 1843, p. 259 ♂. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 56 (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Entom. Zeitschr. XVII, 1873, p. 266; Abeille XI, 1873, p. 773; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 426; Best.-Tab. 9, 1883, p. 24. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 134. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 216 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni IX, 1897, p. 455; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 531. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 37 ♂ ♀ (Gr. *Urorrhynchus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 19. — Schlesien, Österreich, Ungarn, Illyrien, Istrien, (Fiume), Süd-Kroatien: Capela, Velebit; ? Nord-Bosnien

subsp. *latipennis* Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 271 ♀. — Stierl.

Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 80 ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 266; Abeille XI, 1873, p. 773; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 426; Best.-Tab. 9, 1883, p. 24; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 210. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 158. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, 1874, p. 217 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 37. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 19.

sagax Reitter, Ent. Blätter II, 1915, p. 160 *(Phalantorrhynchus)*. — Zumpt, Bol. Soc. Españ. Hist. Nat. 1934, p. 264, 290. — Asturien

salicicola Heyden, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1908, p. 46. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 267. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 43 (Gr. *Otiorrhynchus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 36. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 22. — Tirol, Norditalien, Schweiz, Französische Alpen

salicis Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 266 (non Stroem); Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 77; Berl. Ent. Zeitschr. 1862, p. 358.

ab. *apenninus* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 426 ♂; Best.-Tab. 9, 1883, p. 24. — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni IX, 1897, p. 456, Note. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 43. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 22.

liguricus Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni IX, 1897, p. 451; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 534.

var. *pseudonotus* Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni IX, 1897, p. 450, 452, 456; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 533, 535. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 43. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 37. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 22. — Bergamask.-, Tridentin.-Alpen

scaber (♀) L. Syst. Nat. ed. 10, II, 1758, p. 609. — Daniel, Col.-Studien II, 1898 (1899), p. 42. — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 196. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 106 *(Nihus)*. — Penecke, Wien. Ent. Zeit. XXXIX, 1922, p. 175. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 92. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 34. — Nord- u. Mittel-Europa

griseopunctatus Degeer, Mém. Hist. Ins. V, p. 244; Abh. Gesch. Ins. V, 1781, p. 9 *(Curculio)*. — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 215; l. c. IV, 1789, p. 282.

raucus Herbst, Arch. Ins.-Gesch. IV—V, 1784—85, p. 80, t. 24, f. 25 *(Curculio)*.

multicolor Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1805 *(Curculio)*.

septentrionis Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 360, t. 88, f. 6 *(Curculio)*. — Payk, Fn. Suec. III, 1800, p. 290. — Ol. Entom. V, 1807, Nr. 83, p. 359, t. 31, f. 467. — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 615. — Boh. l. c. VII, I, 1843, p. 363 *(Otiorrhynchus)*. — Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 241. — Küster, Käfer Eur. XI, 1847, Nr. 71. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 425; ed. 2, 1858, p. 747; ed. 3, II, 1874, p. 212 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 270, 276. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 304. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 293; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 153 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 274; Abeille XI, 1873, p. 781; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 463; Best.-Tab. 9, 1883, p. 61; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 220. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 123; l. c. X, 1868, p. 172, 174; l. c. X, 1870, p. 174. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 240. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 175, 178, t. 157, f. 8. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 573; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 621 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 568 *(Brachyrhinus)*. — Gouve & Guilleaume, Ann. Soc. Ent. Belg. Ins. 1906, p. 192—193 (Belgien).

? *echinatus* Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 377, t. 89, f. 13 *(Curculio)*. Deutschland

setosus F. Syst. El. II, 1801, p. 527 *(Curculio)*. — ? Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 169 *(Brachyrhinus)*. — Ill. Mag. Ins. VI, 1807, p. 314. — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 298. — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 335; Ins. Lapp. I, 1838 (1840), p. 188. — C. R. Suhlb. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1835), p. 126.

gemellatus Beck, Beitr. Bayer. Ins.-Fn. 1817, p. 24, t. 7, f. 37 *(Curculio)*.

helveticus Desbr. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. III, 1871, p. 345; Opusc. Ent. I, 1874—75, p. 13; Frelon III, 1893, p. 69; l. c. VII, 1897, p. 74, Note. — Tourn. Petit. Nouv. Ent. II, 1876, p. 85.

arvernicus Desbr. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. III, 1869—72 (1871), p. 345 *(Lissocryptus)*. — Tourn. Petit. Nouv. Ent. II, 8, 1876, p. 85.

Ecchelii Gredler, Zeitschr. Ferdinandeum Innsbruck (3) XXVI, 1882, p. 230.

fuscatus Stierl. Best.-Tab. IX, 1883, II, p. 91.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 164; l. c. XVIII, 1886, p. 296 *(arvernicus)*. — Kleine, Ent. Blätter VI,

1910, p. 50; l. c. XVI, 1884, p. 44 *(septentrionis)*; l. c. XVIII, 1886, p. 287 (Futterpflanzen).

scaberrimus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 52 ♂ ♀ (Subg. *Otiorrhynchus*); Best.-Tab. XVII, 1873, p. 267; Abeille XI, 1873, p. 775; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 431; Best.-Tab. 9, 1883, p. 29. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 130. — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 269; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 776. — A. & F. Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. XL, 1908, p. 262. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. LXXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 40 (Gr. *Otiorrhynchus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 20, Note. — Italien: Rom; Griechenland

Schaubergeri Lona, Wien. Ent. Zeit. XL, 1923, p. 64 (Gr. *Mülleri*). — Oberösterreich: Hohes Nock, Sengsengebirge

Maderianus Penecke, Wien. Ent. Zeit. XL, 1923, p. 140; l. c. XLIII, 1926, p. 13.

Schmidti Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 167 ♂ ♀ (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 275; Abeille XI, 1873, p. 782; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 470; Best.-Tab. 9, 1883, p. 68. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 254. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 219 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Daniel, Col.-Studien II, 1898, p. 49. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 86 (Gr. *Postaremus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 30. — Tridentin. und Cadorische Alpen, Krain

tridentinus Daniel, Col.-Studien I, 1891, p. 59 ♂ ♀. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 30.

secretus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 105 (Gr. *Lolatismus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 34. — Tridentin. Alpen

semitarius Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 97 (Gr. *Otismotilus*). — Krim

sensitivus Scop. Ent. Carn. 1763, p. 32 *(Curculio)*. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1802. — Ol. Entom. V, 1807, Nr. 83, p. 573. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 426; Best.-Tab. 9, 1883, p. 24. — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni IX, 1897, p. 455. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 926. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 37 ♂ ♀ (Gr. *Urorrhynchus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 18, t. 3, f. 14. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 19. — Im ganzen Alpenzuge: Österreich, Kärnten, Tirol, Norditalien; Ungarn, Krain, Kroatien, Bosnien, Herzegovina

planatus Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 295, t. 83, f. 1 *(Curculio)*. — F. Syst. El. II, 1801, p. 522. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 165 *(Brachyrhinus)*. — Ol. Entom. V, 1807, Nr. 83, p. 369, t. 19, f. 235 *(Curculio)*. — Germ. Reise Dalmatien 1817, p. 247. — Gyll. in

Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 553 ♂ ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 258 ♂ ♀ (*Otiorrhynchus*). — Küster, Käfer Eur. XVIII, 1849, Nr. 86. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 422; l. c. ed. 2, 1858, p. 742; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 209 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 501. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 55 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 265; Abeille XI, 1873, p. 773. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 133. — Leisewitz, Chitinfortbewegungsapp. Ins. 1906, p. 112 (Beine).

var. *Hilfi* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 7; l. c. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 37 ♂ ♀. — Herzegovina: Plascha, Vran-Planina

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 44; l. c. XVIII, 1886, p. 287. — Fuchs, Forstl.-Nat. Zeitschr. VI, 1897, p. 381—383; l. c. p. 542; Nat. Zeitschr. Land- u. Forstwirtsch. III, 1905, p. 210—212. — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 49 (Futterpflanzen). — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkrankh. III, 1906—13 (1912), p. 542 (Schädling).

seriatosetulosus (Dan. i. l.) Hänel, Kol. Rundschau 1934, p. 37 (prope *incivilis*). — Kaukasus

seriehispidus Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 325 ♂; l. c. XVII, 1873, p. 275; Abeille XI, 1873, p. 783; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—81, Nr. 8—9 (1883), p. 470; Best.-Tab. 9, 1883, p. 68. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 62 ♂ ♀ (Gr. *Microphalantus*). — ? Schweiz: Neuchatell, ? Zentralasien

seriehirtus Marseul, Abeille X, 1872, p. 754.

shatorensis Apfelb. Glasnik zem. Muzeja Bosn. Herzegovina XL, 1928, p. 59 (bei *spalatrensis* Boh.). — Bosnien

Simoni Bedel, Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, Bull. p. LI. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 444 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 42 ♂ ♀. — Sainte-Claire Deville, Abeille XXX, 1904, p. 195. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 57 ♂ ♀ (Gr. *Harpinorrhynchus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 70. — Französische Alpen, Südfrankreich: Basses Alpes, Digne (Typus)

sitonoides Apfelb. Sitzber. Ak. Wien CXVI, I, 1907, p. 523. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 64 (Gr. *Microphalantus*). — Albanien: Malissoren-Gebirge, Maranai-Gebirge

sordidus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 159 ♂ (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 275; Abeille XI, 1873, p. 782; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 448; Best.-Tab. 9, 1883, p. 46. — Marseul, Abeille X, — Spanien, Algier

1872, p. 246. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 110 ♂ ♀ (Gr. *Aranihus*).

fraternus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 160 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 275; Abeille XI, 1873, p. 782; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 448; Best.-Tab. 9, 1883, p. 46. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 247.

fraterculus (Stierl.) Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 110 (err.).

planicollis (Desbr.) Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 110.

spalatrensis Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 257. — Küster, Käfer Eur. XI, 1847, Nr. 55. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 46 ♂ (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 265; Abeille XI, 1873, p. 773; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 425; Best.-Tab. 9, 1883, p. 23. — Marseul, Abeille XI, 1872, p. 125. — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni IX, 1897, p. 452, 454, 455; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 536, 538. — J. Müller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 12; Boll. Soc. Ent. Ital. 1922, p. 36. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 41 (Gr. *Otiorrhynchus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 21. — Nord- u. Zentraldalmatien: Mossor, Dinara, Prolog

fabrilis Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 352.

var. *cardinigeroides* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 203; l. c. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 41. — Apfelb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 538. — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. 1922, p. 36. — Nordwest-Kroatien: Bjelolasica, ? Risnjakberg

subsp. *gylippus* Reitter, Deutsche Ent. Zeitschrift 1898, p. 352; Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 41 (Gr. *Otiorrhynchus*). — Apfelb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 538; Glasnik zem. Muzeja XXXII, 1920, p. 18; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1929, p. 85. — J. Müller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LVII, 1907, p. 12; Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 36. — Herzegovina: Plasa, Curstinica, Prenj, Jablanica

subg. *biocovensis* Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 36. — Dalmatien: Biocovo

sphaerosoma Apfelb. Akad. Wiss. Wien, Anz. Nr. 9, 1918, p. 3 (*raucus*-Gr.). — N.-Albanien (Merdita)

splendidus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 94 (Gr. *Elechranus*). — Balkan, Bulgarien: Ryla-Gebirge, Griechenland

squamifer Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 314. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 109, Note.

squamulifer Marseul, Abeille X, 1872, p. 244.

squamiperdix Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 33 ♀ (Gr. *Thalycrynchus*). — Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1928, p. 61. — Kroatien: Große Kapella

squamipes Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, (Best.-Tab. 69), p. 110 ♀ (Gr. *Aranihus*). — Tunis, Sfax

stichopterus Apfelb. Glasnik zem. Mus. Bosni Herzeg. XXIII, 1911, p. 221; Wiss. Mittheil. Bosn. Herzeg. XIII, 1916, p. 351; Glasnik zem. Muz. XXXIII, 1920, p. 17; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, p. 85. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 36. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 26.19 — Albanien: Gebirge bei Orohi, Mal i Shêit und Munela

Stierlini Gemm. Col. Hefte IX, 1871, p. 118. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 272; Abeille XI, 1873, p. 779; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 453; Best.-Tab. 9, 1883, p. 51. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 816. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 91 (Gr. *Fondajenus*). — Griechenland: Attika, Koraxgeb.

tristis Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 364; l. c. XVI, 1872, p. 342 (non Scop.). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 222.

stomachosus Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 586 ♂ ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 311 ♂ ♀. — Sainte-Claire Deville, Abeille XXX, 1900—1906, p. 194. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 52 (Gr. *Otiorrhynchus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 58. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 25. — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXVI, 1933, p. 250, 272. — Seealpen, Oberitalien: Piemont

ab. *nigripes* Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 264. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 71 (*"nigriceps"*); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 434; Best.-Tab. 9, 1883, p. 32. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 52. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 25. — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXVI, 1933, p. 250, 251.

nigriceps Stierl. Revis. Eur. Otiorrhychus 1861, p. 71 (err.). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 149.

ab. *pubens* Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 312. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 71 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 268; Abeille XI, 1873, p. 775; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 434; Best.-Tab. 9, 1883, p. 32. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 149. — Desbr. Frelon III, 1894, p. 87 ♂, 92 ♀. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 52. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 59. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 25. — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXVI, 1933, p. 250, 272. — Basses Alpes

Ariasi Stierl. Rev. Europ. Otiorrhynchus 1861, p. 72; Best.-Tab. 1883, p. 32.

var. *Grouvellei* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 433 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 31; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 7, 1886, p. 283, 284. — Desbr. Frelon III, 1894, p. 89 ♂, 93 ♀. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 52. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 58. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 25. — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXVI, 1933, p. 218—276. — Seealpen: Monte Pesio

Peirolerii Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 63. — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXVI, 1933, p. 250.

ab. *Sellae* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 3 (1881), p. 132 ♂ ♀; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 435 ♂ ♀; Best.-Tab. 33, 1883, p. 33; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87, Nr. 7 (1886), p. 283, 284. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 57. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 25. — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXVI, 1933, p. 249, 272. — Westalpen: Monte Viso

ab. *durus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 52. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 58. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 25.

ab. *ruficollis* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 52. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 58. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 25. — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXVI, 1933, p. 272.

var. *griseopunctatus* Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 259. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 259; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 63 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 269; Abeille XI, 1873, p. 776; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 434; Best.-Tab. 9, 1883, p. 32; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87, Nr. 7 (1886), p. 284; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 212 ♂ ♀. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 141. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 618 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Grill, Ent. Tidskr. XIV, 1893, p. 255. — Desbr. Frelon III, 1893—94, Nr. 12 (1894), p. 86 ♂, 93 ♀. — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 194. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 51. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 55. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 25. — Uyttenboogaart, Tijdschr. LXXVI, 1933, p. 218—276. — Westalpen: Piemont, Wallis, von Rosaberg bis Seealpen

clavipes Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 297. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 259; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 63; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 434; Best.-Tab. 9, 1883, p. 32; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 212. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 141. — Fauvel, Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 247 *(Brachyrhinus)*. — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXIV, 1931, p. 281, 298; l. c. LXXVI, 1933, p. 218—276.

var. *martinensis* Cl. Müller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 378 ♂ ♀; Ent. Blätter XXXI, 1935, p. 75. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 53 (Gr. *Otiorrhynchus)*. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 26. — Tridentin. Alpen: S. Martino di Castrozza

var. *crissolensis* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 53 *(grissolensis* err.); l. c. XXXIII, 1914, p. 44 *(crissolensis)*. — Piemont: Monte Viso (Crissolo)

var. *nigerrimus* A. & F. Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXV, 1903, p. 160 ♂ ♀. — Porta, Riv. Col. Ital. II, 1904, p. 153, 154, 155 ♂ ♀. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 51 (Gr. *Otiorrhynchus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 25. — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXVI, 1933, p. 239, 240, 272. — Ligurien: Monte Penna

ab. *judicariensis* (Daniel) Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII (Best.-Tab. 69), 1913, p. 51. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 25. — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXVI, 1933, p. 239, 240, 272. — Tridentin. Alpen, Val di Leno, Val Daone

var. *vesulianus* (Daniel) Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 51.

var. *insubricus* (Reitt.) Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXVI, 1933, p. 240, 241, 272.

Biologie: Groult, Naturaliste I, 1879, p. 99. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 40; l. c. XVIII, 1886, p. 285.

stricticollis Fairm. Ann. Soc. Ent. France 1859, Bull. p. CLXIV. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 382. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 268; Abeille XI, 1873, p. 775; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 433; Best.-Tab. 9, 1883, p. 31. — Desbr. Frelon III, 1894, p. 88 ♂, 92 ♀.— Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 53 (Gr. *Otiorrhynchus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 65. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 25. — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXVI, 1935, p. 253—276. — Südfrankreich, Pyrenäen

ab. *gallicus* Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 74; Berl. Ent. Zeitschr. XVII,

1873, p. 269; Abeille XI, 1873, p. 776; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 433; Best.-Tab. 9, 1883, p. 31. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 151. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 53. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 65. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 25.

Sturanyi Apfelb. Sitzber. Ak. Wiss. Wien CXV, I, 1906, p. IV, 1673 ♂ ♀; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1928, p. 66. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 35 ♂ ♀ (Gr. *Thalycrynchus*). — W.-Montenegro: Cetinje, Rjieka

striginurus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 36 (Gr. *Thalycrynchus*). — Apfelb. Glasnik zem. Muzeja Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 17; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, p. 85.

Stussineri Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 2 (1880), p. 58; l. c. VI, 8—9 (1883), p. 462; Best.-Tab. 9, 1883, p. 60. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 76 (Gr. *Homorhythmus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 29. — Istrien

vestitus Küster, Käfer Eur. XV, 1848, Nr. 61 *(Cathorm.)*. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 130 *(? Otiorhynchus)*. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 637, Nr. 32 *(Trachyphlous)*.

subcostatus Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 129; l. c. XVII, 1873, p. 274; Abeille XI, 1873, p. 781; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 8—9, 1883, p. 463; Best.-Tab. 9, 1883, p. 61; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 220. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 240. — Daniel, Col.-Studien II, 1898, p. 47. — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 196. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 928, fig. 118 B (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 106 (Gr. *Nihus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 93. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 35. — West-Alpen, Schweiz: Engadin, Monte Rosa; Frankreich, Kärnten: Freisteil, Gailtal

septentrionis var. B Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 154.

subspinosus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 127 ♂; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 272; Abeille XI, 1873, p. 779; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 456; Best.-Tab. 9, 1883, p. 54. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 215. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 90. — Apfelb. Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 26; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9/12, p. 110. — Griechenland: Insel Syra

sulcatellus Daniel, Col.-Studien II, 1898, p. 45. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 — Norditalien: Tridentin.

(Best.-Tab. 69), p. 100 (Gr. *Nilepolemis*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 33. — Alpen (Judikarien), Lombardia: Val Danerba, Monte Cadria, Val di Leno, Cima Tombea, Cima di Tasinella

sulcogemmatus Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 339. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 93 ♂ ♀ (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 269; Abeille XI, 1873, p. 776; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 436; Best.-Tab. 9, 1883, p. 34. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 172. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 48 (Gr. *Otiorrhynchus*). — Andalusien

? *frigidus* Stierl. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 74; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1893—97, Nr. 6 (1895), p. 300 (Subg. *Tournieria*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 48, Note; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119.

sulfurifer F. Syst. El. II, 1801, p. 522 (*Curculio*). — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 163 (*Brachyrhinus*). — Ol. Entom. V, 1807, Nr. 83, p. 368, t. 19, f. 237 (*Curculio*). — Panz. Fn. Ins. Germ. IX, 1809, Heft 104, t. 7. — Germ. Reise Dalmatien 1817, p. 246, Obs. — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 556 ♂ ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 260 ♂ ♀ (*Otiorrhynchus*). — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 54 ♂ ♀ (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 269; Abeille XI, 1873, p. 775; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 431; Best.-Tab. 9, 1883, p. 29. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 132. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 216 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 46 (Gr. *Otiorrhynchus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 23. — Nord-Ostitalien: Venet.-Julische Alpen; Krain, Ungarn, Dalmatien

friulicus Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VII, 1797, p. 60, t. 98, f. 11 (*Curculio*).

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 46; l. c. XVIII, 1886, p. 287.

tagenioides Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 149 ♂ (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 274; Abeille XI, 1873, p. 781; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 453; Best.-Tab. 9, 1883, p. 51. — Marseul, Abeille XI, 1872, p. 235. — Redtb. Fn. Austr. ed. II, 1874, p. 218 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.- — Hoch-Obir, Julische Alpen: Triglav

	Tab. 69), p. 101 (Gr. *Nilepolemis*). — Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. 1921, p. 114. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 33.	
	obtusoides Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 272. — Daniel, Col.-Studien II, 1898, p. 42.	
	var. *provocator* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 102.	Julische Alpen: Trenta-Tal
	subsp. *Ravasinii* Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. LIII, 1921—1922, p. 115.	Venetianer Alpen: Cavallo-Raut-Claut Gebirge
teberdensis	Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 58 (Subg. *Tournieria*); l. c. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 109 (Gr. *Eunihus*).	Zentral-Kaukasus
tenuicostis	Hustache, Bull. Soc. Ent. France 1920, p. 19 (*ligneus*-Gruppe); Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 100.	Ost-Pyrenäen
terrifer	Stierl. Best.-Tab. 1883, II, p. 91; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87, Nr. I (1884), p. 38. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 80 (Gr. *Asphaerorrhynchus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 22, Note.	Kaukasus
teter	Gredler, Käfer Tirol II, 1886, p. 334. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 355; l. c. XVII, 1873, p. 275; Abeille XI, 1873, p. 782; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 461; Best.-Tab. 9, 1883, p. 59. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 250. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 107, Note (Gr. *Eunihus*).	Tirol. u. Tridentin. Alpen
thalassinus	Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni XVII, 1905, p. 250; Wiss. Mittheil. Bosnien X, 1907, p. 644; Mittheil. Bosn. Herzeg. XIII, 1916, p. 352; Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXX, 1918, p. 64; l. c. XXXII, 1920, p. 17; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1928, Nr. 5—8, p. 64; l. c. 1929, p. 85. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 34. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 19.	Julische Alpen, Kroatien, Istrien, Bosnien, Herzegovina, Dalmatien, Montenegro, Albanien
	ab. *ascendens* Apfelb. Sitz.-Ber. der Akad. Wiss. Wien 127 B, 1918, p. 169; Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXX, 1918, p. 150; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1928, p. 65.	
	subsp. *hypsobius* Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni XVII, 1905, p. 251; Wiss. Mittheil. Bosnien X, 1907, p. 644; Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 17; Neue syst. Insektenk. 1928, 5—8, p. 65; l. c. 9—12, p. 85. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 34.	Herzegovina: Prenj planina
	subsp. *brachyscelis* Apfelb. Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXIII, 1911, p. 221; Wiss. Mittheil. Bosn. Herzeg. XIII, 1916,	Montenegro: Lovcen-Gebiet,

p. 351; Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 17; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1928, Nr. 5—8, p .65; l. c. 1929, Nr. 9—12, p. 85. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 35 (Gr. *Thalycrynchus*). — Albanien: Munela-Gebirge, Mal i Shêit

ab. *cetinjensis* Apfelb. Glasnik zem. Muz. Bosn. Herz. 1911, p. 221; Wissensch. Mittheil. Bosn. Herzeg. XIII, 1916, p. 352; Neue Beitr. syst. Insektenk. 5—8, 1928, p. 66. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 35.

subsp. *kiorensis* Apfelb. Akad. Wiss. Wien, Anz. Nr. 9, 1918, p. 4; Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXX, 1918, p. 151; Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1928, p. 66. — Kiore-Gebirge (Süd-Albanien)

subsp. *sanctus* Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. 1932, p. 130. — Süditalien

thracicus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 158 (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschrift XVII, 1873, p. 275; Abeille XI, 1873, p. 782; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 448; Best.-Tab. 9, 1883, p. 46. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 244. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 109, Note. — Türkei

tiaretanus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 88 (Gr. *Jelenantus*). — Algier: Tiaret

tournierioides Apfelb. Mittheil. Königl. naturwiss. Instit. Sofia V, 1932, p. 156. — Sliven? (Bulgarien)

transadriaticus (Daniel) Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 40 ♂ ♀. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 20. — Italien: Mte. Gargano

truncatellus Graëlls, Mem. Comis. Mapa Zool. Españ. 1855 (1858), p. 83. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 94 ♂; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 268; Abeille XI, 1873, p. 775; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 435 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 33. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 173. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 49 ♂ ♀ (Gr. *Otiorrhynchus*). — Spanien: La Granja

truncatus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 53 ♂ ♀; (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 269; Abeille XI, 1873, p. 775; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 425; Best.-Tab. 9, 1883, p .23. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 131. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 216 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni IX, 1897, p. 455; Wissensch. Mittheil. Bosn. Herzeg. XIII, 1916, p. 351; Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 17; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, p. 85. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 36 (Gr. *Urorrhynchus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 19. — Gebirge des kroat.-litoral.-adriatisch. Küstengeb. bis nach Albanien (Merdita)

var. *viridilimbatus* Apfelb. Glasnik Muz. Bosni I, 1889, p. 520; Wiss. Mittheil. Bosnien II, 1894, p. 250; Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 17; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, p. 85. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 7; l. c. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 36. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 19. — Südbosnien

var. *laetificator* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 7; l .c. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 36. — Apfelb. Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 17; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, p. 85. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 19. — Zentral-Herzegovina: Vran planina, Corstnica, Prenyplanina

uncinatus Germ. Spec. Ins. novae I, 1824, p. 366. — Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 633; Boh. l. c. VII, I, 1843, p. 368. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 271, 277. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 746; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 211 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 505. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 296 (Subg. *Otiorrhynchus*); Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 162 ♂; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 275; Abeille XI, 1873, p. 782; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 462; Best.-Tab. 9, 1883, p. 60; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 219. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 249. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 35 *(Brachyrhinus)*; (1886), p. 230 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 196. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 569 *(Brachyrhinus)*. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 928 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 106 (Gr. *Nihus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 24. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 94. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 35. — Westliches Mittelgeb. von Deutschland und Schweiz bis Frankreich

setiger Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1891, p. 219.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 46; l. c. XVIII, 1886, p. 287.

valonensis Apfelb. Akad. Wien, Anz. Nr. 9, 1918, p. 4; Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXX, 1918, p. 152; Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1928, p. 68. — Süd-Albanien: Kiore-Gebirge

vehemens Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 270. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 62 ♂ ♀ (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1872, p. 267; Abeille XI, 1873, p. 775; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 432; Best.-Tab. 9, 1883, p. 30; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 212. — Oberitalien: Seealpen, Piemont, Tessin

Marseul, Abeille X, 1872, p. 140. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 47 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Breit, Kol. Rundschau XIV, 1928—29, p. 207. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 23.

ticinensis Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 265 ♂ ♀; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 62 ♂ ♀.

vestitus Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 584 ♂; l. c. VII, I, 1843, p. 304. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 270, 275. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 503. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus p. 120; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 272; Abeille XI, 1873, p. 779; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 449; Best.-Tab. 9, 1883, p. 47. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 206. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 218 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 93 (Gr. *Elechranus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 31. — Deutschland, Österreich, Tirol, Tridentin. Alpen

virgo Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 76 (Gr. *Homorythmus*). — Kaukasus: Swanetien

vitellus Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 588; l .c. VII, I, 1843, p. 320. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 309, Note (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 290; Abeille XI, 1873, p. 798; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 557; Best.-Tab. 9, 1883, p. 155. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 380. — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 196.— Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 112, Note (Gr. *Cerdelcus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 98. — Südfrankreich

priscus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 113 (Gr. *Cerdelcus*).

vodenensis Formanek, Kol. Rundschau VIII, 1920, p. 94 (*perdix*-Gruppe). — Macedonien: Vodena

Weisei Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 21; l. c. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 79 (Gr. *Asphaerorrhynchus*). — Weise, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 49. — Transkaukasus, Armenisch. Gebirge: Alagoes, Kleinasien

ab. *raucoides* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 79.

Subgen. **Cirorrhynchus** Apfelbeck.

Apfelb. Glasnik zem. Bosn. Herzeg. X, 1898, p. 269; l. c. XXXII, 1898, p. 269; l. c. XXXII, 1920, p. 15; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1928, Nr. 5—8, p. 72, Arten p. 36—54. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 49; Best.-Tab. 66, 1912, p. 5 (O. *plumipes* Germ.); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 69.

argenteus Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 118; Abeille XI, 1873, p. 778. — Friv. A — Ungarn, Banat,

Királyi magy. 1865, p. 207, t. 11, f. 8. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 205. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 71 ♀ (Gr. *Cirorrhynchus*). — Apfelb. Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 19; Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1928, Nr. 5—8, p. 49. — Serbien, Rumänien, Bulgarien

valachiae Fuss, Verh. Ver. Siebenbürg. Nat. 1868, p. 171 ♂ ♀ (Subg. *Cirorrhynchus*). — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 361 ♂ ♀. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 750. — Friv. Term. Füzet. XX, 1892, p. 132, Note. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 71 (Gr. *Cirorrhynchus*). — Apfelb. Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 19; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1928, Nr. 5—8, p. 48—49.

argentatus Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 271; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 459; Best.-Tab. 9, 1883, p. 57. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 71. — Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1928, Nr. 5—8, p. 49.

arrogans Friv. Term. Füzet. II, 1878, p. 111 ♀. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 444; Best.-Tab. 9, 1883, p. 42. — Reitter, Best.-Tab. 69, 1914, p. 70. — Apfelb. Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 19; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—112, p. 88. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 27. — Süd-Ungarn: Pécs (Fünfkirchen)

babensis Apfelb. Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. VII, 1895, p. 597; Wiss. Mittheil. Bosnien IV, 1896, p. 543 ♂ ♀, p. 545; Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 19; Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1928, p. 51; l. c. 1929, Nr. 9—12, p. 89. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.Tab. 69), p. 71, Note (Gr. *Cirorrhynchus*). — Herzegovinisch-dalmatinisch-montenegrinische Grenzgebirge: Baba planina bei Gacko, Orien-Gebirge, Lovcen

bellicomus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 7, 8; l. c. XXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 70 ♂ ♀. — Apfelb. Glasnik Zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 19; Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1928, p. 46; l. c. 1929, Nr. 9—12, p. 88. — Herzegovina: Curstnica planina (Jablanica)

ab. *castaneipes* Apfelb. Glasnik Bosn. Herzeg. XXX, 1918 (1919), p. 136; Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1928, p. 47.

capricornis Apfelb. Glasnik Muzeja Bosn. X, 1898, p. 270 ♂ ♀; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, — Dinarische Alpen:

1899, p. 777 ♂ ♀; Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 18; Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1928, p. 47; l. c. 1929, Nr. 9—12, p. 87. — Troglav bei Livno

chrysotrichus Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1928, p. 43. — Herzegovina: (Typus Velez bei Mostar)

niveopictus var. *chrysotrichus* Apfelb. Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXX, 1918, p. 133.

cribrosus Germ. Reise Dalmatien 1817, p. 242 *(Curculio)*. — Ahrens, Fn. Ins. Eur. II, 1816, p. 14. — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 558 ♂ ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 262 ♂ ♀ *(Otiorrhynchus)*. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 110 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 270; Abeille XI, 1873, p. 777; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 444 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 42. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 195; l. c. XI, 1873, p. 777. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, II, 1874, p. 217 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien IV, 1896, p. 545 ♂ ♀; Glasnik zem. Muz. u. Bosn. i Herzeg. XXX, 1918, p. 131; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1928, p. 39. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 70 (Gr. *Cirorrhynchus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 27. — Krain, Kroatien, Istrien, Bosnien, Dalmatien, Albanien, Serbien, Bulgarien

argutus ♀ Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 298.

ab. *melanopus* Apfelb. Glasnik Bosn. Herzeg. XXX, 1918 (1919), p. 131; Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1928, p. 40.

arrogans Reitter (nec Friv.), Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, (Best.-Tab. 69), p. 70.

ab. *pubipennis* Apfelb. Glasnik zem. muz. u. Bosn. i. Herzeg. XXX, 1918, p. 131; Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1928, p. 40.

subsp. *Winneguthi* Apfelb. Sitzber. Ak. Wien CXVI, I, 1907, p. 524 ♂ ♀ (Subg. *Cirorrhynchus*); Glasnik zem. muz. Bosn. Herz. XXXII, 1920, p. 18; Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1928, p. 80; l. c. 1929, Nr. 9—12, p. 87. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 70. — Albanien: Merdita (Munelagebirge)

subsp. *mughus* Apfelb. Glasnik zem. muz. u. Bosn. i Herzeg. XXX, 1918 (1919), p. 131; Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1928, p. 40. — West-Bosnien, Dinarische Alpen

crinipes L. Miller, Wien. Ent. Monatschr. VII, 1863, p. 30—37; Abeille IV, 1867, p. XXIV—XXVI. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 351; l .c. XVII, 1873, p. 270; Abeille XI, 1873, p. 777; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 443; Best.-Tab. 9, 1883, p. 41. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 194. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 620 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Apfelb. Wiss. — Dalmatien: Zara, Ragusa, Castelnuovo, Dalmatin. Inseln, Herzegovina, Mittelitalien

Mittheil. Bosnien IV, 1896, p. 545; Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. X, 1898, p. 269; Wissensch. Mittheil. Bosn.-Herzeg. VI, 1899, p. 777; Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1828, p. 50. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 71 (Gr. *Cirorrhynchus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 27.

herzegovinensis Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 2, 1880—83, Nr. 2 (1880), p. 55 ♂ ♀; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 443; Best.-Tab. 9, 1883, p. 41. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 71. — Herzegovina

subsp. *pilipes* Leoni, Riv. Col. Ital. 1907, p. 192. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 71. — Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1928, p. 50. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 27. — Italien: Bologna, M. Gargano, Campobasso

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 39; l. c. XVIII, 1886, p. 284.

Flecki Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 244 ♂ ♀; l. c. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 71. — Apfelb. Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 19; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1928, p. 48; l. c. 1929, p. 89. — Rumänien: Laculez

Karamani Apfelb. Glasnik Bosn. Herz. XXX, 1918 (1919), p. 135; Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1928, p. 46. — Dalmatien: Sinj bei Spalato

Kelecsenyii Friv. Termés. Füzet. XV, 1892, p. 132 ♂ ♀. — Apfelb. Glasnik zem. muz. Bosn. XXX, 1918, p. 137; Glasnik zem. muz. Bosn. Herz. XXXII, 1920, p. 19; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, 9—12, p. 89. — N.W.-Ungarn; „Com. Nitriensis": Tarvanok

lucidulus Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1928, p. 41. — S.O.-Bosnien, Gebirge bei Serajevo

sarajevensis var. *lucidulus* Apfelb. Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXX, 1918—19, p. 132.

Madari Formanek, Wien. Ent. Zeit. XLII, 1926, p. 142 *(Cirorrhynchus)*. — Kaukasus: Somlja

niveopictus Apfelb. Glasnik muzeja Bosni I, 1889, p. 70; Wissensch. Mittheil. aus Bosn.-Herzeg. II, 1894, p. 517; l. c. IV, 1896, p. 545 ♂ ♀; Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 269; Wissensch. Mitth. aus Bos.-Herzeg. VI, 1899, p. 777; Glasnik zem. muz. Bosn. Herz. XXXII, 1920, p. 19; Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1928, p. 42; l .c. 1929, Nr. 9—12, p. 87. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 8; l. c. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 70. — Zentral- u. Südbosnien, Herzegovina: Preslica, Vranica, Prenj, Volujak

ab. *vranicensis* Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1928, p. 42.

pinivorus Apfelb. Glasnik Bosn.-Herzeg. XXX, 1918 (1919), p. 132; Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1928, p. 42. — Herzegovina: Velež-planina

plicirostris (♀) J. Müller, Ent. Blätter XII, 1916, p. 108. — Zentral-Dalmatien: Mossorgebirge

plumipes Germ. Reise Dalmatien 1817, p. 245, t. 8, f. 15 *(Curculio)*. — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 558 ♂ ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 262 ♂ ♀ *(Otiorrhynchus)*. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 109 ♂ ♀ (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 270; Abeille XI, 1873, p. 777; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 443; Best.-Tab. 9, 1883, p. 41. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 192. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 217 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien IV, 1896, p. 545; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1928, p. 50. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 71 ♂ ♀ (Gr. *Cirorrhynchus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 27. — Steiermark, Kärnten, Krain, Istrien, Kroatien (Kapela, Velebit), Westbosnien, (Klekovaca, Traunik), Serbien

var. *tarnovensis* Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1928, p. 50. — Julische Alpen: (Tarnovaner-Wald), Babaplanina

radusensis Apfelb. Glasnik zem. muz. Bosn.-Herzeg. XXX, 1918 (1919), p. 134; Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1928, p. 44. — W.-Bosnien: Radusaplanina, Kupreska vrata

sarajevensis Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni I, 1889, p. 71; Mittheil. aus Bosn.-Herzeg. II, 1894, p. 517; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 777 ♀; Glasnik zem. muz. Bosn.-Herzeg. XXXII, 1920, p. 19; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 88. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 8; l. c. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 70. — S.-Bosnien, Herzegovina: Trebevič-Gebirge bei Serajevo (Typus), Vranicaplanina, Prenjplanina

vastus Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni VI, 1894, p. 221; Wiss. Mittheil. Bosnien IV, 1896, p. 544 ♂ ♀, 545; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1928, Nr. 5—8, p. 43—44. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 70 (Gr. *Cirorrhynchus*). — Bosnien: Vranplanina, Ljublusaplanina, Radusaplanina

subsp. *livnensis* Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 270; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 778; Glasnik zem. muz. Bosn.-Herzeg. XXXII, 1920, p. 68; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1928, Nr. 5—8, p. 44; l. c. 1929, Nr. 9—12, p. 87. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 70. — Bosnien: Gebirge bei Livno; Krugalpe; Hrbljinaplanina

Subgen. **Dorymerus** Seidlitz.

Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 569; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 615. — Reitter, Wien. Ent. Zeit.

XXXI, 1912, p. 47, 53; Best.-Tab. 66, 1912, p. 3, 9; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 129; Best.-Tab. 70, 1914, p. 1; Fauna Germ. V, 1916, p. 16, 24. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 921. — Apfelb. Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 20; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, p. 90, 98. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 8, Arten p. 102—133. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 15; Arten p. 36—48.

Artengruppen.

Acalorrhynchus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 55; Best.-Tab. 66, 1912, p. 11 (O. *longiventris* Küst.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 131, p. 181; Best.-Tab. 70, 1914, p. 3, p. 53.

Acunotus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 54; Best.-Tab. 66, 1912, p. 10 (*O. horridus* Stierl.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 130, p. 194; Best.-Tab. 70, 1914, p. 2, p. 66.

Advenardus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 57; Best.-Tab. 66, 1912, p. 13 (O. *Kraatzi* Stierl.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 134, p. 158; Best.-Tab. 70, 1914, p. 6, p. 30.

Aleutinops Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 54; Best.-Tab. 66, 1912, p. 10 (*O. elegantulus* Germ.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 130, p. 151; Best.-Tab. 70, 1914, p. 2, p. 23.

Amolsilnus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 58; Best.-Tab. 66, 1912, p. 14 (*O. gracilicornis* Stierl.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 136, p. 153; Best.-Tab. 70, 1914, p. 8, p. 25.

Anchorrhynchus Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 135, p. 185; Best.-Tab. 70, 1914, p. 7, p. 57 (*O. excellens* Kirsch).

Bytosmesus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 54; Best.-Tab. 66, 1912, p. 10 (O. *multicostatus* Stierl.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 131, p. 188; Best.-Tab. 70, 1914, p. 3, p. 60.

Dialonedus Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 132, p. 193; Best.-Tab. 70, 1914, p. 4, p. 65 (*O. cribrirostris* Leoni).

Dorymerus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 53; Best.-Tab. 66, 1912, p. 9 (*O. Kollari* Gyll.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 129, p. 139; Best.-Tab. 70, 1914, p. 1, p. 11.

Dostacasbus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 57; Best.-Tab. 66, 1912, p. 13 (*O. obesus* Stierl.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 135, p. 160; Best.-Tab. 70, 1914, p. 7, p. 32.

Duphanastus Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 136—137, p. 153; Best.-Tab. 70, 1914, p. 8, 9, p. 25 (O. *Apfelbecki* Stierl.).

Ecestomus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 59; Best.-Tab. 66, 1912, p. 15 (*O. alpigradus* Mill.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 139, p. 182; Best.-Tab. 70, 1912, p. 11, p. 54.

Ergiferanus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 59; Best.-Tab. 66, 1912, p. 15 (*O. nubilus* Boh.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 138, p. 164; Best.-Tab. 70, 1914, p. 10, p. 36.

Kreinidinus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 53; Best.-Tab. 66, 1912, p. 9 (*O. Kraussi* Ganglb.) (s. descr.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 130, p. 193; Best.-Tab. 70, 1914, p. 2, p. 65.

Lixorrhynchus Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913, (1914), p. 129, p. 149; Best.-Tab. 70, 1914, p. 1, p. 21 (*O. gracilis* Gyll.).

Majetnecus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 58; Best.-Tab. 66, 1912, p. 14 (*O. salicis* Stroem); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 136, p. 152; Best.-Tab. 70, 1914, p. 8, p. 24.

Mesaniomus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 59; Best.-Tab. 66, 1912, p. 15 (*O. polycoccus* Gyll.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 137, p. 161; Best.-Tab. 70, 1914, p. 9, p. 33.

Metopiorrhynchus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 53; Best.-Tab. 66, 1912, p. 9 (*O. singularis* L.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 129, p. 142; Best.-Tab. 70, 1914, p. 1, p .14.

Mierginus Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 137; p. 165; Best.-Tab. 70, 1914, p. 9, p. 37 (*O. clathratus*).

Misenatus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 59; Best.-Tab. 66, 1912, p. 15 (*O. spartanus* Kirsch); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 138, p. 186; Best.-Tab. 70, 1914, p. 10, p. 58.

Mitadileus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 56; Best.-Tab. 66, 1912, p. 12 (*O. flavoguttatus* Stierl.); Verh. Nat. Ver. Brün LII, 1914, p. 134, p. 164; Best.-Tab. 70, 1914, p. 6, p. 36.

Mitarodes Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 58; Best.-Tab. 66, 1912, p. 14 (*O. lavandus* Germ.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 136, p. 155; Best.-Tab. 70, 1913, p. 8, p. 27.

Necotaleus Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 137, p. 156; Best.-Tab. 70, 1914, p. 9, p. 28 (*O. croaticus* Stierl.).

Nehrodistus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 57; Best.-Tab. 66, 1912, p. 13 (*O. corruptor* Host); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 135, p. 157; Best.-Tab. 70, 1914, p. 7, p. 29.

Normotionus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 57; Best.-Tab. 66, 1912, p. 13 (*O. sulcatus* F.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 134, p. 163; Best.-Tab. 70, 1914, p. 6, p. 35.

Obrasilus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 58; Best.-Tab. 66, 1912, p. 14 (*O. corvus* Boh.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 139, p. 179; Best.-Tab. 70, 1914, p. 11, p. 50.

Obvoderus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 56; Best.-Tab. 66, 1912, p. 12 (*O. aurosquamulatus* Retow.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 134, p. 161; Best.-Tab. 70, 1914, p. 6, p. 33.

Otiolehus Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 139, p. 183; Best.-Tab. 70, 1914, p. 11, p. 55 (*O. rugosogranulatus* Stierl.).

Padilehus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 59; Best.-Tab. 66, 1912, p. 15 (*O. pinastri* Hbst.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 138, p. 189; Best.-Tab. 70, 1914, p. 10, p. 61.

Piopisidus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 55; Best.-Tab. 66, 1912, p. 11 (*O. Danieli* Apfelb.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 132, p. 187; Best.-Tab. 70, 1914, p. 4, p. 59.

Pirostovedus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 55; Best.-Tab. 66, 1912, p. 11 (*O. bosnicus* Stierl.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 132, p. 172; Best.-Tab. 70, 1914, p. 4, p. 44.

Pocusogetus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 57; Best.-Tab. 66, 1912, p. 13 (*O. Rosti* Stierl.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 134, p. 160; Best.-Tab. 70, 1914, p. 6, p. 32.

Postupatus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 56; Best.-Tab. 66, 1912, p. 12 (*O. Brusinae* Stierl.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 132, p. 172; Best.-Tab. 70, 1914, p. 4, p. 44.

Prilisvanus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 58; Best.-Tab. 66, 1912, p. 14 (*O. gemmatus* Scop.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 136, p. 174; Best.-Tab. 70, 1914, p. 8, p. 46.

Provadilus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 55; Best.-Tab. 66, 1912, p. 11 (*O. alpicola* Boh., *O. rugifrons* Gyll.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 131, p. 167; Best.-Tab. 70, 1914, p. 3, p. 39.

Rosvalestus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 54; Best.-Tab. 66, 1912, p. 10 (*O. globus* Boh.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 130, p. 156; Best.-Tab. 70, 1914, p. 2, p. 28.

Satnalistus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 56; Best.-Tab. 66, 1912, p. 12 (*O. duinensis* Germ.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 132, p. 151; Best.-Tab. 70, 1914, p. 4, p. 23.

Spodocellinus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 53; Best.-Tab. 66, 1912, p. 9 (*O. subpubescens* Stierl.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 130, p. 193; Best.-Tab. 70, 1914, p. 2, p. 65.

Udonedus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 54; Best.-Tab. 66, 1912, p. 10 (*O. diabolicus* Reitter); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 133, p. 190; Best.-Tab. 70, 1914, p. 5, p. 62.

Udosellus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 54; Best.-Tab. 66, 1912, p. 10 (*O. Koenigi* Faust); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 133, p. 190; Best.-Tab. 70, 1914, p. 5, p. 62.

Ulozenus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 59; Best.-Tab. 66, 1912, p. 15 (*O. infernalis* Germ.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 138, p. 162; Best.-Tab. 70, 1914, p. 10, p. 34.

Usipoconus Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 136, p. 154; Best.-Tab. 70, 1914, p. 8, p. 26 (*O. eremicola* Rosenh.). — Horion, Nachtr. zu Fn. Germ. 1935, p. 308.

Vedopranus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 58; Best.-Tab. 66, 1912, p. 14 (*O. Retowskii* Reitter); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 135, p. 178; Best.-Tab. 70, 1914, p. 7, p. 50.

Vicoranius Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 55; Best.-Tab. 66, 1912, p. 11 (*O. fusciventris* Fuss); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 132, p. 172; Best.-Tab. 70, 1914, p. 4, p. 44.

abchasicus Rost, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 402. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 160; Best.-Tab. 70, 1914, p. 32 (Gr. *Pocusogetus*). — Formanek, Wien. Ent. Zeit. XXXIX, 1922, p. 75. — Kaukasus: Abchasien

albanicus Apfelb. Sitzber. Akad. Wiss. Wien XVI, I, 1907, p. 521 ♂ ♀; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, p. 96. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 183; Best.-Tab. 70, 1914, p. 55 (Gr. *Ecestomus*). — Albanien, Merdita: Gebirge bei Oroshi und Fandi

var. *torosus* Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 183; Best.-Tab. 70, 1914, p. 55. — Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, Nr. 9—12, 1929, p. 96. — Latif-Orori, Latif-Koritnik

Albinae Formanek, Wien. Ent. Zeit. XXXIX, 1922, p. 74 (Gr. *Prilisvanus*). — Abchasien: Bsyb

alpicola Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 327. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 270, 276. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 749; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 223 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Stierl. Berl. Ent. Zeitschrift II, 1858, p. 277; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 271; Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 135; l. c. XVII, 1873, p. 287; Abeille XI, 1873, p. 793; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 519; Best.-Tab. 9, 1883, p. 117; Fn. Col. Helvet. II, 1888—98 (1891), p. 229. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 503. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 361. — Miller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVIII, 1878, p. 465. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 629 (Subg. *Dorymerus*). — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 278; Wiss. Mittheil. Bosnien X, 1899, p. 784; Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1929, Nr. 9—12, p. 94. — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 199. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 925 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1914, p. 43 (Gr. *Provadilus*). — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 27. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 129. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 42. — Mitteleuropa: Deutschland, Schweiz, Ostfrankreich, Norditalien, Bosnien, Herzegovina

morio Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 426; ed. 2, 1858, p. 747. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 171; Best.-Tab. 70, 1914, p. 43.

Gautardi Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 273; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 287; Abeille XI, 1873, p. 793; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 518; Best.-Tab. 9, 1883, p. 116; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 228. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 362.

Brancsiki Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 518; Best.-Tab. 9, 1883, p. 116 (non 1875). — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 278; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 784. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 171; Best.-Tab. 70, 1914, p. 43.

binominatus Fauvel, Rev. d'Ent. IV, 1885, p. 289.

var. *aterrimus* Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 328. — Küster, Käfer Eur. XI, 1847, Nr. 62. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 272 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 287; Abeille XI, 1873, p. 793; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 519; Best.-Tab. 9, 1883, p. 117. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 362. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 230 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Miller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXVIII, 1878, p. 465. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 629 (Subg. *Dorymerus*). — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 278; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 784. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 925 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 171; Best.-Tab. 70, 1914, p. 43. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 42. — Schweiz, Norditalien, **Krain**, Bosnien: Bjelasnica-planina; Herzegovina: Babaplanina

var. *strigirostris* Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 377. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 274 ♂ (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 287; Abeille XI, 1873, p. 793; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 520; Best.-Tab. 9, 1883, p. 118. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 364. — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 278; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 774, 784. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn 1913 (1914), p. 171; Best.-Tab. 70, 1914, p. 43. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 42. — **Italien**

Javeti Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 133; l. c. XVII, 1873, p. 287; Abeille XI, 1873, p. 793; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 520; Best.-Tab. 9, 1883, p. 118. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 363. — Fauvel, Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 114. — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 268, 278; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 774, 784. — J. Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 199. — Reitter, Best.-Tab. 70, 1914, p. 43. — Französische Alpen: Mont Feu

var. (?) *archaeus* Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 242, Note ♂; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 283; Abeille XI, 1873, p. 790; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, — Kaukasus

1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 519; Best.-Tab. 9, 1883, p. 117. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 332 ♂. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 171, Note; Best.-Tab. 70, 1914, p. 43, Note.

var. *prenjus* Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien IV, 1896, p. 549; Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1929, Nr. 9—12, p. 94. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 171; Best.-Tab. 70, 1914, p. 43. — Herzegovina: Prenjplani

var. *calvus* Fiori, Ann. Soc. Nat. Modena XXXI, 1899, p. 163. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 171; Best.-Tab. 70, 1914, p. 43. — Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1929, Nr. 9—12, p. 94. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 32. — Italien: Abruzzen

alpigradus Müller, Wien. Ent. Monatschr. III, 1859, p. 362. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 243 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 283; Abeille XI, 1873, p. 790; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 502; Best.-Tab. 9, 1883, p. 100. — Friv. A Királyi magyar 1865, p. 212, t. 12, f. 1. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 335 ♂ ♀. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 626 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 182; Best.-Tab. 70, 1914, p. 54 (Gr. *Ecestomus*). — Ungarische Alpen

Biologie: Marseul, Abeille X, 1872, p. 335. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 38; l. c. XVIII, 1886, p. 283.

annulipes Apfelb. Mittheil. Königl. naturwiss. Institut. Sofia V, 1932, p. 158 (Subg. *Dorymerus*). — Witoscha-Gebirge bei Sofia

antistes Peyerimhoff, Bull. Soc. Ent. France 1923, p. 80 (Subg. *Dorymerus*). — Grand Atlas: Tagherat

Apfelbecki Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87, Nr. 10 (1887), p. 390 — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 276; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 783. — Penecke, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 19. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 153; Best.-Tab. 70, 1914, p. 25 (Gr. *Duphanastus*). — Mittel-Steiermark: Schröckel bei Graz, Peggau, Frohnleiten; Kroatien: Lusbreg; Bosnien

arctos (Daniel) Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 220; Best.-Tab. 70, 1914, p. 92 (Subg. *Dorymerus*). — Turkestan: Monte Karateghin (Sary-pul)

armatus Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 284 ♂. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 216 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 280; Abeille XI, 1873, p. 787; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 498; Best.-Tab. 9, 1883, p. 96. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 304. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 158; Best.-Tab. — Süd-West-Europa: Dalmatien; Mittel-Süd-Italien: Kalabrien, Sizilien; Ionische Inseln

70, 1914, p. 30. — Apfelb. Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 20; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1920, Nr. 9—12, p. 92. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 44. Janina, Kleinasien, Mongrelien

irroratus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 217; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 498; Best.-Tab. 9, 1883, p. 96. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 158; Best.-Tab. 70, 1914, p. 30.

cornutus (♂) Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 1 (1888), p. 11. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 158; Best.-Tab. 70, 1914, p. 33.

ab. *minor* Vitale, Natural. Sicil. XVII, 1904, p. 24. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 158; Best.-Tab. 70, 1914, p. 30. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 44.

var. *romanus* Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 285. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1862, p. 217; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 498; Best.-Tab. 9, 1883, p. 96. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 304. — Meyer, Riv. Col. Ital. III, 1905, p. 147. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 158; Best.-Tab. 70, 1914, p. 30. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 44. Italien: Rom

granatus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 217; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 498; Best.-Tab. 9, 1883, p. 96. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 304. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 158; Best.-Tab. 70, 1914, p. 30.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 38; l. c. XVIII, 1886, p. 283 (*romanus* Boh.) (Schädling des Weinstockes).

armicrus Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 267. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 353; l. c. XVII, 1873, p. 289; Abeille XI, 1873, p. 794; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 574; Best.-Tab. 9, 1883, p. 172. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 368. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 188; Best.-Tab. 70, 1914, p. 60 (Gr. *Piopisidus*); Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 14. Kleinasien: Bosz-Dagh

armipes Apfelb. Anz. Akad. Wiss. Wien 1908, Nr. 1, p. 4; Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 21; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 97 *(Dorymerus)*. — Reitter, Best.-Tab. 70, 1913, p. 60. O.-Albanien: Schar-Dagh

asphaltinus Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 360. — Krynicki, Bull. Soc. Nat. Moscou VII, 1832, p. 168. — Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 593 ♂ ♀; Boh. l. c. VII, I, Krim, Kaukasus

1843, p. 326 ♂ ♀. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Curc. 1854, p. XVIII. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 437. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 247 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 284; Abeille XI, 1873, p. 790; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 493; Best.-Tab. 9, 1883, p. 91. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 337. — Csiki, Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 110 ♂, fig. 3, p. 110, fig. 4. — Smirnow, Rev. Russe Ent. IX, 1909, p. 402, f. 6, 7. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 182; Best.-Tab. 70, 1914, p. 54 ♂ ♀ (Gr. *Acallorrhynchus*).

? *tauricus* Stev. Mus. Mosq. II, 1829, p. 96.

kasbekianus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 9 (1876), p. 497 ♀; Verh. Nat. Ver. Brünn XVII, 1878 (1879), p. 5; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 501; Best.-Tab. 9, 1883, p. 99.

Biologie: Steven, Bull. Soc. Nat. Moscou XXXV, 1862, p. 343, 346. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854, p. XVIII. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 338. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 38; l. c. XVIII, 1886, p. 283 (Schädling des Weinstockes). — Federov (S.), Pest of Vines in the Crimea 1925—1926 (in russische Sprache); Vestnik Vinodel. Ukrain. XXVIII, 1927, p. 22—25. — Gavalov, Acta Soc. Ent. Stauropol II, 1926, p. 39—42.

asplenii L. Miller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XVIII, 1868, p. 26. — Crotch, Synops. Col. Eur. 1871, p. 39. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 358; l. c. XVII, 1873, p. 283; Abeille XI, 1873, p. 789; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 504; Best.-Tab. 9, 1883, p. 102. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 331 ♂ ♀. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—1891 (1891), Arten p. 627 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 180; Best.-Tab. 70, 1914, p. 52 (Gr. *Obrasilus*). — Ungarn: Östl. Karpathen

var. *seriepunctatus* Petri, Siebenbürg. Käfer 1912, p. 296. — Siebenbürgen

Biologie: Miller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien 1868, p. 26. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 332. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 39; l. c. XVIII, 1886, p. 283 (Futterpflanzen).

atronitens Formanek, Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 20 *(Dorymerus)*. — Krim

auricapillus Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 353. — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 620 ♂; l. c. VII, I, 1843, p. 369 ♂. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, — Deutschland, Schweiz, Alpengebiet, Banat,

1858, p. 299; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 261 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 285; Abeille XI, 1873, p. 791; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 512; Best.-Tab. 9, 1883, p. 110; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 227. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 349. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 223 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 628 (Subg. *Dorymerus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 925, fig. 115 b (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 166; Best.-Tab. 70, 1914, p. 38 (Gr. *Mierginus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCII, 1933, p. 124. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 46. Dalmatien? Türkei?

punctiscapus Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 375. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 166; Best.-Tab. 70, 1914, p. 38.

angustior Rosenh. Beitr. Ins. Eur. I, 1847, p. 47. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 231; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 345; l. c. XVII, 1873, p. 281; Abeille XI, 1873, p. 788; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 513; Best.-Tab. 9, 1883, p. 111. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 320. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 166; Best.-Tab. 70, 1914, p. 38.

affinis (♂) Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 423 (non Hochhuth 1847); l. c. ed. 2, 1858, p. 744. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 502. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 166; Best.-Tab. 70, 1914, p. 38.

Biologie: Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, p. 213 (Vorkommen). — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 38; l. c. XVIII, 1886, p. 283 (Futterpflanzen).

auricomus Germ. Spec. Ins. novae I, 1824, p. 363. — Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 625 ♂; l. c. VII, 1, 1843, p. 371 ♂. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 228 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 282; Abeille XI, 1873, p. 788; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 523; Best.-Tab. 9, 1883, p. 121; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 225. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 316 ♂ ♀. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 221 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 154; Best.-Tab. 70, 1914, p. 26 (Gr. *Usipoconus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 926 (Subg. *Dorymerus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCII, 1923, p. 117. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 45. Schweiz, Österreich. Alpen, Nord-Italien, Illyrien

— Horion, Nachtr. zu Fn. Germ. 1935, p. 308.

var. *nivalis* Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 366; l. c. X, 1866, p. 135; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 524; Best.-Tab. 9, 1883, p. 122; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 225. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 317. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 154; Best.-Tab. 9, 1914, p. 26. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCII, 1923, p. 118. — Engadin

aurosquamulatus Retowski, Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 132. — Reitter, l. c. VII, 1888, p. 232; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 161; Best.-Tab. 70, 1914, p. 33 (Gr. *Obvoderus*). — Kaukasus, Westzirkassien, Fischt

var. *duricornis* Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 161; Best.-Tab. 70, 1914, p. 33.

austriacus F. Syst. El. II, 1801, p. 539 *(Curculio)*. — Pauz. Fn. Ins. Germ. IX, 1809, Heft 104, t. 8. — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 624 ♂ ♀; Boh. l. c. VII, I, 1843, p. 379 ♂ ♀ *(Otiorrhynchus)*. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 426; ed. 2, 1858, p. 748; ed. 3, II, 1874, p. 214 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Küster, Käfer Eur. XI, 1847, Nr. 76. — Bach, Käferfn. II, 1852—1854 (1854), p. 271. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 506. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 259 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 285; Abeille XI, 1873, p. 791; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 492; Best.-Tab. 9, 1883, p. 90; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 224. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 348. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 623 (Subg. *Dorymerus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 923, fig. 110, A, 111 BC (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 140; Best.-Tab. 70, 1914, p. 12 (Gr. *Dorymerus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 24. — Penecke, Wien. Ent. Zeit. XLI, 1926, p. 11. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 36. — Deutschland, Schlesien, Österreich, Ungarn: Banat; Krain, Illyrien, Kroatien, Bosnien, Herzegovina

? *costatus* Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 260 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 285; Abeille XI, 1873, p. 791; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 492; Best.-Tab. 9, 1883, p. 90. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 349 ♂ ♀. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 222 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 140, Note; Best.-Tab. 70, 1914, p. 12, Note (Gr. *Dorymerus*). — Inner-Krain

ab. *carinatus* Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 624 ♂ ♀; l. c. VII, I,

1843, p. 379. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 426; l. c. ed. 2, 1858, p. 748; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 214 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Küster, Käfer Eur. XI, 1847, p. 77. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 506. — Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 259. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 923. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 140; Best.-Tab. 70, 1914, p. 12. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 36.

subsp. *primigenius* Apfelb. Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XL, 1928, p. 60. — N. Alban.-Alpen

axatensis Hoffmann, Bull. Soc. Ent. France 1930, p. 167; l. c. 1933, p. 29 *(Dorymerus)*. — France: Axat, Forêt de Fontanilles

Borshii Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 135 (Subg. *Dorymerus*). — Süd-Alban. Malj Tomor: Ciafa Kulmaka

bosnicus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 2 (1888), p. 52. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 173; Best.-Tab. 70, 1914, p. 45 (Gr. *Pirostovedus*). — Apfelb. Mittheil. Königl. naturwiss. Instit. Sofia V, 1932, p. 153. — Südbosnien, Bulgarien: Pirin-Gebirge

subsp. *obtusidens* Apfelb. Glasnik Mus. Bosn. Herzeg. XL, 1928, p. 59. — N.-Alban.

Brandisi Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien IV, 1896, p. 546 ♂ ♀. — Daniel, Col.-Studien II, 1898 (1899), p. 43. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 140; Best.-Tab. 70, p. 12. — Penecke, Wien. Ent. Zeit. XLI, 1926, p. 11. — Süd- u. Mittel-Bosnien; Herzegovina: Vranica planina, Sarajevo (Ivangebirge)

Brauneri Smirnow, Rev. Russe Ent. IX, 1909, p. 402, f. 8, 9. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 182; Best.-Tab. 70, 1914, p. 54 (Gr. *Acallorrhynchus*). — Krim

breviclavatus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 482; Best.-Tab. 9, 1883, p. 80. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 148; Best.-Tab. 70, 1914, p. 20 (Gr. *Metopiorrhynchus*). — Dalmatien

Brusinae Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 1 (1888), p. 9. — Apfelb. Glasnik Museia Bosni X, 1898, p. 279; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 784. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 172; Best.-Tab. 70, 1914, p. 44 (Gr. *Postupatus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 42. — Julische Voralpen, Süd-Kroatien: Bijela Lasiča, Bitoraj

calabrus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 2 (1880), p. 59; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 506; Best.-Tab. 9, 1883, p. 104. — Reitter, Verh. Nat. — Italien: Kalabrien

Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 184; Best.-Tab. 70, 1914, p. 56 (Gr. *Otiolehus*).

cancellatus Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 374. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 194 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 343; l. c. XVII, 1873, p. 278; Abeille XI, 1873, p. 785; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 486; Best.-Tab. 9, 1883, p. 84. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 280 ♂ ♀. — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 197. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 149; Best.-Tab. 70, 1914, p. 21 (Gr. *Metopiorrhynchus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCII, 1923, p. 114. — Hoffmann, Bull. Soc. Ent. France 1930, p. 169. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 39. — Italien: Seealpen, Ligurische Alpen, Piemont

var. *Clairi* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—80, Nr. 10 (1880), p. 564; l. c. VI, 8—9, 1883, p. 487; Best.-Tab. 9, 1883, p. 85. — Fauvel, Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 247; l. c. XIV, 1895, p. 114 (*Brachyrhinus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 149; Best.-Tab. 70, 1914, p. 21. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCII, 1923, p. 114. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 39. — Seealpen

carbonarius Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou 1847, p. 519. — Kol. l. c. XXXI, 2, 1858, p. 453. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 343; l. c. XVII, 1873, p. 284; Abeille XI, 1873, p. 790; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 522; Best.-Tab. 9, 1883, p. 120. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 337. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 169; Best.-Tab. 70, 1914, p. 41 (Gr. *Provadilus*). — Zentraler Kaukasus, Armenien

carbonicolor Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 169; Best.-Tab. 70, 1914, p. 41 (Gr. *Provadilus*). — Kaukasus

carmagnolae Villa, Suppl. Col. Eur. 1835, p. 49. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 288; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 192 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 278; Abeille XI, 1873, p. 785; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 479; Best.-Tab. 9, 1883, p. 77; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 221. — Chevr. Ann. Soc. Ent. France 1859, Bull. p. V. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 145; Best.-Tab. 70, 1914, p. 17 (Gr. *Metopiorrhynchus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCII, 1923, p. 109. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 37. — Schweiz, Italien

subsp. *luganensis* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 4 (1890), p. 165; Fn. Col. Helvet. II, 1891, p. 221. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 145; Best.-Tab. 70, 1914, p. 17. — Schweiz: Lugano; Nord-Italien: Bergamask.—

Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 38. — Trident.-Alpen

subsp. *tirolensis* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1893—97, Nr. 3 (1894), p. 111. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 145; Best.-Tab. 70, 1914, p. 17. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 38. — Engadin, Rhätische Alpen, Tirol, Trident.-Alpen

cirrhocnemis Apfelb. Akad. d. Wiss. Wien, math.-natur. Kl. Anz. Nr. 1, 1908, p. 5; Glasnik Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 93. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 170; Best.-Tab. 70, 1914, p. 42 (Gr. *Provadilus*). — Albanien: Schar-Dagh

clathratus Germ. Reise Dalmatien 1817, p. 241 *(Curculio)*. — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 622; l. c. VII, I, 1843, p. 373 *(Otiorrhynchus)*. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 263 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 285; Abeille XI, 1873, p. 791; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 510; Best.-Tab. 9, 1883, p. 108. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 351. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 223 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 166; Best.-Tab. 70, 1914, p. 38 (Gr. *Mierginus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 46. — Julische Voralpen, Illyrien, Küstenland

confinis Friv. Adatok Máramaros vár. fn. 1875, p. 197. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 183; Best.-Tab. 70, 1914, p. 55 (Gr. *Ecestomus*). — Karpathen: Marmarosch

coptocnemis Apfelb. Akad. Wiss. Wien, Anz. Nr. 10, 1918, p. 126 (*alpicola*-Gruppe). — Mazedonien

coriarioides Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 170 ♀; Best.-Tab. 70, 1914, p. 42 (Gr. *Provadilus*). — Kaukasus

cornirostris Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 147 ♂ ♀; Best.-Tab. 70, 1914, p. 19 ♂ ♀ (Gr. *Metopiorrhynchus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 38. — Judikarien: Val di Lemo

corruptor Host in Jacquin, Collect. bot. III, 1789, p. 296, t. 23, f. 4 *(Curculio)*. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 158; Best.-Tab. 70, 1914, p. 30 (Gr. *Nehrodistus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 44. — Südeuropa bis Sizilien und Griechenland:

giraffa Germ. Reise Dalmatien 1817, p. 244 *(Curculio)*. — Hoppe & Hornschuch, Acta Ac. Leopold. Carol. XII, 2, 1825, p. 489, Nr. 14, t. 15, f. 13 *(Loborrhynchus)*. — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 576 ♂ ♀; Boh. l. c. VII, I, 1843, p. 282 ♂ ♀. — Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 241. — Küster, Käfer Eur. XI, 1847, Nr. 67. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 213; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 280; Abeille XI, 1873, p. 787; Mittheil. Schweiz. — Tirol, Kärnten, Krain, Illyrien, Herzegovina, Dalmatien, Corfu, Albanien

Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 497; Best.-Tab. 9, 1883, p. 95. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 301. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 221 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 626 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 158; Best.-Tab. 70, 1914, p. 30 (Gr. *Nehrodistus*).

ab. *ornatus* (Germ.) Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 213; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 498; Best.-Tab. 9, 1883, p. 96. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 301. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 158; Best.-Tab. 70, 1914, p. 30. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 44.

ab. *politus* Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 213; Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 374; l. c. XVI, 1872, p. 342; l. c. XVII, 1873, p. 277; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 498; Best.-Tab. 9, 1883, p. 96. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII 1913 (1914), p. 158; Best.-Tab. 70, 1914, p. 30; Fn. Germ. V, 1916, p. 21.

subsp. *rhamnivorus* Apfelb. Sitzber. Ak. Wien CXVI, 1907, p. 525, Nr. 44. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 158; Best.-Tab. 70, 1914, p. 30. — Albanien: Merdita-Gebirge (Oroski)

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 40; l. c. XVIII, 1886, p. 284 (Futterpflanzen).

corvus Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 325. — Miller, Wien. Ent. Monatschr. III, 1859, p. 358. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 239 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 283; Abeille XI, 1873, p. 789; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9, 1883, p. 503; Best.-Tab. 9, 1883, p. 101. — Friv. A Király magyar 1865, p. 211, t. 11, f. 15. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 328 ♂ ♀. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 627 (Subg. *Dorymerus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 925, fig. 114 c (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 180 (Gr. *Obrasilus*); Best.-Tab. 70, Nr. 52; Fn. Germ. V, 1916, p. 28, t. 153, f. 26. — Ungarn: Siebenbürgen, Beskiden, Karpathen

crepsensis Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 43. — Istrien: Cherso Insel

cribrirostris Leoni, Riv. Col. Ital. IV, 1906, p. 108. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 193; Best.-Tab. 70, 1914, p. 65 (Gr. *Dialonedus*). — Italien: Abruzzen, (Monte Sirente) Lazio

croaticus Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 258 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 285; Abeille XI, 1873, p. 791; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 492; Best.-Tab. 9, 1883, p. 90. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 347 ♂ ♀. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 142, 156; Best.-Tab. 70, 1914, p. 28 (Gr. *Necotaleus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 45. — Kroatien, Bosnien, Herzegovina

argenteosparsus Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1883—93, Nr. 8 (1891), p. 323. — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 276; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 782; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 91. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 142; Best.-Tab. 70, 1914, p. 28. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 45.

subsp. *sirentensis* d'Amore Fracassi, Riv. Col. Ital. IV, 1906, p. 117. — A. & F. Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. XL, 1908, p. 263. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 142; Best.-Tab. 70, 1914, p. 28. — Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 91. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 45. — Mittel-Italien: Abruzzen (Monte Sirente)

subsp. *Havelkae* Apfelb. Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 25; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 91. — Süd-Herzegov.

cymophanus Germ. Fn. Ins. Eur. XXI, 1821, t. 13. — Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 332. — Küster, Käfer Eur. XI, 1847, Nr. 66. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 209 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 279; Abeille XI, 1873, p. 787; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 508; Best.-Tab. 9, 1883, p. 106. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 297. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 627 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 176; Best.-Tab. 70, 1914, p. 48 (Gr. *Prilisvanus*). — Ungarn: Karpathen; Banat, Bosnien, Serbien

Danieli Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien IV, 1896, p. 541 ♂ ♀, 542. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 187; Best.-Tab. 70, 1914, p. 59 (Gr. *Piopisidus*). — Bosnien: Sarajevo, Trebenicgebirge, Bjelasnicaplanina

deleticollis Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 184; Best.-Tab. 70, 1914, p. 56 (Subg. *Otiolehus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 48. — Kalabrien: Silagebirge

delicatulus Marseul, Abeille X, 1872, p. 285 (Mai). — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 337 (November); l. c. XVII, 1873, p. 279; Abeille XI, 1873, p. 786; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 10 (1884), p. 698. — Fauvel, Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. — Seealpen, Basses Alpes, Riviera

114 *(Brachyrhinus)*. — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 197. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 143; Best.-Tab. 70, 1914, p. 15 (Gr. *Metopiorrhynchus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 104. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 37.

rivierae Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 484; Best.-Tab. 9, 1883, p. 82.

denigrator Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 343. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 179 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 277; Abeille XI, 1873, p. 784; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1893), p. 475; Best.-Tab. 9, 1883, p. 73. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 266. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 220 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 623 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien IV, 1896, p. 542; Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 273; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 780; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 109; Mittheil. aus den Königl. Naturwiss. Instituten Sofia V, 1932, p. 159. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 188; Best.-Tab. 70, 1914, p. 60. — Ungarn, Krain, Kroatien, Dalmatien, Bulgarien, Mazedonien, Griechenland, Türkei

lithanthracius Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 346. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 180 ♂; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 277; Abeille XI, 1873, p. 784; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 475; Best.-Tab. 9, 1883, p. 73. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 267. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 623 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 67 ♂ ♀ (Gr. *Microphalantus*); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 188; Best.-Tab. 70, 1914, p. 60 (Gr. *Piopisidus*).

Ocskayi Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 179 (*„Oskayi"*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 43.

var. *hypsicola* Apfelb. Mittheil. Königl. naturwiss. Institut Sofia V, 1932, p. 159. — Jugoslavien: Kopaonikgebirge; Süd-Bulgarien: W.-Rhodope, Demirkapia

Deubeli Ganglb. Ann. Nat. Hofmus. Wien XI, 1896, p. 185. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 140; Best.-Tab. 70, 1914, p. 12 (Gr. *Dorymerus*). — Penecke, Wien. Ent. Zeit. XLI, 1926, p. 11. — Ostgalizische Karpathen; Marmarosch, Siebenbürgen: Rodna.

diabolicus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 22; l. c. XXII, 1903, p. 240 (Subg. *Dorymerus);* Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 190; Best.-Tab. 70, 1914, p. 62 (Gr. *Udonedus*). — Pontische Alpen

difficilis Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 283; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 203; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 327; l. c. XVII, 1873, p. 278; Abeille XI, 1873, p. 786; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 484; Best.-Tab. 9, 1883, p. 82; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 5, 1886, p. 226; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 222. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 288; l. c. XI, 1873, p. 786. — Vitale, Natural. Sicil. XVII, 1904, p. 78. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 148; Best.-Tab. 70, 1914, p. 20. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 112. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 39. — Schweiz, Tessin, Monte Rosa: Macugnaga; Monte Baldo, Sizilien?

simplonicus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87, Nr. 5 (1886), p. 226; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 22. — Fauvel, Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 114. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913, p. 148; Best.-Tab. 70, 1914, p. 20. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 112.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 40; l. c. XVIII, 1886, p. 284.

dives Germ. Fn. Ins. Eur. XXI, 1839, t. 12. — Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 331 ♀. — Küster, Käfer Eur. XI, 1847, Nr. 65. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 280; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 209 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 279; Abeille XI, 1873, p. 787; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 508; Best.-Tab. 9, 1883, p. 106. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 296. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 221 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Seidlitz, Fn. Transylv. 1888—91 (1891), Arten p. 628 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 176; Best-Tab. 70, 1914, p. 48 (Gr. *Prilisvanus*). — Apfelb. Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 21; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 95. — K. Hänel, Ent. Blätt. XXXI, 1933, p. 75. — Steiermark, Kärnten, Krain, Ost-Ungarn: Siebenbürgen

subsp. *demirkapensis* Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni 1898, p. 278 ♂ ♀; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 784 ♂ ♀; Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 211; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 95. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 174; Best.-Tab. 70, 1914, p. 50 (Gr. *Prilisvanus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 132. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 45. — Philippopel: Rhodope-Gebirge (Demir Kapu)

duinensis Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 365. — Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 613; l. c. VII, I, 1843, p. 359. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 205; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 279; Abeille XI, 1873, p. 786; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 489; Best.-Tab. 9, 1883, p. 87. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 290. — Apfelb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLVIII, 1898, p. 272 ♂ ♀; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 90. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 151; Best.-Tab. 70, 1914, p. 23 (Gr. *Satnalistus*). — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. 1922, p. 38. — Lona, Studi Ent. Trieste 1926, I, p. 6. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 43. — Istrien, Venetien, Emilien, Abruzzen

subsp. *stenorostris* Apfelb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLVIII, 1898, p. 372 ♂ ♀; Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 273 ♂ ♀; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 780 ♂ ♀. — Penecke, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 18. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 152; Best.-Tab. 70, 1914, p. 24 (Gr. *Satnalistus*). — Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. 1922, p. 38. — Lona, Studi Ent. Trieste 1926, I, p. 7. — Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, p. 90. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 43. — Nord- und Mittel-Ungarn, Steiermark, Krain, Kroatien, Nord-Bosnien

? *Milleri* Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 364; l. c. XVII, 1873, p. 279; Abeille XI, 1873, p. 786; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 488; Best.-Tab. 9, 1883, p. 86. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 152, Note; Best.-Tab. 70, 1914, p. 24, Note (Gr. *Satnalistus*). — Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 90. — Kroatien

Edithae Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 526; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 166; Best.-Tab. 70, 1914, p. 38 (Gr. *Mierginus*). — Kaukasus: Zirkassien (Novo-Rossisk)

elegantulus Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 367; Fn. Ins. Eur. XVIII, 1836, t. 19. — Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 599; l. c. VII, I, 1843, p. 336. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 201; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 279; Abeille XI, 1873, p. 786; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 527; Best.-Tab. 9, 1883, p. 125. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 287. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 210 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 151; Best.-Tab. 70, 1914, p. 23 (Gr. *Aleutinops*). — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. 1922, p. 43. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 40. — Krain, Kroatien, West-Bosnien, Herzegovina, Montenegro, Turkestan; Italien: Julische Alpen, Aspromonte

tenuis Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. X, 5, 1899, p. 198. — Heyden, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 176. — J. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. 1922, p. 43.
orologus Heyden, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 176.

epiroticus Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni XIII, 1901, p. 434 ♂ ♀; Wiss. Mittheil. Bosnien VIII, 1901, p. 466 ♂ ♀. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 186; Best.-Tab. 70, 1914, p. 58 (Gr. *Anchorrhynchus*). Süd-Bosnien: Troglav; Dinarrische Alpen; Albanien: Janina, (Chani-Driskov), Epirus

equestris Richter, Suppl. Fn. Ins. Eur. 1821, p. 2. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 923, fig. 110 B, 111 A, D. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 141; Best.-Tab. 70, 1914, p. 13 (Gr. *Dorymerus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 25, t. 153, f. 25. — Penecke, Wien. Ent. Zeit. XLI, 1926, p. 11; Col. Centralbl. 1928, p. 127; l. c. p. 147. Deutschland, Schlesien, Österreich, Ungarn, Rumelien, Sibirien

aerifer Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 356. — Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 635; l. c. VII, I, 1843, p. 380. — Küster, Käfer Eur. XVIII, 1849, Nr. 88. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 279. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 749; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 222. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 506. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 256 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 284; Abeille XI, 1873, p. 791; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 8—9, 1883, p. 491; Best.-Tab. 9, 1883, p. 89. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 345 ♂ ♀. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 625 (Subg. *Dorymerus*).
elaboratus Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 625 ♂ ♀; Boh. l. c. VII, I, 1843, p. 380.
ab. *regularis* Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 260; Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 373; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 491; Best.-Tab. 9, 1883, p. 89. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 345.

eremicola Rosenh. Beitr. Ins.-Fn. Eur. I, 1847, p. 44. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 197 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 278; Abeille XI, 1873, p. 785; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 523 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 121. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 282. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 210 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 928 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Tirol, Kärnten, Untersteiermark.

Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 154; Best.-Tab. 70, 1914, p. 26 (Gr. *Usipoconus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 45. — Horion, Nachtr. zu Fn. Germ. 1935, p. 308.
rhodopus Krauss, Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 241.
ab. *tenuicornis* L. Miller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XX, 1870, p. 219. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 353; l. c. XVII, 1873, p. 278; Abeille XI, 1873, p. 785; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 523; Best.-Tab. 9, 1883, p. 121. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 383. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 629 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 154; Best.-Tab. 70, 1914, p. 27. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 45.

etropolensis Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 277; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 783; Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 21; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—10, p. 96. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 184; Best.-Tab. 70, 1914, p. 56 (Gr. *Otiolehus*). — Bulgarien: Etropolbalkan

euboicus Apfelb. Glasnik d. Kroat. Natur. Ges. Zagr. XXXIV, 1922, p. 23 (*Kiesenwetteri*-Gr.). — Euboea

Eugeni Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 41 (Subg. *Arammichnus*); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 172; Best.-Tab. 70, 1914, p. 44 (Gr. *Provadilus*). — Nord-Kaukasus: Tebulos

excellens Kirsch, Ent. Monatsbl. II, 1881, p. 4. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—1883, Nr. 8—9 (1883), p. 510 ♂; Best.-Tab. 9, 1883, p. 108. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 185; Best.-Tab. 70, 1914, p. 57 (Gr. *Anchorrhynchus*). — Griechenland: Morea, Taygetos
longirostris Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87, Nr. 10 (1887), p. 391.

farinosus Formanek, Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 18 (prope *moestus* u. *pierinus*). — Mazedonien: Katschanik; Schar-Dagh

Felicitanae Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 525; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 178; Best.-Tab. 70, 1914, p. 50 (Gr. *Prilisvanus*). — West-Kaukasus, Zirkassien: Atschischto

fischtensis Reitter, Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 101; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 172; Best.-Tab. 70, 1914, p. 44 (Gr. *Vicoranius*). — West-Kaukasus, Zirkassien: Fischt

fraxini Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 364. — Schönherr Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 596; l. c. VII, I, 1843, p. 388. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 506. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 220; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 497; Best.-Tab. — Schweiz, Österreich, Deutschland, Tirol, Trident.-Alpe, Kärnten,

9, 1883, p. 95. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 309. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 925, fig. 113 D (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 153; Best.-Tab. 70, 1914, p. 25 (Gr. *Duphanastus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 28. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 117. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 44. Iulische Alpen

infaustus Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 628; l. c. VII, I, 1843, p. 372.

ab. *funicularis* Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 621. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 748; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 214 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 304; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 220 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1873, p. 280; Abeille XI, 1873, p. 788; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 497; Best.-Tab. 9, 1883, p. 95; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 224. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 309.

ab. *Jekeli* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 497; Best.-Tab. 9, 1883, p. 95.

frigidus Muls. Opusc. Ent. IX, 1859, p. 24. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913, p. 147; Best.-Tab. 70, 1914, p. 19. — Hubenthal, Ent. Blätt. XXVII, 1931, p. 188. — Horion, Nachtr. zu Fn. Germ. 1935, p. 308. Westalpen

subdentatus auct. nec Bach.

?*angustipennis* ~~Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 277~~; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 483; Best.-Tab. 9, 1883, p. 81; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 223. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 924 (Subg. *Dorymerus*).

funebris Apfelb. Glasnik der Kroat. Natur. Ges. Zagreb XXXIV, 1922, p. 23 (prope *infernalis*). Herzegovina

fusciventris Fuss, Verh. Nat. Ver. Siebenbürgen 1868, p. 173. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 362 ♂ ♀; l. c. XVII, 1873, p. 282; Abeille XI, 1873, p. 788; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 526 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 124. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 757. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 630 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 172; Best.-Tab. 70, 1914, p. 44 (Gr. *Vicoranius*). Transsylvanische Alpen, Karpathen

Fussi Küster, Käfer Eur. XVI, 1849, Nr. 88. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 209; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—1883, Nr. 8—9 (1883), p. 507; Best.-Tab. 9, 1883, p. 105. — Marseul, Abeille X, 1872, Siebenbürgen, Rumänien

p. 295. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 628 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 175; Best.-Tab. 70, 1914, p. 47 (Gr. *Prilisvanus*).

Fussianus Csiki, Termész. Füzet. XXIV, 1901, p. 489 ♂ ♀, fig. a (Subg. *Dorymerus*); Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 107—110, fig. 5; p. 244—246. — Krauss, Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 147—150, 247—248 (gegen Csiki!). — Smirnow, Rev. Russe Ent. IX, 1909, p. 402, fig. 3. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 181; Best.-Tab. 70, 1914, p. 53 (Gr. *Acallorrhynchus*). Siebenbürgen, Volhynien

Garibaldinus A. & F. Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. XL, 1908, p. 264. — Porta, Riv. Col. Ital. VIII, 1910, p. 63; Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 39. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 149; Best.-Tab. 70, 1914, p. 21 (Gr. *Metopiorrhynchus*). Kalabrien: Aspromonte

gemmatus Scop. Ent. Carn. 1763, p. 30 *(Curculio)*. — Göze, Naturf. VII, 1775, p. 97, t. 4, f. 6. — F. Gen. Ins. 1776, p. 229; Spec. Ins. I, 1781, p. 197; Mant. Ins. I, 1787, p. 122; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 485; Syst. El. II, 1801, p. 539. — Laich. Verz. Tyrol. Ins. I, 1781, p. 205. — Vill. Entom. Linn. I, 1789, p. 205. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1775. — Ol. Encycl. méthod. V, 1790, p. 557; Ent. V, 1807, Nr. 83, p. 409, t. 6, f. 74. — Sturm, Ins.-Cabin. IV, 1792, 1 ab. 16. — Preyssler in Meyers Physik. Aufs. III, 1793, p. 293. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 346, t. 87, f. 4. — Panz. Ent. Germ. I, 1795, p. 334; in Voet, Col. IV, 1798, p. 69, t. 40, f. 48. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1803, p. 190 *(Brachyrhinus)*. — Germ. Reise Dalmatien 1817, p. 244 *(Curculio)*; Ins. Spec. novae I, 1824, p. 347, t. 2, f. 9 *(Otiorrhynchus)*. — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 594 ♂ ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 330 ♂ ♀. — Küster, Käfer Eur. XI, 1847, Nr. 63. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 424; ed. 2, 1858, p. 745; ed. 3, II, 1874, p. 213 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 270, 274. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Curc. 1854, t. 15, f. 71. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 503. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 279; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 207 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 279; Abeille XI, 1873, p. 787; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—1883, Nr. 8—9 (1883), p. 506; Best.-Tab. 9, 1883, p. 104; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 225. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 294. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 627 (Subg. *Dory-* Alpenkette: von Mont Blanc bis Ostungarn; Südkroatien, West-Bosnien

merus). — Onsea, Glasn. Naravosl. Drust. VIII, 1896, p. 156 (var.). — Geilenkeuser, Verh. Nat. Ver. preuß. Rheinl. 1907, Sitzber. p. 24—34. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 925, fig. 116 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 174; Best.-Tab. 70, 1914, p. 46 (Gr. *Prilisvanus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 28, t. 153, f. 27. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 131. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 45. — Horion, Nachtr. zu Fn. Germ. 1935, p. 308.

religiosus Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 118; Fn. Boica I, 1801, p. 491 *(Curculio)*. — Vill. Entom. Linn. I, 1789, p. 206; l. c. IV, 1789, p. 277. — Gmel. in Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1778. — Oliv. Encycl. méthod. V, 1790, p. 575.

Germari Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 187; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 500; Best.-Tab. 9, 1883, p. 98. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 181; Best.-Tab. 70, 1914, p. 53 (Gr. *Vedopranus*). — Apfelb. Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 21; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 95.

ab. *chlorophanus* Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 347. — Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 330 ♂ ♀. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 270, 275. — Küster, Käfer Eur. XI, 1847, Nr. 64. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 207; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—1883, Nr. 8—9 (1883), p. 507; Best.-Tab. 9, 1883, p. 105. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 294. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 749. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 627 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 174; Best.-Tab. 70, 1914, p. 46. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 132.

squamiger Ol. Entom. V, 1807, Nr. 83, p. 409, t. 26, f. 375 *(Curculio)*. — Germ. Ins. Spec. novae I, 1812, p. 347 var. *(Otiorrhynchus)*. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 132.

globus Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 386. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 202; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 278; Abeille XI, 1873, p. 785; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 517 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 115. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 288. — Friv. Király Magyar 1865, p. 209. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 628 (Subg. *Dorymerus*). — — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 — Nord-Italien, ? Ungarn, ? Banat

(1914), p. 156; Best.-Tab. 70, 1914, p. 28 (Gr. *Rosvalestus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 40.
Biologie: Baudi, Bull. Soc. Ent. Ital. XII, 1880, p. 246 (Weinreben schädlich). — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 40 (Futterpflanzen); l. c. XVIII, 1886, p. 285.

Göbli Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 159; Best.-Tab. 70, 1914, p. 31 (Subg. *Advenardus*). — Mazedonien: Athos

gracilipes Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 23; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 139; Best.-Tab. 70, 1914, p. 11. — Pontische Alpen

gracilis Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 599; l. c. VII, I, 1843, p. 336. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 266; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 286; Abeille XI, 1873, p. 792; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 530; Best.-Tab. 9, 1883, p. 128. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 355. — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 200. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 150; Best.-Tab. 70, 1914, p. 22 (Gr. *Lixorrhynchus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 115. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 39. — Südfrankreich, Seealpen, Frejus
provincialis Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 266 ♂ (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 286; Abeille XI, 1873, p. 792; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 541; Best.-Tab. 9, 1883, p. 129. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 255. — Fauvel, Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 247; l. c. XIV, 1895, p. 114 (*Brachyrhinus*).

graecus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 222 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 280; Abeille XI, 1873, p. 788; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 497; Best.-Tab. 9, 1883, p. 95. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 311 ♂ ♀. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 158; Best.-Tab. 70, 1914, p. 30 (Gr. *Rosvalestus*). — Apfelb. Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 20; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 92. — Süd-Albanien, Griechenland: Akarnanien, Aetolien
subsp. *graecoinsularis* (Daniel) Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 158; Best.-Tab. 70, 1914, p. 30 (Subg. *Nehrodistus*). — Apfelb. Glasnik. zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 20; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 92. — Cephalonia

grandineus Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 356. — Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 1834, p. 622; l. c. VII, 1, 1843, p. 380 ♂ ♀. — Gebler, Bull. Soc. Nat. Moscou 1848, p. 362. — Kol. l. c. XXXI, 2, 1858, p. 454. — Stierl. — S.W.-Sibirien, Baikalseegebiet, Persien?

Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 257 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 285; Abeille XI, 1873, p. 791; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 491; Best.-Tab. 9, 1883, p. 89. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 347. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 155; Best.-Tab. 70, 1914, p. 27 (Gr. *Mitarodes*).

psegmaticus Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1873, p. 292. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 432. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 375; l. c. XVII, 1873, p. 277. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 273.

granicollis Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 369. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 244 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 283; Abeille XI, 1873, p. 790; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 502; Best.-Tab. 9, 1883, p. 100. — Friv. A Királyi magyar 1865, p. 213, t. 12, f. 2. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 336. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 627 (Subg. *Dorymerus*). — Petri, Siebenbürgens Käfer 1912, p. 295. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 163; Best.-Tab. 70, 1914, p. 55 (Gr. *Ecestomus*). — Ungarn, Siebenbürgen

var. *pictus* Petri, Siebenbürg. Käfer 1912, p. 295.

var. *Paringii* Petri, Siebenbürg. Käfer 1912.

Hickeri Penecke, Col. Centralbl. V, 1931, p. 117 (prope *pinastri*). — Karpathen

horridus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 2 (1880), p. 57; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 10, 1883 (1884), p. 698. — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 225; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 194; Best.-Tab. 70, 1914, p. 66 (Gr. *Acunotus*). — Kroatien, Herzegovina, Dalmatien, Trebinje, Montenegro

cribellarius Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 530; Best.-Tab. 9, 1883, p. 128.

impressiventris Fairm. Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, p. 60. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 191 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 277; Abeille XI, 1873, p. 785; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 479 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 77. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 275. — Daniel, Col.-Studien II, 1898, p. 51. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 144; Best.-Tab. 70, 1914, p. 16; Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 44. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 109. — Hoffmann, Bull. Soc. Ent. France 1930, p. 169; l. c. 1933, p. 23, 29. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 37. — Frankreich, Pyrenäen, Nordspanien

var. *Ariasi* Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 72; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 434; Best.-Tab. 9, 1883, p. 32. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 149. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 43. — Nord-Italien: Lombardei

indubitus Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 168; Best.-Tab. 70, 1914, p. 40 (Subg. *Provadilus*). — Westkaukasus: Kuban

infernalis Germ. Reise Dalmatien 1817, p. 242, t. 8, f. 13 *(Curculio)*. — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 590 ♂; Boh. l. c. VII, I, 1843, p. 322 ♂ *(Otiorrhynchus)*. — Küster, Käfer Eur. XXVIII, 1854. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 236 ♂ ♀; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 499; Best.-Tab. 9, 1883, p. 97. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 326. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 222 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 163; Best.-Tab. 70, 1914, p. 35 (Gr. *Ulozenus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 47. — Krain, Julische Alpen, Kroatien, Illyrien, Nord-Bosnien, Dalmatien

intrusus Reiche, Ann. Soc. Ent. France (4) II, 1862, p. 297. — Stierl. Best.-Tab. 9, 1883, p. 112. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 247. — J. Ste.-Claire Deville, Cat. crit. Col. Corse 1914, p. 408. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 102. — Korsika, Sardinien

Koziorowiczi Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 481; Best.-Tab. 9, 1883, p. 79. — A. & F. Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. XL, 1908, p. 263. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 143; Best.-Tab. 70, 1914, p. 15 (Gr. *Metopiorrhynchus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 102.

inunctus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 224; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 282; Abeille XI, 1873, p. 788; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 509; Best.-Tab. 9, 1883, p. 107. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 312. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 184; Best.-Tab. 70, 1914, p. 56. — S.-O.-Bosnien: Zvjeda-planina, Herzegovina: Vareš, Vucja luka; S.-W.-Serbien: Krivača; Bulgarien: Rhodope

rugosogranulatus Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 2 (1888), p. 51. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 184; Best.-Tab. 70, 1914, p. 56 (Gr. *Otiolehus*). — Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 96.

var. *chionophilus* Apfelb. Anz. Kl. Akad. Wiss. Wien 1908, Nr. I, p. 6; Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 21; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 97. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 184; Best.-Tab. 70, 1914, p. 56. — O.-Albanien: Schar-Dagh

Biologie: Hardouin, Bull. Soc. Ent. France 1931, p. 179—182, figs. — Hoffmann, Bull. Soc. Ent. France 1931, p. 183—184.

Joakimoffi Apfelb. Mitteil. König. Naturwiss. Inst. Sofia V, 1932, p. 157 (prope *armipes*). — Pirin Geb. (Bulgarien)

jugigradens (Dan. i. l.) Hänel, Koleopt. Rundschau 1934, p. 39 (prope *pabulator*). — Murá-Paß (Iskander-Kul)

kashmirensis Formanek, Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 19 (prope *bosnicus*). — Kashmir: Pir Panjal

Kiesenwetteri Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 253 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 284; Abeille XI, 1873, p. 791; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 415; Best.-Tab. 9, 1883, p. 113. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 343. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 164; Best.-Tab. 70, 1914, p. 36 (Gr. *Mitadileus*). — Griechenland

var. *flavoguttatus* Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 378. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 164; Best.-Tab. 70, 1914, p. 36. — Griechenland: Korax-Gebirge

guttatus Petri, Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 338. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 79.

Kollari Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 593 ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 379 ♀. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1862, p. 254 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 284; Abeille XI, 1873, p. 791; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 490; Best.-Tab. 9, 1883, p. 88. — Friv. A Király magyar 1865 (1866), p. 213, t. 12, f. 3. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 343. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 624 (Subg. *Dorymerus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 923, fig. 110 A (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 140; Best.-Tab. 70, 1914, p. 12 (Gr. *Dorymerus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 25, t. 153, f. 24. — Penecke, Wien. Ent. Zeit. XLI, 1926, p. 11. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 36. — Horion, Nachtr. zu Fn. Germ. 1935, p. 307. — Bukovina, Ungarn, Siebenbürgen, Walachei, Galizische Gebirge

Küsteri Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 490; Best.-Tab. 9, 1883, p. 88.

ab. *Bielzi* Küster, Käfer Eur. XVI, 1849, Nr. 89. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 254; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 490; Best.-Tab. 9, 1883, p. 88. — Marseul, Abeille X, X, 1872, p. 344. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 923. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 140; Best.-Tab. 70, 1914, p. 12.

Königi Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXII, 1888, p. 150. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 190; Best.-Tab. 70, 1914, p. 62 (Gr. *Udosellus*). — W.-Kaukasus: Zirkassien (Utsch-Dère)

opertosus Reitter, Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 101.

validiscapus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IX, 3, 1894, p. 113.

kopaonicensis Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien XII, 1912, p. 653; Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 21; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 98 (Gr. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 189, 244; Best.-Tab. 70, 1914, p. 61, 116 (Gr. *Cryphiphorus*). — Mazedonien: Monastir, Megazovo; Südserbien: Kopaonik, Novibazar

koritnicensis Apfelb. Ak. Wiss. Anz. Wien Nr. 9, 1918, p. 5 (*marmota*-Gruppe). — Albanien: Schar-Dagh

Krattereri Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 289 ♀. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 237 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 283; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 503; Best.-Tab. 9, 1883, p. 101. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 627 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 179; Best.-Tab. 70, 1914, p. 51 (Gr. *Obrasilus*). — Galizische und Ungarische Ost-Karpathen, Siebenbürgen, Transsylvanische Alpen

egregius L. Miller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XX, 1870, p. 220. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 354; l. c. XVII, 1873, p. 284; Abeille XI, 1873, p. 790; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 504; Best.-Tab. 9, 1883, p. 102. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 767. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 627 (Subg. *Dorymerus*).

Kratteri Marseul, Abeille X, 1872, p. 327 (err.). — Stierl. l. c. XI, 1873, p. 789 (err.).

var. *curvipes* Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 241 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 283; Abeille XI, 1874, p. 790; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 500; Best.-Tab. 9, 1883, p. 98. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 222 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 626 ♂ ♀ (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 180; Best.-Tab. 70, 1914, p. 52. — Zentral- u. Ost-Karpathen, Transsylvanische Alpen

curviscelis Marseul, Abeille X, 1872, p. 333; l. c. XI. 1873, p. 790.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 40 *(egregius)*, p. 41 *(Krattereri)*; l. c. XVIII, 1886, p. 284 *(egregius)*, p. 285 *(Krattereri)*.

Kuenburgi Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 130, 139; l. c. XVII, 1873, p. 274; Abeille XI, — Ostgalizische Karpathen,

1873, p. 781; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 464; Best.-Tab. 9, 1883, p. 62. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 242. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—1891 (1891), Arten p. 621 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Daniel, Col.-Studien II, 1898, p. 42. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 141; Best.-Tab. 70, 1914, p. 13 (Gr. *Dorymerus*). — Penecke, Wien. Ent. Zeit. XLI, 1926, p. 12. Marmarosch, Siebenbürgen

labilis Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—1883, Nr. 8—9 (1883), p. 483; Best.-Tab. 9, 1883, p. 81. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 625 (Subg. *Dorymerus*). — Tyl, Ent. Blätter VII, 1911, p. 125. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 149; Best.-Tab. 70, 1914, p. 21; Fn. Germ. V, 1916, p. 26. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 39. Siebenbürgen

respersus Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 149; Best.-Tab. 70, 1914, p. 21 (nec Stierlin).

Biologie: Tyl, Ent. Blätter VII, 1911, p. 125 (Forst-Schädling).

latipunctus Penecke, Col. Centralbl. 1928, p. 125. Bukovina

latitarsis Apfelb. Akad. Wiss. Wien Anz. Nr. 10, 1918, p. 125 (zwischen *kopaonicensis* und *oligolepis*). Mazedonien

lavandus Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 354. — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 577 ♂ ♀; Boh. l. c. VII, I, 1843, p. 290 ♂ ♀. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 423; l. c. ed. 2, 1858, p. 744; l. c. ed. 3, 1874, p. 213 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 502. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 186 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 277; Abeille XI, 1873, p. 784; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 495; Best.-Tab. 9, 1883, p. 93. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 269. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 625 (Subg. *Dorymerus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 924 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 155; Best.-Tab. 70, p. 27 (Gr. *Mitarodes*). Österreich, Ungarn, Dalmatien, Griechenland, Varna u. Schwarzes Meer

longicornis (♂) Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—80, Nr. 9 (1879), l. c. VI, 8—9, 1883, p. 495; Best.-Tab. 9, 1883, p. 93.

Biologie: Waltl, Correspbl. zool.-min. Ver. Regensburg XXIV, 1870, p. 78. — Kovačevič (Ž) Verh. Deutsch. Ges. angew. Entomologie 1936, p. 33—41.

liburnicus (Daniel) Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 165 ♂ ♀; Best.-Tab. 70, 1914, p. 37 ♂ ♀ (Subg. *Ergiferanus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 47. Velebit

longipennis Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 223; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 280; Abeille XI, 1873, p. 788; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 499; Best.-Tab. 9, 1883, p. 97. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 312. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 165; Best.-Tab. 70, 1914, p. 33 (Gr. *Mesaniomus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 45. — Herzegovina: Gacko, Bakplanina; Dalmatien: Erkvice; Montenegro

longiventris Küster, Käfer Eur. XVIII, 1849, Nr. 87. — Fuss, Verh. Ver. Nat. Hermannstadt 1852, p. 110. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 245 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 284; Abeille XI, 1874, p. 790; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 493; Best.-Tab. 9, 1883, p. 91. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 338. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 626 ♂ ♀ (Subg. *Dorymerus*). — Csiki, Termész. Füzet. XXIV, 1901, p. 490, fig. c; Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 109 ♂, fig. 2, p. 110, fig. 7. — Smirnow, Rev. Russe Ent. IX, 1909, p. 402, fig. 4, 5. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 181; Best.-Tab. 70, 1914, p. 53 (Gr. *Acallorrhynchus*). — Siebenbürgen

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 42; l. c. XVIII, 1886, p. 285.

lugens Germ. Reise Dalmatien 1817, p. 243 *(Curculio)*. — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 620 ♂ ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 369 ♂ ♀ *(Otiorrhynchus)*. — Küster, Käfer Eur. XI, 1847, Nr. 74. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 302; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 252 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 284; Abeille XI, 1873, p. 790; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 505; Best.-Tab. 9, 1883, p. 103. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 341. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 186; Best.-Tab. 70, 1914, p. 58 (Gr. *Misenatus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 47. — Süd-Europa: Spanien, Süd-Italien, Sizilien, Dalmatien, Corfú

tricarinatus Chevr. Ann. Soc. Ent. France 1879, Bull. p. CXXXIX.

impressipennis Brullé, Expéd. sc. Morée III. 1832, p. 239. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 252. — Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr. 1864, p. 256.

scalptus Gyll. in Schönherr, Gen. et Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 591, ♂ ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 369.

Fabricii Stierl. (♂) Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 185; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9, 1883, p. 510; Best.-Tab. 9, 1883, p. 108.

ab. *melitanus* Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 186; Best.-Tab. 70, 1914, p. 58. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 47.

subsp. *spartanus* Kirsch, Ent. Monatsbl. II, 1881, p. 4. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9, 1883, p. 503; Best.-Tab. 9, 1883, p. 101. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 187; Best.-Tab. 70, 1914, p. 59. — Griechenland: Taygetos

lumensis Apfelb. Sitz.-Ber. Akad. Wien. Anz. 1908, Nr. 1, p. 4; Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 21; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 96. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 170; Best.-Tab. 70, 1914, p. 42. — Ost-Albanien: Schar-Dagh

ljumanus Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 183; Best.-Tab. 70, 1914 (Err.), p. 55 (Subg. *Ecestomus*).

lutosus Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 297; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 142; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1872, p. 341. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 226. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3. II. 1874, p. 218 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—1888 (1883), p. 35 *(Brachyrhinus)*; (1886) p. 230 (Subg. *Otiorrhynchus)*; (1888) p. 423 Note. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXIX, 1910, p. 143; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 194; Best.-Tab. 70, 1914, p. 66 (Gr. *Acunotus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 133. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 40. — Schweiz; Ost-Frankreich: Dijon, Seealpen; Italien: Istrien, Lazio, Abruzzen, Apulien; Krain, Kroatien

Sequensi Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 105; l. c. XXIX, 1910, p. 143; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 194; Best.-Tab. 70, 1914, p. 66. — A. & F. Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. XL, 1908, p. 263.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 42; l. c. XVIII, 1886, p. 285.

Maderi Formanek, Kol. Rundsch. VIII, 1920, p. 95 (Gr. *Anchorrhynchus*). — Albanien

malissorum Apfelb. Akad. Wiss. Wien. Sitz.-Ber. 1918, p. 173 (prope *albanicus*). — Nord-Albanische Alpen

marmota Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 230 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1878, p. 281; Abeille XI, 1873, p. 788; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9, 1883, p. 529; Best.-Tab. 9, 1883, p. 127. — Friv. A. Királyi magyar 1865, p. 200, t. 11, f. 14. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 319. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 630 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 165; Best-Tab. 69, 1914, p. 37 (Gr. *Ergiferanus*). — Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, p. 93. — Ungarn, Banat, Siebenbürgen

subsp. *pierinus* Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 168; Best.-Tab. 70, 1914, p. 40 (Gr. *Provadilus*). — Apfelb. Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. 1920, — Mazedonien: Monastir, Periteri

XXXII, p. 20; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 93.

Marthae Reitter, Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 102; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 178; Best.-Tab. 70, 1883, p. 50 (Gr. *Prilisvanus*). — Cirkassien: Abago

Mehelyi Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1893—97, Nr. 6, 1895, p. 300. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 141; Best.-Tab. 70, 1914, p. 13 (Gr. *Dorymerus*). — Penecke, Wien. Ent. Zeit. XLI, 1926, p. 9; Coleopt. Centralbl. 1928, p. 126; l. c. p. 147. — Siebenbürgen

ab. *perniger* Penecke, Coleopt. Centralbl. 1928, p. 147.

Meschniggi Petri, Koleopt. Rundsch. 1928, 14, p. 172. — Griechenland: Thessalien (Olymp.)

Midas (Apfelb.) Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 156; Best.-Tab. 70, 1914, p. 28 (Gr. *Mitarodes*). — Apfelb. Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 20; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 91. — Mazedonien: Golesica-planina, Jesero

Millerianus Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 177; Best.-Tab. 70, 1914, p. 49 (Gr. *Prilisvanus*). — Galiz. Ost-Karpathen: Czernahora-Gebiet; Ungarn: Marmaros, Alpe Howerla

Mocsaryi Csiki, Termész, Füzet. XXII, 1899, p. 247. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 182; Best.-Tab. 70, 1914, p. 54 (Gr. *Ecestomus*). — Ost-Ungarn, Gorgonyi-Gebirge

montigena Friv. Termész. Füzet. XI, 1889, p. 161 (non Marseul).

moesiacus Apfelb. Glasnik Kroat. Natur. Ges. Zagr. XXXIV, 1922, p. 25 (*moesiacus*-Gruppe). — Serbien

moestus Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 627; l. c. VII, I, 1843, p. 376. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 276 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 135; l. c. XVII, 1873, p. 287; Abeille XI, 1873, p. 793; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 521; Best.-Tab. 9, 1883, p. 119. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 367. — Daniel, Col.-Studien II, 1899, p. 52. — Sainte-Claire Deville, L'-Abeille XXX, 1900—1906, p. 199. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 168; Best.-Tab. 70, 1914, p. 40 (Gr. *Provadilus*). — Hustache, Bull. Soc. Ent. France 1923, p. 124. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 41. — Seealpen: westlich von le Tinèe; Berge ringsum S. Martin-Vesubie; Ligurien (Bordighera), Piemont

elongatus (Muls.) Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 135. — Fauvel, Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 114. — Reitter, Verh. Nat.

Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 168; Best.-Tab. 70, 1914, p. 40.

grandifrons Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 352.

subsp. *Raymondi* Gautier, Ann. Soc. Ent. France (4) X, 1860, Bull. p. CXIII. — Daniel, Col.-Studien II, 1898, p. 52. — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 199. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 168, Note; Best.-Tab. 70, 1914, p. 41, Note. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 125. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 41. — Seealpen: östl. von le Tinée, Basses Alpes, Hautes-Alpes

planidorsis Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87, Nr. 7 (1886), p. 283.

montivagus Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 378 ♂. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 262 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 285; Abeille XI, 1873, p. 791; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 513; Best.-Tab. 9, 1883, p. 111. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 350. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 223 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1912 (1913) (Best.-Tab. 69), p. 167; Best.-Tab. 70, 1914, p. 39 (Gr. *Mierginus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 46. — Tirol, Trident.-, Venet.-, Julische Alpen, Krain

carniolicus Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 367; l. c. XVII, 1873, p. 281; Abeille XI, 1873, p. 788; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 514 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 112.

multicostatus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 284; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 288; Abeille XI, 1873, p. 794; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 530; Best.-Tab. 9, 1883, p. 128. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 376. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 224 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 188; Best.-Tab. 70, 1914, p. 60 (Gr. *Bytosmesus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 42. — Steiermark, Krain, Julische Voralpen, Illyrien, Bosnien, Herzegovina: Mostar

planirostris Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87, Nr. 10 (1887), p. 399.

munelensis Apfelbb. Sitzber. Ak. Wien. CXVI, 1, 1907, p. 521 ♂ ♀. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 162; Best.-Tab. 70, 1914, p. 34 (Gr. *Mesaniomus*). — Albanien: Merdita (Munela-Gebirge)

Novaki Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 37. — Lona, Studi Entom. Trieste I, 1925—26, p. 6, f. 3. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 43. — Zentral-Dalmatien: Svilaja (loc. class.) Kroatien: Fuzine, Ostaria (Velebit), Capella-Gebirge

Novellae Lona, Studi Entom. Trieste I, 1925—26, I, f. 7. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 43. — Kroatien: Portoré

nubilus Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 372. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 299; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 264 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 285; Abeille XI, 1873, p. 792; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 516 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 114; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 227 ♂ ♀. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 352. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 223 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—06, p. 198. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 925 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 164; Best.-Tab. 70, 1914, p. 36 (Gr. *Ergiferanus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 122. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 46. — Frankreich: Seealpen; Schweiz (loc. class.), Piemont

Bischoffi Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 301; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 264; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. p. 285; Abeille XI, 1873, p. 792; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 516 ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 114; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 227 ♀. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 352.

var. *partitialis* Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 376. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 300; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 264; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 516; Best.-Tab. 9, 1883, p. 114; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 227. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 352. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 164; Best.-Tab. 70, 1914, p. 36. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 123. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 47. — Schweiz, Nord-Italien: Piemont

partialis Boh. apud Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 164; Best.-Tab. 70, 1914, p. 36 (err.).

Oberti Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 153 *(Brachyrhinus)*. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 154; Best.-Tab. 70, 1914, p. 25 (Gr. *Amosilnus*). — Zentral-Asien: Krasnojarsk, Irkutsk

obesus Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 218 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 280; Abeille XI, 1873, p. 787; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 495; Best.-Tab. 9, 1883, p. 93. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 160; Best.-Tab. 70, 1914, p. 32 (Gr. *Dostacasbus*). — Kreta, Rhodus, Kosos, Karpathos, Chalki

obesulus Marseul, Abeille X, 1872, p. 305.

obsidianus Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 324. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 240 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII. 1873, p. 283; Abeille XI, 1873, p. 789; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 8—9, 1883, p. 504; Best.-Tab. 9, 1883, p. 102. — Friv. A. Királyi magyar 1865—1866, p. 212, t. 11, f. 16. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 330. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 212 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 627 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 180; Best.-Tab. 70, 1914, p. 52 (Gr. *Obrasilus)*; Fn. Germ. V, 1916, p. 28. — Ost-Karpathen: Waldgebirge, Siebenbürgen

perforatus Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 423; l. c. ed. 2, 1858, p. 744. — Miller, Wien. Ent. Monatschr. III, 1859, p. 359. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 502.

obsulcatus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 277 ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 287; Abeille XI, 1873, p. 793; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 521; Best.-Tab. 9, 1883, p. 119. — Marseul, Abeille X, 1871, p. 369. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 170; Best.-Tab. 70, 1914, p. 42 (Gr. *Provadilus*). — Kaukasus

Ronchettii Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 305.

?*coriarius* Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 278 ♂; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 521; Best.-Tab. 9, 1883, p. 119. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 369. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 170, Note; Best.-Tab. 70, 1914, p. 42, Note. — Italien?

obtusus Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 356. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 154; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 274; Abeille XI, 1873, p. 781; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 464; Best.-Tab. 9, 1883, p. 62. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 241. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 142; Best.-Tab. 70, 1914, p. 14 (Gr. *Dorymerus*). — Penecke, Wien. Ent. Zeit. XLI, 1926, p. 92. — Zentral- u. Ost-Karpathen, Siebenbürgen, ? Illyrien

graniventris L. Miller, Wien. Ent. Monatschr. III, p. 361. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 125 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 341; l. c. XVII, 1873, p. 285; Abeille XI, 1873, p. 791; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 493; Best.-Tab. 9, 1883, p. 91. — Friv. A. Királyi Magyar 1865, p. 207, t. 11, f. 11. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 213. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 623 (Gr. *Dorymerus*).

oligolepis Apfelb. Akad. Wiss. Wien. Anz. Nr. 10, 1918, p. 124 (prope *inunctus* Stierl.). — Mazedonien: Golexnica-Alpen
ab. *nitidipennis* Apfelb. Akad. Wiss. Wien Nr. 10, 1918, p. 124.

olympicola Penecke, Col. Centralbl. 1928, Nr. 3, p. 38 (Gr. *Kiesenwetteri*). — Thessalien

opulentus Germ. Fn. Ins. Eur. XVII, 1834, t. 6. — Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 333. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 208 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 279; Abeille XI, 1873, p. 787; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 508; Best.-Tab. Nr. 9, 1883, p. 106. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 295. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 628 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 177; Best.-Tab. 70, 1914, p. 49 (Gr. *Prilisvanus*). — K. Hänel, Ent. Blätt. XXXI, 1935, p. 75 (Morph. u. Biologie). — Siebenbürgen, Transsylvanische Alpen

pabulator Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 169; Best.-Tab. 70, 1914, p. 41 (Gr. *Provadilus*). — Zirkassien

pantherinus Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 278; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 784; Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 20; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, p. 94. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 171; Best.-Tab. 70, 1914, p. 43. — Bosnien: Vranica-planina; Montenegro: Durmitor, Volujak; Albanien: Schar-Dagh

parnassius Apfelb. Glasnik der Kroat. Naturwiss. Ges. Zagreb XXXIV, 1922, p. 24 (Gr. *longipennis*). — Griechenland, Parnass

Paulinus Lona, Studi Ent. Trieste I, 1925—26, pt. 1, p. 4. — Italien: Triest-Umgebungen; Istrien: Levade; Emilia

pedemontanus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 276 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 287; Abeille XI, 1873, p. 793; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 531; Best.-Tab. 9, 1883, p. 129. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 367. — Desbr. Frelon III, 1893—94, Nr. 8 (1893), p. 70. — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—06, p. 200. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 167; Best.-Tab. 70, 1914, p. 39. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 127. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 41. — Französisch-Ital.-Seealpen, Ligurische Alpen, Piemont

pelionis Penecke, Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924, p. 13 (Gr. *excellens*). — Thessalien

peregrinus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 225; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 282; Abeille XI, 1873, p. 789; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 — Türkei, Kleinasien, Höchsyrien

(1883), p. 499; Best.-Tab. 9, 1883, p. 97. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 313. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 181; Best.-Tab. 70, 1914, p. 54 (Gr. *Acallorrhynchus*).

picitarsis Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 266. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 282; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 343; l. c. XVII, 1873, p. 288; Abeille XI, 1873, p. 794; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—1883, Nr. 8—9 (1883), p. 506; Best.-Tab. 9, 1883, p. 104; Fn. Col. Helvet. II, 1886—1898 (1891), p. 228. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 374. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, 1874, p. 224 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 165; Best.-Tab. 70, 1914, p. 37 (Gr. *Ergiferanus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 47. — Steiermark, Julische Alpen?

pignoris Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 146 ♂ ♀; Best.-Tab. 70, 1914, p. 18 ♂ ♀ (Gr. *Metopiorrhynchus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 38. — Nord-Italien: Bergamaskeralpen (M. Grigna); Trident.-Alpen: (M. Pari, Storo)

pinastri Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 358, t. 88, f. 3 *(Curculio)*. — Ol. Entom. V, 1807, Nr. 83, p. 378, t. 25, f. 350. — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 630 *(Otiorrhynchus)*; l. c. VII, 1, 1843, p. 383. — Küster, Käfer Eur. XI, 1847, Nr. 79. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 426; l. c. ed. 2, 1858, p. 747; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 213 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 271, 278. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 505. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 283 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 288; Abeille XI, 1873, p. 794; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 529; Best.-Tab. 9, 1883, p. 127. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 375. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 630 (Subg. *Dorymerus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 925, fig. 115 d (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 189; Best.-Tab. 70, 1914, p. 61 (Gr. *Padilehus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 28, t. 154, f. 2. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 47. — Ostalpen, Österreich bis Bosnien: Krain, Julische Alpen, Kroatien (Ludberg, Agram, Capela, Bala Lasica); Herzegovina: Dervent, Drocedo

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 44 (Futterpflanzen); l. c. XVIII, 1886, p. 286.

planiceps Daniel, Col.-Studien II, 1898, p. 47. — *Kraussi* Ganglb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 105 ♂ ♀ (Subg. *Dorymerus*). — Fiori, Riv. Col. Ital. I, 1903, p. 229. — Nord-Italien: Venezianer-Alpen (M. Cavallo),

Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 194; Best.-Tab. 70, 1914, p. 66 (Gr. *Kreinidinus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 40. — Julische Alpen (M. Canin)

polycoccus Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 286. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 221 ♂ ♀ (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 280; Abeille XI, 1873, p. 788; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 498; Best.-Tab. 9, 1883, p. 96. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 310. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 162; Best.-Tab. 70, 1914, p. 34. — Süd-Ungarn, Dalmatien, Türkei

populeti Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 373. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 301; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 232 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 282; Abeille XI, 1873, p. 788; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 512 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 110; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 227. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 321. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 628 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 159; Best.-Tab. 70, 1914, p. 31 (Gr. *Advenardus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 43. — Steiermark bis Tirol u. Trident.-Alpen; Südungarn, Serbien

Kraatzi Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 222 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 282; Abeille XI, 1873, p. 788; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 511; Best.-Tab. 9, 1883, p. 109. — Friv. A Király magyar 1865, p. 210, t. 11, f. 13. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 310.

robustus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 512; Best.-Tab. 9, 1883, p. 110.

? *Brucki* Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 281, Note ♂ ♀; Abeille XI, 1873, p. 788; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 512; Best.-Tab. 9, 1883, p. 110 (non Bach). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 159; Best.-Tab. 70, 1914, p. 31. — Griechenland

var *Stierlinianus* Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 159; Best.-Tab. 70, 1914, p. 31.

Biologie: Weny, Rovart. Lapok III, 1886, p. 3—9, p. II. — Sajo, Ill. Wochenschr. Ent. I, 1896, p. 309—310. — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 51 (Schädling an Weinreben). — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkrankh. III, 1906—13 (1912), p. 543.

pretiosus Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 377. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 155; Best.-Tab. 70, 1914, p. 27 (Gr. *Mitarodes*). — Griechenland: Koraxgebirge

prisrensis Apfelb. Glasnik Kroat. Natur. Ges. Zagr. XXXIV, 1922, p. 26 (Gr. *polycoccus*). — S.-Serbien

procerus Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 344 (pro 424); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 8, 1875 (1876), p. 487; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 479; Best.-Tab. 9, 1883, p. 77. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 425. — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 197. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 145; Best.-Tab. 70, 1914, p. 17 (Gr. *Metopiorrhynchus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 26. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 110. — Hoffmann, Bull. Soc. Ent. France XXXVIII, 1933, p. 28. — West-Deutschland, Süd-Frankreich, Pyrenaeen

pseudolinearis Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 163 ♂ ♀; Best.-Tab. 70, 1914, p. 35 ♂ ♀ (Gr. *Normotionus*); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 167 ♂ ♀; Best.-Tab. 70, 1914, p. 39 ♂ ♀ (Gr. *Mierginus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 44. — Mittelitalien

pupillatus Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 597; l. c. VII, I, 1843, p. 334. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 282; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 192 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 278; Abeille XI, 1873, p. 785; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 480; Best.-Tab. 9, 1883, p. 78; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 222. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 276. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 220 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 625 (Subg. *Dorymerus*). — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—06, p. 197. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 924, fig. 112 c. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 147; Best.-Tab. 70, 1914, p. 19 (Gr. *Metopiorrhynchus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 26. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 111. — Penecke, Col. Centralbl. II, 1928, p. 266. — Hubenthal, Ent. Bl. XXV, 1929, p. 201; l. c. XXVII, 1931, p. 186. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 38. — Horion, Nachtr. zu Fn. Germ. 1935, p. 308. — Italien: Sizilien

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 44 (Futterpflanzen); l. c. XVIII, 1886, p. 286. — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 49 (Futterpflanzen).

pusillus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 196 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 278; Abeille XI, 1873, p. 785; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 487; Best.-Tab. 9, 1883, p. 85. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 281. — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 198. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, — Seealpen: Piemont (M. Viso)

1913 (1914), p. 143; Best.-Tab. 70, 1914, p. 15 (Gr. *Metopiorrhynchus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 37.

Rambouseki Apfelb. Akad. Wiss. Wien. Anz. Nr. 10, 1918, p. 126 (prope *inunctus* Stierl.). — Balkan-Gebirge

Reichei Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 199; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 278; Abeille XI, 1873, p. 785; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 524; Best.-Tab. 9, 1883, p. 122. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 284. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 629 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 154; Best.-Tab. 70, 1914, p. 26 (Gr. *Amosilnus*). — Siebenbürgen, Dalmatien

respersus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 186 (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 277; Abeille XI, 1873, p. 784; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 494; Best.-Tab. 9, 1883, p. 92. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 270. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 149; Best.-Tab. 70, 1914, p. 21 (Gr. *Metopiorrhynchus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 39. — Böhmen, Österreich, Ungarn, Trident.-Alpen: Monte Pari; Dalmatien

retifer Apfelb. Glasnik zem. muz. Bosn. u. Herzeg. XL, 1928, p. 59 (Gr. *Dorymerus*). — Montenegro

Retowskii Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 387; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 179; Best.-Tab. 70, 1914, p. 51 (Gr. *Vedopranus*). — Kaukasus, Zirkassien

rhamni Apfelb. Glasnik zem. muz. Sarajevo VII, 1895, p. 538; Wiss. Mittheil. Bosnien IV, 1896, p. 547; Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 20; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, p. 92. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 248; Best.-Tab. 70, 1914, p. 120. — Süd-West-Herzegovina: Gacko, Babaplanina

rhinocerulus Penecke, Col. Centralblatt II, 1928, p. 265 (Gr. *Dorymerus*). — Rumänien

Riessi Fuss, Verh. Siebenbürg. Ver. Nat. 1868, p. 175, t. 1, fig. d—h. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 362; l. c. XVII, 1873, p. 284; Abeille XI, 1873, p. 790; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 494; Best.-Tab. 9, 1883, p. 92. — Marseul. Abeille XI, 1873, p. 758. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 626 ♂ ♀ (Subg. *Dorymerus*). — Csiki, Termesz. Füzet. XXIV, 1901, p. 490, fig. 6; Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 109 ♂, fig. 1, p. 110 ♀, fig. 6 (Subg. *Dorymerus*). — Smirnow, Rev. Russe Ent. XX, 1909, p. 402, fig. 1—2. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 181; Best.-Tab. 70, 1914, p. 53 (Gr. *Acallorrhynchus*). — Siebenbürgen, Ost-Karpathen, Walachei

Rosti Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1880—1883, Nr. 8 (1891), p. 324 ♂ ♀. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 160; Best.-Tab. 70, 1914, p. 32 (Gr. *Pocuso-* — Kaukasus: Abchasien

getus). — Formanek, Wien. Ent. Zeit. XXXIX, 1922, p. 75.

rufomarginatus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 526 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 124 ♂ ♀ (Gr. *Dorymerus*). — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 620 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 144; Best.-Tab. 70, 1914, p. 14 (Gr. *Dorymerus*). — Siebenbürgen

rugifrons Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 319 *(Curculio)*; in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 627; Boh. l. c. VII, I, 1843, p. 383 ♂ ♀ *(Otiorrhynchus)*. — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 332; Ins. Lapp. I, 1838 (1840), col. 186 *(Curculio)*. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 115; Man. Brit. Col. 1839, p. 242 *(Otiorrhynchus)*. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 426; ed. 2, 1858, p. 747; ed. 3, II, 1874, p. 213 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 505. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 306; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 279 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 343; l. c. XVII, 1873, p. 287; Abeille XI, 1873, p. 793; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 532 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 130; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 228 ♂ ♀. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 371. — C. G. Thoms, Skand. Col. VII, 1865, p. 126; l. c. X, 1868, p. 173, 174. — G. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, Nr. 96, 1876, p. 61. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 36, Note *(Brachyrhinus)*; (1886), p. 231 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 175, 179. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—1891 (1890), Arten p. 576; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 630 (Subg. *Dorymerus*). — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 200. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 570 (Subg. *Dorymerus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 925, fig. 115 e. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 167; Best.-Tab. 70, 1914, p. 39 (Gr. *Mierginus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 26. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 128. — Buchanan, Canad. Ent. LIX, 1927, p. 183—184. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 41. — Nord- u. Mittel-Europa: Lappland, Norwegen, England, Belgien, Frankreich, Alpen, Deutschland, Österreich, Italien, Nord-America, Canada

scaber Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 115; Man. Brit. Col. 1839, p. 241. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 306.

Ghestleri Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 281; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 343; l. c. XVII, 1873, p. 288; Abeille XI, 1873, p. 794; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 531;

Best.-Tab. 9, 1883, p. 129; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 228. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 374. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 167; Best.-Tab. 70, 1914, p. 39.

var. *Dillwyni* Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 116; Man. Brit. Col. 1839, p. 342. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1886), p. 231. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn VII, 1913 (1914), p. 167; Best.-Tab. 70, 1914, p. 39. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 128. — Britannien, Frankreich: Finisterre

rugicollis Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 120; Man. Brit. Col. 1839, p. 243.

ambiguus Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 387. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 280 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 343; l. c. XVII, 1873, p. 288; Abeille XI, 1873, p. 794; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 532; Best.-Tab. 9, 1883, p. 130. — Rye, Ent. Monthly Mag. II, 1866, p. 181—182. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 373. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 37, Note *(Brachyrhinus)*.

senex Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 280; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 532; Best.-Tab. 9, 1883, p. 130.

var. *impoticus* Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 383. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 281 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 343; l. c. XVII, 1873, p. 288; Abeille XI, 1873, p. 793; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—1883, Nr. 8—9 (1883), p. 532; Best.-Tab. 9, 1883, p. 130. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 373. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 223 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 37, Note; (1886), p. 231 *(Brachyrhinus)*. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 168; Best.-Tab. 70, 1914, p. 40. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 129. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 41. — Frankreich (Typus: Paris)

Piochardi Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 134; l. c. XVI, 1872, p. 343; l. c. XVII, 1873, p. 288; Abeille XI, 1873, p. 794; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 532; Best.-Tab. 9, 1883, p. 130. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 372.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 44; l. c. XVIII, 1886, p. 286. — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 51. — Chittenden. Can. Ent. 1925, p. 290—291 (Historische Noten). — Wilson, Ent. Mo. Mag. LXI, 1925, p. 273, figs. (Larve).

rugosus Hummel, Essais Ent. VI, 1827, p. 12. — Mannerh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 591 ♂ ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 324 ♂ ♀. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 238 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 283; Abeille XI, 1873, p. 789; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 500; Best.-Tab. 9, 1883, p. 98. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 328. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 576 ♂ ♀; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 626 ♂ ♀ (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 179; Best.-Tab. 70, 1914, p. 51 (Gr. *Obrasilus*). — Karpathen, Rußland: Petersburg

salicis Ström, Skrivter Kjöbenh. Selsk. (N. S.) III, 1788, p. 57, tab. f. 5 *(Curculio)*. — Bergroth, Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 227. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 570 (Subg. *Dorymerus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 926 (Subg. *Dorymerus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 926 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 152; Best.-Tab. 70, 1914, p. 24 (Gr. *Majetnecus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 27, t. 154, f. 1. — Penecke, Wien. Ent. Zeit. 1922, p. 176. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 116. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 44. — Wilhelm Székessy, Kol. Rundsch. 1934, p. 36. — Alpen und Karpathen: Von der Schweiz bis Siebenbürgen

lepidopterus F. Ent. Syst. IV, 1794, p. 454; Syst. El. II, 1801, p. 541 *(Curculio)*. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 362, t. 88, f. 8. — Panz, Ent. Germ. 1795, p. 333; Fn. Ins. Germ. III, 1796, Heft 26, t. 19. — Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 276. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 181 *(Brachyrhinus)*. — Ol. Entom. V, 1807, Nr. 83, p. 410, t. 26, f. 376 *(Curculio)*. — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 315 *(Curculio)*; in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 595 ♂ ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 334 ♂ ♀ *(Otiorrhynchus)*. — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 332; Ins. Lapp. I, 1838 (1840), col. 186 *(Curculio)*. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1836), p. 150 *(Curculio)*. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 424; ed. 2, 1858, p. 745; ed. 3, II, 1874, p. 223 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 270, 276. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 281; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 212 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 280; Abeille XI, 1873, p. 787; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 523 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 121; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 224. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 503. — Miller, Wien. Ent. Monatschr. III, 1859,

p. 361. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 125; l. c. X, 1868, p. 173, 174. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 299. — Schöyen, Ent. Tidskr. I, 1880, p. 181, 212. — Bergroth, Berl. Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 227. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 576; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 629 (Subg. *Dorymerus*). — Fauvel, Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 114.

squamiger F. Syst. El. II, 1801, p. 540 *(Curculio)*. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 180 *(Brachyrhinus)*.

pauperculus Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 281; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 212 *(pauperulus)*; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 523; Best.-Tab. 9, 1883, p. 121; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 224. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 299 *(pauperculus)*. Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 926 *(pauperculus)*.

squamifer F. Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 212 (err.).

subsp. *squamosus* (♂ ♀) Miller, Wien. Ent. Monatschr. III, 1859, p. 360. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 211 ♂ ♀ (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII. 1873, p. 279; Abeille XI, 1873, p. 787; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 522 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 120. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 298. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 221 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 926 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 153; Best.-Tab. 70, 1914, p. 25 (Gr. *Majetnecus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 27. — Penecke, Wien. Ent. Zeit. 1922, p. 176. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 44. — Wilh. Székessy, Kol. Rundsch. 1934, p. 36. Ost-Alpen

squameus Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 291. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 189; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 277; Abeille XI, 1873, p. 784; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 501; Best.-Tab. 9, 1883, p. 99. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 272. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 153, Note, p. 248; Best.-Tab. 70, 1914, p. 25, Note, p. 120.

squamatilis Marseul, Abeille X, 1872, p. 298 ♂ ♀.

ab. *squamulatus* Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 211; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 522; Best.-Tab. 9, 1883, p. 120. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 299. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 926 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver.

Brünn LII, 1913 (1914), p. 153; Best.-Tab. 70, 1914, p. 25.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 41 *(lepidopterus)*; l. c. XVIII, 1886, p. 285. — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 49 (Futterpflanzen).

Schaumi Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 255 (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 284; Abeille XI, 1873, p. 791; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 8—9, 1883, p. 490; Best.-Tab. 9, 1883, p. 88. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 344. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 625 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 140; Best.-Tab. 70, 1914, p. 12 (Gr. *Dorymerus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 25, Note. — Penecke, Wien. Ent. Zeit. 1926, p. 11. — Ungarn, Siebenbürgen, Wallachei

spumans Marseul, Abeille X, 1872, p. 344 ♂.

Schlaeflini Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 227; p. 340 *(Schlaeflii)* (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 282; Abeille XI, 1873, p. 788; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 515; Best.-Tab. 9, 1883, p. 113. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 315. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 162, 185; Best.-Tab. 70, 1914, p. 34, 57 (Gr. *Anchorrhynchus*). — Apfelb. Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 21; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, p. 97. — Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 137. — Janina (Typus), Thessalien: Veluchi; Türkei

scitus Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 303. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 119 (Subg. *Otiorrhynchus*): Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 372; l. c. XVII, 1873, p. 280; Abeille XI, 1873, p. 787; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—1883, Nr. 8—9 (1883), p. 496; Best.-Tab. 9, 1883, p. 94. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 307. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 157; Best.-Tab. 70, 1914, p. 29 (Gr. *Nehrodistus*). — Konstantinopel, Smyrna, Griechenland, Bulgarien: Sliven

Tarnieri Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 219 ♂ ♀ (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 372.

sculptirostris Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 1847, p. 511. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 438. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 343; l. c. XVII, 1873, p. 284 (err. *sculticollis*); Abeille XI, 1873, p. 791; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 505; Best.-Tab. 9, 1883, p. 103. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 342. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 184; Best.-Tab. 70, 1914, p. 56 (Gr. *Otiolehus*). — Türkei, Kaukasus, Kleinasien

serenus Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 171; Best.-Tab. 70, 1914, p. 43 (Gr. *Provadilus*). Zentral-Kaukasus

shardaghensis Apfelb. Akad. Wiss. Wien. Anz. Nr. 1, 1908, p. 4. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 187; Best.-Tab. 70, 1914, p. 59 (Gr. *Piopisidus*). Ost-Albanien: Schar-Dagh

signatipennis Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 597; l. c. VII, 1, 1843, p. 335. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 204; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 279; Abeille XI, 1873, p. 786; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 2 (1880), p. 60—61; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 489; Best.-Tab. 9, 1883, p. 87. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 289. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 221 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Apfelb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLVIII, 1898, p. 371 ♂ ♀, fig. 1; Glasnik der Kroat. Naturwiss. Ges. Zagreb XXXIV, 1922, p. 22. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 152; Best.-Tab. 70, 1914, p. 24 (Gr. *Satnalistus*). — Lona, Studi Ent. Trieste 1925—26, I, p. 8. — Penecke, Col. Centralblatt 1927, p .265. — Breit, Kol. Rundsch. XIV, 1928—29, p. 207. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 43. Steiermark, Krain, Julische Alpen, Istrien: Tajano-Maggiore-Gebirge

confusus (♀) Boh. in Schönherr, Gen. Spec. VII, 1, 1843, p. 359. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 205; Mittheil. Schweiz. Ent.Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 489; Best.-Tab. 9, 1883, p. 87. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 292. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 221 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 266; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 774.

illyricus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 204; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 279; Abeille XI, 1873, p. 786; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 489; Best.-Tab. 9, 1883, p. 87; l. c. VI, 1880—83, Nr. 2 (1880), p. 61. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 290. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 221 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 774.

eusomoides (♀) Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1893—97, Nr. 3 (1894), p. 110. — Apfelb. Verh. zoolog.-bot. Ges. Wien 1898, p. 371; Wiss. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1899, p. 774; Glasnik d. Kroat. Naturwiss. Ges. Zagreb XXXIV, 1922, p. 23. — Lona, Studi Ent. Trieste 1925, I, p. 1. — Breit, Kol. Rundschau XIV, 1928—29, p. 207.

?*aureolus* Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 623 ♂ ♀ (*Otiorrhynchus*); l. c. VII, 1, 1843, p. 335 a.

subsp. *virginalis* Apfelb. Glasnik d. Kroat. Natur. Ges. Zagreb XXXIV, 1922, p. 22 (Gr. *signatipennis*). — Lona, Studi Ent. Trieste 1925—26, I, p. 8. Bosn., Herzeg., Dalmatien, Montenegro, Albanien

simulans Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 181; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 524; Best.-Tab. 9, 1883, p. 122. — O. Schneider & Leder, Verh. Nat. Ver. Brünn XVII, 1878 (1879), p. 5. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 154; Best.-Tab. 70, 1914, p .26 (Gr. *Amosilnus*). Kaukasus

subsignatus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 257 (non Gyll.); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 285; Abeille XI, 1873, p. 791; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 491; Best.-Tab. 9, 1883, p. 89. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 154; Best.-Tab. 70, 1914, p. 26.

gracilicornis Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 10 (1893), p. 408.

singularis L. Syst. Nat. ed. 12, I, 1767, p. 1066 *(Curculio)*. — Vill. Entom. Linn. I, 1789, p. 211. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1800. — Ol. Encycl. méthod. V, 1790, p. 553. — Schrank, Fn. Boica I, 1798, p. 493. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 175 *(Brachyrhinus)*. — Ill. Mag. Ins.-Kunde VI, 1807, p. 315, Note *(Curculio)*. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 115 *(Otiorrhynchus)*; Man. Brit. Col. 1839, p. 241. — Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 614; l. c. VII, 1, 1843, p. 360. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 190; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 478; Best.-Tab. 9, 1883, p. 76. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 274. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 36 *(Brachyrhinus)*; (1886), p. 230 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 538. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 570 *(Brachyrhinus)*. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 924, fig. 113 A, 122 A. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 144; Best.-Tab. 1914, p. 16; Fn. Germ. V, 1916, p. 26, t. 153, f. 23. — Hustache, Ann. Bull. Soc. Ent. France 1923, p. 107. — Hoffmann, Bull. Soc. Ent. France 1930, p. 169; l. c. 1933, p. 23—30. — Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. V, LXXV, 1932, p. 262; Ent. Blätter XXIX, 1933, p. 78—82. — Rüschkamp, Ent. Bl. 1932, 4, p. 165. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 37. — Guilleaume, Bull. Ann. Soc. Ent. Belg. LXXIII, 1933, p. 81. — Horion, Nachtr. zu Fn. Germ. 1935, p. 307. Europa (nec Balkan)

picipes F. Gen. Ins. 1776, p. 229; Spec. Ins. I, 1781, p. 197; Mant. Ins. I, 1787, p. 122; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 486; Syst. El. II, 1801, p. 540 *(Curculio)*. — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 205; l. c. IV, 1789, p. 276. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1775. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 557. — Payk. Monogr. Curc. Suec. 1792, p. 100; Fn. Suec. III, 1900, p. 293. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 359, t. 88, f. 5. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 332. — Walck. Fn. Paris I, 1802, p. 249. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 180 *(Brachyrhinus)*. — Ill. Mag. Ins. IV, 1806, p. 160 *(Curculio)*; l. c. VI, 1807, p. 315. — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 317 *(Curculio)*; in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p .613; l. c. VII, 1, 1843, p. 357 *(Otiorrhynchus)*. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 329, t. 2. — Küster, Käfer Eur. XI, 1847, Nr. 70. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 425; l. c. ed. 2, 1858, p. 747; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 212 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 271, 277. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Curc. 1854, t. 15, f. 12. — Stierl, Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 287; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 190 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1873, p. 277 ♂ ♀; Abeille XI, 1873, p. 786. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 505. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 123; l. c. X, 1868, p. 172. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. LX, 1865, p. 282; Monogr. Peritelus 1866, p. 10, t. 8, 13; Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 575; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p .625 (Subg. *Dorymerus*). — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 175, 178, t. 15, f. 9. — Hoffmann, Bull. Soc. Ent. France 1933, p. 30.

granulatus Herbst, Arch. Ins.-Gesch. IV—V, 1784—85, p. 84, Nr. 80, t. 24, f. 33 *(Curculio)*. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1800. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 572. — Hoppe, Enum. Ins. Elytr. Erlang. 1795, p. 63.

notatus Bonsd. Hist. Nat. Curc. Suec. II, 1785, p. 39, fig. 34 *(Curculio)*.

squamiger Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 301 *(Curculio)*. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 115; Man. Brit. Col. 1839, p. 241 *(Otiorrhynchus)*. — Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 282.

var. *Marquardti* Falderm. Bull. Ac. St. Pétersbourg I, 1837, p. 137. — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 357. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 190; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 478 ♂ ♀; Süd-Rußland

Best.-Tab. 9, 1883, p. 76; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 221 ♂ ♀. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 274. — Daniel, Col.-Studien II, 1899, p. 51. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 144; Best.-Tab. 70, 1914, p. 16. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 107. — Rüschkamp, Ent. Bl. 1932, p. 165. — Hoffmann, Bull. Soc. Ent. France 1933, p. 26. — Horion, Nachtr. zu Fn. Germ. 1935, p. 307.

vastator Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 300 *(Curculio)*.

notatus Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 114 *(Otiorrhynchus)*; Man. Brit. Col. 1839, p. 241.

var. *Chevrolati* Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 338. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 747; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 212 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 190; Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 373; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 478; Best.-Tab. 9, 1883, p. 76; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 221. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 274. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 924. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 144; Best.-Tab. 70, 1914, p. 16. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 108. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 37. — Hoffmann, Bull. Soc. Ent. France 1933, p. 26. — Vosges, Seealpen, Hohe Pyrenaeen

subsp. *corniculatus* (♂) Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 145 ♂ ♀; Best.-Tab. 70, 1914, p. 17 ♂ ♀ (Subg. *Metopiorrhynchus*); Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 44. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 109. — Hoffmann, Bull. Soc. Ent. France 1933, p. 23. — Ost-Pyrenaeen, Canigou

Biologie: Faldermann, Ann. Soc. Ent. France V, 1837, Bull. p. LXX *(Marquardti)*. — Motsch, Etud. Ent. II, 1854, p. 25 *(Marquardti)*. — Curtis, Farm Ins. 1860, p. 383—386, f. 7—10. — Butler, Trans. Ent. Soc. London, Bull. 1868, p. XXV. — Newman, Entomol. IX, 1876, p. 134—135, 135—137 *(picipes)*. — Anonym. Amer. Entom. III, 1880, p. 127 *(picipes)*. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, Bull. p. XLVII, XLVIII, LIX, LX *(picipes)*. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 45; l. c. XVIII, 1866, p. 287. — Ed. André, Naturaliste IX, 1887, p. 65, 66, f. 1—4; l. c. 2, I, 1888, p. 65, fig. 3 *(picipes)*. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) XLIV, 1897 (1898), p. 42—43 *(picipes)*. — Schilling, Prakt. Ratgeber Obst-Gartenbau, 1898, p. 260—262. — Theobald, Rep. South. Eastern Agric. College Wye 1905, p. 234 *(picipes)*; Zeitschr. wiss. Ins.-Biolog. II, 1906, p. 119 (Schädling an Zap-

fen) *(picipes)*. — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 50. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkrankh. III, 1906—13, 1912, p. 542. — Crawford, Mon. Bull. Stat. Commis. Hort. Sacramento, Californ. I, 1912, p. 86—87. — Chatanay, Bull. Soc. Ent. France 1914, p. 351 (Schädling an Obstbäumen). — Laing, Scot. For. J. 1929 (Edinburgh), p. 159. — Massee, East Malling Res. St. 1928—30, pt. 2 (suppl.) p. 189, 201, 1 pl.; East Malling (Kent) 1931. — Hoffmann, Bull. Soc. Ent. France 1933, p. 30. — Hus, Tijdschr. Plziekt. XXXIX, Nr. 6, 1933, p. 121—161, 6 t.; Versl. Plziekt. Dienst. Nr. 70, 1933 (Wageningen), p. 1—44, 6 t. — Kaven, Kranke Pflanze XI, Nr. 10, 1934, p. 123, 126 (Schädling an Rhododendren). — Jaruj, Journ. S. Agric. Coll. Wye XXXIV, 1934, p. 65—69. — Jary et Austin, Journ. S. E. Agric. Coll. 1934, Nr. 33, p. 9—16.

Solariorum Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 136 (prope *Schläflini*). — Südalbanien: Tomor-Gebirge (Ciafa Kulmaka)

solitarius Apfelb. Akad. Wiss. Wien. Anz. Nr. 10, 1918, p. 126 (Gr. *alpicola*). — Albanien: Schar-Dagh

sorbivorus (Apfelb.) Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 157; Best.-Tab. 70, 1914, p. 29 (Gr. *Nehrodistus*). — Mazedonien: Mokra-planina, Golešnica-planina bei Veleš

spinidens Apfelb. Akad. Wiss. Wien. Anz. Nr. 10, 1918, p. 125 (prope *oligolepis*). — Albanien: Merdita

Stephani-magni Penecke (♀), Wien. Ent. Zeit. XLIII, 1926, p. 7; ♂ Col. Centralbl. I, 1926—27, p. 323 (*Kollari*-Gr.). — Nordwest-Karpathen, Bukovina: Kloster Putna

styriacus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87, Nr. 7 (1886), p. 283. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 180; Best.-Tab. 70, 1914, p. 52 (Gr. *Obrasilus*). — Steiermark

subcoriaceus Reitter, Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 222; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—1883, Nr. 8—9 (1883), p. 470; Best.-Tab. 9, 1883, p. 68; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 169; Best.-Tab. 70, 1914, p. 41 (Gr. *Provadilus*). — Kaukasus: Swanetien, Zirkassien, Latpari-Stass

subdentatus Bach, Käferfn. II, 1854, p. 271, p. 279. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 282; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 193; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 481; Best.-Tab. 9, 1883, p. 79; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87, Nr. 5 (1886), p. 226; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 223. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 220 (Subg. — Thüringen, Berge von Mitteleuropa

Otiorrhynchus). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 924 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 147; Best.-Tab. 70, 1914, p. 19. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 112. — Penecke, Col. Centralblatt II, 1928, p. 266. — Hubenthal, Ent. Bl. XXV, 1929, p. 201; Ent. Bl. XXVII, 1931, p. 186. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 38. — Horion, Nachtr. zu Fn. Germ. 1935, p. 308.

pupillatus auct. (nec Gyll.).

?rhododendri Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 192 (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 278; Abeille XI, 1873, p. 785; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 481; Best.-Tab. 9, 1883, p. 79. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 278. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 220 (Subg. *Otiorrhynchus*).

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 45; l. c. XVII, 1886, p. 287.

subfilum Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 94; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 186, 196; Best.-Tab. 70, 1914, p. 60, 68 (Gr. *Anchorrhynchus*). — Griechenland: Morea, Taygetos

subpubescens Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1893—97, Nr. 3 (1894), p. 111. — Ganglbauer, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 255. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 193; Best.-Tab. 70, 1914, p. 65 (Gr. *Spodocellinus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 45. — Tirol, Kärnten, Krain, Julische Alpen: Cernaprst

subquadratus Rosenh. Beitr. Ins. Eur. 1847, p. 48. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 198 (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 278; Abeille XI, 1873, p. 785; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 525; Best.-Tab. 9, 1883, p. 123; Fn. Col. Helvet. II, 1886—1898 (1891), p. 226. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 283. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 220 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 155; Best.-Tab. 70, 1914, p. 27 (Gr. *Usiposconus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 118. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 45. — Horion, Nachtr. zu Fn. Germ. 1935, p. 308. — Alpen: Schweiz (Engadin), Steiermark, Alpen: Monte Baldo

subsignatus Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 626; l. c. VII, I, 1843, p. 380. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 453. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 154, Note; Best.-Tab. 70, 1914, p. 26, Note. — Kaukasus

subsigillatus Marseul, L'Abeille 1872, p. 346.

sulcatus F. Syst. Ent. 1775, p. 155; Spec. Ins. I, 1781, p. 197; Mant. Ins. I, 1787, p. 122; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 485; Syst. El. II, 1801, p. 539 — Nord-Mittel-Europa, Kanada,

(Curculio). — Herbst, Arch. Ins.-Gesch. IV—V, 1784—85, p. 85, t. 24, f. 35?; Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 347, t. 87, f. 5. — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 205; l. c. IV, 1789, p. 276. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1774. — Ol. Encycl. méthod. V, 1790, p. 556; Entom. V, 1807, Nr. 83, p. 407, t. 26, f. 371. — Rossi, Mant. Fn. Etr. I, 1792, p. 43; ed. Hellwig I, 1795, p. 382. — ? Hoppe, Enum. Ins. Erlang. 1795, p. 64. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 332. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 315. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 179 *(Brachyrhinus)*. — Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 347 *(Otiorrhynchus)*. — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1831, p. 114; Man. Brit. Col. 1839, p. 241. — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 620 ♂ ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 371 ♂ ♀. — Westwood, Gard. Mag. XIII, 1837, p. 158. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 330. — Küster, Käfer Eur. XI, 1847, Nr. 75. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 426; l. c. ed. 2, 1858, p. 748; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 214 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 271, 280. — Newman, Trans. Ent. Soc. London (2) III, 1855, Proc. p. C—CII. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 303; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 225 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 282; Abeille XI, 1873, p. 788; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 509 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 107; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 226 ♂ ♀. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 506. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 127; l. c. X, 1868, p. 173, 174. — Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) IV, 1869, p. 416; Col. St. Helena 1877, p. 173. — Crotch in Godm. Azoren 1870, p. 81. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 314. — Meliss, St. Helena 1875, p. 155. — G. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, Nr. 96, 1876, p. 61. — Prov. Pet. Fn. Canada I, 1877, p. 507, fig. 42. — Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, Compt. rend. p. XXXV. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 36 *(Brachyrhinus)*, (1866), p. 230 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 576; Fn. Transsylv. 1888—1891 (1891), Arten p. 628 (Subg. *Dorymerus*). — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 175, 179, t. 157, f. 10; l. c. VI, 1913, p. 304. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 538. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 570 (Subg. *Dorymerus*). — Heyden, Korresp.-Bl. Nat. Ver. Riga I, 1903, p. 24 (Kurland). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 925, fig. 115 a, b, c (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver.

Neufundland, Nova Scotia, Australien, Tasmanien, Neuseeland

Brünn LII, 1913 (1914), p. 163; Best.-Tab. 70, 1914, p. 35. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 119. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 43.

griseopunctatus Degeer, Mém. Hist. Ins. V, p. 217 *(Curculio)*. — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 206; l. c. IV, 1789, p. 277. — Grill, Ent. Tidskr. 1893, p. 255.

strictus Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1779 *(Curculio)*.

linearis (♂) Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 226 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 282; Abeille XI, 1873, p. 789; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 509 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 107. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 314 ♂ ♀. — Fauvel, Rev. d'Ent. XLV, 1895, p. 114 *(Brachyrhinus)*.

Biologie: Bouché, Naturg. Ins. 1834, p. 201—202, t. 10, f. 15—21. — Westwood, Gard. Mag. XIII, 1837, p. 157, fig. 67 A—G; Introd. Class. Ins. I, 1839, p. 344—345, fig. 41; 9—11. — Nördlinger, Klein. Feinde Landwirth. p. 190. — Preston, Gard. Chron. 1849, p. 774. — Chapuis & Candèze, Cat. Larv. Col. 1853, p. 210. — Newman, Trans. Ent. Soc. London (2) III, 1855, Proc. p. C—CII. — Laboulbène u. Linder, Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, Bull. p. XXXVII. — Lucas, Ann. Soc. Ent. France (4) IX, 1869, p. 50. — Bolton, Ent. Monthly Mag. XII, 1875, p. 83. — Snellen v. Vollenhoven, Tijdschr. Ent. XIX, 1876, p. 210. — Broun, Trans. N. Zealand Institut IX, 1876, p. 370. — Hankenhorn, Weinbau III, 1877, p. 215—216. — Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XX, 1877, Compt. rend. p. XXXIV—XXXV. — Kulm, Ent. Nachr. III, 1877, p. 171. — Anonym, Wochenbl. Landw. Zeit. Baden 1878, p. 277; Deutsche landw. Presse V, 1878, p. 337, 427. — Dahlen, Weinlaube X, 1878, p. 259—262; Weinbau IV, 1878, p. 203—205, 273. — Puls, Bull. Arboricult. Gand. 1881; Ann. Soc. Ent. France (6) II, 1882, Bull. p. LXXIX—LXXX. — Kunckel, Ann. Soc. Ent. France (6) VI, 1886, Bull. p. LVIII—LIX. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 42, 45; l. c. XVIII, 1886, p. 287, 285. — Letzner, 65. Jahresber. Schles. Ges. Vaterl. Cultur 1887, p. 340—344. — Preudhomme, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIII, 1889, Compt. rend. p. CXXXVIII—CXXXIX, CXLVII—CXLVIII. — Kingsley, Trans. New Zealand Institut XXII, 1890, p. 338. — Butler, Ent. Monthly Mag. XXVII, 1891, p. 223. — Fowler, l. c. XXIX, 1893, p. 18. — Xambeu, Naturaliste XV, 1893, p. 58—59; Moeurs et Métam. d. Ins. II, 1894, p. 89. — Ritzema

Bos, Zeitschr. Pflanzenkrankh. V, 1895, p. 346. — Müller, l. c. XI, 1901, p. 214—216. — Maisonneuve, Bull. Soc. Industr. Agric. Angers (4) XIV, 1904, p. 102—110. — Clark, Trans. Ent. Soc. London 1907, Proc. p. XXIX. — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 52. — — Del Guercio, Cronache Agrarie Firenze I, 1911, p. 39—45, 2 fig. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkrankh. III, 1906—13 (1912), p. 542. — J. Feytaud, Bull. Soc. d'Etude et de vulg. de la zoolog. agricole 1916; C. R. Acad. de Sciences Paris 165, 1917, p. 767; Annales des Epiphyties V, 1918. — Weiss, Jahresber. Ent. Ver. in Bremen 1917—1921, Nr. 5—9, p. 11. — Urban, Ent. Bl. XX, 1924, p. 175—178, fig. (Larve). — Smith, Journ. Econ. Ent. XX, 1927 (Geneva, N. J.), p. 127—131. — Mote et Wilcox, Circ. Oregon Agr. Exp. Sta. Nr. 79, 1927, p. 1—24, t. 1, f. 7. — Tempel, Der gefurchte Dickmaulrüssler als Azaleenschädling, in: Die kranke Pflanze V, 1928, Nr. 7, p. 106—107, fig. 1. — Anderson, Proc. Ent. Soc. Br. Columbia (Vancouver) 1929, p. 46—48. — Smith, Journ. Wash. Acad. Sc. XX, 1930 (Baltimore), p. 185—188. — Barrett, Univ. Cal. Pub. Ent. V, 1930, p. 92. — Smith, Bull. California Agric. Expt. St. Nr. 505, 1930. — Pack, Bull. Utah Agric. Expt. Sta. Nr. 216, 1930. — Thompson, 62nd Ann. Rep. Ent. Soc. Ontario 1931, p. 37—39. — Whitcomb, Nat. Nurserym. XXXIX, 1931, p. 5—6; Expt. Sta. Rec. 1933 (Washington), p. 793. — Keifer, Mon. Bull. Dept. Agric. California XX, Nr. 7, 1931, p. 470—472. — Hamilton, Journ. Econ. Ent. XXIV, Nr. 1, 1931, Nr. 4, p. 162—169. — Poeteren, Versl. Plantenziektenk.-Dienst Nr. 64, 1931, p. 189, 8 pls. — Muggeridge, New Zeal. Journ. Agric. 1931, XLII, Nr. 4, p. 231, 235, 7 figs. — Thiem, Die Gartenwiss. VI, Nr. 5, 1932, p. 519—540, 2 fig. 20 refs. — Smith, Techn. Bull. U. S. Dept. Agric. Nr. 325, 1932, p. 45, figs. — Thiem, Gartenbauwiss. Berlin 1932, 6, p. 519—540. — Hodson, Staniland et Beaumont, Pamph. Seal-Hayne Agric. Coll. No. 37 (Newton Albot, Devon) 1932, p. 25. — Gambrell, Pm. 8th Nat. Shade Tree Conf. 1932 (Rochester), p. 89—93. — E. P., Journ. Econ. Ent. XXVI, Nr. 1 (Geneva) 1933, p. 45. — White, Journ. Econ. Ent. XXVI, Nr. 3, 1933, p. 631, 640. — Hus, Tijdschr. Plziekt. XXXIX, No. 6, 1933, p. 121, 161. — Jary, Journ. S. E. Agr. Coll. Wye XXXIV, 1934, p. 65, 69. — Wilson (G. F.), Iris Yearb. 1934, p. 77—86, 3 figs. — Britton, Bull. Conn. Agric. Exp. St. No. 360, 1934, p. 474—483. — Kaven, Kranke Pflanze XI, No. 10, 1934, p. 123—126.

tanycerus Apfelb. Glasnik d. Kroat. Natur. Ges. Zagreb XXXIV, 1922, p. 26 (Gr. *marmota*). — Serbien

Tatarchani Reitter, Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 222; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 178; Best.-Tab. 70, 1914, p. 50 (Gr. *Prilisvanus*). — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 8—9, 1883, p. 507; Best.-Tab. 9, 1883, p. 105. — Kaukasus: Swanetien

var. *perdurus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 196; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 178; Best.-Tab. 70, 1914, p. 50.

tener Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 265 ♂ ♀ (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 286; Abeille XI, 1873, p. 792; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 517; Best.-Tab. 9, 1883, p. 115. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 354. — Daniel, Col.-Studien II, 1898, p. 52. — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 198. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 164; Best.-Tab. 70, 1914, p. 36 (Gr. *Ergiferanus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 122. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 46. — Seealpen, Alpes de St. Etienne, Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Savoi

subsp. *Bonvouloiri* Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 132; l. c. XVII, 1873, p. 285; Abeille XI, 1873, p. 792; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 517; Best.-Tab. 9, 1883, p. 115. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 353. — Fauvel, Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 114. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 164; Best.-Tab. 70, 1914, p. 36. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 122. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 47. — Französ. Alpen, Col des Fenêtres, St. Martin-Vesubie

var. *grajus* Daniel, Col.-Studien II, 1898, p. 52. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 46. — Grajische-Alpen: Cogne, Val d'Orco

teretirostris Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 131; l. c. XVII, 1873, p. 278; Abeille XI, 1873, p. 785; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 481; Best.-Tab. 9, 1883, p. 79; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87, Nr. 5 (1886), p. 226; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 224. — Marseul. Abeille X, 1872, p. 279. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 924 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 147, 148; Best.-Tab. 70, 1914, p. 19, 20 (Gr. *Metopiorrhynchus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 39. — Schweiz, Piemont

Baudii Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 3 (1881), p. 140; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 480; Best.-Tab. 9, 1883, p. 78.

SP

subg. *plicicollis* Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 148 ♀; Best.-Tab. 70, 1914, p. 20 ♀. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 39. — Trident.-Alpen: Monte Pari

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 46; l. c. XVIII, 1886, p. 287.

thessalicus Apfelb. Glasnik d. Kroat. Natur. Ges. Zagr. XXXIV, 1922, p. 26 (*moesiacus*-Gruppe). — Thessalien

thoracicus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 9 (1892), p. 359 (Subg. *Tournieria*). — Daniel, Col.-Studien II, 1898, p. 51. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 144; Best.-Tab. 70, 1914, p. 16 (Gr. *Metopiorrhynchus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 37. — Lepontinische-, Penninische Alpen (Mte. Barone)

lepontinus Daniel, Col.-Studien II, 1898, p. 51.

tibetanus Form. Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 32 (Gr. *Provalidus*). — Tibet: Gartok

tiflensis Reitter, Ent. Blätter 1915, p. 160. — Transkaukasus

tingens Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 147; Best.-Tab. 70, 1914, p. 19 (*Metopiorrhynchus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 38. — Westalpen: Val di Leno, Cima Tombea,

trojanus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 250 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 284; Abeille XI, 1873, p. 790; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 502; Best.-Tab. 9, 1883, p. 100. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 339. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 187; Best.-Tab. 70, 1914, p. 59 (Gr. *Misenatus*). — Kleinasien, Attika

turca Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 283 ♀. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 215 ♂ ♀ (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 280; Abeille XI, 1873, p. 787; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 496; Best.-Tab. 9, 1883, p. 94. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 302. — Ssilantjew, Zool. Anzeig. XXIX, 1905, p. 583—586, fig. (Parthenogenesis). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 157; Best.-Tab. 70, 1914, p. 29 (Gr. *Nehrodistus*). — Türkei, Kleinasien, Zirkassien, Syrien, Italien: Triest

Biologie: Ballion, Bull. Soc. Nat. Moscou 1887, p. 813—814. — Silantjew, Revue Russe Ent. IV, 1904, p. 328; Zool. Jahrb. Syst. XXI, 1905, p. 491—502, fig.; Zool. Anzeig. XXIX, 1905, p. 383—586; Novorossiisk, St. Petersburg 1909, p. 1—93, 2 Taf. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkrankh. III, 1906—1913 (1912), p. 542. — Mokrshetzki, Bote d. Weinbaues 1908, p. 78—88. — Berekaschwili, Bote d. Weinbaues 1908, p. 452—453.

Valvasori Penecke, Wien. Ent. Zeit. XL, 1923, p. 144 (Gr. *Dorymerus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 46. — Krainer Schneeberg

varius Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 380. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 305 (Subg. *Otiorrhynchus*); Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 197 ♂; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 278; Abeille XI, 1873, p. 786; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 478; Best.-Tab. 9, 1883, p. 76; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 220. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 748; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 214 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 506. — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 197. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 144; Best.-Tab. 70, 1914, p. 16 (Gr. *Metopiorrhynchus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 25. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 103. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 37. — Zentralalpen: Bernina bis Mont Blanc, Seealpen, Tiroler-, Trident.-Alpen

varians Marseul, Abeille X, 1872, p. 282.

maritimus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 478; Best.-Tab. 9, 1883, p. 76. — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 197. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 144; Best.-Tab. 70, 1914, p. 16.

velebiticus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1893—97, Nr. 1 (1893), p. 56. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 165; Best.-Tab. 70, 1914, p. 37 (Gr. *Ergiferanus*). — Penecke, Wien. Ent. Zeit. XL, 1923, p. 144. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 47. — Kroatien, Velebitgeb. (Ostaria)

vernalis Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 199 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 279; Abeille XI, 1873, p. 786; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 488; Best.-Tab. 9, 1883, p. 86. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 285. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 143; Best.-Tab. 70, 1914, p. 15 (Gr. *Metopiorrhynchus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 37. — Schweiz, Italien: Seealpen, Piemont

Dieckí Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 327; l. c. XVII, 1873, p. 279; Abeille XI, 1873, p. 786; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 487; Best.-Tab. 9, 1883, p. 85; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 221.

Dieckidius Marseul, Abeille XI, 1873, p. 756.

crassipes Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 485; Best.-Tab. 9, 1883, p. 83.

Dieckianus Marseul b. Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 143; Best.-Tab. 70, 1914, p. 15 (err.).

verrucipes Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 275; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, — Ost-Bulgarien,

p. 782 ♂ ♀. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 44. — Penecke, Col. Centralblatt 1928, p. 147. — Jenikioj

verrucifer Apfelb. b. Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 141 (err.); Best.-Tab. 70, 1914, p. 13 (Gr. *Dorymerus*); Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 44.

veterator Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXV, 1932, p. 262; Ent. Blätter 1933, p. 78—82. — Rüschkamp, Ent. Blätter 1932, p. 165—166. — Hoffmann, Bull. Soc. Ent. France 1933, p. 23—30. — Guilleaume, Bull. Soc. Ent. Belg. LXXIII, 1933, p. 81. — Horion, Nachtr. zu Fn. Germ. 1935, p. 307. — Holland, Belgien, N.-Frankreich

Marquardti Stierl. ex parte, Daniel (nec Fald.).

Weberi Merkl, Rovart. Lapok IV, 1897, p. 208. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p .175; Best.-Tab. 70, 1914, p. 47. — Banat

Wernerianus Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 185, 189; Best.-Tab. 70, 1914, p. 57, 61 (Gr. *Otiolehus*). — Mazedonien: Monastir

Subg. **Arammichnus** Gozis.

Des Gozis, Rev. d'Ent. I, 1882, p. 203; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1883, p. 414; Rev. d'Ent. IV, 1885, p. 126. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 232. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 8—9, 1883, p. 414, 535; Best.-Tab. 9, 1883, p. 6, 133; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 209, 229; in Calwer, Naturgesch. Käfer Eur. 1893, p. 497. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 569; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 615. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 47, 62; Best.-Tab. 66, 1912, p. 3, 19; Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 109; Fauna Germ. 1916, p. 16, 30, 31, 36. — Apfelb. Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. X, 1898, p. 280; l. c. XXXII, 1920, p. 15, 23—26; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, p. 102. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 7, 139. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 16; Arten p. 50—55.

Eurychirus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 14, 17, 27; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 345; l. c. XVII, 1873, p. 289; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 8—9, 1875 (1876), p. 492—493. — Des Gozis, Rev. d'Ent. I, 1882, p. 20; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1883, p. 414. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 33. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 109 (*Euchyrus* err.).

Artengruppen.

Arammichnasus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 66; Best.-Tab. 66, 1912, p. 22 (*O. laminirostris* Reitter); Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 151.

Arammichnus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 65; Best.-Tab. 66, 1912, p. 21 (*O. cribricollis* Gyll.); Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 124.

Besobarvus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 65; Best.-Tab. 66, 1912, p. 21 (*O. expansus* Reitter); Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 141.

Cryphiphorus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 8—9, 1883, p. 414, 533; Best.-Tab. 9, 1883, p. 6, 131; Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 225—229 (Bestimmungs-Tabelle); Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 209, 229. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1886), p. 232. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 569; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 615. — Apfelb. Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. 1898, p. 280. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 922. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 64; Best.-Tab. 66, 1912, p. 20 (*O. ligustici* L.); Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 114; Fauna Germ. V, 1916, p. 31. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 140.

Edelengus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 63; Best.-Tab. 66, 1912, p. 19 (*O. Gastonis* Fairm.); Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 110.

Elvandrinus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 64; Best.-Tab. 66, 1912, p. 20 (*O. armeniacus* Hochh.); Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 122.

Hanibotus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 65; Best.-Tab. 66, 1912, p. 21 (*O. sulcibasis* Reitter); Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 131.

Holomrasus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 66; Best.-Tab. 66, 1912, p. 22 (*O. hispidus* Stierl.); Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 150.

Lacocnesus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 64; Best.-Tab. 66, 1912, p. 20 (*O. latinasus* Reitter); Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 123.

Meriplodus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 65; Best.-Tab. 66, 1912, p. 21 (*O. Marquardti* Reitter); Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 140.

Mitomiris Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 65; Best.-Tab. 66, 1912, p. 21 (*O. setidorsis* Reitter); Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 133.

Nubidanus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 66; Best.-Tab. 66, 1912, p. 22 (*O. hebraeus* Stierl.); Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 142.

Odelengus Reitter, Wien. Ent. Zeit. 1912 (Best.-Tab. 67), p. 112 (*O. aberrans* Stierl.).

Osmobodes Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 66; Best.-Tab. 66, 1912, p. 22 (*O. mongolicus* Fald.); Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 148.

Stupamacus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 65; Best.-Tab. 66, 1912, p. 21 (*O. russicus* Stierl.); Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 137.

Tecutinus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 63; Best.-Tab. 66, 1912, p. 19 (*O. Escherichi* Reitter); Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 112.

Tithonus Germ. Spec. Ins. nov. I, 1824, p. 355. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 921. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 63; Best.-Tab. 66, 1912, p. 19 (*O. chrysocomus* Germ.); Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 109.

Timalphus Des Gozis, Rev. d'Ent. IV, 1885, p. 126. — — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1886, p. 230; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 209. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 109.

Zadrehus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 64; Best.-Tab. 66, 1912, p. 20 (*O. atroapterus* Deg.); Wien. Ent. Zeit. 1912 (Best.-Tab. 67), p. 123.

aberrans Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—1876, Nr. 9 (1876), p. 512; l. c. VI, 1880—1883, Nr. 8—9 (1883), p. 544; Best.-Tab. 9, 1883, p. 142 (Subg. *Arammichnus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 112 (Gr. *Odelengus*). — Syrien, Rhodus

abnormicollis Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 122 (Gr. *Elvandrinus*). — Kaukasus: Zirkassien, Swanetien

Akinini Stierl. Rev. mens. d'Ent. I, 1883—84, Nr. 4 (1883), p. 96. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 136 (Gr. *Mitomiris*); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 204; Best.-Tab. 70, 1914, p. 76. — Turkestan: Ac-baitae, Lepsinsk

Allardi Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 334, 347 (Subg. *Eurychirus*); Abeille XI, 1873, p. 797; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 134. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 405. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 110 (Gr. *Edelengus*). — Algerien: Oran, Mostaganem, Tlemcen

amplicollis Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 304 (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 289; Abeille XI, 1873, p. 797; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 534; Best.-Tab. 9, 1883, p. 132; Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 228 (Subg. *Cryphiphorus*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 410. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 122 (Gr. *Elvandrinus*). — Pontische Alpen (nicht Türkei)

angustifrons (Faust) Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 539; Best.-Tab. 9, 1883, p. 137 (Subg. *Arammichus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 133 (Gr. *Hanibotus*). — Kaukasus, Araxestal, Persien

anthracinus Scop. Ent. Carn. 1763, p. 30 *(Curculio)*. — Laich. Verz. Tyrol. Ins. I, 1781, p. 209. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1777. — Ol. Entom. V, 1807, Nr. 83, p. 575. — Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 635; l. c. VII, I, 1843, p. 388 *(Otiorrhynchus)*. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 441. — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 198. — A. e F. Solari, Ann. Mus. Zool. Napoli III, 1909, p. 1. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 308 (Subg. *Cryphiphorus*); l. c. XXXI, 1912 (Bestimmungs-Tabelle 67), p. 120 (Gr. *Cryphiphorus*); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 244; Best.-Tab. 70, 1914, p. 116. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 925, fig. 114 b. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 140. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 51. — Pyrenäen, Alpen, Italien: Calabrien; Serbien; Bulgarien: Etropolbalkan, Türkei

helveticus Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 370. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 303; Revis. Eur.

Otiorrhynchus 1861, p. 252 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 284; Abeille XI, 1873, p. 791; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 505; Best.-Tab. 9, 1883, p. 103; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 225. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 222 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Best.-Tab. 67, 1913, p. 120 (Subg. *Arammichnus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 140.

loricatus Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 303; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 252. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 244; Best.-Tab. 7, 1914, p. 120. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 140.

rugulipennis A. Costa, Ric. Ent. Monti Partenii 1858, p. 16, 26. — A. & F. Solari, Ann. Mus. Zool. Napoli III, Nr. 1, 1909, p. 1. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 244; Best.-Tab. 70, 1914, p. 116. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 51.

coenobita Marseul, Abeille XIV, 1876, p. CLXXXVI. — Emery, Nouv. et Faits, Nr. 46, 1874, p. CLXXXVI. — A. & F. Solari, Ann. Mus. Zool. Napoli III, Nr. 1, 1909, p. 1. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 244; Best.-Tab. 70, 1914, p. 116. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 51.

Lazarevici Csiki, Ann. Mus. Hungar. II, 1904, p. 592. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 244; Best.-Tab. 70, 1914, p. 116.

var. *cratoscelis* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 120. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 140. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 51. — Kaukasus, Bulgarien: Rhilo-Geb., Alpen, Piemont, Pyrenäen

Antoinei Hustache, Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc III, 1923, p. 65 (Subg. *Arammichnus*). — Marokko

apulus A. & F. Solari, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 118 ♂ ♀. — Süd-Italien: Grottaglie (Murgie)

armeniacus Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 2, 1847, p. 510. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1859, p. 451. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 344; l. c. XVII, 1873, p. 290 (Subg. *Tournieria*); Abeille XI, 1873, p. 798; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 534; Best.-Tab. 9, 1883, p. 132; Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 227 (Subg. *Cryphiphorus*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 419. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 122 (Gr. *Elvandrinus*).

asper A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 184 *(Cryphiphorus)*. — Mazedonien (Prisren), Bosnien (Livno)

astutus Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XX, 1866, p. 155 ♂ ♀ *(Brachyrhinus* subg. *Tournieria)*. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 135 (Gr. *Mitomiris*). — Centralasien, Akbaital, Tamgafluß, Tokmak

atlasicus Escalera, Trab. Mus. Madrid XI, 1914, p. 405. — Marokko

subsp. *dolabratus* Peyerh. Bull. Soc. Ent. France 1925, p. 105; Ann. Soc. Ent. France 1931, p. 11. — Grand-Atlas

atricolor Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 148 (Gr. *Nubidanus*). — Turkestan: Tschilarik, Vernyi

atroapterus Degeer, Mém. Hist. Ins. V, 1781, p. 243, t. 7, f. 22—24; Abh. Gesch. Ins. V, 1781, p. 363. — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 215, Nr. 182; l. c. IV, 1789, p. 282, Nr. 182. — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 290 *(Curculio)*; in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 603 ♂ ♀ *(Otiorrhynchus)*; l. c. VII, I, 1843, p. 343. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 117; Man. Brit. Col. 1839, p. 242. — Schiödte, Nat. Tidskr. IV, 1842, p. 204—208; l. c. XV, 1843, p. 512; Isis 1845, p. 532—35, 536—39 (Anatomie). — Walton, Brit. Ins. Curc. 1844—52, p. 93. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 271, 278. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 749; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 217 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 304. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 102 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 270; Abeille XI, 1873, p. 777; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 440; Best.-Tab. 9, 1883, p. 38; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 214. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 119 ♂ ♀; l. c. X, 1868, p. 172, 173. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 183. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 35 *(Brachyrhinus)*; (1886), p. 229 (Subg. *Otiorrhynchus)*. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), Arten p. 572; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 619 (Subg. *Otiorrhynchus)*. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 537. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 123 (Gr. *Zadrehus*); l. c. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 56, Note; Fn. Germ. V, 1916, p. 31. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 174, 176 ♂ ♀; l. c. VI, 1913, p. 304. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 568 *(Brachyrhinus)*. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 928. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 123 (Gr. *Lacocnesus*). — Hustache, Ann. — Mitteleuropa: Meeresküste England, Südschweden, Frankreich, Spanien

Soc. Ent. France XCII, 1923, p. 142. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 51. — Zumpt, Bol. Soc. Españ. Hist. Nat. 1934, p. 293.

rotundatus Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1805 *(Curculio)*.

niger Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 242.

arenosus Stierl. Rev. Eur. Ot. 1861, p. 103. — Mac Leay in Dejean, Cat. Col. I, p. 90 *(Pachygaster)* (s. descr.). — Fauvel, Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 113 *(Brachyrhinus)*. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 143.

Perezi Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 361; l. c. XVII, 1873, p. 270; Abeille XI, 1873, p. 777; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 439; Best.-Tab. 9, 1883, p. 37. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 184. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 56, Note. — A. & E. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 6. — Zumpt, Bol. Soc. Españ. Hist. Nat. 1934, p. 293.

pilicornis Chevr. Petit. Nouv. Ent. II, 1877, p. 157. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 8—9, 1883, p. 440; Best.-Tab. 9, 1883, p. 38. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 56, Note. — A. & F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 6. — Zumpt, Bol. Soc. Españ. Hist. Nat. 1934, p. 294.

cantabricus Seoane, Notas Fn. Galleca 1878, p. 11. — Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 609 ♂. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 61, Note (Gr. *Phalantorrhynchus?*); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119. — A. & F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 6. — Zumpt, Bol. Soc. Españ. Hist. Nat. 1934, p. 294.

Biologie: Mathieu, Ann. Soc. Ent. Belg. 1858, p. 204. — Valette, Feuille jeun. Nat. 1877, p. 34. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. Curc. 1854, p. 38. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 39; l. c. XVIII, 1886, p. 283 (Futterpflanzen).

auromaculatus Formanek, Wien. Ent. Zeit. XLIV, 1927, p. 44 (Gr. *Arammichnus*). — Armenien

aurosparsus Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 358. — Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 635; l. c. VI, I, 1843, p. 291 ♀. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 432. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 188; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 277; Abeille XI, 1873, p. 784; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 500; Best.-Tab. 9, 1883, p. 98 (Gr. *Dorymerus*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 271. — Reitter, Verh. Nat. Ver. — Rußland, Kaukasus

Brünn LII, 1913 (1914), p. 244; Best.-Tab. 70, 1914, p. 116.

roscidus Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 578 ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 291. — Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 188. — Reitter, Best.-Tab. 70, 1914, p. 116.

livonicus Seidlitz, Fn. Balt. 1875, p. 400; l. c. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 576; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 625 (Subg. *Dorymerus*). — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 482; Best.-Tab. 9, 1883, p. 80.

Heinzlii Reitter, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 231 ♂ ♀; l. c. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 121 (Gr. *Cryphiphorus*); Verh. Nat. Ver. Brünn LII; 1913 (1914), p. 244; Best.-Tab. 70, 1914, p. 116. — Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 107, Note. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 244; Best.-Tab. 70, 1914, p. 116.

Balassogloi (Faust) Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 550; Best.-Tab. 9, 1883, p. 148 (Gr. *Eurychirus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 141 (Gr. *Meriplodus*). — Mongolei: Barkul; Zentralasien: Thian-Schan, Issyk-Kul, Semiretschie, Schamsi

bardus Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843 p. 348. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 181, Note; Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 375; l. c. XVI, 1872, p. 346 (Subg. *Eurychirus*); Abeille XI, 1873, p. 796; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 354; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 8, 1875 (1876), p. 493; l. c. VI. 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 542; Best.-Tab. 9, 1883, p. 140. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 444. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 403. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 118 (Gr. *Cryphiphorus*). — Sibirien

beatus Faust, Oefv. Finska Vet.-Soc. Förh. XXXII, 1890, p. 65 (Subg. *Arammichnus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 118 (Gr. *Cryphiphorus*). — West-Mongolei

bicostatus Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 337 ♂. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 151 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 274; Abeille XI, 1873, p. 781; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 462 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 60; Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 79, 80 ♂ ♀; l. c. 1889, p. 227 (Subg. *Cryphiphorus*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 237 ♂ ♀. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 631 — Türkei, S. O. Bulgarien, Griechenland: Südeuboea, Andros, Tinos, Mykonos, Keos, Chios,

♂ ♀ (Subg. *Cryphiphorus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 118 (Gr. *Cryphiphorus*). — Samos, Nikaria, Karien

bisphaericus Reiche, Ann. Soc. Ent. France (3) V, 1857, p. 692. — Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien XII, 1912, p. 654 (Subg. *Arammichnus*); Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 109. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 227, Note; Best.-Tab. 70, 1914, p. 99, Note. — Griechenland, Nordmorea: Hagios-Vlassis, Ocha, Keos; Thessalien

expansus Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 94 (Subg. *Arammichnus*); Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 142 (Gr. *Besobarvus*); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 227, 246; Best.-Tab. 70, 1914, p. 99, 118. — Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 107, Note.

scabripes Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 375 (Subg. *Arammichnus*).

brevicornis Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 342. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 177 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 276; Abeille XI, 1873, p. 784; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 474; Best.-Tab. 9, 1883, p. 72. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 265 ♂ ♀. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 114 (Gr. *Tecutinus*). — Türkei: Konstantinopel, Syrien, Bithynischer Olymp

brevinasus Reitter, Ent. Blätter VI, 1910, p. 273 (Subg. *Arammichnus*); Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 132 (Gr. *Hanibotus*). — Persien: Luristan

breviusculus Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 349 (pro 333); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 8, 1875 (1876), p. 490 (Subg. *Eurychirus*); l. c. VI, 1880—1883, Nr. 8—9 (1883), p. 547; Best.-Tab. 9, p. 145. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 144 (Gr. *Nubidanus*). — Kaukasus?, Daghestan: Kurusch

brunneus Steven, Mus. Mosq. II, 1829, p. 96 *(Pachygaster)*. — Krynicky, Bull. Soc. Nat. Moscou VII, 1834, p. 167 *(Otiorrhynchus)*. — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Col. II, 2, 1834, p. 587 ♂ ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 319. — Gebler, l. c. 1848, p. 361. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 436. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 305 (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 289; Abeille XI, 1873, p. 798; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 555; Best.-Tab. 9, 1883, p. 153. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 412. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 80 (Gr. *Asphaerorrhynchus*). — Bosnien, Serbien, Krim, Kaukasus

var. *crispus* Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 319. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 436. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 307 (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 289; Abeille XI, 1873, p. 797; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 555; Best.-Tab. 9, 1883, p. 153. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 413. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 80. — Süd-Rußland, Türkei

var. *pubifer* Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 316. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 306 (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 290; Abeille XI, 1873, p. 798; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 556; Best.-Tab. 9, 1883, p. 154. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 413. — Orient: Kleinasien

var. *Jacqueti* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. X, 1898—1903, Nr. 8 (1901), p. 365; Bull. Soc. Bucarest IX, 1901, p. 760. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 130 (Gr. *Arammichnus*). — Rumänien: Bukarest

var. *fulvicomus* Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 138. — Albanien: Tomorgebirge (Ciafa-Kulmaka)

caesareus K. Daniel, Ann. Nat. Hofmus. Wien XX, 1906, p. 281. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 113 ♂ ♀ (Gr. *Tecutinus*). — Kleinasien: Kappadozien, Erdschias-Gebirge

calabrensis Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 8 (1891), p. 325 ♂ ♀ (Subg. *Arammichnus*). — Flach, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 17. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 131 (Gr. *Arammichnus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 54. — Kalabrien, Sizilien

pustulatus Vitale, Riv. Col. Ital. I, 1903, p. 22; Atti Acc. Pelormit. XX, 1905, p. 181.

cerigensis Apfelb. Glasnik d. Kroat. Nat. Ges. Zagreb XXXIV, 1922, p. 28 (Gr. *Championi*). — Griechenland: Insel Cerigo

Championi Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 131 (Gr. *Arammichnus*). — Griechenland, Herkulesbad

Christophi Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 9 (1876), p. 510 (Subg. *Eurychirus*); l. c. VI, 8—9, 1883, p. 548; Best.-Tab. 9, 1883, p. 146. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 145 (Gr. *Nubidanus*). — Kaspisee-Erdschiasgebiet, Lac Jedersk

chrysocomus Germ. Spec. Ins. nov. I, 1824, p. 355. — Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 635; Boh. l. c. VII, I, 1843, p. 349. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 287; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 113 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 271; — Schweiz, Piemont, Lombardei, Trident.-Alpen, Tirol,

Abeille XI, 1873, p. 778; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 8—9, 1883, p. 446; Best.-Tab. 9, 1883, p. 44; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87, Nr. 5 (1886), p. 230; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p 229 (Subg. *Timolphus*). — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 745; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 210 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 304. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 199. — Des Gozis, Rev. d'Ent. IV, 1885, p. 126 (Subg. *Timalphis*). — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—1891 (1891), Arten p. 619 (Subg. *Otiorrhynchus*). — St.-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 200. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 922, fig. 107 a (Subg. *Tithonus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 110 ♂ ♀ (Gr. *Tithonus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 50. — Horion, Nachtr. zu Fn. Germ. 1935, p. 309. — Niederösterreich, Ungarn, Siebenbürgen, Kärnten, Krain, Illyrien

var. *laevigatocollis* Gredler, Zeitschr. Ferdinandeum Innsbruck (3) VI, 1857, p. 132; Käfer Passeyer II, 1857, p. 48. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 114; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—1883, Nr. 8—9 (1883), p. 446; Best.-Tab. 9, 1883, p. 44. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 199. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 110. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 50. — Trident. Alpen

var. *viridicomus* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 8 (1891), p. 325 ♂ ♀ (Subg. *Timalphis*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 110. — Steiermark, Koralpe

comes Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 182 ♂ *(Cryphiphorus)*. — Bulgarien: Staraplanina,

comparabilis Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 309. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 292 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 345 (Subg. *Eurychirus*); Abeille XI, 1873, p. 795; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 10, 1883 (1884), p. 699. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 387. — Leoni, Natural. Sicil. XIX, 1906, p. 238. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 125 (Gr. *Arammichnus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 52. — Dalmatien, Albanien: Janina; Korfú

concavirostris Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 308. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 290, Note (Subg. *Eurychirus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 347; Abeille XI, 1873, p. 797; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 536; Best.-Tab. 9, 1883, p. 134. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 405. — Reitter, — Sizilien, Cephalonia

Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 130 (Gr. *Arammichnus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 53.

scabrosoides Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 188 (Subg. *Eurychirus*); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 536; Best.-Tab. 9, 1883, p. 134 (Subg. *Arammichnus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 128, Note.

concors A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 173, 187, 190. — Thessalien

(O. *subrotundatus* Apfelb. ex parte).

ab. (?) *stenopterus* Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 191. — „

confluens Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 150 (Gr. *Osmobodes*). — Sibirien: Minussinsk

conicirostris Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87, Nr. 5 (1886), p. 227. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 143 (Gr. *Nubidanus*). — Kaukasus, Transcaspien, Turkestan

conspersus ? Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 364, t. 88, f. 10 *(Curculio)*. — Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 346 *(Otiorrhynchus)*. — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 612; l. c. VII, I, 1843, p. 352. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 447. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 746; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 211 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 505. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 123; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 272; Abeille XI, 1873, p. 779; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 454; Best.-Tab. 9, 1883, p. 52. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 210. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 621 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 929. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 114 (Gr. *Cryphiphorus*). — Osteuropa: Österreich, Ungarn, Kaukasus, Zentralasien, Ostsibirien

chrysostictus Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 585; l. c. VII, 1, 1843, p. 353.

convexiusculus A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. Vol. X, 1931, p. 192 ♂ (Gr. *Cryphiphorus*). — Skutari

Coyei Marseul, Abeille V, 1868, p. 196; l. c. X, 1872, p. 394. — Chevr. Col. Hefte V, 1869, p. 75. — Crotch, Synops. Col. Eur. 1871, p. 40. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 346, 360 (Subg. *Eurychirus*); Abeille XI, 1873, p. 796; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 542; Best.-Tab. 9, 1883, p. 140. — J. & K. Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 109, Note. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 133 (Gr. *Hanibotus*). — Syrien

paradoxus Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 338, 346 (Subg. *Eurychirus*); in Marseul, Abeille X, 1872, p. 401; l. c. XI, 1873, p. 796; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 354; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 8, 1875 (1876), p. 493; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 543; Best.-Tab. 9, 1883, p. 141. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 133.

crassiceps (Daniel) Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 146 (Gr. *Nubidanus*). — Ost-Turkestan: Khotangebirge

cribricollis Gyll. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 582 ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 307 ♂ ♀. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 271; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 288 ♂ ♀ (Subg. *Eurychirus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 345; Abeille XI, 1873, p. 795; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 535; Best.-Tab. 9, 1883, p. 133; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 230. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 384 ♂ ♀. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 224 (Subg. *Eurychirus*). — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 35 (1886), p. 232 *(Brachyrhinus* subg. *Arammichnus)*. — Leoni, Riv. Col. Ital. 1906, p. 108. — A. & F. Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. XL, 1908, p. 263. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 124 (Gr. *Arammichnus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 32. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 143. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 51. — Südeuropa: Südfrankreich, Italien, Ungarn, Dalmatien; Algier, Australien

striatosetosus Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 309. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 248; Best.-Tab. 70, 1914, p. 120. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 144. — Sizilien

terrestris Marseul, Abeille X, 1872, p. 385.

ab. *reticollis* Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 307. — Stierl, Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 289. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 124. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 144. — „

recticollis Weise in Reitter, Cat. Col. Eur. 1891, p. 277 (err.). — Fauvel, Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 114.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 39; l. c. XVIII, 1886, p. 284. — Koebele, 21. Bull. U. S. Dept. Agric. Div. Ent. 1890, p. 12 (Australien). — Wassiliew, Zool. Anz. 34, 1908, p. 29—31 (Parthénogénèse). — Grandi, Boll. Labor. Zool. Portici VII, 1913, p. 17—18, 72—90, fig. 12 (Parthenogenesis). — Hustache, Ann. Soc.

Ent. France 1923, p. 145. — Lea, South Australian Plant Weevils; Journ. Dept. Agric. S. Australia XXX, 1925, No. 6, p. 582, 598, 27 figs. — Ryan, Mon. Bull. Calif. Dept. Agric. XVIII, 1929, No. 10 (Sacramento) p. 567. — Flintoff, Journ. Dept. Agric. W. Australia VI, 1929, Nr. 2, p. 333—339, 5 figs. — Browne et Keifer, Mon. Bull. Dept. Agric. California XIX, 1930, Nr. 10 (Sacramento), p. 595, 5 figs. — Anderwartha, Journ. Dept. Agric. Australian (2) VII, 1931, p. 106—114, 4 figs.; l. c. (2) IX, 1932, p. 104—105. — Keifer, Mon. Bull. Dep. Agric. California XX, Nr. 7, 1931, p. 47—472; Ent. Amer. (N. S.) XIII, Nr. 2, 1933, p. 45—84. — Davison, Journ. Dept. Agric. S. Australian XXXVI, No. 3, 1932 (Adelaide), p. 283, 286. — Essig, Journ. Econ. Ent. XXV, 1932, No. 6 (Geneva), p. 1240. — Anderwartha, Bull. Ent. Res. London XXIV, 1933, p. 373—384, 3 figs.

cribripennis Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XXIV, I, 1851, p. 81. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 178 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 276; Abeille XI, 1873, p. 784; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 474; Best.-Tab. 9, 1883, p. 72. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 266 ♂ ♀. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 113 ♂ ♀ (Gr. *Tecutinus*). — Türkei, Zentral-Kaukasus, Armenisches Gebirge

cribrosicollis Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 345. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 182 ♂; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 343, 346 (Subg. *Eurychirus*); Abeille XI, 1873, p. 796; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 538; Best.-Tab. 9, 1883, p. 136. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 403 ♂. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 150; Best.-Tab. 67, 1912, p. 150 (Gr. *Osmobodes*). — Kaukasus, Sibirien: Nertschinsk, Kjachta, Quellgebiet des Irkut; Nord-Mongolei, Changai-Gebirge

rutilipes Hochh. Bull. Soc. Ent. Moscou 1851, p. 75. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 344, 346 (Subg. *Eurychirus*); Abeille XI, 1873, p. 796; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 354 (pro *cribrosicollis* Schh.); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 8, 1875 (1876), p. 493; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 539; Best.-Tab. 9, 1883, p. 137. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 168. — Reitter, Best.-Tab. 67, p. 150.

crinitellus Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 108 ♂. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 113 ♂ ♀ (Gr. *Tecutinus*). — Kleinasien: Bughar-Macdin

curvimanus	Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 150 (Gr. *Osmobodes*).	Nord-Mongolei, Urga, Karakorum, Sibirien, Baikalsee
debilicornis	A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 180 (Gr. *Cryphiphorus*). — Apfelb. Mittheil. Königl. Wissensch. Institut Sofia V, 1932, p. 154.	Bulgarien: Vitosaplanina, Witoscha-Gebirge
densicollis	Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 148 (Gr. *Nubidanus*).	Araxes: Ilan-Dagh, Ach-Dagh
depressipennis	A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 182 ♂ *(Cryphiphorus)*.	Belgrad
diotus	Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 25; l. c. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 144 (Gr. *Nubidanus*).	Pontische-Alpen
duplopilosus	Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 141 (Gr. *Meriplodus*).	Zentralasien: Semiretschie, Wernyi
Dyris	Peyerimhoff, Bull. Soc. Ent. France 1925, p. 104.	Grand Atlas
edentatus	Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 631 ♂ ♀ (Subg. *Cryphiphorus*). — Gabriel, Zeitschr. Ent. (Breslau) 1899, p. 2. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 119 (Gr. *Cryphiphorus*). — A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 171, 194.	Tatra, Moldau, Transsylvanien, Siebenbürgen, Walachei (Predeal, Sinaia, Comana)
elatior	Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 295 ♂ ♀ (Subg. *Eurychirus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 346; Abeille XIII, 1873, p. 796; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 537; Best.-Tab. 9, 1883, p. 135. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 391. — Vitale, Natural. Sicil. XVII, 1904, p. 79. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 128 (Subg. *Arammichnus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 53.	Sizilien
	syracusanus Fiori, Natural. Sicil. XVIII, 1905, p. 201. — Porta, Riv. Col. Ital. IV, 1907, p. 47. — Reitter, Wien. Ent. Zeit., XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 125, Note (Gr. *Arammichnus*); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 246; Best.-Tab. 70, 1914, p. 118.	
Emiliae	Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni I, 1889, p. 68; Wiss. Mittheil. Bosnien II, 1894, p. 514; Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 24; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 105. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 116, Note (Gr. *Cryphiphorus*).	Bosnien, Herzegovina

eques Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 24; l. c. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 132 (Gr. *Hanibotus*). — Armenisches Gebirge: Ahdagh, Araxes: Krnakuc

var. *perequeus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 132.

Esau (Faust) Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 559; Best.-Tab. 9, 1883, p. 157 (Subg. *Tournieria*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 137 (Gr. *Mitomiris*). — Zentralasien: Issik-Kul, Thian-Schan, Karagai-Tau, Kultscha: Juldus, Margelon

setidorsis Reitter, Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 124 (Subg. *Arammichnus*).

var. *subpustulatus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 136. — Zentralasien: Fluß Tschu

Escherichi Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 353 (Subg. *Cryphiphorus*); Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 113 ♂ ♀ (Gr. *Tecutinus*). — Kleinasien: Bos-Dagh

falsarius Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 138 (Gr. *Stupamacus*). — Attika

Ferdinandi Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 245; Best.-Tab. 70, 1914, p. 117 (Subg. *Arammichnus*). — A. & F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. 1922, p. 82. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 54. — Sizilien

? *Bagnolii* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. X, 1898—1903, Nr. 8 (1901), p. 364 (*Ot.* s. s.). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab. 70, 1813, p. 119. — A. & F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. 1922, p. 82. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 54. — Neapel (Pozzuoli)

subsp. *linussae* A. & F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 83. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 55. — Insel Linosa

Ferrarii L. Miller, Wien. Ent. Monatschr. VII, 1863, p. 85; Abeille IV, 1867, p. XXVI. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 346, 359 (Subg. *Eurychirus*); Abeille XI, 1873, p. 795; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—1883, Nr. 8—9 (1883), p. 538; Best.-Tab. 9, 1883, p. 136. — Marseul, Abeille X, 1872, p .390. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 129 (Gr. *Arammichnus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 53. — Venetien: (Monfalcone, Grado), Venedig; Apulien, Kalabrien, Brindisi, Albanien (Durazzo)

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 40; l. c. XVIII, 1886, p. 284 (Futterpflanzen).

flavimanus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 294 ♂ (Subg. *Eurychirus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 346; Abeille XI, 1873, p. 795; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 547; Best.-Tab. 9, 1883, p. 145. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 390. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 130 ♂ ♀ (Gr. *Arammichnus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 53. — Piemont, Sardinien

Fleischeri Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1893—97, Nr. 7 (1896), p. 327 (Subg. *Arammichnus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 139 (Gr. *Stupamacus*). — Samarkand

Freyi Zumpt, Mittheil. Deutsch. Ent. Ges. 1933, Nr. 1, p. 3. — Molks (Taurus, Caucasicus)

furiosus Reitter, Coleopt. Rundsch. 1916, p. 61 (Gr. *Mitomiris*). — Osttürkei: Aksu

Galteri Apfelb. Sitzungsber. K. Akad. d. Wissenschaft. Wien 1918, p. 175 (Gr. *Cryphiphorus*). — Nordalban. Alpen

Ganglbaueri Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 2 (1888), p. 51. — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 277; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 783. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 119 (Gr. *Cryphiphorus*); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 173; Best.-Tab. 70, 1914, p. 45 (Gr. *Pirostovedus*). — Rumelien; Schar-Dagh (Albanien)

Gastonis Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) VII, 1867, p. 410. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 347, 352 (Subg. *Eurychirus*); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 546; Abeille XI, 1873, p. 792; Best.-Tab. 9, 1883, p. 144. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 397. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, (Best.-Tab. 67), p. 111 (Gr. *Edelengus*); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 243; Best.-Tab. 70, 1914, p. 115. — Algier, Oran

Martini Faust, Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 207 (Subg. *Arammichnus*) (non Fairm.). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 243; Best.-Tab. 70, 1914, p. 115.

? *pachydermus* Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 157. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 8—9, 1883, p. 544; Best.-Tab. 9, 1883, p. 144. — Constantine

gemellatus Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 339 ♂ ♀ (pro 418); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 8, 1875 (1876), p. 484 ♂ ♀; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 462; Best.-Tab. 9, 1883, p. 60; Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 79, 80 ♂ ♀; l. c. 227 (Gr. *Cryphiphorus*) (non Becker). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 118 (Gr. *Cryphiphorus*). — Apfelb. Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 24; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 105. — Griechenland

subnudus Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 80, 81 ♂ ♀; l. c. 1889, p. 225, 229 (Subg. *Cryphiphorus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, (Best.-Tab. 67), p. 116 (Gr. *Cryphiphorus*). — Apfelb. Glasnik zem. muz. — Griechenland: Veluchi

Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 24; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 105.

pseudogemellatus (♀) Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 118. — Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 105.

var. *Wankae* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 307, Nr. 9 ♂ ♀ (Subg. *Cryphiphorus*). — Apfelb. Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 26; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 105. — Griechenland: Parnass

granulatopunctatus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 549; Best.-Tab. 9, 1883, p. 147. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 139 (Gr. *Stupamacus*). — Türkei

gravidus Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 330, 345 (Subg. *Eurychirus*); Abeille XI, 1873, p. 795; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 536; Best.-Tab. 9, 1883, p. 134 (Subg. *Arammichnus*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 761, Nr. 18. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 125 (Gr. *Arammichnus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 52. — Griechenland, Cephalonia, Nizza?

griseolus A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 189 (Gr. *Cryphiphorus*). — Bulgarien: Varna

ab. (?) *dubiosus* A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 190 (♂). — Varna

gymnopterus K. Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 105 ♂ ♀. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 114 (Gr. *Tecutinus*). — Kleinasien: Phrygien (Sultan-Dagh, Ak-Schir)

hebraeus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 301, Note (Subg. *Eurychirus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 346, 347; Abeille XI, 1873, p. 796; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 353; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 8, 1875 (1876), p. 492; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 539; Best.-Tab. 9, 1883, p. 137. — Marseul, Abeille X, 1872. p. 398. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 146 (Gr. *Nubidanus*). — Syrien: Beirut, Damaskus

hellenicus Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 330 ♂; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 547; Best.-Tab. 9, 1883, p. 135. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 760. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 128 (Gr. *Arammichnus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 52, Note. — Jonische Inseln, Griechenland, Südliche Sporaden, ?Ägypten

hellerianus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 135 (Gr. *Mitomiris*); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 212, Note; Best.-Tab. 70, 1914, p. 54, Note. — ?Patria?

hispidus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87, Nr. 5 (1886), p. 227 (Subg. *Arammichnus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 151 (Gr. *Holomrasus*). — Nord-Mongolei: Quellgebiet des Irkut

histrio Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 568; l. c. VII, I, 1843, p. 281. — — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 431. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 122; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 271; Abeille XI, 1873, p. 779; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 454; Best.-Tab. 9, 1883, p. 52. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 208. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 115 (Gr. *Cryphiphorus*). — Süd-Rußland, Krim, Lenkoran, Kaukasus, Türkei, Kairo

histrioides Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 114, Note (Gr. *Cryphiphorus*). — Armenisches Gebirge

Hustachei Lona nom. nov. — Marokko: Tichouke, (Le cerf), Ifrane

granulipennis Hustache, Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc 1932, p. 40 *(Arammichnus)*.

imitator Apfelb. Glasnik Musej Bosni VI, 1894, p. 220; Wiss. Mittheil. Bosnien IV, 1896, p. 545; Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 25; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 108. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 119 (Gr. *Cryphiphorus*). — Bosnien: Volujak b. Cemerno; Herzegovina: Treskavica-planina, Vranica-planina, Montenegro: Durmitor

impexus Gyll. in Ménétriés, Cat. rais. Cauc. 1832, p. 220; in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 608; l. c. VII, I, 1843, p. 350. — Falderm. Fn. Ent. Transcauc. II in Nouv. Mém. Soc. Moscou V, 1837, p. 212; l. c. III in l. c. VI, 1838, p. 182. — Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou 1847, p. 522. — Kol. l. c. XXXI, 2, 1858, p. 444. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 297, Note (Subg. *Eurychirus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 347; Abeille XI, 1873, p. 796; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 547; Best.-Tab. 9, 1883, p. 145. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 395. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 144 (Gr. *Nubidanus*). — Kaukasus

juvenilis Gyll. in Ménétriés, Cat. rais. Zool. Cauc. 1832, p. 221; in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 610; l. c. VII, I, 1843, p. 352. — Falderm. Fn. Ent. Transcauc. II in Nouv. Mém. Soc. Moscou V, 1837, p. 213; l. c. III in l. c. VI, 1838, p. 182. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 445. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 310, Note (Subg. *Eurychirus*); Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862,

p. 377; l. c. XVI, 1872, p. 346; Abeille XI, 1873, p. 796; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 354; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 8, 1875 (1876), p. 493; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 542; Best.-Tab. 9, 1883, p. 140. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 402. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 144, Note (Gr. *Nubidanus*).

impressiceps Reitter, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 236; l. c. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 132 (Gr. *Hanibotus*). — West-Kaukasus, Zirkassien: Atschischho

indefinitus (Solari) Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 126 (Gr. *Arammichnus*). — A. & F. Solari, Wien. Ent. Zeit. 1932, p. 118. — Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. 1931, p. 174. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 52, 54. — Italien: Monte Gargano

ab. *squamulipennis* (Solari) Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 126. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 52, 54.

inhabilis Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 137 (Gr. *Mitomiris*). — Zentralasien: Werny

innocuus Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 350. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 445. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 298, Note (Subg. *Eurychirus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 130, Note (Gr. *Arammichnus*). — Sibirien

intrusicollis Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 262. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 107; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 270; Abeille XI, 1873, p. 777; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 443; Best.-Tab. 9, 1883, p. 41; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 6, 1890, p. 244 (Subg. *Cryphiphorus*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 190. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119; Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 43 (Gr. *Edelengus*). — Andalusien

irritabilis Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 154 ♂ ♀ *(Brachyrhinus)*. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 87 (Gr. *Postaremus*), p. 87, Note (Gr. *Cryphiphorus*); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 244; Best.-Tab. 70, 1914, p. 116 (Gr. *Cryphiphorus*). — S. W. Sibirien, Zentralasien: Krasnojarsk; Altai

italicus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 1 (1888), p. 11. — Daniel, Col.-Studien II, 1898, p. 53. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 128 (Gr. *Arammichnus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 53, 55. — Sizilien

jarpachlinus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 143 (Gr. *Nubidanus*). — Araxes: Jarpachli (Ordubad)

judaicus Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 350 (pro 334), 354 (Subg. *Eurychirus*); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 8, 1875 (1876), p. 490; l. c. VI, 1880-83, Nr. 8—9 (1883), p. 541; Best.-Tab. 9, 1883, p. 139. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 145 (Gr. *Nubidanus*). Syrien, Kaukasus, Kleinasien: Gurien, Taurus

amanus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXIII, 1904, p. 159 (Subg. *Arammichnus*).

juvencus Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 609; l. c. VII, I, 1843, p. 350. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 296; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 538; Best.-Tab. 9, 1883, p. 136. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 389. — Leoni, Natural. Sicil. XIX, 1906, p. 238. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1913 (Best.-Tab. 67), p. 129 (Gr. *Arammichnus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 32. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 53. Deutschland: Harz; Süd-Frankreich, Italien: Toskana, Lazio, Tremiten-Inseln, Korsika, Sardinien, Sizilien; Algerien

vellicatus Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 364. — Stierl. Rev. d. Europ. Ot. 1861, p. 297.

tomentosus Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 610; l. c. VII, I, 1843, p. 351 ♂ ♀. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 271, 278. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 749; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 225 (Subg. *Eurychirus*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 304. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 296 (Subg. *Eurychirus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 345; Abeille XI, 1873, p. 795; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 538; Best.-Tab. 9, 1883, p. 136. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 389. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 632 (Subg. *Arammichnus*). — Leoni, Natural. Sicil. XIX, 1906, p. 238.

convexicollis Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 297; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—82, Nr. 8—9 (1883), p. 538; Best.-Tab. 9, 1883, p. 136.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 46 *(tomentosus)*; l. c. XVIII, 1886, p. 287.

kairuanus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 124 (Gr. *Arammichnus*). Tunis

Kindermanni Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 177 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 276; Abeille XI, 1873, p. 784; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 474; Best.-Tab. 9, 1883, p. 72. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 264. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 243; Best.-Tab. 70, 1914, p. 115 (Gr. *Tecutinus*). Syrien

fallax Marseul, Abeille 1868, p. 195. — Stierl. Best.-Tab. 9, 1883, p. 72.

Krüperi Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87, Nr. 10 (1887), p. 393 (Subg. *Arammichnus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 67 ♂ ♀ (Gr. *Microphalantus*); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 246; Best.-Tab. 70, 1914, p. 118 (Gr. *Stupamacus*). — Apfelb. Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 21; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9/12, p. 109; Mittheil. königl. Naturwiss. Institut Sofia IV, 1932, p. 158, 159, 160. — Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 138. — Nord Griechenland: Veluchi-Gebirge

subsp. *hospitus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 140 ♂ ♀ (Gr. *Stupamacus*). — Apfelb. Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 26; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9/12, p. 109. — Bulgarien: Rhilo-Dagh, W-Rhodope, Demikapu, Mussalah

subsp. *regliae* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 67. — Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9/12, p. 109. — Mazedonien: Perister

subsp. *tomoricensis* Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 138. — Südalbanien: Tomor-Geb. (Abax-Ali)

subsp. *angulipes* Apfelb. Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 21; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9/12, p. 97. — Griechenland: Korax- u. Oxya Geb.

kyllinensis Apfelb. Glasnik d. Kroat. Natur. Ges. Zagr. XXXIV, 1922, p. 28. — Süd-Griechenland, Peloponnes

laconicus Kirsch, Ent. Monatsbl. II, 1880, p. 14. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 566; Best.-Tab. 9, 1883, p. 164. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 206, 246; Best.-Tab. 70, 1914, p. 78, 118 (Gr. *Meriplodus*, nicht *Panorosemus*). — Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 109. — Griechenland: Taygetos

laminirostris Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 66, 151 (Gr. *Arammichnasus*); Best.-Tab. 66, 1912, p. 22; Best.-Tab. 67, p. 151. — Kleinasien: Kilizischer Taurus

laniger Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVIII, 1887, p. 294 (?Subg. *Tournieria*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 135 (Gr. *Mitomiris*). — Zentralasien, Turkestan: Osch, Margelan, Namangan

latifrons Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 4 (1890), p. 164. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 113 (Gr. *Tecutinus*). — Kleinasien, Syrien

latinasus Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. p. 354 (Subg. *Arammichnus*); Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 123 (Gr. *Lacocnesus*). — Kleinasien: Konia, Eski-Chehir

ligustici L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 384; ed. 12, I, 2, 1776, p. 615; Fn. Suec. ed. 2, 1761, p. 181 *(Curculio)*. — Degeer, Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 218; Abh. Gesch. Ins. V, — Nord- u. Mitteleuropa: Frankreich,

1781, p. 350. — F. Syst. Ent. 1775, p. 155; Spec. Ins. I, 1781, p. 197; Mant. Ins. I, 1787, p. 122; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 484; Syst. El. II, 1801, p. 538. — Herbst in Borowsky, Nat. VI, 1784, p. 112; Natursyst. Käfer VI, 1795, p. 337, t. 86, f. 8. — Bonsdorf, Hist. Nat. Curc. Suec. II, 1785, p. 38, fig. 33. — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 202. — Ol. Encycl. méthod. V, 1790, p. 556; Entom. V, 1807, Nr. 83, p. 407, t. 7, f. 77. — Payk. Fn. Suec. III, 1792, p. 274. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 331. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 313. — Walck. Fn. Paris. I, 1802, p. 248. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 178; Gen. Crust. et Ins. II, 1807, p. 257 *(Brachyrhinus)*. — Oken, Lehrb. Nat. III, 1815—16, p. 769 *(Curculio)*. — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1817, p. 310 *(Curculio)*; in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 619; l. c. VII, I, 1843, p. 369 ♂ ♀ *(Otiorrhynchus)*. — Germ. Ins. Spec. novae I, 1821, p. 346 *(Otiorrhynchus)*. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 113; Man. Brit. Col. 1839, p. 241. — Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 221. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1836), p. 129. — Falderm. Fn. Ent. Transcauc. III in Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou VI, 1838, p. 183. — Küster, Käfer Eur. XI, 1847, p. 73. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 427; l. c. ed. 2, 1858, p. 748; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 214 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 271, 280. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXI, 2, 1858, p. 450. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 298; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 270; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 286; Abeille XI, 1873, p. 792; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 348; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 533; Best-Tab. 9, 1883, p. 131; Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 226 (Subg. *Cryphiphorus*); Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 229 ♂ ♀ (Subg. *Cryphiphorus*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 506. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 127; l. c. X, 1868, p. 173, 174. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 359. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 36 *(Brachyrhinus)*; (1886), p. 233 (Subg. *Cryphiphorus*). — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 175, 179, t. 157, f. 11; l. c. VI, 1913, p. 304. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 577 ♂ ♀; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 631 ♂ ♀ (Subg. *Cryphiphorus*). — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 540. — W. W. Fowler, Ent. Monthly Mag. XXXVIII, 1902, p. 269. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 567 (Subg. *Cryphiphorus*). — Bellevoye,

Deutschland, Donau- und Alpengebiet, Rumänien, Serbien

Compt. rend. Soc. Avanc. Sc. XXXVI, 1907 (1908), p. 247, 248, 639, 649 (Mißbildung). — Strelicov, Choziajstvo II, 1908, p. 1267 (Ekaterinoslaw). — Wassiljew, Zool. Anzeig. XXXIV, 1909, p. 29—31 (Parthenogenesis). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912. p. 922, fig. 107 b. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 122 (Gr. *Cryphiphorus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 31, t. 154, f. 3. — Apfelb. Glasnik Kroat. Naturwiss. Ges. Zagreb 1922, p. 27. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 141. — A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 169. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 32.

Müllerí Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1777.

collaris F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 486 *(Curculio)*; Syst. El. II, 1801, p. 540. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 517. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 333. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 181 *(Brachyrhinus)*. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 270 *(Otiorrhynchus)*. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 922. — A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 172.

rugosus Schrank, Fn. Boica I, 1798, p. 498 *(Curculio)*.

Brucki Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 236 *(Liophlocus)*. — A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 172.

xanthotrichus Apfelb. Glasnik Kroat. Natur. Ges. Zagr. XXXIV, 1922, p. 27 (Gr. *ligustici*). — A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 172.

?*levistici* Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 87 *(Curculio)*.

?*agnatus* Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 592 ♂ ♀; l. c. VII, 1, 1843, p. 369 ♂ ♀. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 270; Deutsche Ent. Zeitschr. XXXIII, 1889, p. 226; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 533; Best.-Tab. 9, 1883, p. 131. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 359. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 922. — A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 171, 177, 183.

var. *Lederi* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 9 (1876), p. 498 ♂ (Subg. *Euryommatus*); l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 563; Best.-Tab. 9, 1883, p. 161. — O. Schneider & Leder, Verh. Nat. Ver. Brünn XVII, 1878 (1879), p. 8 ♂ ♀. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913, (1914), p. 215; Best.-Tab. 70, 1913 (1914), p. 87 (Gr. *Proremus*). — A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 173. Kaukasus

? *Lederer i* Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 286, Note; Abeille XI, 1873, p. 316 a; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 347, 348 (pro 428); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 8, 1875 (1876), p. 489; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 533; Best.-Tab. 9, 1883, p. 131; Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 226 (Subg. *Cryphiphorus*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 759. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 121. — A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 173. Kaukasus, Kleinasien, Griechenland

ab. *muticus* A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 174.

var. *brachypterus* A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 173. Sarajevo, Zentral-Bosnien (Vischota-Nemila)

var. *incertus* A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 171 (♀). Velebit

Biologie: Kaltbrunner, Verh. zool.-bot. Ver. Wien III, 1853, Sitzber. p. 135—136 (Schädling des Weinstockes). — Künstler, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XVII, 1867, p. 948, 950; l. c. XXI, 1871, Beih. p. 86, 79. — Makowsky, Verh. Nat. Ver. Brünn IX, 1870, Sitzber. p. 49. — Letzner, Jahresber. Schles. Ges. LIII, 1875, p. 179—180; Ent. Nachr. III, 1877, p. 171. — Kaller, Ent. Nachr. III, 1877, p. 171. — Szalay, Gazdasagi Lapok 1878, p. 330—331. — Poulain, Bull. Soc. Reims 1878, p. 37. — Taschenberg, Zeitschr. ges. Nat. (3) III, 1878, p. 364. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 41; l. c. XVIII, 1886, p. 285. — Girard, Ann. Soc. Ent. France (6) V, 1885, Bull. p. XC. — Laboulbène, l. c. (6) VIII, 1888, Bull. p. CV. — Leprieur, l. c. (6) VIII, 1888, Bull. p. CIV. — Berthelin, l. c. (6) VIII, 1888, Bull. p. CXX. — Decaux, l. c. (6) X, 1890, Bull. p. XX. — Mégnin, Bull. Soc. Zool. France XX, 1895, p. 133—134. — Gauckler, Ill. Wochenschr. Ent. II, 1897, p. 524—525. — Holl, l. c. p. 549—550. — Remisch, Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. IV, 1908, p. 331—332. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkrankh. III, 1906—13 (1912), p. 543. — Strelicov, Choziajstvo II, 1908, p. 1267—1269. — Wassiliew, Zool. Anzeig. XXXIV, 1909, p. 29—31 (Parthénogénèse). — J. Wassiliew, Arbeit. Ent. Comm. Handwerschaf. VIII, 2, 1909, p. 1—37. — Csiki, Rovaert. Lapok XVI, 1909, p. 88—96 (Parthenogenese). — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 51. — De Salvo, Rivista della filossera e delle viti americane 1912, ser. 5 a, XVIII, p. 100—102. — Rambousek, Ochrl Rost. XI, 1931 (Prag), p. 153—158. — Gröh. Zuckerrübenbau XIV, 1932, No. 3,

p. 37; Ochr. Rost. XIII, 1933, No. 5—6 (Prag), p. 189. — Herrick, Journ. Econ. Ent. XXVI, 1933, Nr. 3 (Geneva), p. 731. — Hardouin, Bull. Soc. Sc. Seine et Oise (2) XIII, 1932, p. 84 (Parthenogenese). — Miestinger, Bäuerisch - niederöst. Landes-Landwirt. Kammer (Wien), 1932, Nr. 37.

ligusticiformis Formanek, Wien. Ent. Zeit. XLIII, 1926, p. 146. — Kaukasus: Tiflis

liophloeoides Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni I, 1889, p. 68; Wiss. Mittheil. Bosnien II, 1894, p. 516; Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 25; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9/12, p. 107. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 117. — Herzegovina: Bilek, Domanovic, Hutovo

lopadusae A. & F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 126. — Italien

lubricus Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 298. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 301, Note (Subg. *Eurychirus*); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1863), p. 551, Note; Best.-Tab. 9, 1883, p. 149, Note. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 407. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 124, Note (Gr. *Arammichnus*).

lumenifer Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 25 (Subg. *Arammichnus*); l. c. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 134 (Gr. *Mitomiris*). — Taschkent

luteus Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 361; l. c. XVII, 1873, p. 270; Abeille XI, 1873, p. 777; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 442; Best.-Tab. 9, 1883, p. 40; Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 228 (Gr. *Cryphiphorus*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 190. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914) (Best.-Tab. 67), p. 119 (Gr. *Cryphiphorus*). — Griechenland, Süd-Euboea

atticus Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 228, 230 (Subg. *Cryphiphorus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 119; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 244; Best.-Tab. 70, 1914, p. 116.

Mancinii A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 183 *(Cryphiphorus)*. — Italien: prope Cremona, prope Thien (Veneto)

Marquardtianus Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 57 (Subg. *Arammichnus*); Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, Best.-Tab. 67, p. 141 (Gr. *Meriplodus*) (err.: *Marquardti*); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 246; Best.-Tab. 70, 1914, p. 118. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 924, fig. 113 B (Subg. *Dorymerus*). — Zentralasien, Kaukasus: Alexander-Gebirge, Lepinsk, Wernyi

Marquardti Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 141 (err.) (Gr. *Meriplodus*); Verh. Nat. Ver. Brünn

LII, 1913 (1914), p. 246; Best.-Tab. 70, 1914, p. 118.

Marseuli Stierl. in Marseul, Abeille X, 1872, p. 400; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 339, 346 (Subg. *Eurychirus*); Abeille XI, 1873, p. 796; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 353; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—1876, Nr. 8, 1875 (1876), p. 492; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 547; Best.-Tab. 9, 1883, p. 145. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 146 (Gr. *Nubidanus*). — Sibirien

matutinus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 127 (Gr. *Arammichnus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 52. — Abruzzen

mendax Apfelb. Akad. Wien. Anz. 1918, Nr. 10, p. 127 (Gr. *Ganglbaueri*).

subsp. *tenuiscapus* Apfelb. Akad. Wien. Anz. 1918, Nr. 10, p. 127. — S. O. Montenegro (Vernosa)

subsp. *tenuirostris* Apfelb. Akad. Wien. Anz. 1918, Nr. 10, p. 127. — Albanien (Merdita)

messenius Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 332, 347 (Subg. *Eurychirus*); Abeille XI, 1873, p. 797; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 354; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 8, 1875 (1876), p. 493; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 542; Best.-Tab. 9, 1883, p. 140. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 763. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 143, Note (Gr. *Nubidanus*). — Griechenland

microps Hustache, Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc XII, 1932, p. 40. — Marokko: Casablanca

miramarae Schauf, Nunquam Otios. III, 1879 (1882), p. 538 (Subg. *Eurychirus*). — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 8—9, 1883, p. 546; Best.-Tab. 9, 1883, p. 144. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 147 (Gr. *Nubidanus*). — Balearen

modestus Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 343 (pr. 423); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 8, 1875 (1876), p. 486; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 475; Best.-Tab. 9, 1883, p. 73. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 115 (Gr. *Cryphiphorus*). — Apfelb. Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 23; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 102. — Griechenland, Peloponnes

molytoides Reitter, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 24 (Subg. *Cryphiphorus*); l. c. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 119 (Gr. *Cryphiphorus*). — Apfelb. Wissensch. Mittheil. Bosn. Herzeg. VIII, 1901, p. 469. — Peristeri (Epirus)

mongolicus (Faust) Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 150 (Gr. *Osmobodes*). — Nord-Mongolei, Schangaigeb., Quellgebiet des Irkut

Montandoni A. & F. Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXV, 1904, p. 164 ♂ ♀ (Subg. *Cryphiphorus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 244; Best.-Tab. 70, 1914, p. 116 (Gr. *Cryphiphorus*). — Rumänien: Comana Vlasca

moriger Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 245; Best.-Tab. 70, 1914, p. 117 (Gr. *Arammichnus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 52, Note. — Malta, Korfu

morosus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 129 (Subg. *Arammichnus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 144 (Gr. *Nubidanus*). — Turkestan: Tschingau, Kara-tagai, Kindir-tau, Alka-Kul

nitidiventris Fairm. Naturaliste II, 1884, p. 446. — Marokko: Casablanca

mauritanicus Hustache, Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc III, 1923, p. 64; 1932, p. 41.

nuncius Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 321 (Subg. *Cryphiphorus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 116 (Gr. *Cryphiphorus*) (*nuntius* err.). — Apfelbeck, Glasnik zem. muz. Bosn. Herzegov. XXXII, 1920, p. 23; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 103. — Griechenland: Veluchi

obcoecatus Schönherr in Ménétriés, Cat. rais. 1832, p. 220. — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 602; l. c. VII, I, 1843, p. 343. — Faldermann, Fn. Ent. Transcauc. II in Nouv. Mém. Soc. Moscou V, 1837, p. 210; l. c. III in l. c. VI, 1838, p. 182. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 440. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 170; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 276; Abeille XI, 1873, p. 783; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 471; Best.-Tab. 9, 1883, p. 69. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 257. — Reitter, Best.-Tab. 70, 1914, p. 116. — Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 108; Mittheil. aus Kön. Naturwiss. Institut Sofia V, 1932, p. 161. — Kaukasus, Bulgarien: Ryla Gebirge

simplicatus Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 243 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 283; Abeille XI, 1873, p. 790; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 501; Best.-Tab. 9, 1883, p. 99. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 334. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 43. — Apfelb. Mittheil. Königl. wissenschaftl. Institut Sofia V, 1932, p. 161.

cirrorrhynchoides Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 121 *(Cryphiphorus)*; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 244; Best.-Tab. 70, 1914, p. 116.

var. *hospes* Apfelb. Mittheil. Königl. Naturwiss. Institut Sofia V, 1932, p. 160. — Bulgarien: Pirin-Gebir.

var. *rhodopicola* Apfelb. Mittheil. Königl. Naturwiss. Institut Sofia V, 1932, p. 163. — Rhodope-Gebirge

obscurus Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 607; l. c. VII, I, 1843, p. 348. — Gebler, Bull. Soc. Nat. Moscou 1841, p. 605; l. c. 1848, p. 363. — Kol. l. c. XXXI, 2, 1858, p. 443. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 181; Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 374. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 149 (Gr. *Osmobodes*). Ost-Sibirien, Altai-Geb.

ocellifer Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 127 ♀ (Subg. *Arammichnus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 33. Sizilien

Oertzeni Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 544; Best.-Tab. 9, 1883, p. 142 (Subg. *Arammichnus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 141 (Gr. *Meriplodus*). Griechenland: Korax-Geb.

orbicularis Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 340, t. 86, f. 11 *(Curculio)*. — F. Syst. El. II, 1801, p. 523. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 164 *(Brachyrhinus)*. — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 600 ♂ ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 338 ♂ ♀ *(Otiorrhynchus)*. — Küster, Käfer Eur. XI, 1847, Nr. 69. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 424; l. c. ed. 2, 1858, p. 745; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 210 (Subg. *Otiorrhynchus*)? — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 271, 278. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 439. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 504. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 105 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 270; Abeille XI, 1873, p. 777; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—84, Nr. 8—9 (1889), p. 442; Best.-Tab. 9, 1883, p. 40; Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 229 (Subg. *Cryphiphorus*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 187. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 631 (Subg. *Cryphiphorus*). — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni X. 1898, p. 280; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 786; Mittheil. Königl. Naturwiss. Institut Sofia V, 1932, p. 154. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 922, fig. 107 c (Subg. *Cryphiphorus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 117 (Gr. *Cryphiphorus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 31, t. 154, f. 4. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 50. Mitteleuropa: Frankreich, Österreich, Trident.-Alpen, Bosnien, Serbien, Bulgarien

catenulatus Panz. Ent. Germ. 1795, p. 330 *(Curculio)*.

? *maurus* Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p .122. — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 214; l. c. IV, 1789, p. 280. Ungarn

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 43, l. XVIII, 1886, p. 286.

ovatulus Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, 1843, p. 351. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 300 (Subg. *Eurychirus*); Süd-Europa

Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 551, Note; Best.-Tab. 9, 1883, p. 149, Note. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 406. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 124, Note (Gr. *Arammichnus*).

ovinus Penecke, Col. Centralbl. 1928, p. 39 (Gr. *Escherichi*). — Thessalien

Parreyssi Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 187; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 277; Abeille XI, 1873, p. 784; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 499; Best.-Tab. 9, 1883, p. 97. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 270. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 244; Best.-Tab. 70, 1914, p. 116. — Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, p. 108. — Türkei, Bulgarien: Rhodope-Gebirge, Rhilo-Gebirge

ceps Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 23, p. 188 (s. descr.).

bulgaricus Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 274; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 781. — Reitter, Best.-Tab. 70, 1914, p. 116, Nr. 10.

rhilicola Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 120 (Gr. *Cryphiphorus*); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 244; Best.-Tab. 70, 1914, p. 116.

perlucens Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 134 (Gr. *Mitomiris*). — Zentralasien: Buchara

petrensis Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 338. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 105; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 270; Abeille XI, 1873, p. 777; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 442; Best.-Tab. 70, 1883, p. 40; Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 229 (Subg. *Cryphiphorus*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 188. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 227 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 280; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 786; Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 24—25; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 107. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 50. — Illyrien (Typus), Kroatien (Velebit), Dinarische Alpen (Livno, Dinara), W.-Bosnien (Vran-plan.), (Preslica-planina) Herzegovina

subsp. *gyraticollis* (♂) Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 106; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 270; Abeille XI, 1873, p. 777; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 442; Best.-Tab. 9, 1883, p. 40; Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 229 (Subg. *Cryphiphorus*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 189. — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 280; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 774; Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 24; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, p. 106. — Lesne, Bull. Soc. Ent. — Bosnien (Gebirgsform), Sarajevo, Rogatica, Romanja-planina, Kalinovik, Bradina, Prenj-plan., Nevesinje, Yeleč-plan., Baba-plan.

France 1906, p. 186. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 117.

nevesinjensis Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 117 (Gr. *Cryphiphorus*).

ab. *Henschi* Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni I, 1889, p. 69; Wiss. Mittheil. Bosnien II, 1894, p. 515; Glasnik zem. Muzeja Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 24; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, p. 107. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 118 (Gr. *Cryphiphorus*).

subsp. *Ludovici* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 117 (Gr. *Cryphiphorus*). — Apfelb. Glasnik zem. Muzeja Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 24; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 106. — Montenegrinische Gebirgsform: Krivoščya, Duga Pässe, Njegus, Lovcen, Cetinje

phrygius (Daniel) Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 139 (Gr. *Stupamacus*). — Anatolien: Ak-Chehir

Picl A. & F. Solari, Ann. Museo Genova XLII, 1905, p. 87. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 244; Best.-Tab. 70, 1914, p. 115. — Peyerimhoff, Ann. Soc. Ent. France 1931, p. 100. — Algerien

Bedeli Peyerimhoff, Bull. Soc. Ent. France 1927, p. 239.

picimanus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 168 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 342, 343, 340 (Subg. *Eurychirus*); Abeille XI, 1873, p. 796; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 548; Best.-Tab. 9, 1883, p. 146. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 393. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 115 (Gr. *Cryphiphorus*). — Apfelb. Glasnik zem. mus. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 23; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 104. — Griechenland, Parnass, Oet, Kione, Kephalonia Skyros

var. *cribratostriatus* Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 326 ♂; l. c. XVII, 1873, p. 277; Abeille XI, 1873, p. 784; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 475; Best.-Tab. 9, 1883, p. 73. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 755. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 244; Best.-Tab. 70, 1914, p. 116. — Griechenland

subsp. *koracensis* Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 376 ♂ ♀; l. c. 1889, p. 228 (Subg. *Cryphiphorus*). — Apfelb. Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 23; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 163. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 116 (Gr. *Cryphiphorus*). — Griechenland: Korax-Gebirge

subsp. *koronae* Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 228, 229 ♂ ♀ (Subg. *Cryphiphorus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 115 (Gr. *Cryphiphorus*). — Apfelb. Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 23; Neue Beiträge syst. Insektenk. IV, 1929, p. 102. — Griechenland: Veluchi, Peristeri

subsp. *oxyanus* (Apfelb. in litt.) Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 244; Best.-Tab. 70, 1914, p. 116. — Apfelb. Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 23; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 104. — Griechenland: Oxyá Gebirge

pindicus A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 192. — Griechenland: Veluchi-Geb.

Pipitzi Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87, Nr. 1 (1884), p. 39 (Subg. *Arammichnus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 112 (Gr. *Edelengus*). — Erzerum

plagiator Apfelb. Akad. Wien. Anz. 1918, Nr. 10, p. 127 (Gr. *Ganglbaueri*). — Mazedonien

planithorax Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 364. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 150 (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 342, 347 (Subg. *Eurychirus*); Abeille XI, 1873, p. 797; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 546; Best.-Tab. 9, 1883, p. 144. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 397. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 111 (Gr. *Edelengus*). — Algier, Tunis

carinulatus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. X, 1898—1903 (1901), p. 365 (Subg. *Arammichnus*).

subsp. *Annibali* Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 331, 347 (Subg. *Eurychirus*); Abeille XI, 1873, p. 797; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 546; Best.-Tab. 9, 1883, p. 144 (Subg. *Arammichnus*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 762. — Bedel, Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 200. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 111. — Oran (nicht Syrien)

Brisouti Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87, Nr. 1 (1884), p. 40 (Subg. *Arammichnus*).

polonicus A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 180 *(Cryphiphorus)*. — Galizien: Premysl

Popovi Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXII, 1888, p. 154. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 145 (Gr. *Nubidanus*). — Sibirien: Kiachta

poricollis Schönherr in Ménétriés, Cat. rais 1832, p. 220. — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 604; l. c. VII, I, 1843, p. 345. — Faldermann, Fn. Ent. Transcauc. II in Nouv. Mém. Soc. Moscou V, 1837, p. 211; l. c. III, l. c. VI, 1838, p. 182. — Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou 1847, p. 520. — Kol. l. c. — Trans-Kaukasus, Armenisches Gebirge, Erzerum

XXXI, 2, 1858, p. 441. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 181 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 343, 347 (Subg. *Eurychirus*); Abeille XI, 1873, p. 797; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 354; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 8, 1875 (1876), p. 493; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 548; Best.-Tab. 9, 1883, p. 146. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 398. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 147 (Gr. *Nubidanus*).

proximophthalmus Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 244; Best.-Tab. 70, 1914, p. 116 (Subg. *Arammichnus*). — Tunis

psalidiiformis Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 25 (Subg. *Arammichnus*); l. c. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 137 (Gr. *Mitomiris*). — Zentralasien, Taschkend

pulchellus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 299 ♂ ♀ (Subg. *Eurychirus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 346; Abeille XI, 1873, p. 796; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 537; Best.-Tab. 9, 1883, p. 135. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 392. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 127 (Gr. *Arammichnus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 53. — Sizilien

? *neapolitanus* Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 298; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 346 (Subg. *Eurychirus*); Abeille XI, 1873, p. 796; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 537; Best.-Tab. 9, 1883, p. 135. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 392. — Leoni, Natural. Sicil. XIX, 1906, p. 238. — Italien: Sizilien

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 42 *(neapolitanus)*; l. c. XVIII, 1886, p. 286.

punctirostris Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 548; Best.-Tab. 9, 1883, p. 146. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 148 (Gr. *Nubidanus*). — Trans-Kaukasus, Armenisches Gebirge, Kasikoperan, Achmangan-Gebirge, Araxestal: Ach-Dagh, Ilan-Dagh

pusio Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 612; l. c. VII, I, 1843, p. 352. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 446. — Reitter, Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 334; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 551, Note; Best.-Tab. 9, 1883, p. 149, Note. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 407. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1913 (Best.-Tab. 67), p. 124, Note. — Kaukasus

Rebmanni Zumpt, Mittheil. Deutsch. Ent. Ges. 1933, Nr. 1, p. 4. — West-Kaukasus, Suchoy-Fontan

refrigeratus (Faust) Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 541; Best.-Tab. 9, 1883, p. 139 (Subg. *Arammichnus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 136 (Gr. *Mitomiris*). — Zentralasien: Issik-Kul

Roubali Penecke, Col. Centralbl. 1931, p. 120 (Gr. *Chryphiphorus*). — Slovacchia: U. Tatra (Gemer, Silica)

ruminalis Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 53 (Gr. *Arammichnus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 142 (Gr. *Nubidanus*). — Transkaspien: Turkestan: Kopet-Dagh

russicus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 544; Best.-Tab. 9, 1883, p. 142 (Subg. *Arammichnus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 140 (Gr. *Stupamacus*). — Shar Tash, Kashgar, Kirgisensteppe, Zentralasien, Fergana, Alai-Tau, Karagai-Tau, Aulie-Ata, Pamir

var. *erroneus* Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 141 (*Brachyrhinus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 139. — Turkestan: Ak-ssai, Kavschan

Schatzmayri Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 138. — Südalbanien: Tomorgebirge (Ciafa Kulmaka)

Schmonli Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 9 (1876), p. 507, p. XII; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 547; Best.-Tab. 9, 1883, p. 145 (Subg. *Eurychirus*) (err. *Schmorli*). — Schneider & Leder, Verh. Nat. Ver. Brünn XVII, 1878 (1879), p. 7. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 143 (Gr. *Nubidanus*). — Transkaspien, Kaspisches Gebiet, Krasnowodsk

scintillus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 138 (Gr. *Stupamacus*). — Altai-Gebirge

scobinatus A. & F. Solari, Ann. Museo Genova XLII, 1905, p. 88. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 243; Best.-Tab. 70, 1914, p. 115. — Algerien, Tunis, Constantine

microscabris Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 112 (Gr. *Edelengus*); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 243; Best.-Tab. 70, 1914, p. 115.

semigranulatus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 331 ♂ ♀ (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 346; Abeille XI, 1873, p. 796; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 354; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. — Türkei

IV, 1880—83, Nr. 8, 1875 (1876), p. 493 (Subg. *Eurychirus*); l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 543 (Subg. *Arammichnus*); Best.-Tab. 9, 1883, p. 141. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 400. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 132 (Gr. *Hanibotus*); l. c. XXXIII, 1914, p. 43, Note.

semituberculatus Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 346 (Subg. *Eurychirus*); Abeille XI, 1873, p. 796; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 354; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1880—83, Nr. 8 (1875) (1876), p. 493; l. c. VI, 8—9, 1883, p. 533; Best.-Tab. 9, 1883, p. 141. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 763. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. 1914, p. 43. — Antiochien

setosulus Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 293 ♂ ♀ (Subg. *Eurychirus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 345; Abeille XI, 1873, p. 795; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 548; Best.-Tab. 9, 1883, p. 144. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 388. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 126 (Gr. *Arammichnus*). — Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. 1931, p. 135. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 52. — Mittel- u. Süd-Italien: Toskana, Abruzzen, Lazio, Capri, Sizilien

subsp. *Grandii* Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. 1931, p. 175. — Ravenna

siccensis Peyerimhoff, Bull. Soc. Ent. France 1930, p. 257 (bei *Kräperi*). — Tunisia

similis A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 176 (var. E. Stierlin ♂) *(Criphyphorus)*. — Ungarn

simplex (Faust) Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 2 (1880), p. 52; Horae Soc. Ent. Ross. XVI, 1882, p. 150 (Subg. *Eurychirus*); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 8—9, 1883, p. 537; Best.-Tab. 9, 1883, p. 135 (Subg. *Arammichnus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 130 (Gr. *Arammichnus*). — Altai

Strebloffi Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880, p. 53 (Subg. *Eurychirus*); Horae Soc. Ent. Ross. XVI, 2, 1882, p. 152; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 542; Best.-Tab. 9, 1883, p. 140. — Faust, Oefv. Finska Vet.-Soc. Förh. XXXII, 1890, p. 64 ♂ ♀. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 149 (Gr. *Osmobodes*). — West-Sibirien: Krasnojarsk

strumosus Heller, Wien. Ent. Zeit. III, 1884, p. 146 ♂; l. c. V, 1886, p. 253. — Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 228 (Subg. *Cryphiphorus*); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 6 (1890), p. 244; Best.-Tab. 1883, p. 91. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 116 (Gr. *Cryphiphorus*). — Bosnien, Montenegro: Volujak-Gebirge

subaequivestis A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 193 ♂ *(Cryphiphorus)*. — Nordalbanien: Merdita (Munela)

subcontractus A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 186 ♂ *(Cryphiphorus)*. — Keretschkoi prope Salonicco

subeques Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 132 (Gr. *Hanibotus*). — Armenisches Gebirge, Alagves

subopacus Petri, Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 340 (Gr. *Meriplodus*). — Syrien

subrotundatus Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 346 (pro 426); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 8, 1875 (1876), p. 488; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 533; Best.-Tab. 9, 1883, p. 131; Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 227 (Subg. *Cryphiphorus*); Fn. Col. Helvet II, 1886—98 (1891), p. 229. — Fauvel, Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 114. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 122. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 142. — A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 179, 186, 190, 191. — Apfelb. Mittheil. Königl. Naturwiss. Institut Sofia V, p. 154. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 51. — Ost-Kaukasus, Kurusch (Typus), Varna am Schwarzen Meer

var. *cinerascens* A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 188. — Kaukasus (?Trsi-Pass)

var. *tauricus* A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 188. — Krim

var. *brevicollis* A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 189. — Dobroudja (Macin)

subseriatus A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 178 *(Cryphiphorus)*. — Bosnien, Herzegovina, Trident.-Alpen, Seealpen, Schweiz

adriaticus Apfelb. i. litt.

sulcibasis Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 24; l. c. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 133 (Gr. *Hanibotus*). — Araxestal: Krnakuč (Ahdagh)

supremus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 138 (Gr. *Stupamacus*). — Altaigeb.

tardipes Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 134 (Gr. *Mitomiris*). — Zentralasien: Aulie-Ata, Ala-Tau

telueticus Escalera, Trab. Mus. Madrid 11, 1914, p. 406 *(Arammichnus)*. — Marokko

tenuimanus Faust, Oefv. Finska Vet.-Soc. Förh. XXXII, 1890, p. 64 ♂ ♀ (Subg. *Arammichnus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 149, Note (Gr. *Osmobodes*). — West-Sibirien

Titan Apfelb. Sitzber. Ak. Wien CXVI, I, 1907, p. 524 ♀; Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 25; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 108 (*Ganglbaueri*-Gruppe). — Reitter, Verh. Nat. Ver. — West-Albanien: Merdita (Munela Geb.)

Brünn LII, 1913 (1914), p. 173; Best.-Tab. 70, 1914, p. 45 (Gr. *Pirostovedus*).

Torrnezyi Peyerimhoff, Bull. Soc. Ent. France 1922, p. 63 *(Arammichnus)*. — Marokko

transparens Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 354 (Subg. *Eurychirus*) (non Fischer 1821); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—1876, Nr. 8, 1875 (1876), p. 492; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 540; Best.-Tab. 9, 1883, p. 138. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 147 (Gr. *Nubidanus*). — Orenburg, Uralsk

? *minutus* Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 350, 354 (pro 334) (Subg. *Eurychirus*); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 8, 1875 (1876), p. 493; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 540; Best.-Tab. 9, 1883, p. 138. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 147, Note (Gr. *Nubidanus*). — Orenburg

tristis Scop. Ent. Carn. 1763, p. 31 *(Curculio)*. — Ol. Encycl. méthod. V, 1790, p. 574. — Harold, Col. Hefte X, 1872, p. 220 *(Otiorrhynchus)*. — Sahlb. Meddel. Soc. Fl. et Fn. Fenn. XXXI, 1905, p. 55. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 925, fig. 115 c (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 121 (Gr. *Cryphiphorus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 31. — Apfelb. Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 25; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 108. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 51. — Nord- u. Mitteleuropa: Schweden, Alpen, Karpathen, Rußland, Uralgebirge; Turkestan, Wernyi, (nicht Bosn.-Herzeg.)

nigrita F. Gen. Ins. 1776, p. 229; Spec. Ins. I, 1781, p. 197; Mant. Ins. I, 1787, p. 485; Syst. El. II, 1801, p. 539 *(Curculio)*. — Petagna, Spec. Ins. Calabr. 1787, p. 13. — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 205; l. c. IV, 1789, p. 276. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1774. — Ol. Encycl. méthod. V, 1790, p. 556. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 516. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 332. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. II, 1804, p. 179 *(Brachyrhinus)*. — Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 346 *(Otiorrhynchus)*. — Gyll. in Schönherr, Gen. Curc. II, 2, 1834, p. 594 ♂ ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 334. — Gebler, Bull. Soc. Nat. Moscou 1848, p. 363. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 270, 275. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 749; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 222 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 439. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 503. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 229 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 280; Abeille XI, 1873, p. 788; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 513;

Best.-Tab. 9, 1883, p. 111. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 127; l. c. X, 1868, p. 173, 174. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 317. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 576; Fn. Transsylv. 1888—1891 (1891), Arten p. 628 (Subg. *Dorymerus*). — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 570 (Subg. *Dorymerus*).

cuprens Laich. Verz. Tyrol. Ins. I, 1781, p. 208 *(Curculio)*.

sulcatus Bonsd. Hist. Nat. Curc. Suec. II, 1785, p. 40, fig. 35. — Payk. Monogr. Curc. Suec. 1792, p. 81; Fn. Suec. III, 1800, p. 275 *(Curculio)*. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1836), p. 129.

lugubris Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1777 *(Curculio)*.

aeneopunctatus Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 314 *(Curculio)*. — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 332; Ins. Lapp. I, 1838 (1840), col. 186.

subsp. *cuprifer* Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 270; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 286; Abeille XI, 1873, p. 792; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 534; Best.-Tab. 9, 1883, p. 132; Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 227 (Subg. *Cryphiphorus*). — Friv. A Király magy. 1866, p. 214, t. 12, f. 4. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 360; l. c. XI, 1873, p. 792. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 631 (Subg. *Cryphiphorus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 243; Best.-Tab. 70, 1914, p. 115 (corr.). — Banat, Ungarn, Siebenbürgen

Biologie: Kiesenwetter, Allg. Deutsche Naturhist. Zeit. I, 1846, p. 567—569 (Weinstockschädling). — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 46; l. c. XVIII, 1886, p. 287. — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 51.

tritonis Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 126 (Gr. *Arammichnus*). — Korfú

Trophonius Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 125 (Gr. *Arammichnus*); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 245; Best.-Tab. 70, 1914, p. 117. — Sizilien, Malta

striatosetosus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 289 (non Boh.); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 536; Best.-Tab. 9, 1883, p. 134. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 125, Note.

sulcirostris Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 291 ♂ (Subg. *Eurychirus*) (non Boh.); Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 345; Abeille XI, 1873, p. 795; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 535; Best.-Tab. 9, 1883, p. 133. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 386 (p. p.).

— Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 125, Note.

tuniseus Pic, Echange XXV, 1909, p. 121. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 243; Best.-Tab. 70, 1914, p. 115. — Le Kef Tunisien

turbator A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 175 *(Cryphiphorus)*. — Nord-Steiermark

umbilicatoides Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 126 (Gr. *Arammichnus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 52. — Sizilien

umbilicatus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 291 ♂ ♀ (Subg. *Eurychirus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 345; Abeille XI, 1873, p. 795; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 536; Best.-Tab. 9, 1883, p. 134. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 385. — Leoni, Natural. Sicil. XIX, 1906, p. 238. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 124 (Gr. *Arammichnus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 51. — „

unctuosus Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 363. — Gebler in Ledebour, Reise Altai-Gebirge II, 1830, Nr. III, p. 171; Bull. Soc. Nat. Moscou 1848, p. 365. — Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 612; l. c. VII, I, 1843, p. 352. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 446. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 300 ♂ ♀ (Subg. *Eurychirus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 347; Abeille XI, 1873, p. 797; Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 354; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 8, 1875 (1876), p. 493; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 539; Best.-Tab. 9, 1883, p. 137. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 399. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 147 (Gr. *Nubidanus*). — Sibirien: Altaigebirge, Barnaul, Loktewsk

valdemosae Schauf. Nunquam otios. III, 1879 (1882), p. 537 ♂ ♀ (Subg. *Eurychirus*). — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 545; Best.-Tab. 9, 1883, p. 143 (Subg. *Arammichnus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 147 (Gr. *Nubidanus*). — Balearen

Vaucheri Peyerimhoff, Bull. Soc. Ent. France 1924, p. 240, fig. — N.-Afrika

Vaulogeri Pic, Bull. Soc. Ent. France 1900, p. 316 (Subg. *Arammichnus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 110, Note (Gr. *Edelengus*); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 243; Best.-Tab. 70, 1914, p. 115. — Nord-Afrika: Tunis (Sbeitla et Fériana), Südwest Algier: Negrim

velutinus Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 361. — Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 587 ♀; Boh. l. c. VII, I, 1843, p. 318. — ? Gebler, Bull. Soc. Nat. Moscou 1848, p. 366. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 423; — Mittel-Süd-Europa, Rußland, Kaukasus, Zentral-

l. c. ed. 2, 1858, p. 744; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 214 (Subg. *Tournieria*). — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 270, 274. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXII, 2, 1858, p. 434. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 502. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 308 (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 290; Abeille XI, 1873, p. 798; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 556; Best.-Tab. 9, 1883, p. 154. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 415. — Retowski, Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 134. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 632 (Subg. *Tournieria*). — Breit, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 257. — Hubenthal, Ent. Blätter V, 1909, p. 1—4, 21—24; Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 147—149. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 130 (Gr. *Arammichnus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 32, t. 15, f. 5. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 147. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 53. asien, Sibirien

humilis Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 362. — Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 633; l. c. VII, I, 1843, p. 319. — Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou 1847, p. 509. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 270, 275. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 749; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 224 (Subg. *Eurychirus*). — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 435. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 503. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 296 (Subg. *Eurychirus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 345; Abeille XI, 1872, p. 795; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 537; Best.-Tab. 9, 1883, p. 135. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 388. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—1891 (1891), Arten p. 632 (Subg. *Arammichnus*). — Hubenthal, Ent. Blätter V, 1909, p. 1—4, 21—24; Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 147—149.

Godeti Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 589; l. c. VII, I, 1843, p. 319.

globithorax Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 318. — Gebler, Bull. Soc. Nat. Moscou 1848, p. 361. — Kol. l. c. XXXI, 2, 1858, p. 434. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 308, Note (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 376; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 556; Best.-Tab. 9, 1883, p. 154. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 408. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 130, Note.

exilis Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 352. — Kol. Bull. Soc. Nat.

Moscou XXXI, 2, 1858, p. 447. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 309 (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 290; Abeille XI, 1873, p. 798; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 557; Best.-Tab. 9, 1883, p. 155. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 415. — Retowski, Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 134. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 246; Best.-Tab. 70, 1914, p. 118.

chesgicus Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 435, fig. 42.

cerdanensis Jacquet, Echange IV, 1888, p. 4. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 43.

proreus Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 39 (Subg. *Tournieria*); Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 26 (Subg. *Arammichnus*).

vexator Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 57 ♂ ♀ (Subg. *Arammichnus*).

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 41 *(humilis)*; l. c. XVIII, 1886, p. 285. — Tyl, Ent. Blätter VII, 1911, p. 126 (Vorkommen).

vicarius A. & F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1931, p. 185 ♂ *(Cryphiphorus)*. — Albanien (prope Vallona)

villosus Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 329, 346 (Subg. *Eurychirus*); Abeille XI, 1873, p. 795; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 537; Best.-Tab. 9, 1883, p. 135. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 760. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 128 (Gr. *Arammichnus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 53. — Istrien: Lussino-Insel; Dalmatien: Lesina, Spalato; Griechenland

vulturensis Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. 1931, p. 174 (prope *setosulus*). — Apulien (Mte Vulture)

Zebei Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 122 (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 271; Abeille XI, 1873, p. 779; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 455; Best.-Tab. 9, 1883, p. 53. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 208. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 244; Best.-Tab. 70, 1914, p. 116 (Gr. *Cryphiphorus*). — Serbien, Bulgarien: Sliven

argentifer Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1884—87, Nr. 7 (1891), p. 269. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 43.

Zumpti Lona, Deutsche Ent. Zeitschr. 1933, p. 156. — Südl. Pamir (Dijeken Aral)

Subgen. **Limatogaster** Apfelb.

Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 279; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 785; Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII,

1920, p. 15; Neue Beitr. syst. Insektenk. V, 1928, Nr. 5—8, p. 71, 72. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 213—215 (Revision); l. c. XXXI, 1912, p. 54; Best.-Tab. 66, 1912, p. 11 (*O. rugicollis* Germ.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 131, p. 190; Best.-Tab. 70, 1914, p. 3, p. 62.

lasioscelis Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 215 ♂ ♀ (Subg. *Limatogaster*); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 193; Best.-Tab. 70, 1914, p. 65 (Gr. *Limatogaster*). — Apfelb. Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 22; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 99. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 41. — Istrien: Lussinpiccolo; Bosnien; Dalmatinische Inseln: Meleda, Lesina

nyctelius Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 215; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 192; Best.-Tab. 70, 1914, p. 64 (Gr. *Limatogaster*). — Südkrain, Julische Voralpen, Bosnien, Herzegovina

subsp. *podgoricensis* Lona nom. nov. *Esau* Apfelb. Sitzungsber. Akad. Wissensch. Wien 1918, p. 174 (*non* Stierl.). — Montenegro: Podogorica

pachyscelis Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 268 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 286; Abeille XI, 1873, p. 792; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—1883, Nr. 8—9 (1883), p. 528; Best.-Tab. 9, 1883, p. 126. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 357. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 223 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—1891 (1891), Arten p. 630 (Subg. *Dorymerus*). — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 279; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 785. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 214 ♂ ♀ (Subg. *Limatogaster*); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 192; Best.-Tab. 70, 1914, p. 64 (Gr. *Limatogaster*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 41. — Krain, Kroatien, Banat, Bosnien, Herzegovina, Dalmatien, Montenegro, Griechenland

rugicollis Germ. Reise Dalmatien 1817, p. 241 (*Curculio*). — Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 626 ♂ ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 382 ♂ ♀ (*Otiorrhynchus*). — Küster, Käfer Eur. XI, 1847, Nr. 78. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 267 ♂ ♀; l. c. XVII, 1873, p. 286; Abeille XI, 1873, p. 792; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 528; Best.-Tab. 9, 1883, p. 126. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 356. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 213 (Subg. *Limatogaster*); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 191; Best.-Tab. 70, 1914, p. 63 (Gr. *Limatogaster*). — Apfelb. Glasnik zem. Muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 22; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 99. — S. W. Herzegovina, West-Montenegro, N.-W.-Albanien

ab. *Paganettii* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. X, 1898—1903, Nr. 5 (1899), p.

198. — Apfelb. Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p 22; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 99.

subsulcatus Apfelb. Akad. Wiss. Anz. Nr. 10, 1918, p. 128 (Gr. *pachyscelis*). — West-Albanien (Merdita)

tumidipes Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 269 ♂ ♀ (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 286; Abeille XI, 1873, p. 792; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 529 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 127. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 358. — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 279 ♂ ♀; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 785; Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 22; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 100. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 192; Best.-Tab. 70, 1914, p. 65 (Gr. *Limatogaster*). — Krain, Kroatien, Bosnien, Herzegovina, Dalmatien bis Montenegro, nicht in Griechenland

donabilis Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 214; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 191; Best.-Tab. 70, 1914, p. 63. — Apfelb. Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. 1920, XXXII, p. 22; Neue Beitr. zur syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 98.

subsp. *Hopffgarteni* Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 2 (1880), p. 54 ♂ ♀, 61; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 529; Best.-Tab. 9, 1883, p. 127. — Apfelb. Wissensch. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 774; Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 22; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 99. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXII, 1902, p. 215 ♂ ♀ (Subg. *Limatogaster*); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 192; Best.-Tab. 70, 1914, p. 65 (Gr. *Limatogaster*). — Süd-Bosnien, Dalmatien: Castelnuovo

Darius Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXII, 1903, p. 214 ♀ (Subg. *Limatogaster*); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 191; Best.-Tab. 70, 1914, p. 63 (Gr. *Limatogaster*). — Apfelb. Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 22; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 98.

subsp. *antennarius* Apfelb. Akad. Wien. Anz. Nr. 10, Sitz.-Ber. 1918, p. 174. — S.-Bosnien, Herzegovina, Nordalbanische Alpen: Prokletija

Subgen. **Tournieria** Stierl.

Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 14, 15, 17, 27; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 347; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 8—9, 1883, p. 415, 551; Best.-Tab. 9, 1883, p. 7, 149; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 209, 230; in Calwer, Naturgesch. Käf. Eur. 1893, p. 427. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 109, 409. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 33. —

Kuhnt, Ill. Best.-Tabelle Käfer Deutschlands 1912, p. 921. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 569; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 615. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 47, 60; Best.-Tab. 66, 1912, p. 3, 16; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 194; Best.-Tab. 70, 1914, p. 66; Fauna Germ. V, 1916, p. 16, 28. — Apfelb. Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. X, 1898, p. 281; l. c. XXXII, 1920, p. 15; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1928, p. 72; l. c. 1929, p. 100. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 8. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 15.

Artengruppen.

Eprahenus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 61; Best.-Tab. 66, 1912, p. 17 (*O. Beckeri* Stierl.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 211; Best.-Tab. 70, 1914, p. 83.

Melasemnus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 62; Best.-Tab. 66, 1912, p. 18 (*O. ovalipennis* Boh.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 229; Best.-Tab. 70, 1914, p. 101.

Namertanus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 61; Best.-Tab. 66, 1912, p. 17 (*O. pseudomias* Hochh.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 217; Best.-Tab. 70, 1914, p. 89.

Odopadus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 62; Best.-Tab. 66, 1912, p. 18 (*O. anatolicus* Boh.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 226; Best.-Tab. 70, 1914, p. 98.

Panorosemus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 60; Best.-Tab. 66, 1912, p. 16 (*O. gibbicollis* Boh.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 205; Best.-Tab. 70, 1914, p. 77.

Pendagron Des Gozis, Rev. d'Ent. IV, 1885, p. 126. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1886), p. 231. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 62; Best.-Tab. 66, 1912, p. 18 (*O. ovatus*); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 236; Best.-Tab. 70, 1914, p. 108.

Pinduchus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 60; Best.-Tab. 66, 1912, p. 16; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 204; Best.-Tab. 70, 1914, p. 76.

Pliadonus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 62; Best.-Tab. 66, 1912, p. 18 (*O. brachialis* Stierl.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 222; Best.-Tab. 70, 1914, p. 94.

Pocodalemus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 60; Best.-Tab. 66, 1912, p. 16 (*O. Frivaldszkyi* Rosenh.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 206; Best.-Tab. 70, 1914, p. 78.

Podomincus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 61; Best.-Tab. 66, 1912, p. 17 (*O. juglandiformis* Reitter). Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 214; Best.-Tab. 70, 1914, p. 86.

Podonebistus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 60; Best.-Tab. 66, 1912, p. 16 (*O. prolongatus* Stierl.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 66.

Podoropelmus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 61; Best.-Tab. 66, 1912, p. 17 (*O. fullo* Schrk.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 208; Best.-Tab. 70, 1914, p. 80.

Prodeminus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 62; Best.-Tab. 66, 1912, p. 18 (*O. maxillosus* Gyll.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 219; Best.-Tab. 70, 1914, p. 91.

Proremus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 61; Best.-Tab. 66, 1912, p. 17 (*O. coarctatus* Stierl.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 214; Best.-Tab. 70, 1914, p. 86.

Rimenostolus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 60; Best.-Tab. 66, 1912, p. 16 (*O. globicollis* Hochh.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 200; Best.-Tab. 70, 1914, p. 72.

Tournieria Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 226; Best.-Tab. 70, 1914, p. 98.

Viroprius Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 62; Best.-Tab. 66, 1912, p. 18 (*O. ottomanus* Stierl.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 220; Best.-Tab. 70, 1914, p. 92.

Zariedus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 60; Best.-Tab. 66, 1912, p. 16; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 198; Best.-Tab. 70, 1914, p. 70.

Zavodesus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 61; Best.-Tab. 66, 1912, p. 17 (*O. glabellus* Rosenh.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 218; Best.-Tab. 70, 1914, p. 90.

Zelotomelus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 61; Best.-Tab. 66, 1912, p. 17 (*O. erinaceus* Stierl.); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 210; Best.-Tab. 70, 1914, p. 82.

abagoensis Reitter, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 235 (Subg. *Arammichnus*); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 212; Best.-Tab. 70, 1914, p. 84 (Gr. *Eprahenus*). — Kaukasus, Zirkassien: Abago

albidus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 315 (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 290; Abeille XI, 1873, p. 798; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 561; Best.-Tab. 9, 1883, p. 159. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 423. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 208; Best.-Tab. 70, 1914, p. 80 (Gr. *Podoropelmus*). — Apfelb. Glasnik. zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 22; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 101. — Südserbien, Bulgarien, Mazedonien, Türkei

illustris Apfelb. Glasnik Musej Bosni X, 1898, p. 281; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 786 (Subg. *Tournieria*).

var. *elegans* Stierl. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 75; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1893—97, Nr. 6 (1895), p. 301. — Patria?

albohirtus Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVIII, 1887, p. 177 (Subg. *Tournieria*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 213; Best.-Tab. 70, 1914, p. 85 (Gr. *Eprahenus*). — Turkestan: Kyndyr-Tau

anatolicus Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 287 (*O. anadolicus*). — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 318 ♂ ♀ (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. — Zephalonien, Korfu, Griechenland,

XVI, 1872, p. 347; Abeille XI, 1873, p. 799; l. c. XVII, 1873, p. 291; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 570; Best.-Tab. 9, 1883, p. 168. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 425 ♂ ♀. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 227; Best.-Tab. 70, 1914, p. 99. — Türkei, Kleinasien

apschuanus (Stierl.) Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 232; Best.-Tab. 70, 1914, p. 104 (Subg. *Tournieria*). — West-Kaukasus, Abschasien, Mte. Gagry

arachniformis Reitter, Bull. Soc. Ent. Egypte I, 1908, p. 52, 53 (Subg. *Tournieria*). — Ägypten, Kairo

asiaticus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 324 (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 348; l. c. XVII, 1873, p. 291; Abeille XI, 1873, p. 799; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 576; Best.-Tab. 9, 1883, p. 174; Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 373. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 430. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 221; Best.-Tab. 70, 1914, p. 93 (Gr. *Viroprius*). — Griechenland, Zykladen: Nikaria, Karpathos, Armathia; Kleinasien: Syra

atticus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87, Nr. 10 (1887), p. 391. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 197; Best.-Tab. 70, 1914, p. 69 (Gr. *Podonebistus*). — Griechenland: Attika

rhincoloides (♀) Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87, Nr. 10 (1887), p. 392.

auripes Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 351 (pro 335) (Subg. *Tournieria*); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 8, 1875 (1876), p. 491; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 574; Best.-Tab. 9, 1883, p. 172. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 205; Best.-Tab. 70, 1914, p. 77 (Gr. *Panorosemus*). — West-Persien

bidentatus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—80, Nr. 8 (1879), p. 429; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 480; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 8—9, 1883, p. 564; Best.-Tab. 9, 1883, p. 162. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 234; Best.-Tab. 70, 1914, p. 104 (Gr. *Melasemnus*). — West- u. Zentral-Kaukasus

Bleusei Faust, Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 173. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 196; Best.-Tab. 70, 1914, p. 68 (*Eleusei* err.) (Gr. *Podonebistus*). — Rhodus

Bodemeyeri K. & J. Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 111 ♀ (Subg. *Tournieria*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 219; Best.-Tab. 70, 1914, p. 91 (Gr. *Zavodesus*). — Kleinasien: Bulghar-Maaden

brachialis Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 293 ♀. — Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou 1847, p. 509. — Kol. l. c. XXXI, 2, 1858, p. 433. — Stierl. Revis. Eur. Otior- — West-Kaukasus

Zeitschr. VI, 1862, p. 376; l. c. XVI, 1872, rhynchus 1861, p. 189, Note; Berl. Ent. p. 344, 348; l. c. XVII, 1873, p. 291; Abeille XI, 1873, p. 799 (Subg. *Tournieria*); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 569; Best.-Tab. 9, 1883, p. 167. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 427. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 225 (Gr. *Pliadonus*); Best.-Tab. 70, 1914, p. 97.

longipes (♀) Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 335, 348 (Subg. *Tournieria*); l. c. XVII, 1873, p. 291; Abeille XI, 1873, p. 799; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 570; Best.-Tab. 9, 1883, p. 168. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 764. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 225.

callicnemis Apfelb. Ak. Wien. Anz. Nr. 10, 1918, p. 128 (Gr. *ovalipennis*). — Albanien: Merdita

carceliformis Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1893—97, Nr. 7 (1896), p. 326. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 210; Best.-Tab. 70, 1914, p. 82 (Gr. *Podoropelmus*). — West-Kaukasus, Abchasien

chalciditanus (Daniel) Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 198; Best.-Tab. 70, 1914, p. 70 (Subg. *Podonebistus*). — Mazedonien: Athos

cinereus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—80, Nr. 8 (1879), p. 430; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 481; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 8—9, 1883, p. 568; Best.-Tab. 9, 1883, p. 166. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 236; Best.-Tab. 70, 1914, p. 108 (Gr. *Tournieria*).

circassicus Reitter, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 233 (Subg. *Tournieria*); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 211; Best.-Tab. 70, 1914, p. 82 (Gr. *Podoropelmus*). — West-Kaukasus, Zirkassien

coarctatus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 313 (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 290; Abeille XI, 1873, p. 798; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 560; Best.-Tab. 9, 18883, p. 158. — Friv. Király magyar 1865, p. 215, t. 12, f. 5. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 421. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 633 (Subg. *Tournieria*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 215; Best.-Tab. 70, 1914, p. 87 (Gr. *Proremus*). — Siebenbürgen, Serbien, Bulgarien (Kuri-Baglar)

Conradti Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVIII, 1887, p. 295 (? Subg. *Tournieria*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 212; Best.-Tab. 70, 1914, p. 84 (Gr. *Eprahenus*). — Turkestan: Kashgar

cornicinus Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 323 (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 348; l. c. XVII, — Türkei, Griechenland,

1873, p. 291; Abeille XI, 1873, p. 799; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 567; Best.-Tab. 9, 1883, p. 165. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 431. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 227; Best.-Tab. 70, 1914, p. 99. — Jonische Inseln, Dalmatien?

bisphaericus Stierl. (nec Reiche) Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 322 ♂ ♀ (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 348; l. c. XVII, 1873, p. 291; Abeille XI, 1873, p. 799; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 6—8 (1883), p. 565; Best.-Tab. 9, 1883, p. 163 (non Reiche). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 432 ♂ ♀. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 227, Note; Best.-Tab. 70, 1914, p. 99, Note.

Brenskei Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 95 ♂ ♀.

corneolus Weise in Reitter, Cat. Col. Eur. ed. 2, 1906, col. 607. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 49.

crassicollis Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 311 (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 290; Abeille XI, 1873, p. 798; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 561; Best.-Tab. 9, 1883, p. 159. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 418. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 229; Best.-Tab. 70, 1914, p. 101 (Gr. *Melasemnus*). — Kleinasien, Insel Zypern

crataegi Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 366. — Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 635; Boh. l. c. VII, I, 1843, p. 381. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 201; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 278; Abeille XI, 1873, p. 785; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 525; Best.-Tab. 9, 1883, p. 123. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 287. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 220 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 207; Best.-Tab. 70, 1914, p. 79 (Gr. *Pocodalemus*). — A. & F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. 1922, p. 84. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 48. — Nord- u. Mitt.-Italien, Kroatien, Bosnien: Sarajevo; Dalmatien, Bulgarien: Keleder

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 39; l. c. XVIII, 1886, p. 284 (Futterpflanzen). — Heikertinger, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LXXIII, 1923—1924, p. 126, f. 3 (Erstes Larvenstudium); Kol. Rundschau XII, 1926, p. 25—27. — Wahl, Bundesanstalt für Pflanzenschutz Wien 1931 (Schädling an Cyclamen).

cukalensis Apfelb. Ak. Wien. Anz. Nr. 10, 1918, p. 129 (*maxillosus*-Gruppe). — Nord-Albanien: Cukali-Gebirge

davricus Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. 1931, p. 173. — Davras-Gebirge (Klein-Asien)

decoratus Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 179 ♂ ♀; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 569; Best.-Tab. 9, 1883, p. 167. — Schneider & Leder, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 222; Best.-Tab. 70, 1914, p. 94 (Gr. *Pliadonus*). — Kaukasus

deformis Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—80, Nr. 10 (1880), p. 565; l. c. VI, 8—9, 1883, p. 525; Best.-Tab. 9, 1883, p. 123. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 207, Note; Best.-Tab. 70, 1914, p. 79, Note. — Apfelb. Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 22; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 100. — A. & F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. 1922, p. 85. — Türkei: Konstantinopel, Kleinasien: Alem Dagh

crataegi (♀) var. B Stierl. Revis. Eur. Otiorrh. 1861, p. 202.

gazella Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 214; Best.-Tab. 70, 1914, p. 86 (Gr. *Proremus*).

dentitibia Reitter, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 234; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 225: Best.-Tab. 70, 1914, p. 97. — West-Kaukasus, Zirkassien (Abago), Erivan-Gebirge

fortispinus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 304.

desertus Rosenh. Beitr. Ins. Eur. I, 1847, p. 52. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 286; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 288; Abeille XI, 1873, p. 794; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 577; Best.-Tab. 9, 1883, p. 175; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 331. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 379; l. c. XI, 1873, p. 794. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 224 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 200. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 237; Best.-Tab. 70, 1914, p .109 (Gr. *Pendragon*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 136. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 49. — Britannien, Alpen (Typus: Tyrol) Pyrenäen

muscorum H. Bris. in Grenier, Cat. Col. France 1863, p. 109. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 358; l. c. XVII, 1873, p. 289; Abeille XI, 1873, p. 794; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 577; Best.-Tab. 9, 1883, p. 175. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 378. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 175, 181; l. c. VI, 1913, p. 305. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 237; Best.-Tab. 70, 1914, p. 199. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p 137.

abietinus Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 282 (Subg. *Tournieria*); Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 788. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 237; Best.-Tab. 70, 1914, p. 109.

var. *globithorax* Fiori apud Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 49. — Emilia: Monte Cimone

dispar Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—1880, Nr. 8 (1879), p. 428 ♂ ♀; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 481; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 576 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 174. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 226; Best.-Tab. 70, 1914, p. 98 (Gr. *Pliadonus*). — Kaukasus

elongatus Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 1847, p. 526. — Kol. l. c. XXXI, 2, 1858, p. 457. — Schaufuss, Col. Hefte II, 1867, p. 21. — Stierl. Abeille XI, 1873, p. 799. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 211; Best.-Tab. 70, 1914, p. 83 (Gr. *Eprahenus*). — Russisch-Armenisches Gebirge: Eriwan Alagoes

alagoesus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p .26 (Subg. *Tournieria*); l. c. XXVIII, 1909, p. 306.

Emgei Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—1887, Nr. 10 (1887), p. 392. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 229; Best.-Tab. 70, 1914, p. 101 (Gr. *Tournieria*). — Griechenland: Stura u. Süd-Euboea

erinaceus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 9 (1876), p. 506 (Subg. *Tournieria*); l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 564; Best.-Tab. 9, 1883, p. 162. — Schneider & Leder, Verh. Nat. Ver. Brünn XVII, 1878 (1879), p. 14, t. 5, f. 48. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 211; Best.-Tab. 70, 1914, p. 83 (Gr. *Zelotomelus*). — Zentral-, West-Kaukasus

erivanensis Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 245; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 215; Best.-Tab. 70, 1914, p. 87 (Gr. *Proremus*). — Russisch-Armenisches Gebirge: Alagoes

europaeus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 571; Best.-Tab. 9, 1883, p. 169. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 226; Best.-Tab. 70, 1914, p. 98 (Gr. *Tournieria*). — Türkei

euxinus Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 281; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 787 (Subg. *Tournieria*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119. — Ost-Rumelien: Burgas, Istocna

Faldermanni Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 2, 1847, p. 515. — Kol. l. c. XXXI, 2, 1858, p. 454. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 344, 347; l. c. XVII, 1873, p. 291; Abeille XI, 1873, p. 799; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), — Kaukasus

p. 575; Best.-Tab. 9, 1883, p. 173. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 438. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 201; Best.-Tab. 70, 1914, p. 73 (Gr. *Rimenostolus*).

tristriatus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—80, Nr. 8 (1879), p. 427; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 480.

flavopilosus Apfelb. Glasnik Kroat. Natur. Gesellschaft Zagreb XXXIV, 1922, p. 17. — Serbien

formicarius Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 314 ♂ ♀ (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 290; Abeille XI, 1873, p. 798; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 561; Best.-Tab. 9, 1883, p. 159. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 422. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 222; Best.-Tab. 70, 1914, p. 94 (Gr. *Viroprius*). — Griechenland

c *lucae* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 3 (1881), p. 134; l. c. VI, 8—9, 1883, p. 567; Best.-Tab. 9, 1883, p. 165.

frater Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 321 (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 348; l. c. XVII, 1873, p. 291; Abeille XI, 1873, p. 799; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 566; Best.-Tab. 9, 1883, p. 164. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 428. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 222; Best.-Tab. 70, 1914, p. 94 (Gr. *Pliadonus*). — Griechenland, Kreta, Kleinasien, Türkei

ab. *creticus* Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 275; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 287; Abeille XI, 1873, p. 793; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 167. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 365. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 222; Best.-Tab. 70, 1914, p. 94.

Frivaldszkyi Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 263. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 327 (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 348; l. c. XVII, 1873, p. 291; Abeille XI, 1873, p. 799; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 567; Best.-Tab. 9, 1883, p. 165; Marseul, Abeille X, 1872, p. 434. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 207; Best.-Tab. 70, 1914, p. 79 (Gr. *Pocodalemus*). — Türkei

fulliformis Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 209 ♂ ♀; Best.-Tab. 70, 1914, p. 81 (Subg. *Podoropelmus*). — Kaukasus: Mlok

fullo Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 116; Fn. Boica I, 1798, p. 492 *(Curculio)*. — Herbst, Arch. Ins.-Gesch. IV—V, 1784—85, p. 86, t. 24, f. 37. — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 206; l. c. IV, 1789, p. 277. — Gmel. in L. Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1777. — Rossi, Fn. — Mittel- u. Osteuropa: Schweden, Deutschland, Österreich, Kaukasus,

Etr. I, 1790, p. 206; ed. Hellwiz I, 1795, p. 277. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 560; Best.-Tab. 9, 1883, p. 158 *(Otiorrhynchus)*; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 230. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 922, fig. 108 B, fig. 123 A, B, C. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 208; Best.-Tab. 70, 1914, p. 81; Fn. Germ. V, 1916, p. 29, t. 154, f. 6. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 134. Ost-Rumelien: Sliven

carinatus Payk. Monogr. Curc. 1792, p. 83 *(Curculio)*.

zebra F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 484; Syst. El. II, 1801, p. 538 *(Curculio)*. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 361, t. 88, f. 7. — Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 278. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 178 *(Brachyrhinus)*. — Ill. Mag. Ins.-Kunde VI, 1807, p. 159 *(Curculio)*. — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 316 *(Curculio)*; in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 622; l. c. VII, I, 1843, p. 380 *(Otiorrhynchus)*. — Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou 1847, p. 516. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 427; ed. 2, 1858, p. 748; ed. 3, 1874, p. 215 (Subg. *Tournieria*). — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 271, 280. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 506. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 455. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 313 (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 290; Abeille XI, 1873, p. 798. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 124; l. c. X, 1868, p. 173, 174. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 420. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 578; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 633 (Subg. *Tournieria*).

ab. *subsetulosus* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 7 (1891), p. 270 (Subg. *Tournieria*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 208; Best.-Tab. 70, 1914, p. 80; l. c. Note.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 40, l. c. XVIII, 1886, p. 285 (Futterpflanzen). — Chorbdadzhier, Svedeniya po Zemled period. Byul. X, 1929, Nos 3—4 (Sofia), p. 3—59.

gibbicollis Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 336. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 749; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 225 (Subg. *Tournieria*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 503. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p .326 ♂ ♀ (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 348; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 566; Best.-Tab. 9, 1883, p. 164. — Marseul, Abeille X, 1872, Krain, Kroatien, Velebit-Geb.

p. 435. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 922, fig. 108 B. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 206; Best.-Tab. 70, 1914, p. 78 (Gr. *Panorosemus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 29. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 48.

glabellus Rosenh. Beitr. Ins. Eur. 1847, p. 51. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 286; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 288; Abeille XI, 1873, p. 794; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 577; Best.-Tab. 9, 1883, p. 175; Fn. Col. Helvet II, 1886—98 (1891), p. 230. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 379. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 224 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 219; Best.-Tab. 70, 1914, p. 91 (Gr. *Zavodesus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 49. — Trident. Alpen: Monte Baldo; Venet.- u. Julische Alpen, Krain, Kroatien, Kapela-Gebirge, Bosnien, Türkei

parvulus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 5, 1881 (1882), l. c. VI, 1880—83, Nr. 10, 1883 (1884), p. 399 (p.). — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 266; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 774.

globicollis Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou 1847, p. 513. — Kol. l. c. XXXI, 2, 1858, p. 451. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 344, 347 (Subg. *Tournieria*); l. c. XVII, 1873, p. 291; Abeille XI, 1873, p. 799; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 574; Best.-Tab. 9, 1883, p. 172. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 199. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 201; Best.-Tab. 70, 1914, p. 73 (Gr. *Rimenostolus*). — Kaukasus, Armenisches Gebirge

globipes Apfelb. Ak. Wien. Anz. Nr. 10, 1918, p. 129. — Süd-Albanien (Kiore-Gebirge bei Valona)

granulatissimus Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 224; Best.-Tab. 70, 1914, p. 96 (Subg. *Pliadonus*). — Westkaukasus: Gagry-Alpe

griseus Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 43 (Subg. *Tournieria*). — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 347, 359; l. c. XVII, 1873, p. 291; Abeille XI, 1873, p. 799; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 10 (1884), p. 699; Best.-Tab. 9, 1883, p. 93. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 221; Best.-Tab. 70, 1914, p. 93 (Gr. *Viroprius*). — Griechenland

haedillus Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 199; Best.-Tab. 70, 1914, p. 71 (Subg. *Zariedus*). — Turkestan: Taschkent

haplolophus Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 204, 212; Best.-Tab. 70, 1914, p. 76, 84 (Gr. *Pinduchus*). — Turkestan: Aulie-Ata

hastilis	Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 199; Best.-Tab. 70, 1914, p. 71 (Gr. *Zariedus*).	Nord-Mongolei: Barkul
hebes	Reitter, Wien. Ent. Zeit. IX, 1890, p. 196; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 235; Best.-Tab. 70, 1914, p. 107 (Gr. *Melasemnus*).	Kaukasus: Zirkassien (Chag)
	var. *subuniseriatus* Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 218; Best.-Tab. 70, 1914, p. 90.	
Helenae	Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 225; Best.-Tab. 70, 1914, p. 97 (Subg. *Pliadonus*).	Kaukasus: Teberda, Zirkassien
hirsutus	Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—1880, Nr. 10 (1880), p. 567; l. c. VI, 1880—1883, Nr. 6—8 (1883), p. 568; Best.-Tab. 9, 9, 1883, p. 166. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 221; Best.-Tab. 70, 1914, p. 93 (Gr. *Viroprius*).	Kreta
hystericus	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 61. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 148; Best.-Tab. 70, 1914, p. 70 (Gr. *Zariedus*).	Turkestan: Magellan, Alexander-Gebirge
irregularis	Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 327; l. c. XVII, 1873, p. 286; Abeille XI, 1873, p. 792; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 559; Best.-Tab. 9, 1883, p. 157. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 758. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 218; Best.-Tab. 70, 1914, p. 90 (Gr. *Zavodesus*).	Türkei (nicht Griechenland)
Jovis	L. Miller, Wien. Ent. Monatschr. VI, 1862, p. 352; Abeille I, 1864, p. XXI. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 357; l. c. XVII, 1873, p. 282; Abeille XI, 1873, p. 789; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 10, 1883 (1884), p. 698. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 204. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 196; Best.-Tab. 70, 1914, p. 68 (Gr. *Podonebistus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 48.	Griechenland, Cephalonia
	var. *perdixoides* Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 196; Best.-Tab. 70, 1914, p. 68.	Parnass, Valuchi
	var. *Holdhausi* A. & F. Solari, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 121 ♀. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 196; Best.-Tab. 70, 1914, p. 68. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 48.	Italien: Lago San Giovanni: Gargano
	Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 41; l. c. XVIII, 1886, p. 285 (Futterpflanzen).	
juglandis	Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien IV, 1896, p. 548; Glasnik zem. muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 22; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 101. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 82; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 208; Best.-Tab. 70, 1914, p. 80 (Gr. *Choilisanus*).	Südost-Bosnien: Uvac, Südserbien, Bulgarien: West-Rhodope, Rilo-Klost

juglandiformis Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 61 (*Podominous*).

juldusanus Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 211; Best.-Tab. 70, 1914, p. 83. — Ost-Turkestan: Juldus

Kulzeri Zumpt, Mitteil. Deutsch. Ent. Ges. 1933, Nr. 1, p. 6. — Westkaukasus: Zageri

Kuschakewitschi Stierl. Rev. mens. d'Ent. I, 1883—84, Nr. 4 (1883), p. 97. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 205; Best.-Tab. 70, 1914, p. 77 (Gr. *Pinduchus*). — Turkestan: Sergiopol

kytherus Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 237; Best.-Tab. 70, 1814, p. 109 (Gr. *Pendragon*). — Griechenland: Cerigo

laevipennis Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 373 (Subg. *Tournieria*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 203; Best.-Tab. 70, 1914, p. 75 (Gr. *Rimenostolus*). — Kreta

laeviusculus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 287, Note; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 344, 347; l. c. XVII, 1873, p. 291; Abeille XI, 1873, p. 799; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 575; Best.-Tab. 9, 1883, p. 173. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 437. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 202; Best.-Tab. 70, 1914, p. 74 (Gr. *Rimenostolus*). — Rußland?, Kleinasien, Zilizisch.-Taurus, Monte Aman, Korfù

ab. *heterostictus* Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 110 ♂ ♀ (Subg. *Tournieria*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 202; Best.-Tab. 70, 1914, p. 74.

lubriculus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 322 (Subg. *Tournieria*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 228; Best.-Tab. 70, 1914, p. 100 (Gr. *Tournieria*). — Griechenland: Euboea, Parnass, Attika

maculiscapus Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 203; Best.-Tab. 70, 1914, p. 75 (Subg. *Rimenostolus*). — Turkestan: Alai Gebirge (Fergana)

Mazurai Formanek, Ent. Blätter VI, 1910, p. 17 ♂ ♀ (*Mazurae*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 217; Best.-Tab. 70, 1914, p. 89 (Gr. *Namertanus*). — Siebenbürgen: Retiezat-Gebirge; Banat, Herkulesbad

maxillosus Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 598 ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 335 ♀. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 745; ed. 3, II, 1874, p. 215 (Subg. *Tournieria*). — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 503. — Stierl. Revis. Otiorrhynchus 18611, p. 320, 323 ♂ ♀ (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 348; Abeille XI, 1873, p. 799; l. c. XVII, 1873, p. 291; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 564; Best.-Tab. 9, 1883, p. 162. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 429. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 633 (Subg. *Tournieria*). — Nord-Italien, Julische Voralpen, Herzegovina, Dalmatien, Montenegro

— Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913, (1914), p. 220; Best.-Tab. 70, 1914, p. 92 (Gr. *Prodeminus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 30. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 49.

Merkli Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—80, Nr. 10 (1880), p. 569; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 575; Best.-Tab. 9, 1883, p. 173. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 238; Best.-Tab. 70, 1914, p. 110 (Gr. *Pendragon*). — Bosnien, Herzegovina, Rhilo-Dagh, Türkei

miser Kirsch, Ent. Monatsbl. II, 1881, p. 3. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 564; Best.-Tab. 9, 1883, p. 162. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 219; Best.-Tab. 70, 1914, p. 91 (Gr. *Zavodesus*). — Türkei, Griechenland

parvulus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 5, 1881 (1882), p. 251; l. c. VI, 1880—83, Nr. 10, 1883 (1884), p. 699 (p.).

moestificus Schönherr in Ménétriés, Cat. rais. Zool. Cauc. 1832, p. 221. — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 628; l. c. VII, I, 1843, p. 377. — Falderm. Fn. Ent. Transcauc. II in Nouv. Mém. Soc. Moscou V, 1837, p. 215; l. c. III in l. c. VI, 1838, p. 183. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 452. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 279, Note; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 288; Abeille XI, 1873, p. 794; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 521; Best.-Tab. 9, 1883, p. 119. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 443. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 211; Best.-Tab. 70, 1914, p. 83 (Gr. *Eprahenus*). — Kaukasus

Beckeri Stierl. Deutsche Ent. Zeitschrift XIX, 1875, p. 345 (pro 425); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 8, 1875 (1876), p. 488; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 573; Best.-Tab. 9, 1883, p. 171.

montigena Marseul, Abeille X, 1872, p. 173. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 150; Best.-Tab. 70, 1914, p. 22. — Spanien: Reynosa

montanus Chevr. Rev. Mag. Zool. 1866, p. 25 (non Boh.). — ? Stierl. Abeille XI, 1873, p. 794.

protensus Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 301; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—80, Nr. 10 (1880), p. 562; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 527; Best.-Tab. 9, 1883, p. 125.

nasutus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 9 (1876), p. 503 (Subg. *Tournieria*); l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 563; Best.-Tab. 9, 1883, p. 161. — O. Schneider & Leder, Verh. Nat. Ver. Brünn XVII, 1878 (1879), p. 19. — Reitter, Verh. — Kaukasus

Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 216; Best.-Tab. 70, 1914, p. 88 (Gr. *Proremus*).

nefandus Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXII, 1888, p. 151. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 197; Best.-Tab. 70, 1914, p. 69 (Gr. *Podonebistus*). — Krim, Trans-Kaukasus, Kleinasien

mecops Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 105.

?discretus Stierlin, Rev. Europ. Otiorrhynchus 1861, p. 236; Best.-Tab. 1883, II, p. 92. — Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. I, p. 105. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 197; Best.-Tab. 70, 1914, p. 69, Note. — Kleinasien

nitidus Reiche, Ann. Soc. Ent. France (3) V, 1857. p. 690. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 328 (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 348; l. c. XVII, 1873, p. 392; Abeille XI, 1873, p. 800; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 573; Best.-Tab. 9, 1883, p. 171. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 235; Best.-Tab. 70, 1914, p. 107 (Gr. *Melasemnus*). — Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 108. — Griechenland, Syrien

nitens Marseul, Abeille X, 1872, p. 436.

sesquidentatus Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 109 (Subg. *Arammichnus*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 137 (Gr. *Stupamacus*); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 235, 246; Best.-Tab. 70, 1914, p. 107, 118.

nudiformis Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 202; Best.-Tab. 70, 1914, p. 74 (Gr. *Rimenostolus*). — Syrien: Monte Amanus, Beirut, Zeiton

osmanlis Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 570; Best.-Tab. 9, 1883, p. 168 (Subg. *Tournieria*). — Weise, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 49. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 227; Best.-Tab. 70, 1914, p. 99 (Gr. *Tournieria*). — Kaukasus, Kleinasien

Othryades Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 228; Best.-Tab. 70, 1914, p. 100 (Gr. *Tournieria*). — Griechenland

ottomanus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 325 (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 348; l. c. XVII, 1873, p. 291; Abeille XI, 1873, p. 799; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 565; Best.-Tab. 9, 1883, p. 163. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 433. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 206; Best.-Tab. 70, 1914, p. 78 (Gr. *Panorosemus*). — Griechenland, Türkei

acuminatus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 4 (1881), p. 159;

l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 565; Best.-Tab. 9, 1883, p. 163 (Subg. *Tournieria*).

ovalipennis Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 288. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 319 ♂ ♀ (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 348; l. c. XVII, 1872, p. 292; Abeille XI, 1873, p. 800; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 573; Best.-Tab. 9, 1883, p. 171. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 426. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 633 (Subg. *Tournieria*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 230; Best.-Tab. 70, 1914, p. 102 (Gr. *Melasemnus*). — Süd-Ost-Europa: Griechenland (Skiathos, Skopelos, Euboea, Samos, Nikaria, Rhodos); Kleinasien, Thrazien, Kaukasus

crucirostris Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XXIV, I, 1851, p. 67. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 344.

brevipennis Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 9 (1892), p. 359.

ab. *granithorax* Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 230; Best.-Tab. 70, 1914, p. 102.

ovatus L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 384; ed. 12, I, 2, 1767, p. 615; Fn. Suec. ed. 2, 1761, p. 182 (*Curculio*). — F. Syst. Ent. 1775, p. 156; Spec. Ins. I, 1781, p. 199; Mant. Ins. I, 1787, p. 123; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 490; Syst. El. II, 1801, p. 544. — Müller, Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 87. — Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 119. — Herbst, Arch. Ins.-Gesch. IV—V, 1784—85, p. 85, t. 24, f. 36; Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 357, t. 88, f. 2. — Bonsd. Hist. Nat. Curc. Suec. II, 1785, p. 35, fig. 26. — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 203. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1775. — Oliv. Encycl. méthod. V, 1790, p. 560. — Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 134; ed. Hellwig I, 1795, p. 142. — Payk. Monogr. Curc. Suec. 1792, p. 82; Fn. Suec. III, 1800, p. 277. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 335, Nr. 206. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 315. — Walck. Fn. Paris I, 1802, p. 248. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 184 (*Brachyrhinus*). — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 320 (*Curculio*);. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 631; l. c. VII, I, 1843, p. 386 (*Otiorrhynchus*). — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 333; Ins. Lapp. I, 1838 (1840), col. 187. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 116; Man. Brit. Col. 1839, p. 242. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1836), p. 150, Nr. 34. — Küster, Käfer Eur. XI, 1847, Nr. 80. — Gebler, Bull. Soc. Nat. Moscou 1848, p. 363. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 426; l. c. ed. 2, 1858, p. 748; ed. 3, II, 1874, p. 213 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Bach, Käferfn. II, 1854, — Europa, Zentral-Asien, Baikalien, Nordamerika

p. 271, 279. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 307; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 285; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 289; Abeille XI, 1873, p. 794; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 577; Best.-Tab. 9, 1883, p. 175. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 456. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 505. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 125; l. c. X, 1868, p. 173, 174. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 37 *(Brachyrhinus)*, (1886), p. 231 (Subg. *Pendagron*). — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 578; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 633 (Subg. *Tournieria*). — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 175, 180, t. 157, f. 13; l. c. VI, 1913, p. 304. — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 282; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 787; Glasnik Kroat. Naturwiss. Gesells. Zagreb XXXIV, 1922, p. 17, 18; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, p. 102. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 538. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 571 (Subg. *Dorymerus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 922, fig. 108 A, 123 D. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 238; Best.-Tab. 1914, p. 110; Fn. Germ. V, 1916, p. 30, t. 154, f. 7. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1927, p. 138. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 50.

Scopolii Poda, Ins. Mus. Graec. 1762, p. 30 *(Curculio)*. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1777. — Ol. Encycl. méthod. V, 1790, p. 575.

rufipes Scop. Ent. Carn. 1763, p. 32 *(Curculio)*.

Rosae Degeer, Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 219 *(Curculio)*.

pabulinus Panz. Fn. Ins. Germ. V, 1798, Heft 57, t. 19; Krit. Revis. I, 1805, p. 133 *(Curculio)*. — Steph. Ill. Brit. Entom. Mandib. IV, 1831, p. 116; Man. Brit. Col. 1839, p. 242 *(Otiorrhynchus)*. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 271, 279. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 308; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 286; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 577; Best.-Tab. 9, 1883, p. 175; Fn. Col. Helvet. II, 1886—91, p. 231. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 378. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 922. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 237; Best.-Tab. 70, 1914, p. 109. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 138.

vorticosus ♂ Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 630; l. c. VII, I,

1843, p. 385. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 286; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 577; Best.-Tab. 9, 1883, p. 175. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 922.

? *globulipennis* Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 632; l. c. VII, 1, 1843, p. 387. — Gebler, Bull. Soc. Nat. Moscou 1848, p. 361. — Kol. l. c. XXXI, 2, 1858, p. 456. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 287, Note; Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 376. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 237, Note; Best.-Tab. 70, 1914, p. 109, Note (Gr. *Pendagron*). West-Sibirien: Barnaul

subsp. *glacialis* Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 282; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 787; Wiss. Mittheil. Bosnien 1903, p. 187; Glasnik muz. Bosn. Herzeg. XXXII, 1920, p. 22; Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 9—12, p. 102. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 238; Best.-Tab. 1914, p. 110. Bosnien: Treskavica-planina

Biologie: Degeer, Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 219; Abh. Gesch. Ins. IV—V, 1781, p. 351 (Metamorphose). — Laboulbène, Ann. Soc. Ent. France (3) I, 1853, Bull. p. XLVIII. — Nördlinger, Nachträge 1880, p. 17—18. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 43; l. c. XVIII, 1886, p. 286 (Futterpflanzen). — Altum, Zeitschr. Forst- u. Jagdwesen VI, 1885, p. 587—591 (Metamorphose). — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1886, p. 231. — Cooley, Bull. Nr. 55 Montana Agric. Experim. Stat. 1905, p. 130—140, t. 1—2 (Schädling). — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 49. — Cosens, Trans. Canad. Institut (Toronto) Nr. 22, 1912, p. 297—387, t. I—XIII. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkrankh. III, I, 1906—13 (1912), p. 542. — Treherne, Bull. Canada Dep. Agric. Ent. (Ottawa) 8, 1914, p. 43; Canad. Ent. XLIX, 1917, p. 257—260. — Spessivtseff, Medd. Stat. Skogsförsöksanst. 20, 1923, p. 241—260 (Morphol., Biolog.). — Barrett, Univ. Cal. Pub. Ent. 5, 1930, p. 94. — Pack, Bull. Utah Agric. Expt. Sta. 1930, Nr. 216. — Fulmek, Garten-Zeitung (Wien) 1930 (Schädilng). — Bodo, Mitt. burgenländ. Landwirtschaftskammer 1930, Nr. 6, p. 102; Neuheiten Geb. Pflschutzes 1930, Nr. 3, Wien, p. 81. — Downes, Pamph. Dept. Agric. Canada (N. S.) Nr. 5, 1931, Ottowa (Schädling). — Keifer, Mon. Bull. Dept. Agric. California XX, Nr. 7, 1931 (Sacramento), p. 470—72, 2 figs. — Whitcomb, Nat. Nurserym. XXXIX, 1931, Nr. 11, p. 5; Expt. St. Rec. 1933, Nr. 6 (Washington), p. 793. — Gambrell, Proc. 8th Nat. Shade Tree Conf. 1932 (Rochester), p. 89. — Da-

niel, Journ. Econ. Ent. XXV, Nr. 4, 1932 (Geneva), p. 841—843.

pauxillus Rosenh. Beitr. Ins. Eur. 1847, p. 50. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 307; Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 287; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 289; Abeille XI, 1873, p. 795; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 562; Best.-Tab. 9, 1883, p. 160. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 380. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 224 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 633 (Subg. *Tournieria*). — Sainte-Claire Deville, L'Abeille XXX, 1900—1906, p. 200. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 217; Best.-Tab. 70, 1914, p. 89 (Gr. *Proremus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 29. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1923, p. 135. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 49. — Mitteleuropa: Frankreich, Schweiz, Alpengebiet bis Siebenbürgen, Kroatien, Bulgarien, Griechenland, Türkei

Hampei Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 200; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 279; Abeille XI, 1873, p. 786; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 527; Best.-Tab. 9, 1883, p. 125. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 286. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 630 (Subg. *Dorymerus*).

rugirostris Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—80, Nr. 9 (1879), p. 514; l. c. VI, 8—9, 1883, p. 562; Best.-Tab. 9, 1883, p. 160.

pygmaeus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 562; Best.-Tab. 9, 1883, p. 160.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 43; l. c. XVIII, 1886, p. 286.

pertinax Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVIII, 1887, p. 293 (Subg. *Tournieria*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 213; Best.-Tab. 70, 1914, p. 85 (Gr. *Eprahenus*). — Turkestan: Kashgar

phreatus Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 202 ♂ ♀; Best.-Tab. 70, 1914, p. 74 (Gr. *Rimenostolus*). — Armenien: Achalzik, Araxestal: Ordubad

pilifer Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1893—1897, Nr. 7 (1896), p. 328. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 201; Best.-Tab. 70, 1914, p. 73 (Gr. *Rimenostolus*). — Kaukasus: Grusien

piliporus Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 200; Best.-Tab. 70, 1914, p. 72 (Gr. *Zariedus*). — Turkestan: Semiretschie, Mojun-Kum, Wernyi, Djarkent

pilosellus Apfelb. Akad. Wien. Anz. Nr. 10, 1918, p. 129 (*ovalipennis*-Gruppe). — Albanien: (Merdita)

porcellus Daniel, Col.-Studien II, 1898, p. 48. — Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. — Italien: Gran Sasso

248; Best.-Tab. 70, 1914, p. 120. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 48.

prolixus Rosenh. Beitr. Ins. Eur. 1847, p. 53. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 234; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 282; Abeille XI, 1873, p. 789; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 526; l. c. VI, 10, 1883 (1884), p. 698; Best.-Tab. 9, 1883, p. 124. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 323. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 222 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 194; Best.-Tab. 70, 1914, p. 66 (Gr. *Podonebistus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 48. — Tirol, Trident.-Alpen

prolongatus Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 235; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 282; Abeille XI, 1873, p. 789; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 527; l. c. VI, 10, 1883 (1884), p. 698; Best.-Tab. 9, 1883, p. 125. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 324. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 195; Best.-Tab. 70, 1915, p. 67 (Gr. *Podonebistus*). — Griechenland

pseudobrachialis Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 224; Best.-Tab. 70, 1914, p. 96 (Gr. *Pliadonus*). — Zirkassien: Amuco

pseudomecops Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 195; Best.-Tab. 70, 1914, p. 67 (Gr. *Podonebistus*). — Borshom

pseudomias Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 2, 1847, p. 524. — Kol. l. c. XXXI, 2, 1858, p. 446. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 273; Abeille XI, 1873, p. 780; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 451; Best.-Tab. 9, 1883, p. 49; Fn. Col. Helvet. II, 1880—98 (1891), p. 218. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 226. — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 271; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 778. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 217; Best.-Tab. 70, 1914, p. 89. — Zumpt, Mittheil. Deutsch. Ent. Ges. IV, 1933, Nr. 1, p. 7. — Kaukasus, Talyschgebirge, Südbosnien

ptochoides Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 27 (Subg. *Tournieria*); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 235; Best.-Tab. 70, 1914, p. 107 (Gr. *Melasemnus*). — Araxestal: Ordubad

pulvinatus Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 1847, p. 518. — Kol. l. c. XXXII, 2, 1858, p. 452. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 344, 348; l. c. XVII, 1873, p. 292; Abeille XI, 1873, p. 800; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 576; Best.-Tab. 9, 1883, p. 174. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 427. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 234; Best.-Tab. 70, 1914, p. 106. — Kaukasus, Armenisches Gebirge, Araxestal

Raddei Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 178 (Subg. *Tournieria*); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 568; Best.-Tab. 9, 1883, p. 166. — O. Schneider & Leder, Verh. Nat. Ver. Brünn XVII, 1878 (1879) p. 13, t. 5, f. 44.

reclinatus Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 234; Best.-Tab. 70, 1914, p. 106 (Gr. *Melasemnus*). — Kaukasus: Mlok

Reitteri Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 9, (1876), p. 500 (Subg. *Tournieria*); l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 570; Best.-Tab. 9, 1883, p. 168. — O. Schneider & Leder, Verh. Nat. Ver. Brünn XVII, 1878 (1879), p. 15. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 223; Best.-Tab. 70, 1914, p. 95 (Gr. *Pliadonus*). — Kaukasus

rotundatus Siebold, Preuß. Provinz.-Blätter VI, 1837, p. 431 Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 279. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 336; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 328, 336, 345; l. c. XVII, 1873, p. 289; Abeille XI, 1873, p. 795; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 485; Best.-Tab. 9, 1883, p. 83. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 576; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 629 (Subg. *Dorymerus*). — Helm, Schrift. Nat. Ges. Danzig (N. F.) IX, 1896, p. 89. — Heyden, Korrespbl. Nat. Ver. Riga XLVI, 1903, p. 24. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 925. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 216; Best.-Tab. 70, 1914, p. 88 (Gr. *Proremus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 29. — Danzig, Galizien, Südrußland, Kaukasus

rotundus Marseul, Abeille X, 1872, p. 444, p. 759.

Dzieduszyckii Lomnicki, Kosmos (Lemberg) VI, 1881, p. 433.

Biologie: Bail, 27—28, Ber. Westpreuß. Bot.-Zool. Ver. 1906; Naturwiss. Wochenschr. (N. F.) V, 1906, p. 618—619. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkrankh. III, 1906—1913 (1912), p. 542. — Lengerken in Zeitschr. wiss. Insektenbiol. IX, 1913, p. 7—12; in Zeitschr. angew. Ent. V, 1919, p. 67—83, 319—321 (Lebensweise und Entwicklung). — Burkhardt in Zeitschr. angew. Ent. V, 1919, p. 295—300 (Verbreitung und Lebensweise).

rufimanus Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XXIV, 1, 1851, p. 80. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 575; Best.-Tab. 9, 1883, p. 173. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 203; Best.-Tab. 70, 1914, p. 75 (Gr. *Rimenostolus*). — Kaukasus, Russisches Armenien, Türkei, Kleinasien

nudus Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 330, 333 (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 347; l. c. XVII, 1873, p. 291; Abeille XI, 1873, p. 799.

rufitarsis Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. X, 1898—1903, Nr. 8 (1901), p. 366 (Subg. *Tournieria*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 231; Best.-Tab. 70, 1914, p. 103 (Gr. *Melasemnus*). — Syrien

saturnus Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 199; Best.-Tab. 70, 1914, p. 71 (Gr. *Zariedus*). — Buchara

schamylianus Reitter, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 234; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 223; Best.-Tab. 70, 1914, p. 95 (Gr. *Pliadonus*). — Kaukasus, Zirkassien: Abago

Schuhmacheri Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 571; Best.-Tab. 9, 1883, p. 169. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 196; Best.-Tab. 70, 1914, p. 68 (Gr. *Podonebistus*). — Syrien: Libanon

Schusteri Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1893—97, Nr. 10 (1897), p. 479 (Subg. *Tournieria*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 237; Best.-Tab. 70, 1914, p. 237 (Gr. *Pendragon*). — Siebenbürgen: Transsylvanische Alpen, Schuler-Gebirge

pristodon K. Daniel, Soc. Ent. XII, 1897, p. 65 ♂ ♀; Col.-Studien II, 1898, p. 50.

scopularis Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 1847, p. 506. — Kol. l. c. XXXII, 2, 1858, p. 437. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 344 (Subg. *Tournieria*); l. c. XVII, 1873, p. 290; Abeille XI, 1873, p. 798; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 562; Best.-Tab. 9, 1883, p. 160. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 419. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 209; Best.-Tab. 70, 1914, p. 81 (Gr. *Podoropelmus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 49. — Südrußland, Kaukasus, Kleinasien, Griechenland, Apulien, Calabrien, Sizilien

chrysopterus Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 312; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 344.

secundarius Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 200; Best.-Tab. 70, 1914, p. 72 (Gr. *Zariedus*). — Turkestan: Taschkent

sedulus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 54. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 200; Best.-Tab. 70, 1914, p. 73 (Gr. *Zariedus*). — Turkestan: Kujuk

semiopacus Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 202; Best.-Tab. 70, 1914, p. 74 (Gr. *Rimenostolus*). — Kleinasien: Tossia

serbicus Apfelb. Glasnik Kroat. Naturw. Gesell. Zagreb XXXIV, 1922, p .17 (*ovatus*-Gruppe). — Serbien

serdicanus Apfelb. Glasnik Kroat. Naturwiss. Gesell. Zagreb XXXIV, 1922, p. 18 (*ovatus*-Gruppe). — Bulgarien, Hochgebirge (Vitosa, Rhodope)

Sieversi Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXII, 1888, p. 152 (Subg. *Tournieria*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 233; Best.-Tab. 70, 1914, p. 105 (Gr. *Melasemnus*). — Kaukasus: Manglis, Araxestal

	ab. *pastoralis* Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 233; Best.-Tab. 70, 1914, p. 105.	
spinifer	K. & J. Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 112 ♂ ♀ (Subg. *Tournieria*). — Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 230; Best.-Tab. 70, 1914, p. 102 (Gr. *Melasemnus*).	Kleinasien: Bulghar-Maaden, Bulgar-Dagh
Starcki	Retowsky, Wien. Ent. Zeit. IV, 1885, p. 10. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 224; Best.-Tab. 70, 1914, p. 96 (Gr. *Pliadonus*).	West-Kaukasus, Zirkassien, Novorossisk
Steindachneri	Apfelb. Sitzber. Ak. Wiss. Wien CXVI, I, 1907, p. 525 (Subg. *Tournieria*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 230; Best.-Tab. 70, 1914, p. 102 (Gr. *Melasemnus*).	Albanien: Merdita (Munela-Geb.)
subbidentatus	Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1893—97, Nr. 6 (1895), p. 301. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 207; Best.-Tab. 70, 1914, p. 79 (Gr. *Pocodalemes*).	Kaukasus, Zirkassien: Abchasien
subellipticus	Apfelb. Glasnik d. Kroat. Naturwiss. Gesell. Zagreb XXXIV, 1922, p. 18 (*ovatus*-Gruppe).	Zentral-Bosnien
subsquamulatus	Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—88, Nr. 1 (1884), p. 40 (Subg. *Tournieria*); Best.-Tab. 6, p. 93. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 216; Best.-Tab. 70, 1914, p. 88 (Gr. *Proremus*).	Kaukasus
suramensis	Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 210; Best.-Tab. 70, 1914, p. 82 (Gr. *Podoropelmus*).	Kaukasus: Suram
swaneticus	Reitter, Rev. mens. Ent. I, 1883—84, Nr. 4, 1883, p. 116; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 233; Best.-Tab. 70, 1914, p. 105 (Gr. *Melasemnus*).	Kaukasus: Swanetien
	bifoveolatus (Reitter) Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87, p. 149.	
	subsp. *Adelaidae* Reitter, Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 69 (Subg. *Tournieria*); Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 233; Best.-Tab. 70, 1914, p. 105 (Gr. *Melasemnus*).	West-kaukasus, Zirkassien (Fischt)
tarphiderus	Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 205; Best.-Tab. 70, 1914, p. 77 (Gr. *Pinduchus*).	Ost-Turkestan: Juldus
	ab. *tarphideroides* Reitter, l. c. p. 205, p. 77.	
tbatanicus	Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 225; Best.-Tab. 70, 1914, p. 97 (Gr. *Pliadonus*).	Kaukasus: Tbatani
Tetrarchus	Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 227, Note, 231; Best.-Tab. 70, 1914, p. 99, Note, 103.	Kleinasien, Smyrna
teucrus	Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 228; Best.-Tab. 70, 1914, p. 100 (Gr. *Tournieria*).	Griechenland: Naxos, Taygetos

erroneus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 322 (Subg. *Tournieria*) (non Faust 1886).

Thaliarchus Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 236 ♀; Best.-Tab. 70, 1914, p. 108 ♀ (Gr. *Melasemnus*). — Kreta

transsylvanicus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 320 ♂ ♀ (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 348; l. c. XVII, 1873, p. 291; Abeille XI, 1873, p. 800; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 573; Best.-Tab. 9, 1883, p. 171. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 426. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 633 (Subg. *Tournieria*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 231; Best.-Tab. 70, 1914, p. 103 (Gr. *Melasemnus*). — Zilizisch. Taurus, Kleinasien: Adana, Tokat

veluchianus Apfelbeck, Wiss. Mittheil. Bosnien XII, 1912, p. 654 (Subg. *Tournieria*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 228; Best.-Tab. 70, 1914, p. 100 (Gr. *Tournieria*). — Nordgriechenland: Karpension, Veluchi

vitis Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 578; l. c. VII, I, 1843, p. 294. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 433. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 325 (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 368; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 578; Best.-Tab. 9, 1883, p. 176. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 439; Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 44. — Krim: Theodosia, Busagan, Gnundshi, Kertsch

vilis Gemm. et Harold, Catal. Col. VIII, 1871, p. 2270 (err.).

strongylus Retowski, Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 133. — Reitter, l. c. VI, 1887, p. 133; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 206; Best.-Tab. 70, 1914, p. 78 (Gr. *Panorosemus*); Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 44.

Theodosianus Retowski, Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 133.

zariedoides Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 213; Best.-Tab. 70, 1914, p. 85 (Gr. *Zelotomelus*). — Turkestan: Alai-Geb.

Subgen. **Neotournieria** Apfelbeck.

Apfelb. Mittheil. Königl. Naturwiss. Institut Sofia V, 1932, p. 155.

Bureschi (♀) Apfelb. l. c. p. 155. — Bulgarien: Kryaschevo bei Sofia

Lehmanni Lpc. *Macedonia*

Subgen. **Tyloderes** Stierl.

Schönherr, Dispos. meth. Curc. 1826, p. 206; Gen. Curc. II, 2, 1834, p. 636; l. c. VII, I, 1843, p. 388. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 330. — Redtb. Gutt. Deutsch. Käferfn. 1845, p. 39;

Fn. Austr. 1849, p. 39, 421; l. c. ed. 2, 1858, p. CXXI, 750; l. c. ed. 3, I, 1874, p. CXXXII; l. c. II, 1874, p. 225. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 155, 280. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 451, 507. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 158, 625. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 282; Fn. Balt. ed. 2, 1887—1891 (1890), Arten p. 569; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 615. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 368; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 8—9, 1883, p. 415—578; Best.-Tab. 9, 1883, p. 7, 176; in Calwer, Käferb. 1893, p. 423. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 921. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 47, 67; Best.-Tab. 66, 1912, p. 3, 23; Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 151; Fauna Germ. V, 1916, p. 16. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 16.

Dejeani Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 390 *(Tyloderes)*. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 578; Best.-Tab. 9, 1883, p. 176. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 152 (Subg. *Tyloderes*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 55. — Steiermark

chrysops Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VII, 1797, p. 63, t. 98, f. 13 *(Curculio)*. — Germ. Mag. Ins. II, 1817, p. 340 *(Plinthus)*. — Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 636 *(Tyloderes)*. — Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 388 *(Tyloderes)*. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 281. — Jacq. du Val Gen. Col. d'Eur. Curc. 1854, t. 16, f. 73. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 507. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 445. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 225. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—81, Nr. 8—9 (1883), p. 578; Best.-Tab. 9, 1883, p. 176. — Meixner, Mittheil. Nat. Ver. Steiermark 1908, p. 447—450. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 152 *(Tyloderes)*; Best.-Tab. 67, p. 152. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 55. — Tirol, Trident.-Alpen, Steiermark: Koralpe

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 46; l. c. XVIII, 1886, p. 287.

Megerlei F. Syst. El. II, 1801, p. 521 *(Curculio)*. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 186 *(Brachyrhinus)*. — Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 389 *(Tyloderes)*. — Germ. Fn. Ins. Eur. XVIII, 1836, t. 15 *(Tyloderes)*. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 446 (Subg. *Tyloderes*). — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 225 *(Tyloderes)*. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 578; Best.-Tab. 9, 1883, p. 176 *(Tyloderes)*. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 152 (Subg. *Tyloderes*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 55. — Österr.-Alpen, Trident.-Alpen, Steiermark

var. *lacernatus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 152. — Krain

Incertae sedis.

acatium Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 590; l. c. VII, 1843, p. 323. — Stierl. Revis. Otiorrhynchus 1861, p. 335. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 411. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119. — Krim?

adspersus Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 329. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 215, Note ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 280; Abeille XI, 1873, p. 787; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 8—9, 1883, p. 496; Best.-Tab. 9, 1883, p. 94. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 303. — Kleinasien: Anatolien

altaicus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 330, Note; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 348; l. c. XVII, 1873, p. 292; Abeille XI, 1873, p. 800 (Subg. *Tournieria*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 435. — Sibirien

amoenus Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVII, 1886, p. 139 (Subg. *Tournieria*). — Kashgar

amplus Petri, Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 94 ♀. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119. — Siebenbürgen: Kronstadt

angusticollis Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 344. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 440. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 180; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 277; Abeille XI, 1873, p. 784. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 267. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119. — Türkei, Bucharei

arachnoides Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 108 ♂ ♀; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 270; Abeille XI, 1873, p. 777; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 552; Best.-Tab. 9, 1883, p. 150. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 191 ♂ ♀. — Reitter, Bull. Soc. Ent. Egypte I, 1908, p. 53. — Syrien

argillosus Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XXIV, 1851, p. 73. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 382. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 271; Abeille XI, 1873, p. 778; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—84, Nr. 8—9 (1883), p. 455; Best.-Tab. 9, 1883, p. 53. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119. — Kaukasus

clemens Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 632; l. c. VII, I, 1843, p. 387. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 287; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 288; Abeille XI, 1873, p. 794. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 381. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119. — Südrußland

constricticollis Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 303 ♂ ♀ (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 289; Abeille XI, 1873, p. 797; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 554; Best.-Tab. 9, 1883, p. 152. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 410 ♂ ♀; l. c. XI, 1873, p. 797. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119. Türkei

cruralis Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1893—97, Nr. 3 (1894), p. 115. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119. Patria?

cypricola Reiche & Saulcy, Ann. Soc. Ent. France 1857, p. 688. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 233; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 282; Abeille XI, 1873, p. 789; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 10, 1883 (1884), p. 698. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 323. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 44. Zypern

decussatus Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XXIV, 1, 1851, p. 72. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 290, Note. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 417; l. c. XI, 1873, p. 798, Note. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119. Kaukasus

depressus Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 338 (pro 418); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 8, 1875 (1876), p. 483; l. c. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 457; Best.-Tab. 9, 1883, p. 55. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119. Italien?, Kaukasus?, Türkei?

Desbrochersi Stierl. Frelon V, 1895—96, Nr. 3 (1896), p. 44 (Subg. *Tournieria*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119. Karpathen

dubitabilis Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 266. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 351; l. c. XVII, 1873, p. 270; Abeille XI, 1873, p. 777, Nr. 88; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 454; Best.-Tab. 9, 1883, p. 52. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 193. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 44. Kleinasien

fasciculatus Ménétr. Mém. Ac, St. Pétersbourg VI, 1849, p. 261, t. 5, f. 12. Basshkir

hystrix Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 618; l. c. VII, I, 1843, p. 367. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 450. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 335 (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 290; Abeille XI, 1873, p. 798; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 557; Best.-Tab. 9, 1883, p. 155. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 417. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Kaukasus

Brünn LII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119.

inductus Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 596; l. c. VII, 1, 1843, p. 334. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 336. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119. — Kroatien

intercallaris Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 313. — Küster, Käfer Eur. XI, 1847, Nr. 61. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 118, Note; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 271; Abeille XI, 1873, p. 778; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 449, Note; Best.-Tab. 9, 1883, p. 47. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 204. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119. — Ungarn

intrusus Reiche, Ann. Soc. Ent. France (4) II, 1862, p. 297. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 357; l. c. XVII, 1873, p. 783; Abeille XI, 1873, p. 789; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 514; Best.-Tab. 9, 1883, p. 112. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 329. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119. — Korsika

Kotulae Smulikowski, Polskie Pismo I, 1922, p. 16—18. — Polen

lagenaria Muls. Nouv. et Faits Ent. (2) Nr. 19, 1878, p. 75. — Trapezunt

monedula Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 229; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 282; Abeille XI, 1873, p. 788; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 514; Best.-Tab. 9, 1883, p. 112. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119. — Rumelien

mus Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 366; l. c. XVII, 1873, p. 282; Abeille XI, 1873, p. 788; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 515; Best.-Tab. 9, 1883, p. 113. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 319. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119. — Dalmatien

orientalis Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, I, 1834, p. 556; l. c. VII, 2, 1843, p. 260. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 54. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 132. — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 226; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 777. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab. 69, 1914, p. 119. — Halbinsel Chalki (nicht Sizilien)

Ormayi Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—94, Nr. 1 (1888), p. 10. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119. — Siebenbürgen

ostentatus Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 583; l. c. VII, I, 1843, p. 304. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII. 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119. — Huhenthal, Ent. Blätter 1916, p. 69. — Horion, Nachtr. zu Fn. Germ. 1935, p. 309. — Deutschland

pellucidus J. Sahlb. Acta Soc. Fn. et Fl. Fenn. XIX, Nr. 4, 1900, p. 18 (Subg. *Tournieria*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119. — Süd-Finland: Karislojo (Karkkali)

perplexus Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 608; l. c. VII, I, 1843, p. 348. — Gebler, Bull. Soc. Nat. Moscou 1841, p. 605; l. c. 1848, p. 363. — Kol. l. c. XXXI, 2, 1858, p. 443. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 375; l. c. XVII, 1873, p. 288; Abeille XI, 1873, p. 794. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 381. — Sibirien

petiginosus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 251; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 284; Abeille XI, 1873, p. 790; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 511; Best.-Tab. 9, 1883, p. 109. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 340. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119. — Dalmatien

phasma Rottenb. Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 225, t. 7, f. 1. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 271; Abeille XI, 1873, p. 778; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 579; Best.-Tab. 9, 1883, p. 177. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 765. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119. — Sizilien; Etna

heteromorphus Rottenb. Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 226. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 279; Abeille XI, 1873, p. 786; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 488; Best.-Tab. 9, 1883, p. 86. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 43; l. c. XVIII, 1886, p. 286.

piceus Stierl. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 75; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1893—97, Nr. 6 (1895), p. 299. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 247; Best.-Tab. 70, 1914, p. 119. — Banat

pilosus Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 586; l. c. VII, I, 1843, p. 302. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 433. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 333. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 248; Best.-Tab. 70, 1914, p. 120. — Krim

proletarius Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 385. — Gebler, Bull. Soc. Nat. Moscou 1848, p. 364. — Kol. l. c. XXXI, — Westsibirien

2, 1858, p. 455. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 287; Abeille XI, 1873, p. 793; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 519; Best.-Tab. 9, 1883, p. 117. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 44.

prostratus Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 280; Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 176. — Turkestan: Ismir

tenuis Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 294. — Heyden, l. c. 1886, p. 280; Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 176.

pullus Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 606; l. c. VII, 1, 1843, p. 348. — Gebler, Bull. Soc. Nat. Moscou 1848, p. 365. — Kol. l. c. XXXI, 2, 1858, p. 442. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 181, Note; Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 374; l. c. XVII, 1873, p. 276; Abeille XI, 1873, p. 783; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 471; Best.-Tab. 9, 1883, p. 69. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 268. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 44. — Westsibirien

pulverulus Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 317. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 334 (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 273; Abeille XI, 1873, p. 780; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 451; Best.-Tab. 9, 1883, p. 49. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 229. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 44. — Anatolien: Namengan

punctirostris Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1893—97, Nr. 3 (1894), p. 159 ♀ (non 1883). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 43. — Patria?

saevus Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 335. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 325, Note; Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 377 (Subg. *Tournieria*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 440. — Anatolien: Ismir

Schneideri Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76, Nr. 9 (1876), p. 501 ♂ ♀ (Subg. *Tournieria*). — Schneider & Leder, Verh. Nat. Ver. Brünn XVII, 1878 (1879), p. 16, t. 5, f. 47. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 248; Best.-Tab. 70, 1914, p. 120. — Kaukasus

seductor Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 206 (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 279; Abeille XI, 1873, p. 786; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 489; Best.-Tab. 9, 1883, p. 87. — Friv. A. Királyi Magyar 1865, p. 209. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 293. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 629 (Subg. *Dorymerus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 248; Best.-Tab. 70, 1914, p. 120. — Ungarn, Siebenbürgen

segnis Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 629; l. c. VII, 1, 1843, p. 385. — J. L. Leconte, Rep. Explor. Mississippi River IX, 1857. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 505. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 285 (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 288; Abeille XI, 1873, p. 794; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 577; Best.-Tab. 9, 1883, p. 175. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 377. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 749; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 224 (Subg. *Otiorrhynchus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 248; Best.-Tab. 70, 1914, p. 120. — Horion, Nachtr. zu Fn. Germ. 1935, p. 309. — Deutschland

setiger Waltl, Reise Spanien 1835, II, p. 78 *(Loborhynchus)*. — Spanien

striolaticeps Mshl. Fn. Brit. Ind. 1916, p. 258, fig. 80. — Kashmir

strix Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—1893, Nr. 7 (1891), p. 271. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 248; Best.-Tab 70, 1914, p. 120. — Griechenland

subdepressus Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 323; l. c. XVII, 1873, p. 273; Abeille XI, 1873, p. 780; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 451; Best.-Tab. 9, 1883, p. 49. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 248; Best.-Tab. 70, 1914, p. 120. — ? Türkei

depressior Marseul, Abeille XI, 1873, p. 752. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 248; Best.-Tab. 70, 1914, p. 120.

sulcifrons Gyll. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 577 ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 291 ♀. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 252; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 284; Abeille XI, 1873, p. 790; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 511; Best.-Tab. 9, 1883, p. 109. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 334. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 248; Best.-Tab. 70, 1914, p. 120. — Illyrien

sulcirostris Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 279. — Marseul, Abeille XI, 1872, p. 386 (p. p.). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912 (Best.-Tab. 67), p. 125, Note, p. 126; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 248; Best.-Tab. 70, 1914, p. 120. — Illyrien, Dalmatien

tenebricosus Herbst, Arch. Ins.-Gesch. IV—V, 1784—1785, p. 81, t. 24, f. 27; Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 333, t. 86, f. 5 *(Curculio)*. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1798. — ? Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 174 *(Brachyrhinus)*. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p.

117; Man. Brit. Col. 1839, p. 242. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1888), p. 423, Note. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 175, t. 157, f. 1. — Fauvel, Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 113.

tenuis Stierl. Rev. mens. d'Ent. I, 1883—84, Nr. 4 (1883), p. 98. — Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. 188, p. 280; Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 176. — Turkestan

tomentifer Boh. in Schönherr, Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 321. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 436. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 310, Note (Subg. *Tournieria*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 290; Abeille XI, 1873, p. 798; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 554; Best.-Tab. 9, 1883, p. 152. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 416. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 248; Best.-Tab. 70, 1914, p. 120. — Krim, Kaukasus

trichographus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 169 ♂ ♀ (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 275; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 470; Best.-Tab. 9, 1883, p. 68. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 256. — Apfelb. Wiss. Mittheil. Bosnien IV, 1895, p. 542; Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 272; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 779. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 248; Best.-Tab. 70, 1914, p. 120. — Herzegovina, Dalmatien

turbatus Schönherr, Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 635; l. c. VII, I, 1843, p. 388. — Italien

nigrita Ol. Entom. V, 1807, Nr. 83, p. 406, t. 26, f. 370 *(Curculio)*.

ursus Gebler, Bull. Ac. St. Pétersbourg III, 1845, p. 104; Bull. Soc. Nat. Moscou 1860, II, p. 28. — Songarei

verrucicollis Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 242, Note (Subg. *Otiorrhynchus*); Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 283; Abeille XI, 1873, p. 790; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 520; Best.-Tab. 9, 1883, p. 118. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 332. — Apfelb. Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 278; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 784. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 248; Best.-Tab. 70, 1914, p. 120. — Kaukasus

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 160:

C. Lona

Curculionidae: Otiorrhynchinae II.

Dr. W. Junk
Verlag für Naturwissenschaften
's-Gravenhage
1937.

Troglorrhynchus Schmidt.

F. Schmidt, Schrift. zool.-bot. Ver. Wien IV, 1854, p. 25 *(Troglorrhynchus)*. — Gerstäcker, Archiv f. Naturg. XXI, 2, 1855, p. 184. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. XCXX, p. 739; l. c. ed. 3, I, 1874, p. CXXXII; l. c. II, 1874, p. 225. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 450, 506. — Stierl. Rev. Eur. Otiorhynch. 1861, p. 14; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 363, 368; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1883, p. 415, 579; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 7, 177. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 159, 625. — Seidl. Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 284; Fauna Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 569; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 615. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. III, 1871, p. 36—39. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 34, Note. — Flach, Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 56. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 10; l. c. LII, 1913 (1914), p. 239; Best.-Tab. 70, 1914, p. 111; Fauna Germ. V, 1916, p. 15. — Solari, A. F., Boll. Soc. Ent. Ital. 1923, p. 51.— Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 31 (pars) (*Troglorrhynchus* s. str.) (Curcul. Gallo-Rhén. p. 149). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 870 (Katal.). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 55.

Andreinii F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1932, p. 21 ♀. — Italien: Genga (Prov. Ancona)

anophthalmus F. Schmidt, Schrift. zool.-bot. Ver. Wien IV, 1854, p. 25, t. 3, f. 1—3 *(Troglorrhynchus)*. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 739; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 226. — Mahler, Verh. zool.-bot. Ver. Wien VI, 1856, p. 11. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschlands 1859, p. 507. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9, 1883, p. 580; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 178. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 449 (subg. *Troglorrhynchus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 240; Bestimm.-Tab. 70, p. 112 (subg. *Troglorrhynchus*). — G. Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LVI, 1924, p. 78. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 870. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 56. — Kärnten (Dobratsch), Krain, Julische und Venetianische Alpen, Nordistrien, Cherso

var. *anophthalmoides* Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 240; Best.-Tab. 70, 1914, p. 112. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 56.

Biologie: Joseph, Berl. Ent. Zeitschr. XXV, 1881, p. 238—239. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 47; l. c. XVIII, 1886, p. 287. — Ganglb. Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 25. — Netolitzky, Mittheil. Nat. Ver. Steiermark XLV, 1908, p. 436.

argus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 291; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 239; Bestimm.-Tab. 70, 1914, p. 111 (subg. *Troglorrhynchus).* — Zentral-Kaukasus: Surampaß

baldensis Czwalina, Berl. Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 121 *(Troglorrhynchus);* Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 206 ♀. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 581; Best.-Tab. 9, 1883, p. 179. — Holdhaus, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 255. — F. Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLIII, 1907, p. 471. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 241; Best.-Tab. 70, 1914, p. 113 (subg. *Troglorrhynchus*). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 870. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 56. — Trentino: Monte Baldo, Cima Trombea, Lorina-Tal

camaldulensis Rottenb. Berl. Ent. Zeitschr. XIV, 1870, p. 40 *(Troglorrhynchus).* — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 363; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 581; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 179. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 451 (subg. *Troglorrhynchus).* — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 242; Bestimm.-Tab. 70, 1914, p. 114. — F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. XI, 1932, p. 17—19. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 870. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 56. — Mittelitalien: Camaldoli bei Neapel

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 47; l. c. XVIII, 1886, p. 287.

celejensis Müller, Boll. Soc. Ent. Ital. LVI, 1924, p. 78 (subg. *Troglorrhynchus*). — Nord-Jugoslavien: Celje

Doderoi A. F. Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXV, 1903, p. 166 ♂ *(Troglorrhynchus).* — Porta, Riv. Col. Ital. LII, 1904, p. 154 ♂ ♀; Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 55. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 240; Bestimm.-Tab. 70, 1914, p. 112 (subg. *Troglorrhynchus);* Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 44. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 870. — Sardinien: Höhle bei Turritas (Golfo Aranci)

Doriae A. F. Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXV, 1903, p. 168 *(Troglorrhynchus).* — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 242; Bestimm.-Tab. 70, 1914, p. 114. — Zante

Giaquintoi F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. XI, 1932, p. 17 ♂ ♀ *(Troglorrhynchus).* — Lazio: Mte. Scalambra

Grenieri Allard, Abeille V, 1869, p. 472 *(Troglorrhynchus).* — Crotch, Synops. Col. Eur. 1871, p. 40. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 363 (III); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 581; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 179. — A. F. Solari, Bull. — Corsica (Porto Vecchio Omessa), Nizza

Soc. Ent. Ital. XXXV, 1903, p. 166. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 240; Bestimm.-Tab. 70, 1914, p. 112 (subg. *Troglorrhynchus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 32, 34; Curc. Gall.-Rhén. p. 150, 152 *(Troglorrhynchus)*. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 870. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 55.

nicaeicivis Gozis, Miscell. Ent. III, 1895, p. 80. — Deville, Cat. Col. Corse 1914, p. 440.

poster Mars. Abeille X, 1872, p. 449.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 47; l. c. XVIII, 1886, p. 287.

Hummleri Flach, Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 245 ♂ ♀ *(Troglorrhynchus)*. — A. F. Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. XL, 1908, p. 267. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 240; Bestimm.-Tab. 70, 1914, p. 112. — A. F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. XI, 1932, p. 21 (subg. *Troglorrhynchus*). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 870. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 56. — Italien: Mte. Conero bei Ancona

Biologie: Paganetti-Hummler, Ill. Zeitschr. f. Ent. IV, 1899, p. 378—379; Verh. zool.-bot. Ges. Wien LI, 1901, p. 405.

inaliparum Rost, Ent. Nachricht. XIX, 1893, p. 342 *(Troglorrhynchus)*. — West-Kaukasus: Circassien

intermedius Hustache, Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc III, 1923, p. 66 *(Troglorrhynchus)*. — Marokko

latirostris Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. III, 1871, p. 37, t. 1, f. 2, 3, 5 *(Troglorrhynchus)*. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 581; Best.-Tab. 9, 1883, p. 179. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 240; Bestimm.-Tab. 70, 1914, p. 112 (subg. *Troglorrhynchus*). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 870. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 56. — Italien: Siena (Montagnola Senese)

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 47; l. c. XVIII, 1886, p. 287.

Laurae A. F. Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLIII, 1907, p. 470. — F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1932, p. 22—23 (subg. *Troglorrhynchus*). — Porta, Riv. Col. Ital. VI, 1908, p. 153. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 241; Bestimm.-Tab. 70, 1914, p. 113. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 870. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 56. — Italien: Insel Giglio

Leonii A. F. Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. XL, 1908, p. 265, 267 (subg. *Troglorrhynchus*). — Porta, Riv. Col. Ital. VIII, 1910, p. 65. — Italien: Abruzzo (Celano)

Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 242; Bestimm.-Tab. 70, 1914, p. 114. — Luigioni, Mem. Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 870. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 57.

Mairei Peyerimh. Bull. Soc. Ent. France 1913, p. 474 ♂ ♀ f. 2—3. — Algerien (Djurdjura), Höhle Ifri bou-Amane

majusculus F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. X, 1932, p. 20 ♀. — Italien: Lazio (Filettino)

Martini Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) II, 1862, p. 555 *(Troglorrhynchus)*. — Bellevoye, Ann. Soc. Ent. France (4) III, 1863, p. 178, t. 3, f. 8. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 363; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 580; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 178. — Marseul, Abeille X, 1871, p. 450. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 242; Best.-Tab. 70, 1914, p. 114. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 32, 33 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 150, 151). — Hoffmann, Bull. Soc. Ent. France 1933, p. 200. — Ost-Pyrenäen: Villefranche-Höhle

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 47; l. c. XVIII, 1886, p. 287.

Mayeti Fairm. Ann. Soc. Ent. France 1878, Bull. p. CXXXII *(Troglorrynchus)*. — Reitter, Verh. Naturf. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 242; Best.-Tab. 70, 1914, p. 114. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 32, 33 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 150, 151). — Hoffman, Bull. Soc. Ent. France 1933, p. 200. — Ost-Pyrenäen: El Pey Höhle bei Arles-sur-Tech

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 47; l. c. XVIII, 1886, p. 287.

microphthalmus A. F. Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. XL, 1908, p. 264 (subg. *Troglorrhynchus*). — Porta, Riv. Col. Ital. VIII, 1910, p. 64. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 242; Bestimm.-Tab. 70, 1914, p. 114 (subg. *Troglorrhynchus*). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 870. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 56. — Abruzzo: Castel di Sangro, Monte Pagano

Moczarskii Breit, Ent. Blätt. LX, 1913, p. 238. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 870. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 56. — Bergamasker Alpen: Oltre il Colle

myops Reitter, Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 31 *(Troglorrhynchus)*; Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 239; Best.-Tab. 70, 1914, p. 111 (subg. *Troglorrhynchus*). — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883); p. 580; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 178. — Kaukasus: Letschgum

planophthalmus Heyden, Ent. Reise südliche Spanien 1870, p. 151. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 352 (III); l. c. XVII, 1873, p. 273; Abeille XI, 1873, p. 780; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 579; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 177. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 241; Bestimm.-Tab. 70, 1914, p. 113 (subg. *Troglorrhynchus*). — Spanien: Sierra Nevada

sardous A. F. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. 1932, p. 22 ♂ ♀. — Sardinien: Lula

Stolzi Holdhaus, Münch. Kol. Zeitschr. III, 1908, p. 311 (*Troglorrhynchus*). — Fiori, Riv. Col. Ital. VI, 1908, p. 211. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 242; Best.-Tab. 70, 1914, p. 114. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 870. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 56. — Toscana: Mte. Argentario bei Orbetello

terricola Linder in Grenier, Cat. Col. France 1863, p. 109; Ann. Soc. Ent. France (4) III, 1863, p. 484, t. 9, f. 6 (*Troglorrhynchus*). — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 363 (III); Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 580; Best.-Tab. 9, 1883, p. 178. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 451 (subg. *Troglorhynchus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 114. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 32, f. 38 (Curc. Gallo-Rhén. p. 150). — Ost-Pyrenäen

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 47; l. c. XVIII, 1886, p. 287. — Normand, Échange XX, 1904, p. 78.

---

phasma Rottenb. Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 225, t. 8, f. 1, 1a (*Otiorrhynchus*). — Stierl. Mitteil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1883, p. 117 [Best.-Tab. IX] (*Troglorrhynchus*). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 870 (*Troglorrhynchus*). — Porta, Fauna Ital. V, 1932, p. 57 (*Troglorrhynchus*). — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. pars 12, 1932, p. 1431, nr. 1844 (*Otiorrhynchus* inc. sed.). — Sizilien: Nicolosi (Etna)

heteromorphus Rottenb. Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 225 (*Otiorrhynchus*). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 870. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 57. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. pars 12, 1932, p. 1431, nr. 1844 a. — Sizilien: Nicolosi (Etna)

Solariola Flach.

Flach, Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 56. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LII, 1913 (1914), p. 239; Best.-Tab. LXX, 1913, p. 111. — A. F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. 1923, p. 51, 57 (Revision).

— Luigioni, Mem. Pontificia Sc. Accad. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 817 (Katal.). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 57.

Solariella Flach, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 318 (non Wood 1843) *(Troglorrhynchus* subgen.). — Fiori, Riv. Col. Ital. III, 1905, p. 218. — Reitter, Fauna Germ. V, 1916, p. 15. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 32, 153 (Curcul. Gallo-rhén. p. 150, 153).

Doderoi A. F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. 1923, p. 55, 57. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 871. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 57. — Sizilien: Castelbuono

Gestroi A. F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. 1903, p. 169 *(Otiorr.* subg. *Troglorrhynchus)*; l. c. 1923, p. 52, 57 *(Solariola)*. — Porta, Riv. Col. Ital. II, 1904, p. 155 *(Otiorr.* subg. *Troglorrhynchus)*; Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 57. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 871 *(Solariola)*. — Süd-Italien: Vallo della Lucania, S. Biase di Ceraso, Monte Sacro; Sicignano (Salerno)

subsp. *hirtula* A. F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. 1923, p. 52. — Flach, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 318. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 871. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 57. — Calabria: S. Eufemia d'Aspromonte, Gerace

subsp. *Clermonti* Normand, Bull. Soc. Ent. France 1908, p. 227 (*Troglorr.* subg. *Solariella)*. — Clermont, Echange XXV, 1909, Beil. p. 1. — A. F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. 1923, p. 51, 53 *(Solariola)*. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 32, 35 (Faune Gallo-rhén. p. 150, 153) *(Troglorr.* subg. *Solariella)*. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 57, Note *(Solariola)*. — Süd-Frankreich: Morcens (Landes)

Paganettii Flach, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 318 *(Troglorr.* subg. *Solariella)*. — A. F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. 1923, p. 52, 56, 57 *(Solariola)*. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 871. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 57. — Calabrien: Aspromonte

Flachi Weise in Heyd., Reitt., Weise, Cat. Col. Eur. ed. 2, 1906, p. 608; Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 13 *(Otiorr. Solariella)*. — A. F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. 1923, p. 52.

Vitalei A. F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. 1923, p. 53, 57. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 871. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 58. — Sicilien: Messina

4

Omoiotus Sharp.

Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 95.

ovatus Sharp, l. c. p. 96. — Japan

1

Stomodes Schönh.

Schönh. Disp. meth. Curc. 1826, p. 188; Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 510; l. c. VII, 1, 1843, p. 146. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 327. — Redtenb. Gatt. Deutsch. Käferfn. 1845, p. 40; Fn. Austr. 1849, p. 40, 429; l. c. ed. 2, 1858, p. CXXI, 739; l. c. ed. 3, I, 1874, p. CXXXII, II, 1874, p. 226. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 155, 267. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. Curc. 1854, p. 35. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 450, 499. — Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynch. 1861, p. 10, 332 *(Otiorrhyn.* subg. *Stomodes);* Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 407, 582; Best.-Tab. 9, 1883, p. 7, 180. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 155, Note. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 3, 24; Fn. Balt. ed. 2. 1887—91 (1890), Gatt. p. 155; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 155. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 453. — Bedel, Fn. Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1883), p. 33; (1886), p. 232 *(Brachyrrhinus* subg. *Stomodes).* — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 908, 929. — Wagner, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 257—277 (Revision); in Calwer, Käferb. ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1035, 1044. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 10; Fn. Germ. V, 1916, p. 15, 32. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 36 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 154). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 871. — Porta, Fauna Col. Ital., V, 1932, p. 58.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 47; l. c. XVIII, 1886, p. 288.

angustatus Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 335 *(Otiorrhynchus);* Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 582; Best.-Tab. 9, 1883, p. 180 *(Stomodes).* — Wagner, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 266, 271. — Griechenland

Letzneri Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 375. — Wagner, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 261 (Typeuntersuchung).

convexicollis L. Müller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXX, 1880, p. 226 .— Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 583; Best.-Tab. 9, 1883, p. 181. — Wagner, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 207, 274. — Herzegovina—Bosnien: Mostar, Velezplanina, Sarajevo, Treskavica-Planina

Ganglbaueri Wagner, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 268, 275 ♀. — Rumänien, Krim

gyrosicollis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 146. — Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 429; l. c. ed. 2, 1858, p. 739; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 226. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 267. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. Curc. 1854, p. 35, t. 14, f. 67. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 499. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 25; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 633. — Brisout, Ann. Soc. Ent. France (5) II, 1872, Bull. p. XLVII. — Stierlin, Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 368; Revis. Eur. Otiorrhynchid. 1861, p. 332 — Mittel-Europa: Süd-Deutschland, Frankreich (eingeführt), Alpen, Ostschweiz, Österreich, Krain, Siebenbürgen; Italien:

	(Otiorrhynchus subg. *Stomodes);* Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 582; Best.-Tab. 9, 1883, p. 180. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 454. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 37; (1886), p. 232 *(Brachyrrhinus* subg. *Stomodes).* — Wagner, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 262, 267, 272; in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1045, t. 37, f. 5. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 929, f. 24. — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 32, t. 154, f. 8. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 36 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 154.). — Hardouin, Miscell. Ent. XXXIII, 1931, p. 25—27. — Hoffmann, Bull. Soc. Ent. France 1932, p. 36 (Sexualcharaktere). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 871. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 58.	Venezia Tridentina; Dalmatien, Bosnien: Livno, Sarajevo, Uvac
var. *gracilior*	Brancsik, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 230. — Wagner, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 273.	Karpathen, Ungarn
Leonhardi	Wagner, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 266, 270.	Griechenland: Parnassos
Mülleri	Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 140.	Albanien: Berg Toik
periteliformis	Reitter, Ent. Blätter XI, 1915, p. 161.	Persien
rotundicollis	Friv. Termész. Füzet. IV, 1880, p. 264. — Stierlin, Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 583; Best.-Tab. 9, 1883, p. 181. — Wagner, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 267 ♂ ♀.	Türkei, Rhilo-Dagh, Rhodope Geb.
tolutarius	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 511; l. c. VII, 1, 1843, p. 146. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 327. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynch. 1861, p. 332 *(Otiorrhynchus* subg. *Stomodes);* Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 582; Best.-Tab. 9, 1883, p. 180. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 25. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 25. — Wagner, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 258, 266, 269 ♂ ♀. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 58.	Italien: Sizilien, Puglie (Gargano), Abruzzo (Cerchio), Römisch. Apennin; Kroatien: (Velebit), Herzegovina; Dalmatien (Split); Griechenland (Parnass); Taurien; Armenien; Amurland
puncticollis	Tourn. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. I, 1862—65 (1864), p. 268; Abeille V, 1871, p. 366. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 455. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 582; Best.-Tab. 9, 1883, p. 180. — Wagner, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 259. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 871.	
elongatus	Hochhuth, Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 1847, p. 503 *(Omias).* — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 582; Best.-Tab. 9, 1883, p. 180.	

— Wagner, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 258 (Typeuntersuchung).
Krüperi Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 323. — Wagner, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 259 (Typeuntersuchung).
Amorei Desbr. Frelon XII, 1903—04 (1904), p. 64. — Porta, Riv. Col. Ital. II, 1904, p. 163. — Wagner, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 260. — Holdhaus, Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 350.
9

Stomodesops Reitter.

Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 11; Fauna Germ. V, 1916, p. 15. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 58.

Schaufussi L. Miller, Wien. Ent. Monatschr. VII, 1863, p. 31 *(Otiorrhynchus)*. — Marseul, Abeille IV, 1867, Nouv. Faits, Div. Nr. 14, p. XXIV—XXVI; l. c. XI, 1873, p. 454, 456. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 25 *(Stomodes)*. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 360 ♂ ♀ *(Otiorr.* subg. *Tournieria)*; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 582 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 180 ♂ ♀ *(Stomodes)*. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 11 *(Stomodesops)*. — Luigioni, Mem. Pontificia Sc. Accad. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 871. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 58. — Dalmatien; Herzegovina: Trebinje, Domanovic, Dracevo; Griechenland; Korfu
1

Meiranella Reitter.

Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 11; Fn. Germ. V, 1916, p. 16.

brevisetis Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 11 (s. descr.). — Kaukasus

caucasica Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76 (1876), p. 509 *(Parameira)*; in Schneider & Leder, Verh. Nat. Ver. Brünn XVII, 1878 (1879), p. 21; Beitrag Kaukas. Käferfn. 1879; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 583; Best.-Tab. 9, 1883, p. 181. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 11 *(Meiranella)*. — „
2

Parameira Seidlitz.

Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 3, 26; Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Gatt. p. 155; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 155. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 457. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 3, I, 1874, p. CXXXII; l. c. II, 1874, p. 206. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, 1883, p. 407, 583; Best.-Tab. 9, 1883, p. 7, 181. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 11; Fauna Germ. V, 1916, p. 16.

coronata Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 324; l. c. XVII, 1873, p. 275; Abeille XI, 1873, p. 782; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 461; Best.-Tab. 9, 1883, p. 59. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 43 *(Parameira)*. — Griechenland

Gebleri Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 202. — Ost-Sibirien

Krüperi Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 191. — Griechenland: Ins. Syra

rudis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 147 *(Stomodes)*. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynch. 1861, p. 333 *(Otiorr.* subg. *Stomodes)*; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 584 *(Parameira)*; Best.-Tab. 9, 1883, p. 182. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 26. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 458. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3. II, 1874, p. 226. — Türkei

hispida Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynchid. 1861, p. 163 *(Otiorrhynchus)*. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 252; l. c. XI, 1873, p. 458.

styphloides Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 465; Best.-Tab. 9, 1883, p. 63. — Daniel, Col.-Studien II, 1898, p. 43. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913 (Best.-Tab. 69), p. 102, Note; l. c. XXXIII, 1914, p. 43. — Türkei: Konstantinopel

setosa Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 27 *(Parameira)*. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, 1874, p. 226. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 363; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 584; Best.-Tab. 9, 1883, p. 182. — Türkei

islamita Marseul, Abeille X, 1873, p. 458.

5

Genera exotica.

Agronus G. H. Horn.

G. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, Nr. 96, 1876, p. 63. — J. L. Leconte & G. H. Horn, Class. Col. North Amer. ed. 2, in Smiths. Misc. Coll. XXVI, Nr. 507, 1883, p. 447. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 355; l. c. XLV, 1913, p. 422.

Carri Buchanan, Proc. Ent. Soc. Washington XXXI, 1929, p. 102, figs. — Kanada

cinerarius G. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, Nr. 96, 1876, p. 64 — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 355; l. c. XLV, 1913, p. 422. — Kalifornien

deciduus G. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, Nr. 96, 1876, p. 64. — „

3

Calyptops Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1840, p. 890. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 162. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 2.

granosa Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1840, p. 891. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 162, t. 64, f. 3. — Heyne & Taschenb. Exot. Käfer 1908, p. 225, t. 30, f. 2. — Süd-Afrika, Kap

1

Catergus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 399.

concinnus Boh. in Schönh. l. c. p. 400. — Kafferngebiet

1

Catodryobius Broun.

Broun, Subantarct. Isl. New Zealand I, 1909, p. 108.

Benhami Broun, l. c. p. 110 ♂. — Enderby Ins.

erubescens Broun, l. c. p. 111 ♂. — Carnley Harbour

grandis Broun, l. c. p. 112, t. 3, f. 15. — Disappointment Ins.

tebricus Broun, l. c. p. 110, t. 3, f. 11—13. — Carnley Harbour

vestitus Broun, l. c. p. 109, t. 3, f. 10. — Resnares

4

Diaecoderus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 315.

fortipes Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 39. — Abessinien: Choa

hamaticollis Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 315. — Ostafrika: Tabora

2

Epitimetes Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIX, 1877, p. 143. — Sharp, Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 419. — Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 435.

bicolor Broun, Bull. New Zeal. Instit. I, pars 6—8, 1921, p. 621. — Neu-Seeland

cupreus Broun, Bull. New Zeal. Instit. I, pars 5, 1917, p. 406. — „

densus Broun, Bull. New Zeal. Instit. I, pars 6—8, 1921, p. 622. — „

foveiger Broun, Trans. New Zeal. Instit. XLV, 1913, p. 97; Bull. New Zeal. Instit. I, pars 5, 1917, p. 406. — „

lutosus Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIX, 1877, p. 143. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 435. — NeuSeeland: Christchurch

Wakefieldi Sharp, Trans. Roy. Dubl. Soc. (2) III, 1886, p. 420. — Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1183. — Neu-Seeland

6

Exonastus Broun.

Broun, Bull. New Zealand Instit. I, 1921, p. 622.
amplus Broun, l. c. p. 623. Neu-Seeland
fumidus Broun, l. c. p. 623. ,,
2

Getopsephus Broun.

Broun, Trans. New Zealand Instit. XLV, 1913, p. 106.
acuminatus Broun, Trans. New Zealand Instit. XLV, 1913, p. 107. Neuseeland
costifer Broun, Bull. New Zealand Instit. I, 1921, p. 558. ,,
funestus Broun, l. c. p. 558. ,,
3

Helicorhynchus Olliff.

Olliff in Whymper, Travels Great Andes, Suppl. App. 1891, p. 61.
vulsus Olliff, l. c. p. 62. Ecuador: Pichinda, Chimborazo
1

Heterexis Broun.

Broun, Subantarct. Isl. New Zealand I, 1909, p. 113.
laeviusculus Broun, l. c. p. 114 ♂ ♀. Adams Insel
sculptipennis Broun, l. c. p. 114. ,,
2

Homodus Broun.

Broun, Man. New Zealand Col. II, 1881, p. 703.
fumeus Broun, l. c. p. 703. New Zealand: Parua
1

Hygrochus Broun.

Broun, Man. New Zealand Col. II, 1881, p. 702.
cordipennis Broun, Bull. New Zealand Instit. I, 1910, p. 59. Neuseeland
granifer Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 58. ,,
illepidus Broun, Man. New Zealand Col. 1893, p. 1220. ,,
monilifer Broun, Bull. New Zealand Instit. I, 1921, p. 625. ,,
oculatus Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XII, 1893, p. 292. ,,
oscitans Broun, Man. New Zealand Col. II, 1881, p. 702 (Genotypus). ,,
scutellaris Broun, Bull. New Zealand Instit. I, 1914, p. 121. ,,
verrucosus Broun, Man. New Zealand Col. 1893, p. 1220. ,,
8

Hyphantus Germar.

Germar, Ins. Spec. Novae I, 1824, p. 334. — Schönh. Disp. meth. Curc. 1826, p. 207; Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 637; l. c. VII, 1, 1843, p. 408. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 331. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 106. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 160. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 282; Otiorrhynchid. 1868, p. 2. — Desbr. Frelon II, 1892, p. 12—19.

argentinensis Hustache, An. Mus. Nac. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 156, fig. — Argentinien

baccifer Germ. Ins. Spec. Novae I, 1824, p. 335. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 637; l. c. VII, 1, 1843, p. 408 ♂ ♀. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 331. — Pascoe, Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1886, p. CLII. — Desbr. Frelon II, 1892—93 (1892), p. 15. — Heyne & Taschenb. Exot. Käfer 1903—08 (1908), p. 225, t. 30, f. 1. — Brasilien

var. *t e r e t i r o s t r i s* Desbr. Frelon II, 1892—93 (1892), p. 16, 19.

dehiscens Desbr. l. c. p. 15, 18. — ,,

distinguendus Desbr. l. c. p. 15, 17 ♀. — ,,

maculifer Desbr. l. c. p. 15, 16 ♀. — ,,

sulcifrons Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 410 ♂ ♀. — Desbr. l. c. p. 14, 16. — ,,

uncinatus Desbr. l. c. p. 15, 18. — ,,

verrucifer Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 409 ♂ ♀. — Desbr. l. c. p. 14, 16. — ,,

8

Isaniris J. Thoms.

J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 129. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 179 *(Peritelides)*. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 280, 282; Otiorrhynchid. 1868, p. 3. — Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 516, Note; l. c. p. 518 (Bestimm.-Tab.).

acuticollis Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 124 ♂ ♀. — Deutsch-Ost-Afrika

ater Mshl. Bull. Ent. Research XI, 1920, p. 273, t. 7, f. 1. — Rhodesia

australis Mshl. Mem. Mus. Zool. Univ. Coimbra (I) nr. 81, 1935, p. 15. — Portug. Ost-Afrika

bidentulus Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 517, 519 ♀. — Gabun, Kongo

centropus Mshl. Bull. Ent. Research XXV, 1934, p. 496. — Tanganyika

cognatus Mshl. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 239. — Kongo

costulatus J. Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 130. — Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 518 (? *Systates*). — Gabun

cribripennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 227. — Madagascar

Gerstaeckeri Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 517 ♂ ♀. — Heller, Ent. Tidskr. XXV, 1904, p. 163. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 22. — Kamerun

hamaticollis Hustache, Sbornik ent. odd. Nár. Mus. Praze IX, 1931, p. 69; Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 268. — Belg. Kongo

subsp. *tibialis* Hust. Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 268.
subsp. *mimetis* Hustache, l. c. p. 269.

lanipes Hustache, Voy. Babault Afr. Or. Angl. 1921, p. 24. — Brit. Ost-Afrika
pilipes Hustache, Rev. Zool. Afr. XI, 1923, p. 157. — Belg. Kongo
pusillus Hustache, l. c. p. 156. — Mshl. Bull. Ent. Research XVIII, 1927—28, p. 259. — Belg. Kongo, Uganda
Biologie: Mshl. l. c. (Futterpflanze).
Seydeli Hustache, Sbornik ent. odd. Nár. Mus. Praze IX, 1931, p. 68 ♀; Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 267 ♂. — Belg. Kongo
sinuatus Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 518, 519. — Gabun
spinithorax Hustache, Sbornik ent. odd. Nár. Mus. Praze IX, 1931, p. 67. — Ost-Afrika
Thomsoni Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 516, 518 ♂ ♀. — Heller, Ent. Tidskr. XXV, 1904, p. 163. — Gabun, Kongo, Kamerun
trapezicollis Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 124, Note ♂. — Abessinien
veterator Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 268. — Ruwenzori
viridimicans J. Thoms Arch. Ent. II, 1858, p. 130. — Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 518, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 22. — Gabun, Kongo, Kamerun

20

Lepydnus Champ.

Champ. Trans. Linn. Soc. London XVI, 1914, p. 396.

nepenthicola Champ. l. c. p. 397, t. 22, f. 2. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 499. — Seychellen

1

Mitophorus Gerst.

Gerst. Monatsber. Akad. Wiss. Berlin 1855, p. 84; v. Decken's Reise III, 2, 1873, p. 221. — Lacord. Hist. Nat. Ins. Col. VI, 1863, p. 57. — Aurivillius in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru Exped. VII, Nr. 21, 1910, p. 418. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 72.

acerbus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 226 ♂ ♀. — Togo: Bismarckburg
aeneipennis Gerst. Arch. Naturg. XXXVII, 1871, I, p. 69. — Endara
globosus Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 778. — Somaliland
gravidus Gerst. Jahrb. Wiss. Anstalt. Hamburg I, 1884, p. 117. — Auriv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru Exped. VII, Nr. 21, 1910, p. 418. — Massai, Kilimandjaro
humerosus Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXII, 1892, p. 779. — Somaliland
inflatus Gerst. Arch. Naturg. XXXVII, 1871, I, p. 69. — Endara

longirostris Hustache, Voy. Alluaud & Jeann. Afr. Or. XIX, 1929, p. 440 ♂ ♀ *(Systates)*. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 515 *(Mitophorus)*. — Kilimandjaro

pilosus Hust. Voy. Babault Afr. Or. Angl. 1921, p. 16, fig. — Engl. Ostafrika

pruinosus Gerst. Monatsber. Akad. Wiss. Berlin 1855, p. 84; in Peters' Reise Mossambique 1862, p. 312, t. 18, f. 12. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 58. — Mossambique

rugosicollis Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894 (1895), p. 398. — Somaliland

semiaeneus Gerst. Jahrb. Wiss. Anstalt. Hamburg I, 1884, p. 58. — Aurivillius in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru Exped. VII, Nr. 21, 1910, p. 418. — Massai, Kilimandjaro

sulciscapus Auriv. l. c. p. 418. — Meru Niederung: Ngare na nyuki

vittatus Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XI, 1871, p. 154, t. 6, f. 5. — Weißer Nil

13

Paragraphus Blatchley & Leng.

Blatchley & Leng, Rhynchophora North East America 1916, p. 108—109.

setosus Blatchley & Leng, h. c. p. 110. — Hog Island bei Dunedin (Fla)

1

Phaeocharis Broun.

Broun, Trans. New Zealand Instit. XLV, 1913, p. 104.

cuprealis Broun, l. c. p. 105. — Neuseeland

punctatus Broun, l. c. p. 105. — „

2

Phlyctinus Schönh.

Schönh. Disp. Meth. Curc. 1826, p. 196 *(Peritelus* subg. *Phlyctinus)*, p. 194 *(Per.* subg. *Pyctoderes)*; Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 522; l. c. VII, 1, 1843, p. 159. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 164. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 282; Otiorrhynchid. 1868, p. 2.

agrestis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 524 *(Phlyctinus)*; l. c. VII, 1, 1843, p. 161. — Kap

callosus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 523; l. c. VII, 1, 1843, p. 160. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 164. — Lea, Proc. Linn. Soc. New South Wales LV, 1930, p. 467. — Kap, Transvaal, Australien

tottus var. 2 Sparrm. Vet. Ak. Nya Handl. VI, 1785, p. 20.

Biologie: Lounsburg, Agric. Journ. Cape Good Hope XXXVII, 1910, p. 448—450, fig. — Reh in Sorauer, Handb. d. Pflanzenkrankh. III, 1906—1913 (1912), p. 543 (Schädlich an Reben in Süd-Afrika).

2

Pseudocratopus Hustache.

Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXIX, 1921, p. 175.

costulatus Hustache, l. c. p. 176, t. 6, f. 5. — Réunion

minutus Hustache, l. c. p. 177, t. 6, f. 1. — „
2

Sciobius Schönh.

Schönh. Disp. meth. 1826, p. 197; Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 534; l. c. VII, 1, 1843, p. 192. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. 1840, p. 328. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 163. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 3. — Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906, I, p. 236—276, t. 18, 19 (Monographie).

Siteytes Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 395 (nec Lacord.). — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 70, 231. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VI, 1930, p. 572.

aciculatifrons Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 198. — Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906, I, p. 241, 256 ♂. — Natal, Kapkolonie

albicinctus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 396 *(Siteytes)*. — Kapland

albiceratus Boh. l. c. p. 397 (err.).

geniculatus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 122 *(Sciobius)*; Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 70.

angustus Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906, I, p. 242, 267 ♂, t. 19, f. 2. — Transvaal: Shilouvane

Arrowi Mshl. l. c. p. 242, 271, t. 19, f. 10. — Natal

asper Hesse, Trans. Roy. Soc. South Afr. XVI, 1928, p. 166. — Kapland

Barkeri Mshl. Proc. Roy. Soc. London 1906, I, p. 241, 257 ♂ ♀, t. 19, f. 8. — Natal: Malvern

bistrigicollis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 202. — Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906, I, p. 241, 251 ♂ ♀. — Natal: Malvern, Umkomaas River, Durban, Umbilo

brevicollis Fåhrs. Oefv. Vet.-Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 29. — Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906, I, p. 241, 249 ♂ ♀. — Kaffern-gebiet; Natal, Zululand, Transvaal

cinereus Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906, I, p. 240, 244 ♂ ♀, t. 18, f. 3. — Kapkolonie: Knysna; Transkei: Kentani

cognatus Mshl. l. c. p. 241, 247 ♂ ♀, t. 18, f. 6. — Natal: Estcourt, Drakensberg

cultratus Mshl. l. c. p. 240, 243 ♂ ♀, t. 18, f. 1. — Natal: Durban, Pinetown, Maritzburg

dealbatus Fåhrs. Oefv. Vet.-Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 28. — Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906, I, p. 241, 246 ♂. — Kaffern-gebiet; Natal: Durban

granipennis	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 200. — Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906, I, p. 241, 252 ♂ ♀.	Pondoland: Port St. John
	deplanatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 201.	Kap
granosus	Fåhrs. Oefs. Vet. Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 27 ♂ ♀. — Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906, I, p. 240, 243 ♂ ♀.	Kafferngebiet; Natal: Estcourt, Ober-Tongaart, Durban, Maritzburg, Zululand: Eshowe
griseus	Gyllh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 536; l. c. VII, 1, 1843, p. 195. — Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906, I, p. 241, 258.	Kapkolonie: Uitenhage, Bedford, Grahamstown, Somerset East, Tsomo
Horni	Mshl. l. c. p. 242, 272 ♂ ♀, t. 19, f. 11.	Natal: Charlestown
impressicollis	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 199. — Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906, I, p. 241, 249 ♀.	Kap
lateralis	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 201. — Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906, I, p. 241, 254.	,,
latipennis	Fåhrs. Oefv. Vet.-Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 30. — Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906, I, p. 241, 255 ♀.	Kafferngebiet
marginatus	Fåhrs. Oef. Vet.-Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 28 ♂. — Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906, I, p. 242, 261 ♂.	Natal: Malvern, Howick
muricatus	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 193. — Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906, I, p. 242, 266.	Kap
nanus	Mshl. l. c. p. 242, 270 ♀, t. 19, f. 8.	Kapkolonie: Somerset East
obesus	Mshl. l. c. p. 241, 245 ♂ ♀, t. 18, f. 2.	Natal: Colenso, Frere, Transvaal: Leydenburg
Oneili	Mshl. l. c. p. 241, 252 ♀, t. 18, f. 5.	Kapkolonie: Grahamstown
opalinus	Mshl. l. c. p. 241, 248, t. 18, f. 4.	Natal: Malvern, Howick
paivanus	Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) IX, 1862, p. 22. — Paiva, Gazetta med. Lisboa 1862, Nr. 11 Rev. Zool. 1862, p. 362. — Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906, I, p. 275.	Angola

panzanus	Mshl. l. c. p. 242, 268 ♂, t. 19, f. 4.	Natal: Umpanzi River
Peringueyi	Mshl. l. c. p. 242, 263, t. 18, f. 11.	Transvaal: Leydenburg
planipennis	Mshl. l. c. p. 241, 253 ♂ ♀, t. 18, f. 7.	Natal: Ifafa Mouth; Pondoland: Port St. John
pollinosus	Fåhrs. Oefv. Vet.-Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 29. — Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906, I, p. 242, 260.	Natal: Howick
pondo	Mshl. l. c. p. 242, 264 ♂ ♀, t. 19, f. 3.	Pondoland: Port St. John
prasinus	Mshl. l. c. p. 242, 270 ♂ ♀, t. 19, f. 5.	Natal: Pinetown, Howick, Eastcourt
pullus	Sparrm. Vet.-Ak. Nya Handl. VI, 1785, p. 56, t. 3, f. 8 *(Curculio)*. — Gyllh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 537; l. c. VII, 1, 1843, p. 196 *(Sciobius)*. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 328. — Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906, I, p. 242 ♂ ♀.	Kapkolonie: Uitenhaage, Port Alfred, Kowie, Grahamstown; Pondoland: Port St. John
	♂ *cinctus* Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 196 *(Sciobius)*.	Kap
	♂ *ovarius* Boh. l. c. p. 197 *(Sciobius)*.	Kap, Kaffern-gebiet
scapularis	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 195. — Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906, p. 241, 258 ♂ ♀.	Kapkolonie; Grahamstown
Schönlandi	Mshl. l. c. p. 242, 268 ♀, t. 19, f. 6.	Kapkolonie
spatulatus	Mshl. l. c. p. 242, 262, t. 18, f. 10.	Natal: Unter-Tugela
subnodosus	Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) IV, 1869, p. 416; in Mell, St. Helena 1875, p. 155, t. 23, f. 4; Col. St. Helena 1877, p. 171.	St. Helena
tenuicornis	Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906, I, p. 241, 255 ♀, t. 18, f. 9.	Natal; Zululand: Eshowe
tottus	Sparrm. Vet.-Ak. Nya Handl. VI, 1785, p. 50, t. 2, f. 21 *(Curculio)*. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1793. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 535; l. c. VII, 1, 1843, p. 193 *(Sciobius)*. — Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906, I, p. 242, 265 ♂ ♀.	Kapkolonie; Grahamstown, Orange River, Bloemfontain
	porcatus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 535; l. c. VII, 1, 1843, p. 193 *(Sciobius)*.	Kap
viduus	Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906, I, p. 242, 264 ♀, t. 19, f. 1.	Transvaal
viridis	Mshl. l. c. p. 242, 269 ♂ ♀, t. 19, f. 7.	„

vittatus Mshl. l. c. p. 242, 271 ♂, t. 19, f. 8. Transvaal
Wahlbergi Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 438. — Heyne & Taschenberg, Exot. Käfer 1903—08 (1908), p. 225, t. 30, f. 3. — Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906, I, p. 242, 273. Port Natal
43

Sciopithes G. H. Horn.

G. H. Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, Nr. 96, 1876, p. 62. — J. L. Leconte & G. H. Horn, Class. Col. North Amer., ed. 2, in Smiths. Misc. Coll. XXVI, Nr. 507, 1883, p. 447. — Casey, Ann. New York Ac. Sc. IV, 1888, p. 254. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 354; l. c. XLV, 1913, p. 422.

angustulus Casey, Ann. New York Ac. Sc. IV, 1888, p. 254, 257. Kalifornien
arcuatus Casey, l. c. p. 254, 257. „
brumalis Casey, l. c. p. 254, 256. „
obscurus G. H. Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, Nr. 96, 1876, p. 63. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 422. Kalifornien, Oregon, Vancouver
setosus Casey, Ann. New York Ac. Sc. IV, 1888, p. 254, 258. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 355. Kalifornien
significans Casey, l. c. p. 254, 255. „
6

Zenagraphus Broun.

Broun, Bull. New Zealand Instit. I, 1914, p. 326.
metallescens Broun, l. c. p. 327. Neuseeland
1

2. Tribus: Peritelini.

Otiorrhynchides gr. *Péritelides* Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 145, 178.
Otiorrhynchides s. str. Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 1 (pars).
Otiorrhynchini gr. *Periteli* J. L. Leconte, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 58, 65; Smiths. Misc. Coll. XXVI, 1883, p. 446, 447.
Peritelinae Casey, Ann. New York Ac. IV, 1888, p. 268—269.
Otiorrhynchinae trib. *Peritelini* Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 9, 11; Fn. Germ. V, 1916, p. 15, 32.
Brachyrhininae trib. *Simoini* Pierce, Proc. U. S. Nat. Museum XLV, 1913, p. 423 (pars).
Otiorrhynchinae trib. *Otiorrhynchini* Blatchley & Leng, Rhynchophora North East America 1916, p. 98, 108 (pars).
Otiorrhynchinae trib. *Peritelini* Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 37 (Curcul. Gallo-rhén. p. 155); Bull. Soc. Ent. Egypte 1935, p. 200.
Otiorrhynchinae trib. *Peritelini* Porta Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 14, 59.

Caenopsis (Först.) Bach.

(Först.) Bach, Käferfn. II, 1852—54, p. 155 *(Caenopis)* p. 268 *(Caenopsis)*. — Redtenb. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. CXX, p. 741 *(Coenopsis)*; l. c. ed. 3, I, 1874, p. CXXXII; l. c. II, 1874, p. 227. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 450, 500 *(Caenopsis)*. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 183 *(Coenopsis)*. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 3, 33; Fauna Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Gatt. p. 155; Fauna Transylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 155. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 97. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1883), p. 33, 38; (1886), p. 234; 1888), p. 423 *(Caenopsis)*. — Stierlin, Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 407 *(Caenopsis)*; Best.-Tab. 9, 1883, p. 5, 182 *(Coenopsis)*. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 172, 187 *(Caenopsis)*. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 534, 536. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 551, 572. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 908, 929. — Reitter, Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 11; Fauna Germ. V, 1916, p. 32, 33. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1035, 1045. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 37 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 155); Bull. Soc. Ent. Égypte 1935, p. 202 (Arten aus Nordafrica). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 59.

Cataphorticus Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. Curcul. 1854, p. 216, 235. — Ber. Ent. 1854, p. 73. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1883), p. 38.

brevisetis Desbr. Frelon V, 1895—96 (1895), p. 26. — Hustache, Bull. Soc. Ent. Égypte 1935, p. 203, Note 4. — Portugal

confusus Hustache, Bull. Soc. Ent. Égypte 1935, p. 203, 204. — Marocco

fissirostris (Schönh.) Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XIX, 1847, p. 452 *(Trachyphloeus?)*; Brit. Ins. Fam. Curc. 1844—52 (1852), p. 94. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 500 *(Caenopsis)*. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 34 *(Coenopsis)* — Marseul, Abeille X, 1872, p. 97. — Stierlin, Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 584; Best.-Tab. 9, 1883, p. 182. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 39; (1886), p. 234. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 187; l. c. VI, 1913, p. 305. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 536. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 572. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 930. — Wagner in Calwer, Käferb. ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1045. — Reitter, Fauna Germ. V, 1916, p. 33. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 39 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 157), fig. 35, 36. — England und Ireland (Süd); Belgien: Mont Noir bei Ypres, forêt la Houssière; Deutschland: Rheintal (Crefeld), Westfalen; Frankreich; Portugal: Correa de Baros

Bachi (Först.) Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 269.

impressicollis Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. X, 1898—1903 (1899), p. 197 *(Otiorrhynchus)*. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 105, Note; Best.-Tab. 69, 1913, p. 105. — Frankreich

Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. France 1873, p. 80; Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.)

XXIII, 1876 (1877), p. 222; Larves Col. 1877, p. 382. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 48; l. c. XVIII, 1886, p. 288.

Formaneki Leonhard, Ent. Mitteil. I, 1912, p. 338. — Portugal: Lissabon

Larraldi Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) IV, 1857, p. 140 *(Trachyphloeus)*. — Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 140 *(Caenopsis)*. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 34 *(Coenopsis)*. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 97, 98 ♂ ♀. — Bedel, Faun. Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1883), p. 39, Note. — Stierlin, Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 584; Best.-Tab. 9, 1883, p. 182. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 39 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 157). — Süd-Frankreich, Algerien

rigidus Rey, Echange X, 1894, p. 138. — Landes

maroccanus Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLI, 1904, p. 525. — Hustache, Bull. Soc. Ent. Égypte 1935, p. 203. — Tanger

Peyerimhoffi Hustache, Bull. Soc. Ent. Égypte 1935, p. 203, 204. — „

Pici Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 175; l. c. VI, 1897—98 (1897), p. 33, Note. — Hustache, Bull. Soc. Ent. Égypte 1935, p. 203, 204. — Algerien, Kabylien

var. *angustior* Pic, Echange XXII, 1906, p. 3. — Hustache, l. c. p. 202, 204. — Yakouren

Reichei Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XVII, 1874, Compt. rend. p. LXXXIX. — Stierlin, Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 584; Best.-Tab. 9, 1883, p. 182. — Hustache, Bull. Soc. Ent. Égypte 1935, p. 203. — Spanien: Andalusien; Algeciras; Portugal, Sizilien

brevisetis Desbr. Frelon V, 1895—96 (1895), p. 26.

Waltoni Boh. in Schönh. Gen. Spec. VII, 1, 1843, p. 115 *(Trachyphloeus)*; l. c. VIII, 1, 1844, p. 440. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XVII, 1847, p. 219; Brit. Ins. Fam. Curc. 1844—52 (1852), p. 81; Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 343. — Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) X, 1862, p. 335; Col. Atlant. 1868, p. 328 *(Coenopsis)*. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 33, 35. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 97, 98. — Bedel, Fn. Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1883), p. 39; (1886), p. 234 *(Caenopsis)*. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 584; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 182. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 187; l. c. VI, 1913, p. 305. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 573. — Standen, Lancashire Natural. II, 1909, p. 84. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 929, f. 126 b. — Reitter, Fauna Germ. V, 1916, p. 33. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 39 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 157). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 59. — Britannien, N. Frankreich, Holland, Belgien, Rheinpreußen, Sardinien, Madeira, Spanien (Pozuelo de Calatrava)

maderiensis Pic, Echange XXII, 1906, p. 3.
ventricosus Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 122; Man. Brit. Col. 1839, p. 244.
Biologie: Bauduer, Pet. Nouv. Ent. 1869, p. 13. — Marseul, Abeille XI, 1872, p. 98. — Perris, Ann. Soc. Ent. France 1873, p. 80. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 48; l. c. XVIII, 1886, p. 288.
10

Homorhythmus Bedel.

Bedel, Faune Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 38; (1886), p. 232. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. 2, 1887—91 (1889), Arten p. 578; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 634. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1912, p. 5 (Best.-Tab. LVI) (*Otiorr.* subg.); Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 72 (Best.-Tab. LXIX) (*Otiorr.* subg.); Fauna Germ. V, 1916, p. 21 (*Otiorr.* subg.). — A. F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 54. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCII, 1923, p. 21, 81 (Curcul. Gallo-Rhén.). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 60, Note 1. — Hustache, Bull. Soc. Ent. Égypte 1935, p. 201, 204 (eigene Gattung).

astragali Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynchus 1861, p. 130 ♂ ♀ *(Otiorrhynchus)*; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 586, 596; Best.-Tab. 9, 1883, p. 184 *(Peritelus* subg. *Peritelus)*. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 290, 338, 346 *(Peritelus* subg. *Peritelus)*; Monogr. Peritelus 1866, p. 18, 66, 74. — Marseul, Abeille XI, 1872, p. 38, 47 *(Peritelus* subg. *Peritelus)*. — A. F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 56. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Scienze Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 871. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 28. — Sardinien: Laconi, Sadali, Seui

var. *montanus* A. F. Solari, l. c. p. 56. — Luigioni, l. c. — Sardinien: Gennargentu

Cremieri Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 363 *(Otiorrhynchus)*. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynch. 1861, p. 132 (Berl. Ent. Zeitschr. 1861); Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 587, 598; Best.-Tab. 9, 1883, p. 185 *(Peritelus* subg. *Peritelus)*. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 291, 338, 339 ♂ ♀ *(Peritelus* subg. *Peritelus)*; Monogr. Peritelus 1866, p. 19, 66, 67 ♂ ♀. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 38, 51 ♂ ♀. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 74 (Best.-Tab. LXIX). — A. F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 59. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCII, 1923, p. 23, 82 (Curcul. Gallo-Rhén.) (*Otiorr.* subg.). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 871. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 28. — Süd-Frankreich; Monaco; Italien: Piemonte, Toscana, Lazio, Campania, Sicilia; Balearen

grandis Desbr. Ann. Soc. Ent. France (6) VIII, 1888, Bull. p. CCVI. — A. F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 55. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 871. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 28. — Italien: Campania (Cava de Tirreni, Anguissola), Sizilien (Madonie, Nebrodi)

nebrodensis Daniel in litt. (cf. Solari l. c.).

planidorsis Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 73 (Best.-Tab. LXIX) (non Seidlitz).

hirticornis Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 327, t. 85, f. 14 *(Curculio)*. — Paykull, Fauna Suec. III, 1800, p. 458. — Gyllenh. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 287; in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 618 *(Otiorrhynchus)*; l. c. VII, 1, 1843, p. 360. — Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 425; l. c. ed. 2, 1858, p. 746; l. c. ed. 3, 1874, p. 211 (subg. *Otiorrhynchus*). — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 271, 277. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 290; Revis. Eur. Otiorrhynch. 1861, p. 132 *(Otiorrhynchus)*; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 586, 597; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 184 *(Peritelus* subg. *Peritelus)*; Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 231 *(Peritelus)*. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 291, 338, 343 ♂ ♀, t. 4, f. 13; Monogr. Peritelus 1866, p. 19, 66, 71 ♂ ♀, tab., f. 13 *(Peritelus* subg. *Peritelus)*; Fauna Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 574; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 634 *(Peritelus* subg. *Homorhythmus)*. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 123; l. c. X, 1868, p. 173, 174. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 38, 48 *(Peritelus* subg. *Peritelus)*. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 38; (1886), p. 232 *(Peritelus* subg. *Homorhythmus)*. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 535 *(Peritelus)*. — Méquignon, Bull. Soc. Ent. France 1902, p. 238 (Frankreich). — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 571, 572 *(Peritelus* subg. *Homorhythmus)*. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 930, f. 127a, d. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 75 (Best.-Tab. LXIX); Fauna Germ. V, 1916, p. 21, t. 154, f. 10 *(Otiorrhynchus)*. — A. F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 58 *(Peritelus* subg. *Peritelus)*. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCII, 1923, p. 23, 85 *(Otiorrhynchus)*. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 871. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 29. — Europa

simo Oliv. Entom. V, 1807, p. 361, t. 31, f. 472 *(Curculio)*.

variegatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 360 *(Otiorrhynchus)*.

— Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 291; Rev. Eur. Otiorrhynch. 1861, p. 132; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 231 *(Peritelus)*.

♀ *depubes* Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 361 *(Otiorrhynchus)*. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 292; Rev. Eur. Otiorrhynch. 1861, p. 132.

var. *setulifer* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 75 (Bestimm.-Tab. LXIX). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCII, 1923, p. 86 (Curc. Gallo-Rhén.). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 871. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 29. — Cottische und Seealpen

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 49; l. c. XVIII, 1886, p. 289. — Bourgeois, Mitteil. Ent. Ges. Colmar VIII, 1905—06 (1906), p. 210. — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 53.

ignoratus A. F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 57 ♂ ♀. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 871. — Porta, Fauna Col. Ital. V,, 1932, p. 29. — Sardinien: Laconi, Sadali

juniperi Desbr. Ann. Soc. Ent. France (6) VIII, 1888; Bull. p. CCV. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 74 (Best.-Tab. LXIX). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 871. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 28. — Sardinien: Capo Caccia

sardonius Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 74 (Best.-Tab. LXIX). — A. F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 56.

kabylianus Pic, Miscell. Ent. IV, 1896, p. 113. — Hustache, Bull. Soc. Ent. Égypte 1935, p. 205. — Kabylie: Azagza, Yakouren, Djurjura

roseomicans Pic, Bull. Soc. Ent. France 1908, p. 263. — Hustache, l. c. p. 205.

Ottonis Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 74 (Best.-Tab. LXIX). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 871. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 29. — Sardinien: M. Albo

planidorsis Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 291, 338, 341 ♂ ♀; Monogr. Peritelus 1866, p. 19, 66, 69 ♂ ♀ *(Peritelus* subg. *Peritelus)*. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 38, 49 ♂ ♀. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 586, 598; Best.-Tab. 9, 1883, p. 184. — A. F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 55. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCII, 1923, p. 23, 83. — Süd-Frankreich

var. ♂ *subimpressus* Pic, Echange XXXVI, 1920, p. 11.

platysomus Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 290, 329 ♂ ♀; Monogr. Peritelus 1866, p. 18, 57 ♂ ♀ *(Peritelus* subg. *Peritelus)*. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 39, 53 ♂ ♀. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, — ,,

1880—83 (1883), p. 587, 596; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 185. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 72 (Best.-Tab. LXIX) *(Otiorrhynchus* subg. *Homorhythmus)*. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCII, 1923, p. 24, 81 *(Otiorrhynchus* subg. *Homorhythmus)*.

subdepressus Muls. Opusc. Ent. IX, 1859, p. 19. — Rey, Échange X, 1894, p. 138. — Hustache, l. c. p. 81.

quadraticollis Desbr. Frelon XIV, 1905—06 (1905), p. 22. — A. F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 59. — Spanien: Murcia

Schoenherri Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 149 *(Peritelus)*. — Stierlin, Berl. Ent. Zeitschr. II, 1858, p. 362 *(Otiorrhynchus)*; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—1883 (1883), p. 587, 597; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 185 *(Peritelus* subg. *Peritelus)*. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 184, Note *(Peritelus)*. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 291, 338 ♂ ♀; Monogr. Peritelus 1866, p. 19, 66 ♂ ♀ *(Peritelus* subg. *Peritelus)*. — Pascoe, Ent. Monthly Mag. VI, 1869—70 (1869), p. 100, Note *(Peritelus)*. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 38, 52 ♂ ♀ *(Peritelus* subg. *Peritelus)*. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1913, p. 75 (Bestimm.-Tab. LXIX) *(Otiorr.* subg. *Homorhythmus)*. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCII, 1923, p. 23, 84 *(Otiorr.* subg. *Homorhythmus)*. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 871. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 29. — Süd-Frankreich: Provence; Italien: Piemonte

12

Peritelus Germ.

Germ. Ins. Spec. Novae I, 1824, p. 407. — Latr. Fam. Règne anim. 1825, p. 391 („Peritèle"). — Berthold, Natürl. Fam. 1827 *(Peritelus)*. — Schönh. Disp. meth. Curc. 1826, p. 193; Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 511; l. c. VII, 1, 1843, p. 148. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 327. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 106. — Redtenb. Gatt. Deutsch. Käferfn. 1845, p. 139; Fn. Austr. 1849, p. 39, 427; l. c. ed. 2, 1858, p. CXX, 739; l. c. ed. 3, I, 1874, p. CXXXII; II, 1874, p. 227. — Bach, Käfern. II, 1852—54 (1854), p. 155, 268. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 450, 500. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 184. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 271—355; Monogr. Peritelus 1868, 82 pp. tab.; Otiorrhynchid. 1868, p. 3, 27; Fauna Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Gatt. p. 155, Arten p. 578; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 155, Arten p. 634. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 31—96. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 33, 37; (1886), p. 232; (1888), p. 423. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 407, 585; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 5, 183; Fn. Col. Helvet. II, 1886—93 (1891), p. 208, 231. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 255. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 172, 181. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV,

1893, p. 145 (System. Stellung). — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 534, 535. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 551. — Donisthorpe, Ent. Record XVI, 1904, p. 150 (England). — Kuhnt, Ill. Bestimm.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 908, 950, f. 24, C, 25 A. — Wagner in Calwer, Käferb. ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1035, 1045. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Bestimm.-Tab. 68), p. 12; Fauna Germ. V, 1916, p. 21, 33. — Deville, Cat. Col. Corse 1915, p. 412. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 40 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 158). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 872 (Katalog der ital. Arten). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 59.

Centricnemus Stev. Mus. Mosq. II, 1829, p. 94 *(leucogrammus)*.

Pedanus Schönh. in Gemm. & Harold, Cat. Col. VIII, 1871, p. 2280.

Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXII, 1876 (1877), p. 222; Larves Col. 1877, p. 382. — Rupertsberger, Biol. Käfer Eur. 1880, p. 199; Biol. Lit. Käfer Eur. 1891, p. 203. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 48. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 71.

Subgen. **Gymnomorphus** Seidl.

Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 273 (*Peritelus* subg.); Monogr. Peritelus 1866, p. 77; Otiorrhynchid. 1868, p. 27; Fauna Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), Arten p. 578; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 634. — Marseul, Abeille XI, 1872, p. 44. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 585; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 183. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Bestimm.-Tab. 68), p. 12 *(Gymnomorphus)*; Fauna Germ. V, 1916, p. 33. — Wagner in Calwer, Käferb. ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1046 *(Peritelus* subg. *Gymnomorphus)*. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 41 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 159).

nigrans Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) II, 1862, p. 555 *(Peritelus)*. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 290, 349 ♂ ♀ *(Peritelus* subg. *Gymnomorphus)*; Monogr. Peritelus 1866, p. 77 ♂ ♀. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 38, 44 ♂ ♀. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 585; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 183. — Marchal, Tabl. anal. Col. Eur. IX, Curcul. in Miscell. Ent. 1894—96, p. 111. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 12 *(Gymnomorphus)*; Fauna Germ. V, 1916, p. 33. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 41, 45 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 159, 163). — Frankreich: Pyrénées Orientales, Aude

albocoronatus Stierl. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXIX, 1895, p. 74 *(Otiorrhynchus)* Mitth. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1893—97 (1895), p. 299. — Fauvel, Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 114. — A. F. Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLI, 1904, p. 536; Bull. Soc. Ent. Ital. XL, 1908, p. 263.

Subg. **Ctenochirus** Seidl.

Seidlitz, Fauna Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 578; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 634. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1046. — Reitter, Fauna Germ. V, 1916, p. 33. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 60.

leucogrammus Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 408. — Steven, Mus. Mosq. II, 1829, p. 94 *(Centricnemus)*. — Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 517 *(Peritelus)*. — Boh. in Schönh. l. c. VII, 1, 1843, p. 152. — Gebler, Bull. Soc. Nat. Moscou XXI, 1848, p. 360. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 427; l. c. ed. 2, 1858, p. 740; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 227. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 268. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 427. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 500. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 290, 292, t. 4, f. 10 *(Peritelus* subg. *Peritelus)*; Monogr. Peritelus 1866, p. 18, 20, tab. f. 10; Fauna Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 579 *(Peritelus* subg. *Ctenochirus)*; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 634. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 39, 55. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 588, 595; Best.-Tab. 9, 1883, p. 186 *(Peritelus* subg. *Peritelus)*; Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 231 *(Peritelus)*. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 572 *(Peritelus* subg. *Peritelus)*. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 930 *(Peritelus)*. — Wagner in Calwer, Käferb. ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1046 *(Peritelus* subg. *Ctenochirus)*. — Reitter, Fauna Germ. V, 1916, p. 33, t. 154, f. 11 *(Perit.* subg. *Ctenochirus)*. — Scherdlin, Deuxième Suppl. Cat. Col. des Vosges 1920, p. 171. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 42, 46 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 160, 164) *(Peritelus* s. str.). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 872. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 60.

Südost-Mittel- und Süd-Europa, Ost-Frankreich: Strasbourg, Deutschland, Österreich, Ungarn, Podolien, Wolhynien, Rußland, Griechenland, Südsibirien

Biologie: Frauenfeld, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XI, 1861, p. 169 (Metamorphose). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 55. — Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 400. — Redtb. Fauna Austr. ed. 3, 1874, p. 227. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXIII, 1876 (1877), p. 213, 222; Larves Col. 1877, p. 373, 382. — Bargagli, Bull.Soc.Ent.Ital. XVI, 1884, p. 49; l. c. XVIII, 1886, p. 289. — Rupertsberger, Biol. Käfer Eur. 1880, p. 199; Biol. Litt. Käfer Eur. 1894, p. 203. — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 53. — Reitter, Fauna Germ. V, 1916, p. 33.

Subg. **Peritelus** Seidl.

Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 283; Mon. Peritelus 1866, p. 18; Otiorrhynchid. 1868, p. 27; Fauna Balt. ed. 2, 1887—90 (1890), Arten p. 578; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 634. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 37, 45. — Wagner in Calwer, Käferb. ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1046. — Reitter, Fauna Germ. V, 1916, p. 33. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 41, 42 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 159, 160); Bull. Soc. Ent. Égypte 1935, p. 202 (Gattung; Arten aus Nordafrica). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 60.

adusticornis Kiesenw. Ann. Soc. Ent. France (2) X, 1851, p. 635. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 313, 323 ♂ ♀; Monogr. Peritelus 1866, p. 18, 41, 51 ♂ ♀ *(Peritelus* subg. *Peritelus)*. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 41, 76 *(Peritelus* subg. *Peritelus)*. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 591, 596; Bestimm. Tab. 9, 1883, p. 189 *(Peritelus* subg. *Peritelus)*. — Südfrankreich, Spanien (Mont Serrat)

Biologie: Marseul, Abeille X, 1872, p. 76. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 48; l. c. XVIII, 1886, p. 288.

Andreae Desbr. Frelon X, 1901—02, p. 105 ♂ ♀. — Porta, Riv. Col. Ital. I, 1903, p. 86 ♂ ♀; Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 63. — Luigioni, Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 872. — Italien: Bologna

balearicus Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 35. — Balearen

biimpressus Hustache, Bull. Soc. Ent. Egypte 1935, p. 205, 209 ♂. — Algerien: Valmy

familiaris Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 514; l. c. VII, 1, 1843, p. 150 *(Peritelus)*. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 426. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 290, 300, 354, t. 4, f. 13; Monogr. Peritelus 1866, p. 18, 28 ♂ ♀, 82, tab. f. 13; Fauna Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 579; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 634 *(Peritelus* subg. *Peritelus)*. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 39, 62 ♂ ♀. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 589; Best.-Tab. 9, 1883, p. 187. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 60. — Ungarn, Siebenbürgen, Podolien, Serbien, Südrußland, Taurien

var. *famularis* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 514 *(Peritelus)*; l. c. VII, 1, 1843, p. 150. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 426.

Biologie: Sajó, Ill. Wochenschr. f. Ent. I, 1896, p. 293, 309. — Pospelow, Zeitschr. f. Landwirtsch. und Industrie 1906. — Kleine, Ent. Blätter, VI, 1910, p. 53. — Kaufmann, Rovart. Lapok XVII, 1910, p. 69. — Reh in Sorauer, Handb. d. Pflanzenkrankh. III, 1906—13 (1912), p. 543.

flavipennis Jacq. du Val, Ann. Soc. Ent. France (3) II, 1852, p. 413 *(Peritelus)*. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 354; Monogr. Peritelus 1866, p. 82. — Desbroch. Frelon I, 1891, p. 34. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 43, 51, f. 43 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 161, 169). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 872. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 61. — Süd-Frankreich, Italien (Seealpen, Sizilien)

subdepressus Muls. & Rey, Opusc. Ent. IX, 1859, p. 19 *(Peritelus)*. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 290, 313, 318, 354 ♂ ♀; Monogr. Peritelus 1866, p. 18, 41, 46 ♂ ♀ *(Peritelus* subg. *Peritelus)*. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 41, 83 ♂ ♀. — Stierlin, Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 593, 596; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 191.

Leveillei Bris. Ann. Soc. Ent. France (6) III, 1883; Bull. p. VI. — Ardèche

var. *siculus* Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 318, 320; Monogr. Peritelus 1866, p. 46, 48. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 85. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 593; Best.-Tab. 9, 1883, p. 191. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 872. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 61. — Sizilien

globulicollis Seidlitz, Abeille X, 1872, p. 39, 61 *(Peritelus* subg. *Peritelus)*. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 589, 596; Best.-Tab 9, 1883, p. 187. — Südspanien: Alicante

Gougeleti Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 291, 334 ♂ ♀, t. 4, f. 7, 12, 14; Monogr. Peritelus 1866, p. 19, 62 ♂ ♀, tab. f. 7, 12, 14 *(Peritelus* subg. *Peritelus)*. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 40, 74 ♂ ♀; Nouv. Faits 1872, p. CXXXIX. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 590—597; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 189. — Andalusien, Malaga

hispanus Chevr. Rev. Mag. Zool. 1866, p. 105 *(Myllocerus)*. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. 1867, p. 433.

Grenieri Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 291, 332 ♂ ♀; Monogr. Peritelus 1866, p. 19, 60 ♂ ♀ *(Peritelus* subg. *Peritelus)*. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 40, 73 ♂ ♀. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 591, 597; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 189. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 41, 48 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 161, 166). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 62. — Süd-Frankreich, Sizilien

Henoni Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 181 ♂ *(Peritelus)*. — Hustache, Bull. Soc. Ent. Égypte 1935, p. 205, 206. — Algerien: Nemours

var. *uniformis* Pic, Échange XXXVI, 1920, p. 11.

hybridus Seidlitz, Abeille X, 1872, p. 39, 61 *(Peritelus* subg. *Peritelus)*. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 589; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 187. Südspanien, ? Türkei, Syrien

Kiesenwetteri Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 290, 322; Monogr. Peritelus 1866, p. 18, 41, 50 *(Peritelus* subg. *Peritelus)*. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—1883 (1883), p. 591, 596; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 189. Andalusien

hispalensis Marseul, Abeille X, 1872, p. 41, 79.

magnicollis Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 182 *(Peritelus)*. — Hustache, Bull. Soc. Ent. Égypte 1935, p. 206, 209. Algerien: Oran

major Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 34 *(Peritelus)*. Turkestan

maroccanus Pic, Échange XXXVI, 1920, p. 11. — Hustache, Bull. Soc. Ent. Égypte 1935, p. 206, 210. Marocco

mononychus Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 290, 347 ♂ ♀; Monogr. Peritelus 1866, p. 18, 75 ♂ ♀ *(Peritelus* subg. *Peritelus)*. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 38, 45 ♂ ♀. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 586, 596; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 184. Spanien

necessarius Gyllh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 513; l. c. VII, 1, 1843, p. 148 *(Peritelus)*. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 290, 313 ♂ ♀, t. 4, f. 8, 15; Monogr. Peritelus 1866, p. 18, 41 ♂ ♀, tab. f. 8, 15. *(Peritelus* subg. *Peritelus)*. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 41, 79 ♂ ♀. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 592, 596; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 190; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 232 ♂ ♀. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 45, 54 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 163, 172). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 61. Süd-Frankreich: Unteres Rhônebecken, Seealpen

noxius Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 515; l. c. VII, 1, 1843, p. 150 *(Peritelus)*. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 290, 308 ♂ ♀, t. 4, f. 14; Monogr. Peritelus 1866, p. 18, 36 ♂ ♀ *(Peritelus* subg. *Peritelus)*. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 40, 69 ♂ ♀. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 590, 596; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 188; Fn. Col. Helvet. II, 1896—98 (1891), p. 232. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 44, 52 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 162, 170). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 872. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 60. Süd-Frankreich, Italien: Ligurien, Piemont (Ivrea), Toscana (Viareggio), Lazio

Biologie: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXII, 1876 (1877), p. 222; Larves Col. 1877, p. 382. — Bargagli, Bull. Soc.

Ent. Ital. XVI, 1884, p. 49; l. c. XVIII, 1886, p. 289.

Pici Desbr. Ann. Soc. Ent. France LXIII, 1894, Bull. p. CCLXVII *(Peritelus)*. — Hustache, Bull. Soc. Ent. Égypte 1935, p. 205, 208. — Algier: Oran (Rio-Salado)

prolixus Kiesenw. Ann. Soc. Ent. France (2) IX, 1851, p. 636 *(Peritelus)*. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 291, 315; Monogr. Peritelus 1866, p. 19, 41, 43 *(Peritelus* subg. *Peritelus)*. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1883 (1883), p. 592, 596; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 190. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 43, 49, f. 42 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 161, 167). — Pyrenäen

promissus Marseul, Abeille X, 1872, p. 41, 81 *(Peritelus* subg. *Peritelus)*.

Biologie: Marseul, l. c. 1872, p. 81. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 50; l. c. XVIII, 1886, p. 289.

ruficornis Ch. Bris. in Grenier, Cat. Col. France 1863, p. 106 *(Peritelus)*. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 290, 310 ♂ ♀, t. 4, f. 7; Monogr. Peritelus 1866, p. 16, 38 ♂ ♀, tab. f. 7 *(Peritelus* subg. *Peritelus)*. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 40, 71 ♂ ♀. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1880—83 (1883), p. 590, 596; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 188. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 42, 48 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 160, 166). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 61. — Süd-Frankreich: Ost-Pyrenäen

rusticus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 148 *(Peritelus)*. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 290, 313, 320; Monogr. Peritelus 1866, p. 18, 41, 48 *(Peritelus* subg. *Peritelus)*. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 41, 77 ♂ ♀. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 38; (1886), p. 233. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 593, 596; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 191; Fn. Col. Helvet II, 1886—98 (1891), p. 232. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 43, 50 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 161, 168). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 872. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 61. — Frankreich, Italien: Seealpen (Sospel, Col di Tenda)

senex Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 516; l. c. VII, 1, 1843, p. 152 *(Peritelus)*. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 290, 295 ♂ ♀, t. 4, f. 7, 8, 10; Monogr. Peritelus 1866, p. 18, 23 ♂ ♀, tab. f. 7, 8, 10 *(Peritelus* subg. *Peritelus)*. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 39, 57 ♂ ♀. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 38; (1886), p. 233. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 588, 595; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 186. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 572. — Frankreich, Norditalien, Steiermark

Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 42, 47 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 160, 165). — Luigioni, Mem.-Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 872. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 60.

Marqueti Gautier, Ann. Soc. Ent. France (3) V, 1857, Bull. p. CXXXVI *(Peritelus)*.

Biologie: Marseul, Abeille X, 1872, p. 57. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 50; l. c. XVIII, 1886, p. 289.

setabensis Hustache, Ann. Inst. gen. tec. Valencia Trab. Lab. Hist. Nat. 1921, Nr. 10, 1921, p. 5, f. 1a, 2a. — Spanien Valencia

sinuatus Chevr. Rev. Mag. Zool. 1860, p. 79 *(Peritelus)*. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 291, 335 ♂ ♀, t. 4, f. 12 *(Peritelus* subg. *Peritelus)*. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 40, 75 ♂ ♀. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 591, 597; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 189. — Hustache, Bull. Soc. Ent. Égypte 1935, p. 207. — Algier, Oran

subargentatus Desbr. Bull. Accad. Hippone 1870, p. 75 ♀. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 592, 596; Best.-Tab. 9, 1883, p. 190 (subg. *Peritelus*). — Hustache, Bull. Soc. Ent. Égypte 1935, p. 207. — Oran

? *coniceps* Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1897), p. 1 *(Peritelus)*. — Hustache, Bull. Soc. Égypte 1935, p. 207.

var. *oranensis* Hustache, l. c. p. 208. — „

sphaeroides Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 408 *(Peritelus)*. — Bedel, Faune Col. Bassin. Seine VI, 1882—88 (1886), p. 233 *(Peritelus* subg. *Peritelus)*. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 535 *(Peritelus)*. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 572 *(Peritelus* subg. *Peritelus)*. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 930, f. 125. — Wagner in Calwer, Käferb. ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1046, t. 37, f. 6. — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 34, t. 154, f. 9. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 44, 53, f. 41, 44 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 169, 171). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 872. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 60. — Holland, Frankreich, Süd- und West-Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien (Piemonte, Lombardia, Toscana), Amurgebiet (?)

tenietensis Pic, Miscell. Ent. IV, 1896, p. 113. — Hustache, Bull. Soc. Ent. Égypte 1935, p. 210.

Biologie: Fischer, Stett. Ent. Zeit. VIII, 1847, p. 6. — Bach, Verh. Nat. Ver. preuß. Rheinl. VI, 1849, p. 161. — Pliester, Verh. Nat. Ver. preuß. Rheinl. VII, 1850, p. 255. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 65. — Girard, Les Insectes I, 1873, p. 677; Ann. Soc. Ent. France (6) IV, 1884, Bull. p. LXIX;

Bull. Insectol. Agric. IX, 1884, p. 107. — Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 93, 216. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 227. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXIII, 1876 (1877), p. 222; Larves Col. 1877, p. 382. — Rupertsberger, Biol. Käfer Eur. 1880, p. 199; Biol. Lit. Käfer Eur. 1894, p. 203. — Lucas, Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, Bull. p. LXXXIX. — Kittel, Korresp.-Bl. Nat. Ver. Regensburg XXXV, 1881, p. 45. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 49; l. c. XVIII, 1886, p. 289. — Störmer, Prakt. Blätt. f. Pflanzenbau II, 1904, p. 7—9. — Zimmermann, Obstschädlinge 1905, p. 6. — Bourgeois, Mitt. Nat. Ges. Colmar (n. F.) VIII, 1905—06 (1906), p. 210; Cat. Col. Vosges 1906. — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 53. — Reh in Sorauer, Handb. der Pflanzenkrankh. III, 1906—13 (1912), p. 543. — Jacquet, Bull. Soc. Linn. Lyon IX, 1930, p. 75.

griseus Oliv. Entom. V, 1807, p. 358, t. 31, f. 475 (nec F.) *(Curculio)*. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 512 *(Peritelus)*; l. c. VII, 1, 1843, p. 148 ♂ ♀. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 327. — Blanch. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1845, p. 121. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 268. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Curc. 1854, t. 15, f. 68. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 740; l. c. ed. 3, 1874, p. 227. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 500. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 290, 303 ♂ ♀, t. 4, f. 11; Monogr. Peritelus 1866, p. 18, 31 ♂ ♀, tab. f. 11 *(Peritelus* subg. *Peritelus)*. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 39, 65 ♂ ♀. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 38. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 589, 596; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 187; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 232 *(Peritelus)*. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 181; l. c. VI, 1913, p. 305.

Biologie: Lucas, Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, Bull. p. XXXIX. — Girard, Ann. Soc. Ent. France (6) IV, 1884, Bull. p. LXIX; Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 144—145.

var. *laetus* Rey, Échange X, 1894, p. 139. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 930. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XLIII, 1924, p. 54 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 172). — Süd-Frankreich

var. *nigripes* Rey, Échange X, 1894, p. 139. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 930. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XLIII, 1924, p. 54 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 172). — „

Susanae Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 290, 298; Monogr. Peritelus 1866, p. 18, 26 ♂ ♀ *(Peritelus* subg. *Peritelus)*. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 39, 60 ♂ ♀. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 588, 595; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 186. — Spanien: Andalusien, Granada, Sierra Susana

Biologie: Seidlitz, l. c. p. 298. — Marseul, l. c. p. 60. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 50; l. c. XVIII, 1886, p. 289.

tenuicornis Schauf. Nunquam Otiosus III, 1879—82 (1882), p. 539 *(Peritelus)*. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 587, 597; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 185 *(Peritelus* subg. *Peritelus)*. — A. F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 58. — Balearen: Mallorca (El Terreno)

inviridis Pic, Échange XXIV, 1908, p. 82 *(Peritelus* subg. *Meira)*. — Fuente, Bol. Soc. Hist. Nat. España X, 1910, p. 182. — A. F. Solari, l. c. p. 58.

Subg. **Pseudomeira** Stierl.

Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1881), p. 160; l. c. 1883, p. 585; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 183. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 41, 58, 59 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 159, 176, 177); Bull. Soc. Ent. Égypte 1935, p. 202 (Gattung). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 63.

angulicollis Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1897), p. 1. — Hustache, Bull. Soc. Ent. Égypte 1935, p. 210. — Tunesien

echidna Seidl. Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 291, 328, t. 4, f. 5; Monogr. Peritelus 1865, p. 19, 56, tab. f. 5 *(Peritelus* subg. *Peritelus)*. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 42, 86. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 594, 597; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 192. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc (2) XIII, 1929, p. 873. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 61. — Italien: Toscana, Sinalunga), Umbria (Rieti), Campania

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 48; l. c. XVIII, 1886, p. 289.

foveithorax Desbr. Opusc. Ent. I, 1874—75, p. 12 *(Peritelus)*. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 594, 597; Best.-Tab. 9, 1883, p. 192 *(Peritelus* subg. *Peritelus)*. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 60, 63 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 178, 181). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 873. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 61. — Corsica: Bonifacio

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 48 *(furcithorax)*; l. c. XVIII, 1886, p. 289; l. c. XIX, 1897, p. 32.

Holdhausi A. F. Solari, Riv. Col. Ital. V, 1907, p. 117. — Holdhaus, Anzeig. Akad. Wiss. Wien VIII, 1907, p. 106—111. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 873. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 64 ♂ ♀. Italien: Insel Elba, Insel Gorgona

insularis Desbr. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. III, 1869—72 (1871), p. 345 *(Peritelus)*. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 595, 597; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 193 *(Peritelus* subg. *Peritelus)*. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 61, 62 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 179, 180). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 873. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 61. Corsica: Aleria, Ajaccio

brevicollis (Seidl.) Mars. Abeille X, 1872, p. 86. — Desbr. Opusc. Ent. I, 1874—75, p. 12, Note.

curticollis Mars. Abeille X, 1872, p. 42, 86. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 593, 597; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 191. — Desbr. Frelon 1, 1891, p. 34.

Biologie: Vitale, Riv. Ital. Sc. Nat. XXIV, 1904, p. 13, 14 *(insularis)*. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 48; l. c. XVIII, 1886, p. 288 *(curticollis)*.

Kraatzi Tourn. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. I, 1862—65 (1864), p. 268, *(Peritelus)*. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 873. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 66. Sizilien: Madonie

mutatus Pic, Échange XXIV, 1908, p. 44.

liguricus A. F. Solari, Riv. Col. Ital. V, 1907, p. 119. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 872. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 69. Ligur. Apennin (Monte Penna)

Lostiae Desbr. Frelon II, 1892, p. 88. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 872. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 64. Sardinien, Sizilien

muscorum Desbr. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. III, 1869—72 (1871), p. 346. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 748. — Hustache, Ann .Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 61, 63 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 179, 181). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 873. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 62. Corsica

muscicola Desbr. Abeille XI, 1873, p. 748 *(Peritelus)*. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 595, 597; Best.-Tab. 9, 1883, p. 193 *(Peritelus* subg. *Peritelus)*.

nicaeensis Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—80, p. 601 *(Dorymerus)*; l. c. VI, 1880—83 (1881), p. 160 *(Pseudomeira)*; l. c. VI, Süd-Frankreich: Nizza,

	1880—83 (1883), p. 601; Best.-Tab. 9, 1883, p. 199 *(Peritelus* subg. *Pseudomeira)*. — Fauvel, Rev. Ent. XIV, 1895, p. 114 *(Brachyrhinus)*. — Heyden, Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 46 *(Meira)*. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 58 (Curcul. Gallo-Rhné. p. 176). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 872. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 63.	Menton; Italien: San Remo
	Clairi Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1881), p. 162 *(Pseudomeira)*; l. c. VI, 1880—83 (1883), p. 601 *(Peritelus* subg. *Pseudomeira)*; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 199. — Fauvel, Rev. Ent. XIV, 1895, p. 114. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 872.	
obscurus	A. F. Solari, Riv. Col. Ital. V, 1907, p. 117. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 872. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 64.	Italien: Campania, Calabria (Aspromonte), Sicilia (Messina, Palermo)
	parvulus Desbr. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. III, 1869—72 (1871), p. 345 (nec Seidl.).	
	subsp. *Ferdinandi* Deville, Cat. rais. Col. Corse 1915, p. 410. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 61, 63 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 179, 181). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 872. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 64.	Corsica: Aleria, Vizzavona, Tattone
Paganettii	A. F. Solari, Riv. Col. V, 1907, p. 120 ♂ ♀. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 873. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 66.	Italien: S. Eufemia di Aspromonte
parvulus	Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 291, 327; Monogr. Peritelus 1866, p. 19, 55 *(Peritelus* subg. *Peritelus)*. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—1883 (1883), p. 594, 597; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 192. — Desbr. Frelon I, 1891, p. 34. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 872. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 61.	Italien: Liguria, Toscana, Abruzzo, Campania, Puglie (Gargano), Sicilia
	italus Mars. Abeille X, 1872, p. 42, 88 ♂ ♀ (subg. *Peritelus*).	
	Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 49; l. c. XVIII, 1886, p. 289 (Futterpflanze). — Vitale, Riv. Ital. Sc. Nat. XXIV, 1904, p. 13 (Schutzfärbung). — Seidlitz, l. c. 1865. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 88.	
Reitteri	Vitale, Riv. Col. Ital. I, 1903, p. 23 *(Peritelus)*; Atti Accad. Sc. Peloritana XX, 1905, p. 183. — Heyden, Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 46 *(Peritelus* subg. *Pseudomeira)*. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 873. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 66.	Sizilien

rudis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 152 *(Peritelus)*. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 354; Monogr. Peritelus 1866, p. 82. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 872. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 61. Italien: Toscana, Elba, Campania, Calabria

Brucki Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 291, 325, 354 ♂ ♀, t. 4, f. 5, 9, 11; Monogr. Peritelus 1866, p. 19, 53 ♂ ♀, 82, tab. f. 5, 9, 11 *(Peritelus* subg. *Peritelus)*. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 42, 87 ♂ ♀. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 594, 597; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 192 (subg. *Peritelus)*.

Biologie: Marseul, Abeille X, 1872, p. 87. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 50; l. c. XVIII, 1886, p. 289.

sardous A. Costa, Rendic. Accad. Sc. Napoli XXIII, 1884, p. 168; Atti Accad. Sc. Napoli (2) I, 1888, p. 14 *(Peritelus)*. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 872. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 64. Sardinien: Monte Gennargentu, V. di Correboi

Silvestrii A. F. Solari, Riv. Col. Ital. V, 1907, p. 120. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 873. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 67. Italien: Calabria (Gerace, Nicastro)

subsetosus Rey, Échange X, 1894, p. 139. Frankreich

Vitalei Desbr. Frelon II, 1892—93 (1892), p. 7 *(Peritelus)*. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 873. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 66. Sizilien: Messina

Biologie: Vitale, Riv. Ital. Sc. Nat. XXIV, 1904, p. 13 (Schutzfärbung).

Subg. **Meira** Jacq. du Val.

Jacq. du Val, Ann. Soc. Ent. France (2) X, 1852, p. 708, 711; Gen. Col. Eur. Curc. 1854, p. 34. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. CXX, p. 736; l. c. ed. 3, I, 1874, p. CXXXII; l. c. II, 1874, p. 227. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 280; Monogr. Peritelus 1866, p. 18; Otiorrhynchid. 1868, p. 27, 28; Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 578; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 634. — Lacord. Gen. Col. VI, 1866, p. 185. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 38, 39. — Desbr. Frelon V, 1896, p. 13—19. — Deville, Abeille XXX, 1906, p. 258, 260. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1046. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 41, 45, 55, 59 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 159, 163, 173, 177).

Amorei Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLI, 1904, p. 526. — Porta, Riv. Col. Ital. VI, 1908, p. 146; Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 65. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 873. Zentral-Italien: Abruzzo (Cerchio)

Baudii Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93 (1892), p. 362 *(Meira)*. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 873. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 64. Italien: Abruzzo (Mte. Velino), Lazio (Roma), Campania, (Camaldoli bei Neapel)

crassicornis Jacq. du Val, Ann. Soc. Ent. France (2) X, 1852, p. 713 *(Meira)*; Gen. Col. Eur. Curc. 1854, p. 34, t. 14, f. 65. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 736; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 227. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 291, t. 4, f. 9; Monogr. Peritelus 1866, p. 19, tab. f. 9; Otiorrhynchid. 1868, p. 28, 29. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 598 *(Peritelus* subg. *Meira)*; Best.-Tab. 9, 1866, p. 196. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1047, t. 37, f. 7. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 45, 58, f. 40, 44 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 163, 176). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 62. Frankreich: Hérault, Gard, Ardèche

crassulicornis Marseul, Abeille X, 1872, p. 42, 90 *(Peritelus* subg. *Meira)*.

Sedilloti Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. France (6) II, 1882, Bull. p. CLXXIX *(Meira)*. — Deville, Abeille XXX, 1906, p. 259, 260.

Damryi Tourn. Pet. Nouv. Ent. II, 8, 1876, p. 11 *(Peritelus)*. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 601; Best.-Tab. 9, 1883, p. 199 *(Peritelus* subg. *Meira)*. — Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 18. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 62, 63 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 180, 181). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 873. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 63. Corsica

var. *sulcatulus* Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 19.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 48; l. c. XVIII, 1886, p. 288.

exiguus Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynch. 1861, p. 133 *(Otiorrhynchus)*; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 600; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 198 *(Peritelus* subg. *Meira)*. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 31 (subg. *Meira)*. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 43, 91. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 873. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 63. Sizilien

florentinus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884 (Bestimm.-Tab. 13), p. 93. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 873. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 65. Italien: Emilia, Toscana (Monte Argentario), Lazio

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 48; l. c. XVIII, 1886, p. 289.

latiscrobs Desbr. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. III, 1869—72 (1871), p. 346 *(Peritelus* subg. *Meira)*. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 599; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 197 *(Peritelus* subg. *Meira)*. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 61, 63 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 179, 181). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 873. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 63. Corsica: Bastia, Porto Vecchio

distinguendus (Desbr.) Weise in Heyden, Reitter, Weise, Cat. Col. Eur. ed. 2, 1906, col. 10.

hamatus (Seidlitz) Mars. Abeille X, 1872, p. 43, 91 *(Peritelus* subg. *Meira)*; Desbr. Opusc. Ent. I, 1874—75, p. 12, Note.

uniformis Desbr. Opusc. Ent. I, 1874—75, p. 12.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XIV, 1884, p. 48 *(distinguendus)*; p. 49 *(hamatus)*; l. c. XVIII, 1886, w. 288 *(distinguendus)*; p. 289 *(hamatus)*.

leptosphaeroides Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 32 *(Peritelus* subg. *Meira)*. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 43, 92. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 600; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 198. Algerien

Logesi Pic, Échange XXIV, 1908, p. 44. Sizilien

siculus Desbr. Fielon II, 1892—93 (1892), p. 4 *(Meira)*. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 66.

microphthalmus Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 28, 32 *(Peritelus* subg. *Meira)*. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 43, 92. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 600; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 198. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 873. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 63. Sizilien: Palermo, Mte. Pellegrino

exiguus var. β Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynch. 1861, p. 133.

neapolitanus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 329 *(Pseudomeira)*. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 873. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 66. Italien: Lazio (Colli Albani), Campania, Puglie (Mte. Gargano)

Pfisteri Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 150 *(Cathormiocerus)*; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 600 *(Peritelus* subg. *Meira)*; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 198. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 291, Note; Monogr. Peritelus 1866, p. 19, Note; Otiorrhynchid. 1868, p. 31. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 43, 91. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 873. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 63. Sizilien: Palermo, Mte. Pellegrino

Raffrayi Pic, Échange XXIV, 1908, p. 44. — Porta, Riv. Col. Ital. VII, 1909, p. 19. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 873. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 65. Italien: Lazio (Roma), Colli Albani

sassariensis Desbr. Ann. Soc. Ent. France (6) VIII, 1888, Bull. p. CCVI *(Meira)*. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 873. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 65. Sardinien: Sassari

Seidlitzi Desbr. Ann. Soc. Ent. France (6) VIII, 1888, Bull. p. CCVI *(Meira)*. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 873. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 65. Sardinien

squamulatus Reiche, Ann. Soc. Ent. France (4) II, 1862, p. 297 *(Cathormiocerus)*. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 28 *(Peritelus)* subg. *Meira)*. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 598; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 196. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 61, 62 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 179, 180). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 873. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 62. Corsica: Zicavo

corsicus Desbr. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. III, 1869—72 (1871), p. 347; Opuscul. Ent. I, 1874—75, p. 12, Note.

squamans Marseul, Abeille X, 1872, p. 42, 89 *(Peritelus* subg. *Meira)*.

?minutissimus Desbr. Abeille XI, 1873, p. 748.

Stierlini Deville, Abeille XXX, 1906, p. 260 *(Meira)*. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 45, 57 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 163, 175). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 874. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 62. Süd-Frankreich: Seealpen

crassicornis Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 28, 29 *(Peritelus* subg. *Meira)* (pars).

suturellus Fairm. Ann. Soc. Ent. France (3) IX, 1859, p. 59 *(Meira)*. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 291, Note; Monogr. Peritelus 1866, p. 19, Note *(Meira)*; Otiorrhynchid. 1868, p. 30 *(Peritelus* subg. *Meira)*. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 43, 90. — Stierlin, Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 598; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 196. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 45, 55 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 163, 173). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 873. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 62. Süd-Frankreich; Italien: Piemont, Meran

elongatulus Fairm. Ann. Soc. Ent. France (3) VII, 1859, Bull. p. CIV.

Grouvellei Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1882), p. 255 *(Meira)*; l. c. VI, 1880—83 (1883), p. 599; Bestimm.-

Tab. 9, 1883, p. 197 *(Peritelus* subg. *Meira)*. — Desbr. Frelon XVI, 1908, p. 86.
minimus Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynch. 1861, p. 134 *(Otiorrhynchus)*.
minutus Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1881), p. 163 *(Pseudomeira)*. — Deville, Abeille XXX, 1906, p. 259.
Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 50; l. c. XVIII, 1886, p. 289.

vauclusianus Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1898), p. 63 *(Meira)*. — Deville, Abeille XXX, 1906, p. 259. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 45, 56 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 163, 174). — Südfrankreich: Vaucluse, Hérault, Pyrénées-Orient.
Fagniezi Desbr. Frelon XVI, 1908—09 (1908), p. 63 ♂ ♀. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 57 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 175).
vallis-clausae Abeille, Bull. Soc. Ent. France 1905, p. 209.

variegatus A. F. Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXV, 1903, p. 171 ♂ ♀. — Porta, Riv. Col. Ital. II, 1904, p. 155. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 873. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 65. — Norditalien: Liguria (S. Ilario)
subsp. *caprasiae* A. F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LXV, 1933, p. 161. — Insel Capraia

Subg. **Leptosphaerotus** Seidl.

Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 351; 1868, p. 27. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 38, 93. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 31, Note. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Bestimm.-Tab. 68), p. 12, Note; Fauna Germ. V, 1916, p. 33, Note. — Hustache, Bull. Soc. Ent. Égypte 1935, p. 202, 211. — Otiorrhynchid.

agglutinans Hustache, Bull. Soc. Ent. Égypte 1935, p. 213, 239, t. 2, f. 26 ♂ ♀. — Algerien: Arouled, Akfadou

aquilus Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) XII, 1860, p. 134 *(Otiorrhynchus)*. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynch. 1861, p. 131; Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 372 *(Peritelus)*; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 602 *(Peritelus* subg. *Leptosphaerotus)*; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 200. — Harold, Col. Hefte X, 1872, p. 220. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 290, 354; Monogr. Peritelus 1866, p. 18, 79. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 44, 95. — Bedel, Abeille XXVII, 1891, p. 155 *(Leptosphaerotus)*. — Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 13 *(Meira)*. — Hustache, Bull. Soc. Ent. Égypte 1935, p. 215, 220, t. 3, f. 29. — Algerien
furinus Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) XII, 1860, p. 135 *(Otiorrhynchus)*. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynch. 1861, p. 131; Berl. Ent.

Zeitschr. VI, 1862, p. 372. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 351.

major Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynch. 1861, p. 103. — Hustache, Bull. Soc. Ent. Égypte 1935, p. 220.

var. *ampliicollis* Desbr. Frelon XIV, 1905—06 (1905), p. 18. — Tunesien

aureolus Hustache, Bull. Soc. Ent. Égypte 1935, p. 219, 236, t. 2, f. 22. — Algerien: Mahadid

brevipennis Hustache, l. c. p. 219, 235, t. 2, f. 20, 21; t. 3, f. 40 ♂ ♀. — Constantine

conicirostris Hustache, l. c. p. 219, 234, t. 2, f. 15 ♀. — Tunesien: Ain-Draham

delicatulus Hustache, l. c. p. 219, 229 ♂ ♀. — Algerien: Edough, Djurjura

diversipennis Pic, Échange XXIV, 1908, p. 44 *(Meira)*. — Hustache, Bull. Soc. Ent. Égypte 1935, p. 215, 241, t. 2, f. 28, 28a ♀ *(Leptosphaerotus)*. — Algerien: Bône

edoughensis Desbr. Opusc. Ent. I, 1874—75, p. 12 ♂ *(Meira)*; Frelon V, 1895—96 (1896), p. 15 *(Meira)*. — Stierl. Revis. Eur. Otiorrhynch. 1861, p. 133 *(Otiorrhynchus)*; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 600; Best.-Tab. 9, 1883, p. 198 (subg. Meira). — Hustache, Bull. Soc. Ent. Égypte 1935, p. 215, 240 *(Leptosphaerotus)*. — Algerien: Bône, Edough

fallaciosus Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 14, 16 ♀ *(Meira)*. — Hustache, Bull. Soc. Ent. Égypte 1935, p. 214, 237. — Algerien: Constantine (Djebel Batna)

gracilis Chevr. Rev. Mag. Zool. 1861, p. 121 ♂ *(Peritelus)*. — Hustache, Bull. Soc. Ent. Égypte 1935, p. 214, 237 ♂ ♀, t. 3, f. 43 *(Leptosphaerotus)*. — Algerien: Alger

subplanus Desbr. Frelon II, 1892—93 (1892), p. 4; l. c. V, 1895—96 (1896), p. 14 *(Meira)*. — Hustache, Bull. Soc. Ent. Égypte l. c. p. 237.

humeralis Hustache, l. c. p. 218, t. 1, f. 8, 8a, t. 3, f. 44 ♂ ♀ *(Leptosphaerotus)*. — Algerien, Tunesien

infuscatus Hustache, l. c. p. 218, 228 ♂ *(Leptosphaerotus)*. — Kabylie: Kebarches

intermedius Hustache, l. c. p. 217, 222 ♀ *(Leptosphaerotus)*. — Oran

intersetosus Chevr. Rev. Mag. Zool. 1860, p. 80 *(Otiorrhynchus)*. — Stierl. Rev. Eur. Otiorrhynch. 1861, p. 135 *(Otiorrhynchus)*; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 602; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 200 *(Peritelus* subg. *Leptosphaerotus)*. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 353, t. 4, f. 5; Monogr. Peritelus 1866, p. 81, tab. f. 5. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 43, 93. — Desbr. Frelon V, 1895—96, 1896, p. 14. — Hustache, Bull. Soc. Ent. Égypte 1935, p. 218, 224, t. 1, f. 6, 7; t. 3, f. 37 ♂ ♀ *(Leptosphaerotus)*. — Algerien: Algier, Bône

	gracilentus Desbr. Frelon XIV, 1905—06 (1905), p. 16 ♀ *(Meira)*. — Hustache, l. c. p. 224.	
Lameyi	Hustache, l. c. p. 213, 236, t. 2, f. 23 *(Leptosphaerotus)*.	Philippeville
latithorax	Desbr. Bull. Accad. Hippone 1870, p. 77; Frelon V, 1895—96 (1896), p. 14. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 559; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 197 *(Meira)*. — Hustache, Bull. Soc. Ent. Égypte 1935, p. 217, 239 *(Leptosphaerotus)*.	Algerien: Alger, Bône
longior	Pic, Echange XXIV, 1908, p. 45 *(Meira)*. — Hustache, Bull. Soc. Ent. Egypte 1935, p. 214, 238, t. 2, f. 24 ♂ ♀ *(Leptosphaerotus)*.	Algerien: Kabylie
minor	Pic, Échange XXIV, 1908, p. 44 *(Meira)*. — Hustache, Bull. Soc. Ent. Égypte 1935, p. 213, 238, t. 3, f. 35 *(Leptosphaerotus)*.	Tunesien: Ain-Draham
mixtus	Hustache, l. c. p. 217, 222, t. 3, f. 31 *(Leptosphaerotus)*.	Constantine
Moissoni	Hustache, l. c. p. 218, 226 ♂ *(Leptosphaerotus)*.	Oran
muricatus	Chevr. Rev. Mag. Zool. 1860, p. 78 *(Cathormiocerus)*. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 27. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 44, 94 *(Peritelus* subg. *Leptosphaerotus)*. — Hustache, Bull. Soc. Ent. Égypte 1935, p. 215, 231, t. 3, f. 33 ♂ ♀ *(Leptosphaerotus)*.	Tunesien; Algerien (Edough)
	separatus Desbr. Frelon XV, 1906—08 (1907), p. 99. — Hustache, l. c. p. 231, 233.	
	var. *Olivieri* Desbr. Bull. Accad. Hippone 1870, p. 76; Frelon V, 1895—96, 1896, p. 14, 17. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 602; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 200. — Bedel, Abeille XXVII, 1891, p. 154. — Hustache, Bull. Soc. Ent. Égypte 1935, p. 233.	Bône, Constantine
	? *fallens* Desbr. Frelon XIV, 1905—06 (1905), p. 19. — Hustache, Bull. Soc. Ent. Égypte 1935, p. 233.	
Normandi	Hustache, l. c. p. 215, 223, t. 1, f. 4 ♂ *(Leptosphaerotus)*.	Bône
obesus	Hustache, l. c. p. 218, 229, t. 1, f. 12 ♀ *(Leptosphaerotus)*.	Akfadou
Peyerimhoffi	Pic, Bull. Soc. Ent. France 1907, p. 274 *(Meira)*. — Hustache, Bull. Soc. Ent. Égypte 1935, p. 216, 223.	Algerien: Djebel Djurdjura
rubripes	Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1897), p. 21 *(Meira)*. — Hustache, Bull. Soc. Ent. Égypte 1935, p. 219, 230, t. 1, f. 13, 13a, 14, t. 3, f. 34 ♂ ♀ *(Leptosphaerotus)*.	Algerien (Kabylie); Tunesien (Ain-Draham)
rudicollis	Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 181 *(Meira)*. — Hustache, Bull. Soc. Ent. Égypte 1935, p. 217, 223, t. 1, f. 3, 3a, t. 3, f. 32 *(Leptosphaerotus)*.	Kabylie: Jakouren; Alger: Azazga
ruficolor	Pic, Échange LII, 1936, p. 22 ♂.	Algerien: Collo
rufus	Hustache, l. c. p. 218, 226, t. 1, f. 9 ♀ *(Leptosphaerotus)*.	Tunesien: Bulla Regia

setuliferus Desbr. Bull. Acad. Hippone 1870, p. 75 ♂; Frelon IV, 1895—96 (1895), p. 12. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 198; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 198. — Hustache, Bull. Soc. Ent. Égypte 1935, p. 215, 240, t. 2, f. 27, t. 3, f. 39 *(Leptosphaerotus)*. — Algerien: Bône, Edough, Teniet el Had

setulosus Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 180 *(Meira)*. — Hustache, Bull. Soc. Ent. Égypte 1935, p. 219, 234, t. 2, f. 16, 17, t. 3, f. 36 ♂ ♀ *(Leptosphaerotus)*. — Algerien: Alger, Constantine; Tunesien, Ain-Draham

var. *Theryi* Pic, Échange XXIV, 1908, p. 44. — Hustache, Bull. Soc. Ent. Égypte 1935, p. 235 ♂.

Simoni Hustache, l. c. p. 217, 224, t. 1, f. 5 *(Leptosphaerotus)*. — Djebel Mahadid

sordidus Hustache, l. c. p. 214, 238 ♂ ♀, t. 2, f. 25, t. 3, f. 41 *(Leptosphaerotus)*. — Arouled, Akfadou

stagnalis Hustache, l. c. p. 217, 221 ♂ ♀, t. 1, f. 2, t. 3, f. 30 *(Leptosphaerotus)*. — Agoulmine, Durouffal, Akfadou

subconiceps Desbr. Frelon II, 1892—93 (1892), p. 5; l. c. V, 1895—96 (1896), p. 14 *(Meira)*. — Hustache, Bull. Soc. Ent. Égypte 1935, p. 220, 235 ♂ ♀, t. 2, f. 18, 19, t. 3, f. 42 *(Leptosphaerotus)*. — Algerien: Alger; Tunesien: Ain Draham

subcylindricus Hustache, l. c. p. 228 ♂ ♀, t. 1, f. 11, t. 3, f. 38 *(Leptosphaerotus)*. — Algerien: Edough

testaceicornis Pic, Échange XXIV, 1908, p. 44 ♀ *(Meira)*. — Hustache, Bull. Soc. Ent. Égypte 1935, p. 213, 238 *(Leptosphaerotus)*. — Ain Beida

villosicollis Hustache, l. c. p. 217, 227, t. 1, f. 10 ♂ *(Leptosphaerotus)*. — Philippeville

Species incertae sedis.

aequatorialis Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 449 *(Meira)*. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 515 (? Gattung). — Engl. Ostafrika: Pori, Mbuyuni

albidus Ballion, Bull. Soc. Nat. Moscou LIII, 1, 1878, p. 355 *(Peritelus)*. — Kuldscha

congoanus Hustache, Rev. Zool. Afr. XII, 1926, p. 44 *(Peritelus)*. — Belg. Kongo

Kenyae Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 446 *(Peritelus)*. — Kenya Berg

minuscula Desbr. Frelon XIV, 2, 1905—06 (1905), p. 17. — Hustache, Bull. Soc. Ent. Égypte 1935, p. 212, 238. — Tunesien: Ain Draham

ornatus Fåhrs. Oefv. Vet.-Akad. Forh. XXVIII, 1871, p. 35 *(Peritelus)*. — Kafferngebiet

pygmaeus Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. X, 1898—1903 (1899), p. 199 *(Meira)*. — Steiermark

sphaeroides (Creutz.) Mäklin, Svensk. Vet.-Ak. Handl. (2) XVIII, 1880 (1881), p. 28 *(Peritelus)* (non Germar 1824). — Krasnojarsk

sulcirostris Ballion, Bull. Soc. Nat. Moscou LIII, 1, 1878, p. 356 *(Peritelus)*. Kuldscha
trivialis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 150. „
116

Mazuranella Formánek

Formánek, Wien. Ent. Zeit. 1923, p. 108.
parnassicola Form. l. c. p. 109. Grecia
1

Genera exotica.

Antispyris Mshl.

Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 505, 509.
planicollis Mshl. Trans. Zool. Soc. Lond. XIX, 1909, p. 228, t. 7, f. 17 *(Amphitmetus)*; Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 509 *(Antispyris)*. — Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 266. Tropisch. Afrika
1

Apotmetus Mshl.

Mshl. Trans. Zool. Soc. XIX, 1909, p. 229; Rev. Zool.-Bot. Afr. XXIV, 1933, p. 67; Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 503, 505. — Aurivillius, Arkiv Zool. 18A, 1926, p. 2.
humeralis Mshl. Rev. Zool.-Bot. Afr. XXIV, 1933, p. 67 *(Amphitmetus)*; Ann. Mag. Nat. Hist. 10, XV, 1935, p. 503 *(Apotmetus)*. Ruwenzori
karissimbi Auriv. Arkiv Zool. 18 B, 1926, p. 2. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) 15, 1935, p. 503. Birunga: Karissimbi Vulkan
montanus Mshl. Trans. Zool. Soc. XIX, 1909, p. 229, t. 8, f. 18; Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 503. Ruwenzori
suturalis Mshl. Rev. Zool.-Bot. Afr. XXIV, 1933, p. 66; Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 503. „
4

Aragnomus G. H. Horn.

G. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, Nr. 96, 1876, p. 63. — J. L. Leconte & G. H. Horn, Class. Col. North Amer. ed. II, in Smiths. Misc. Coll. XXVI, Nr. 507, 1883, p. 448. — Casey, Ann. New York Acad. Sc. IV, 1888, p. 269. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 423.
griseus G. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, Nr. 96, 1876, p. 72. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 357; l. c. XLV, 1913, p. 425. Kalifornien
Biologie: Beutenmüller, Journ. New York Ent. Soc. I, 1893, p. 38.
hispidulus Casey, Ann. New York Acad. Sc. IV, 1888, p. 266. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 357. „
setosus Van Dyke, Pan-Pacif. Ent. XII, 1936, p. 30. „
3

Asceparnus Schönh.

Schönh. Mant. sec. Curc. 1847, p. 59. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 189. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 282; Otiorrhynchid. 1868, p. 2.

nodipennis Lacord. l. c. p. 190. — Schönh. Mant. sec. Curc. 1847, p. 60 (s. descr.). Schwanenfluß
1

Caterectus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 401. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 180. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 280, 282; Otiorrhynchid. 1868, p. 3.

Caterictus Gemm. & Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2278.

granicollis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 402. Kafferngebiet

insularis Boh. l. c. p. 403. Pulo Penang
2

Dysticheus G. H. Horn.

G. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 73. — J. L. Leconte, Smiths. Misc. Coll. XXVI, 1883, p. 448. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 423.

insignis G. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 73. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Museum XLV, 1913, p. 425. Kalifornien
1

Eucyllus G. H. Horn.

G. H. Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 74. — J. Leconte, et G. H. Horn, Class. Col. North Amer. ed. 2, in Smiths. Misc. Coll. XXVI, 1883, p. 448. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 423.

vagans G. H. Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 74. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 357; l. c. XLV, 1913, p. 425. Arizona, Kalifornien
1

Nemocestes Van Dyke.

Van Dyke, Pan-Pacif. Ent. XII, 1936, p. 22, 24.

Geoderces G. H. Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 70. — J. L. Leconte & G. H. Horn, Class. Col. North America, ed. 2, in Smiths. Misc. Coll. XXVI, 1883, p. 448. — Casey, Ann. New York Ac. Sc. IV, 1888, p. 264, 269. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 423. — Blatchley & Leng, Rhynchophora North East. America 1916, p. 109, 115, 137 (pars). — V. Dyke, Pan-Pacif. Ent. XII. 1936, p. 22 *(Nemocestes)*.

Horni Van Dyke, Pan-Pacif. Ent. XII, 1936, p. 25. Von Canada und New York bis Lake Superior und Vancouver

melanothrix G. H. Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 71 (nec Kirby) *(Geoderces)*. — J. L. Leconte, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 437. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 356; l. c. XLV, 1913, p. 424. — Blatchley & Leng, Rhynchophora of North East. America 1916,

p. 116. — Van Dyke, Pan-Pacif. Ent. XII, 1936, p. 22 *(Nemocestus)*.

incomptus G. H. Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876. p. 72 *(Geoderces)*. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 356. — Van Dyke, Pan-Pacif. Ent. XII, 1936, p. 22 (*Nemocestes*, Genotypus). — Indianapolis, San Francisco bis Vancouver

Koebelei Van Dyke, Pan-Pacif. Ent. XII, 1936, p. 183. — U. S. A.

Koebeli Van Dyke, l. c. p. 29.

longulus Van Dyke, Pan-Pacif. Ent. XII, 1936, p. 26. — U. S. A.

montanus Van Dyke, l. c. p. 27. — U. S. A.

puncticollis Casey, Ann. New York Ac. Sc. IV, 1888, p. 264 *(Geoderces)*. — Van Dyke, Pan-Pacif. Ent. XII, 1936, p. 24 *(Nemocestes)*. — Kalifornien

sordidus Van Dyke, Pan-Pacif. Ent. XII, 1936, p. 26. — U. S. A.

tuberculatus Van Dyke, l. c. p. 28. — U. S. A.

8

Geodercodes Casey.

Casey, Ann. New York Ac. Sc. IV, 1888, p. 265, 269. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1912, p. 423.

hispidus G. H. Horn, Proc. Californ. Ac. Sc. IV, 1894, p. 442. — Kalifornien

latipennis Casey, Ann. New York Ac. Sc. IV, 1888, p. 265. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 425. — „

2

Glyptosomus Schönh.

Schönh. Mant. sec. Curc. 1847, p. 62. — Lacord. Gen. Curc. VI, 1863, p. 190. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. 1865, p. 281; Otiorrhynchid. 1868, p. 4.

costipennis Fåhrs. Oefv. Vet.-Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 36. — Schönh. Mant. sec. Curc. 1847, p. 63 (s. descr.). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 190, Note. — Natal, Kaffern-gebiet

1

Leptospyris Auriv.

Auriv. in Sjöstedt, Kilim.-Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 409. — Msh. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 504, 514.

glacialis Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 402. — Engl. Ost-Afrika: Berg Kenya

laevis Hustache, l. c. p. 403. — „

lateralis Auriv. in Sjöstedt, Kilim.-Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 409, f. 2. — Engl. Ostafrika: Berg Meru

montana Auriv. l. c. p. 409. — „

squamulosa Auriv. l. c. p. 410. — Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 404. — Kilimandjaro: Kiboscho; Bismarckhügel

sylvaticus Hustache, l. c. p. 401. — Engl. Ost-Afrika: Berg Kenya

6

Merulia Auriv.

Auriv. in Sjöstedt, Kilim.-Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 407. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 504.

callosa Hustache, Voy. Alluaud et Jeannel Afr. Or. XIX, 1922, p. 390. — Engl. Ostafrika: Berg Aberdere u. Kinangop

vittata Auriv. in Sjöstedt, Kilim.-Meru Exped. I, 7, 21, 1900, p. 407, fig. 1. — Meru

2

Neomias Hustache.

Hustache, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XVIII, 1936, p. 433.

alpinus Hustache, Voy. Alluaud & Jeann. Afr. Or. XIX, 1929, p. 452 *(Omias)*; Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XVIII, 1936, p. 433 *(Neomias)*. — Berg Kenya

crassicornis Hustache, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XVIII, 1936, p. 436. — Abessinien: Berg Chillalo

cribricollis Hustache, l. c. p. 434, f. 10. — Abessinien: Berg Zukwala

Kenyae Hustache, Voy. Alluaud & Jeann. Afr. Or. XIX, 1929, p. 451, t. 10, f. 4 *(Omias)*; Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XVIII, 1936, p. 433 *(Neomias)*. — Berg Kenya

var. *glacialis* Hustache, Voy. Alluaud & Jeann. Afr. Or. XIX, 1929, p. 452.

monilicornis Hustache, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XVIII, 1936, p. 437, f. 11. — Abessinien: Berg Chillalo

5

Parasystates Auriv.

Auriv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 410.

albovittatus Auriv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 412 ♂ ♀. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 513. — Meru Berg

subsp. *Kenyae* Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 406. — Kenya Berg

abyssinicus Hustache, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XVIII, 1936, p. 419 ♂ ♀. — Abessinien: Djem-Djem

alpinus Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 413 ♂ ♀. — Engl. Ostafrika: Aberdare Geb., Kinangop-berg

alternans Hustache, l. c. p. 408. — Kenya Berg

brunneus Hustache, l. c. p. 414. — ,,

Bourgeoni Mshl. Rev. Zool. Afr. XXIV, 1933, p. 68. — Ruwenzori

cardui Auriv. Arkiv Zool. 18 A, Nr. 23, 1926, p. 12. — Elgon

congoanus Hustache, Rev. Zool. Afr. XI, 1923, p. 170. — Belg. Kongo

costulatus Auriv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 413; Ark. Zool. 18 A, Nr. 22, 1926, p. 5. — Kilimandjaro und Meruberg

depressus Auriv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 411, f. 4 (♀ err.). — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 513 ♂. — Meru

subconvexus Auriv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 411, f. 3 (♂ err.). — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 513 ♀.

elongatus Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 407. — Kenya Berg

Hancocki Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VI, 1930, p. 555. — Uganda

Johnstoni Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 511 ♂ ♀. — Uganda, Kenya

kenyanus nom. nov. — Engl. Ostafrika: Kenya Berg, Aberdare Geb. (Kinangop Berg)

Kenyae Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 411 (nec Hust. l. c. p. 406).

kivuensis Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 266. — Belg. Kongo: Kivu

minor Auriv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 413 ♂ ♀. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 513. — Kilimandjaro, Kiboscho

Neavei Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 512; ♂ ♀. — Uganda

nodipennis Mshl. l. c. p. 509 ♂ ♀, f. 2. — „

rugulipennis Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 409. — Kenya Berg

virescens Auriv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 412 ♂ ♀. — Kilimandjaro: Kiboscho

20

Oreorrhinus Mshl.

Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 504, 506.

aberdarensis Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 507, 509 ♂ ♀. — Kenya

glabricollis Mshl. l. c. p. 507, 509 ♂ ♀. — „

punctipennis Hustache, Voy. Alluaud & Jeann. Afr. Or. XIX, 1929, p. 445 *(Neosystates)*. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 506, 509 *(Oreorrhinus)*. — Kilimandjaro

Lovéni Auriv. Arkiv Zool. 18 A, 1926, p. 7 *(Leptospyris)*. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 506, 509 *(Oreorrhinus)*. — Berg Elgon

4

Oreosystates Mshl.

Mshl. Rev. Zool.-Bot. Afr. 24, 1923, p. 69; Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 505.

muscosus Mshl. l. c. p. 60, fig. — Ruwenzori

1

Orthoptochus Casey.

Casey, Ann. New York Ac. IV, 1888, p. 261. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Museum XLV, 1913, p. 424.

squamiger Casey, l. c. p. 261. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Museum XXXVII, 1910, p. 355; l. c. XLV, 1913, p. 424. — Kalifornien

Paraptochus Seidlitz.

Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 3, 35, Note. — G. H. Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 67. — J. L. Leconte & G. H. Horn, Class. Col. North America, ed. 2, in Smiths Misc. Coll. XXVI, 1883, p. 447. — Casey, Ann. New York Ac. Sc. IV, 1888, p. 268: — Pierce, Proc. U. S. Nat. Museum XLV, 1913, p. 424.

sellatus Bohem. Eug. Resa, Col. 1859, p. 126 *(Peritelés)*. — G. H. Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 67, 437 *(Paraptochus)*. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 355. — Kalifornien

californicus Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 36, Note *(Paraptochus)*. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1914, p. 424.

setiferus Nan Dyke, Pan-Pacific Ent. XI, 1935, p. 93. — „

uniformis l. c. p. 95. — „

4

Peritelinus Casey.

Casey, Ann. New York Ac. Sc. IV, 1888, p. 263, 269. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 424.

erinaceus V. Dyke, Pan-Pacif. Ent. XII, 1936, p. 20. — U. S. A.

oregonus V. Dyke, Pan-Pacif. Ent. XII, 1936, p. 21. — „

variegatus Casey, Ann. New York Ac. Sc. IV, 1888, p. 263. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 424. — Kalifornien

3

Peritelodes Casey.

Casey, Ann. New York Ac. Sc. IV, 1888, p. 262, 269. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 424.

obtectus Casey, Ann. New York Ac. Sc. IV, 1888, p. 262. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 424. — Kalifornien

3

Peritelopsis G. H. Horn.

G. H. Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 70. — J. L. Leconte & G. H. Horn, Class. Col. North Amer. ed. 2, in Smiths. Misc. Coll. 1883, p. 448. — Casey, Ann. New York Ac. Sc. IV, 1888, p. 269. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 424.

globiventris J. L. Leconte, Rep. Explor. Mississippi River IX, 1857, p. 56 *(Ptochus)*. — G. H. Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. — Mississippi

70, 437 *(Peritelopsis)*. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 424.

1

Rhypodillus Cock.

Cock. Ent. News XVII, 1906, p. 243. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 425.

Rhypodes G. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, Nr. 96, 1876, p. 66, 75 (non Stål 1874). — J. L. Leconte & G. H. Horn, Class. Col. North Amer. ed. 2, in Smiths. Misc. Coll. XXVI, 1883, p. 448.

brevicollis G. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 75. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 357. — Kolorado

dilatatus G. H. Horn, l. c. p. 75. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Museum XXXVII, 1910, p. 357; l. c. XLV, 1913, p. 425. — Kalifornien

2

Seneciobius Auriv.

Auriv. in Lovén, Kring Mt. Elgon 1921, p. 93; Ark. Zool. 18 A, 1926, p. 4.

Neoteripelus Hustache, Rev. Zool. Afr. XI, 1923, p. 180. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 504 (eigene Gattung).

Neosystates Hustache, Voy. Alluaud & Jeann. Afr. Or. XIX, 1929, p. 443. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 503.

granulifer Auriv. Ark. Zool. 18 A, 1926, p. 6 *(Seneciobius)*. — Engl. Ostafrika: Berg Elgon

kenyanus Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 505. — Kenya

laevis Auriv. Ark. Zool. 18 A, 1926, p. 6 *(Seneciobius)*. — Engl. Ostafrika: Berg Elgon

Lovéni Auriv. in Lovén, Kring Mt. Elgon 1921, p. 93, f. 44 *(Seneciobius)*. — „

granulipennis Hust. Rev. Zool. Afr. XI, 1923, p. 188 *(Neoteripelus)*. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 503.

nitens Hustache, Voy. Alluaud & Jeann. Afr. Or. XIX, 1929, p. 443, t. 10, f. 1—3 ♂ ♀ *(Neosystates)*. — Engl. Ostafrika: Kilimandjaro, Aberdare Geb. Kinangop Berg

nitidipennis Auriv. Ark. Zool. 18 A, 1926, p. 5 *(Seneciobius)*. — Engl. Ostafrika: Berg Elgon

pustulosus Auriv. l. c. p. 6 *(Seneciobius)*. — Engl. Ostafrika: Berg Elgon

sculpturatus Hustache, Sbornik ent. odd. Nar. Mus. Praze IX, 1931, p. 74 *(Neosystates)*. — Ostafrika

8

Stenoptochus Casey.

Casey, Ann. New York Ac. Sc. IV, 1888, p 259, 268. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 424.

inconstans Casey, Ann. New York Ac. Sc. IV, 1888, p. 260. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 424. — Kalifornien

Vanduzeei Van Dyke, Pan-Pacific Ent. XI, 1935, p. 95. — „

2

Subleptospyris Mshl.

Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) X, 1932, p. 217; l. c. (10) 15, 1935, 504.

turbida Mshl. l. c. p. 217, fig. — Uganda

1

Systates Gerst.

Gerst. Arch. Naturg. XXXVII, I, 1871, p. 71. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 123, Note. — Hustache, Voy. Alluaud & Jeann. Afr. Or. XIX, 1929, p. 415.

Subgen. *Liosystates* Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 269.

abyssinicus Fairm. Naturaliste II, 1882, p. 192; Ann. Soc. Ent. France (6) III, 1883, p. 106. — Abyssinien

acuminatus Hustache, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XVIII, 1936, p. 429 ♀. — Abyssinien: Berg Chillalo

aeneolus Harold, Monatsber. Akad. Berlin 1880, p. 264. — Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XVIII, 1895 (1896), p. 715. — Ostafrika: Tanga

? *niger* (Chevr.) Auriv. in Sjöst. Kilim.-Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 413 *(Sphrigodes)*.

subsp. *manicanus* Mshl. Mem. Mus. Zool. Univ. Coimbra 81, 1935, p. 20. — Port. Ost-Afrika

affinis Hustache, Voy. Babault Afr. Or. Angl. 1921, p. 21, t. 2, f. 3; Voy. Alluaud & Jeann. Afr. Or. XIX, 1929, p. 416. — Brit. Ostafrika: Tana River, Pori, Mbuguni

albidovittatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CCCXLVII; Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 318. — Italien. Somaliland: Mogadiscio

albohirtus Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 67 ♂. — Auriv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 414. — Ostafrika: Ikuma, Usambara (Mombo)

albosetosus Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 401. — Gallaland: Ganale Alto

alternatus Auriv. Ark. Zool. 18 A, Nr. 22, 1926, p. 4, 5 ♂ ♀. — Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 269 (subgen. *Liosystates*). — Zentralafrika: Birunga (Karissimbi)

alticola Auriv. Ark. Zool. 18 A, Nr. 22, 1926, p. 3, 5, f. 2 ♂ ♀. — Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 260 (subg. *Liosystates*). — Zentralafrika: Birunga

alticollis Mshl. Bull. Ent. Res. XXV, 1934, p. 497. — Tanganyika

amabilis Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 398. — Kongo

amoenulus	Gerst. Arch. f. Nat. XXXVII, 1, 1871, p. 72. — Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. 1929, p. 442.	Zanzibar, Ostafrika: Bura
amplicollis	Gerst. Arch. f. Nat. XXXVIII, 1, 1871, p. 71.	Endara
angusticollis	Taschenb. Zeitschr. f. Naturwiss. LVI, 1883, p. 179.	Sokotra
angulipennis	G. Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 282, t. 6, f. 5 ♂ ♀.	Zentral-Afrika
var. *micans*	Hustache, Rev. Zool. Afr. XI, 1923, p. 159.	Belg. Kongo
angulithorax	Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. LXXVI; Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 319.	Italien. Somaliland: Mogadiscio
angustirostris	Auriv. Ark. Zool. 18 A, Nr. 23, 1926, p. 20.	Erythraea: Ghinda
annulatus	Mshl. Bull. Ent. Res. XXV, 1934, p. 498.	Tanganyika
apicipennis	Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 36.	Abessinien: Choa
appendiculatus	Auriv. Ark. Zool. VIII, 1913, Nr. 21, p. 4, Note ♂.	D.O.Afrika
armatus	Auriv. Ark. Zool. 18 A, Nr. 23, 1926. p. 19.	Abessinien
armiger	Kolbe, Deutsch-Ost-Afrika IV, Col. 1897, p. 273, Nr. 23, t. 3, f. 32.	Ost-Afrika: Albert Nyanza
assimilis	Auriv. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris XVIII, 1912, p. 357; Voy. Rothschild en Éthiopie II, Col. 1922, p. 734, t. 1, c. 27, f. 3 ♂ ♀.	Engl. Ost-Afrika; Abessinien: Addis Abeba
Bayeri	Hust. Rev. Zool. Afr. IX, 1923, p. 161.	Engl. Ost-Afrika
beiranus	Mshl. Bull. Ent. Research XI, 1920, p. 274.	Beira
Bequaerti	Hust. Rev. Zool. Afr. XI, 1923, p. 168.	Belg. Kongo
bispinosus	Hust. l. c. p. 158.	,,
bituberosus	Auriv. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris XVIII, 1912, p. 353; Voy. Rothschild en Éthiopie II, Col. 1922, p. 730, t. 1, c. 26, f. 2, 3 ? ♂.	S.-Aethiopien: Kiéka
brevicollis	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 323.	Deutsch-Ost-Afrika
brevicornis	Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 434.	Engl. Ostafrika: Berge Aberdare und Kinangop; Fluß Tchania
brevis	Hustache, Rev. Zool. Afr. XI, 1923, p. 162.	Belg. Kongo
brunneimaculatus	Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 439 ♂.	Engl. Ostafrika: Pori, Mburguni, Tavéta, Voi
calcaratus	Mshl. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 239.	Kongo
carinicollis	Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 271 (subgen. *Liosystates*).	Mombasa, Ruwenzori
castaneipennis	Hustache, Voy. Babault Afr. Or. Angl. 1921, p. 18.	Engl. Ostafrika

castellanus	Faust, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 245 ♂ ♀.	Erythraea
chiridensis	Mshl. Bull. Ent. Research XI, 1920, p. 275.	Rhodesia
cinereus	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 325.	Deutsch Ostafrika: Usambara
collaris	Hartmann, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 377. — Auriv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 414.	,,
conicirostris	Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 437 ♂ ♀.	Engl. Ostafrika: Shimoni, Tiwi
conspersus	Gerst. Decken's Reise III, 2, 1873, p. 232, Note. — Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. 1929, p. 442.	Mossambique, Zanzibar, Ostafrika: Ramisi, Shimoni, Tixi, Tanga
constrictus	Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 397.	Kongo
contiguus	Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 277 ♂ ♀.	Tanganyika-See
cordatus	Auriv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 417 ♂ ♀.	Kilimandjaro
corinthius	Fairm. Ann. Soc. Ent. France 1891, p. 266.	Tropisches Afrika: Mrogoro
crenatipennis	Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. CXLVII; Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 316. — Auriv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 414. — Hustache, Ann. Mus. Civ. Genova LI, 1924, p. 168; Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. 1929, p. 416.	Zanzibar, Kilimandjaro: Kibonoto, Kenya: Nyere
densepunctatus	Auriv. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris XVIII, 1912, p. 358; Voy. Rothschild en Éthiopie II, Col. 1922, p. 736, t. 1, c. 28, fig. 1 ♂, ? ♀.	Engl. Ostafrika: Berg Loraghi
denticollis	Hartmann, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 379 ♂ ♀. — Auriv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 414.	Usambara
dentipes	Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906, p. 921 ♂ ♀, t. 66, f. 5.	Mashonaland: Salisbury
depressus	Auriv. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris XVIII, 1912, p. 358; Voy. Rothschild en Éthiopie II, 1922, Col. p. 735, t. I, c. 27, f. 5 ♀.	Süd-Aethiopien: Tchafianani
dilaticollis	Hustache, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XVIII, 1936, p. 425, f. 7.	Abessinien: Berg Chillalo
dimorphus	Hustache, Sborn. ent. odd. ent. Mus. Praze IX, 1931, p. 70; Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XVIII, 1936, p. 427.	Erythraea: Cheren
Dollei	Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 35 ♂ ♀.	Abessinien: Choa

egenus	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 32 ♂ ♀.	Deutsch Ostafrika: Usambara, Kwai, Nguela
elegantulus	Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 424 ♂ ♀.	Kenya
ellipticus	Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 278 ♂ ♀.	Belg. Kongo: Kivu
elongatus	Auriv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 414 ♂ ♀.	Engl. Ostafrika: Meru-Berg und -Niederung
	var. *aenescens* Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 421. var. *setulosus* Auriv. l. c. p. 415. — Hustache, l. c. p. 420.	Engl. Ostafrika: Kijabé, Fluß Amboni, Longonotberg, Kilimandjaro, Kenya, Nairobi
erinaceus	Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 274 ♂ ♀.	Franz. und Belg. Congo; Gabon
Ertli	Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 275 ♂ ♀.	Ostafrika: Lukuledi
exaptus	Mshl. Bull. Ent. Research. XI, 1920, p. 273, t. 7, f. 2.	Rhodesia
farinosus	Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 427 ♂ ♀.	Ostafrika: Taveta
fossulatus	Kolbe, Berl. Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 30 ♂ ♀.	Westafrika: Chinchoxo
funicularis	Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXV, 1881, p. 87 (? *Systates*).	Zanguebar
fuscicornis	Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 37.	Abessinien: Choa
fuscoaeneus	Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. rend. p. LXXVI; Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 316.	Italien. Somaliland: Mogadiscio
gemmatus	Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 519 ♂ ♀; l. c. XLVII, 1899, p. 398.	Westafrika: Gabun, Congo
glaber	Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 421 ♂ ♀.	Engl. Ostafrika, Kijabé, Malafluß
granaticollis	Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVI, 1882, Compt. rend. p. LIII.	Zanzibar
granosus	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 325.	Deutsch-Ostafrika
granulipennis	Hustache, Rev. Zool. Afr. XI, 1923, p. 167.	Belg. Kongo
habenatus	Mshl. Bull. Ent. Research XVI, 1925—26, p. 392, f. 1—2 ♂ ♀.	Tanganyika: Arusha
Hacquardi	Hustache, Sborn. ent. odd. ent. Mus. Praze IX, 1931, p. 71.	Zanguebar

hirtus	Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, I, 1871, p. 72. — Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 442.	Deutsch-Ostafrika: Mombasa, Zanzibar; Kongo
hystricodes	Mash. Mem. Mus. Zool. Univ. Coimbra 81, 1935, p. 17.	Portug. Ost-Afrika
hystrix	Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, I, 1871, p. 72.	Mombasa
infranotatus	Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) I, 1928, p. 406.	Nyassaland
interstitialis	Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 38.	Abessinien: Choa
irregularis	Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 227.	Usambara: Derema
kapirensi	Hustache, Rev. Zool. Afr. XI, 1923, p. 169.	Belg. Kongo
katonaense	Hustache, Sbornik ent. odd. ent. Mus. Praze IX, 1931, p. 72.	Ostafrika
kigomanus	Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 279 ♂ ♀.	Belg. Kongo: Kigoma
kivuanus	Hustache, l. c. p. 276 ♂ ♀.	Belg. Kongo: Kivu
laevinasus	Hustache, Sborn. ent. odd. ent. Mus. Praze XIV, 1936, p. 14; Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 269 (subgen. *Liosystates*).	Uganda: Ruanda
laevirostris	Hustache, l. c. p. 288 ♂ ♀.	Belg. Kongo: Manyema, Ruanda
laevistriatus	Hustache, Rev. Zool. Afr. XI, 1923, p. 159; l. c. XXV, 1934, p. 269 (subg. *Liosystates*).	Belg. Kongo
laticollis	Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XIX, 1886, p. 327.	Kongo
latirostris	Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 430.	Mombasa Ins.
Lesnei	Mshl. Mem. Mus. Zool. Univ. Coimbra 81, 1935, p. 21.	Portug. Ost-Afrika
lepidotus	Hustache, l. c. p. 418 ♂ ♀.	Engl. Ostafrika: Shimoni, Zanzibar, Rhodesia: Mamark
Lindblomi	Auriv. Ark. Zool. 18 A, Nr. 23, 1926, p. 21.	Engl. Ostafrika
lineatulus	Hustache, Rev. Zool. Afr. XI, 1923, p. 162.	„
var. *aeneus*	Auriv. Ark. Zool. 18 A, Nr. 23, p. 22.	
longefemoratus	Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 319.	Uzagara
longehirtus	Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 429 ♂ ♀.	Engl. Ostafrika: Kilimandjaro
Lovéni	Auriv. Ark. Zool. 18 A, Nr. 23, 1926, p. 17.	Engl. Ostafrika: Elgon, Lumbua
luminifer	Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 191.	Zentralafrika

maculosus	Auriv. Ark. Zool. 18 A, Nr. 23, 1926, p. 4, 5 ♂ ♀. — Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 269 (subgen. *Liosystates*).	Zentralafrika: Birunga (Karissimbi)
marginalis	Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 423 ♂ ♀.	Engl. Ost-Afrika: Molo
marmoratus	Hustache, Sbornik ent. odd. Mus. Praze IX, 1931, p. 70.	Ostafrika
Maynei	Mshl. Bull. Ent. Res. VIII, 1917, p. 114, fgs.	Belg. Kongo: Mayumba
metallicus	Gerst. Jahrb. Wiss. Anstalt. Hamburg I, 1884, p. 58.	Massai
meruensis	nom. nov. *albosetosus* Auriv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 415 ♂ ♀ (nec Gestro).	Kilimandjaro, Meru
minimus	Marshall, Bull. Ent. Res. XXV, 1934, p. 498.	Tanganyika
minutus	Hustache, Voy. Babault Afr. Or. Angl. 1921, p. 20.	Engl. Ostafrika: Nairobi, Bura
mixtus	Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 399 ♂ ♀.	Kongo: Tschi, Loango
Monardi	Hustache, Bull. Soc. Neuchât. Sc. Natur. LX, 1935, p. 178 ♂ ♀.	Angola
moniliatus	Fairm. in Revoil, Fn. et Fl. Çomal. 1882, Col. p. 87.	Somaliland
nemoralis	Hustache, Rev. Zool. Afr. XI, 1923, p. 166.	Belg. Kongo
neovittatus	Auriv. Ark. Zool. 18 A, Nr. 23, 1926, p. 19.	Abessinien
nigriclava	Hustache, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XVIII, 1936, p. 427 ♂ ♀.	Abessinien: Djem-Djem
nigrinus	Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 433.	Kilimandjaro
nigrogranatus	Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVI, 1882, Compt. Rend. p. LII ♂ ♀.	Zanzibar
nitens	Hustache, Voy. Babault Afr. Or. Angl. 1921, p. 22, t. 1, f. 6; Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 442.	Engl. Ostafrika: Kenya
noxius	Hustache, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XVIII, 1936, p. 430, f. 8 ♂, 9 ♀.	Abessinien: Djem-Djem
niveovittatus	Auriv. Ark. Zool. 18 A, Nr. 23, 1926, p. 19.	Abessinien
nyamukubianus	Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 270 (subgen. *Liosystates*).	Belg. Kongo: Kivu
nyasalis	Mashl. Mem. Mus. Zool. Univ. Coimbra 81, 1935, p. 18.	Nyasaland
obesus	Auriv. Ark. Zool. 18 A, Nr. 23, 1926, p. 22; Voy. Rothschild en Éthiopie II, Col. 1922, p. 736, t. 1, c. 29, f. 1.	Abessinien: Harrar, Karssa
opacus	Auriv. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris XVIII, 1912, p. 355; Voy. Rothschild en Éthiopie II, Col. 1922, p. 732, pl. 1, c. 27, f. 1 ♂.	Abessinien
otiorrhynchoides	Hustache, Rev. Zool. Afr. XI, 1923, p. 163.	Belg. Kongo

ovipennis Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 436. — Engl. Ostafrika: Taveta, Bura

Overlaeti Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 280 ♂ ♀. — Lulua: Sandea

peraffinis Hustache, l. c. p. 271 ♀. — Mombasa: Lubero

pilifrons Hustache, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XVIII, 1936, p. 424. — Abessinien: Maraca, Addis Alam

pilipennis Hustache, Rev. Zool. Afr. XI, 1923, p. 165. — Belg. Kongo

pellucidus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 36. — Abessinien: Choa

perblandus Mshl. Bull. Ent. Research XVIII, 1928, p. 260 ♂ ♀, f. 3. — Nyassaland, Portug. Ostafrika

peryanus Mshl. Mem. Mus. Zool. Univ. Coimbra, 81, 1935, p. 19. — Portug. Ost-Afrika

pilosulus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 37. — Abessinien: Choa

planiusculus Hustache, Bull. Soc. Neuchât. Sc. Natur. LX, 1935, p. 179 ♀. — Angola

pollinosus Gerst. Arch. Naturg. XXXVII, 1, 1871, p. 71; Beitrag Ins. Sansibar 1871, p. 229, t. 11, f. 7; v. d. Decken's Reise III, 2, 1873, t. 11, f. 7. — Auriv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 414. — Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 419. — Ostafrika: Mombasa, Tanga, Massai, Taveta, Kilimandjaro, Usambara

var. *pubescens* Hustache, l. c. p. 420. — Ostafrika: Pori, Mbuyuni, Tavata Voi, Bura

Biologie: Moebius, Tropenpflanzer VI, 1902, p. 200. — Aulmann, Mitt. Zool. Mus. Berlin V, 1911, p. 261—263. — Reh in Sorauer, Handb. d. Pflanzenkrankh. III, 1906—13 (1912), p. 543 (Schädlich an Baumwolle und Manihot in Deutsch-Ostafrika).

prolixus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1884, Compt. rend. p. CCCXLVII; Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 317. — Italien. Somaliland: Mogadiscio

proximus Hustache, Rev. Zool. Afr. XI, 1923, p. 160. — Belg. Kongo

ptochoides Hustache, Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 45. — „

pumilus Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 521 ♂. — Westafrika: Kuilu, Gabun

pupillatus Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 287 ♂ ♀. — Belg. Kongo: Katanga

pustulatus Faust apud Hustache, Ann. Mus. Civ. Genova LI, 1924, p. 168. — Engl. Ostafrika: Fort Hall

pyriformis Auriv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 415 ♂ ♀. — Kilimandjaro: Bura

quadrispinosus Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 281, t. 6, f. 4 ♂ ♀. — Zentralafrika

ramosus Mshl. Bull. Ent. Research VIII, 1917, p. 112, f. — Afrika

rhinorhytus	Auriv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 416 ♂ ♀. — Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 428; Ann. Mus. Civ. Genova LI, 1924, p. 168.	Kilimandjaro, Nairobi, Kyabé, Kenya, Fort Hall
	var. *rufipes* Auriv. l. c. p. 416.	Meru
Rothschildi	Auriv. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris XVIII, 1912, p. 354; Voy. Rothschild en Éthiopie II, Col. 1922, p. 730, pl. 1, c 26, f. 4 ♂.	Engl. Ostafrika: Rendilé, Karoli
rubripes	Hustache, Rev. Zool. Afr. XI, 1923, p. 164.	Belg. Kongo
rudis	Mshl. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 240.	,,
ruficornis	Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 38.	Abessinien: Choa
rugulipennis	Hustache, Voy, Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 416 ♂ ♀.	Kilimandjaro
sabinionis	Auriv. Ark. Zool. 18 A, Nr. 22, 1926, p. 5, f. 3 ♀.	Zentral-Afrika: Birunga
Saeuberlichi	Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 68 ♂ ♀.	Ostafrika: Ikutha
Scotti	Hustache, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XVIII, 1936, p. 422 ♂ ♀, f. 6.	Abessinien: Berg Zukwala
seminudus	Gerst. Arch. f. Naturg. XXXVII, I, 1871, p. 71. — Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XVIII 1895 (1896), p. 716. — Hustache, Voy. Alluand & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 420.	Endara; Engl. Ostafrika: Bura, Pori Mbuguni
setifer	Auriv. Ark. Zool. 18 A, Nr. 23, 1926, p. 18.	Kilimandjaro: Kibonoto
	setulosus Auriv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 416.	
setosipennis	Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVIII, 1884, Compt. Rend. p. CXLVII; Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 317.	Zanzibar
sexspinosus	Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) VI, 1920, p. 380, t. 13, f. 12.	Nyasaland
Sidama	Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 402.	Gallaland: Arussi Galla, Ganale Guddà
simplex	Auriv. Ark. Zool. VIII, 1913, Nr. 21, p. 4 ♂.	Engl. Ostafrika
Smeei	Mshl. Bull. Ent. Research XVIII, 1928, p. 261, f. 4 ♂ ♀; Ann. Mag. Nat. Hist. (10) I, 1928, p. 407.	Nyasaland: Mlanjeberg. Portug. Ostafrika
sparsutus	Faust, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 144 ♂ ♀.	Erythraea
sphaericus	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 123 ♀. — Auriv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 417; Voy. Rothschild en Éthiopie II, Col. 1922, p. 732, t. 1, c. 27, f. 2 ♂ ♀. — Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 442.	Engl. Ostafrika: Tanga, Shimoni, Fluß Ramisi, Usambara (Momho)
squamosus	Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 286 ♂ ♀.	Belg. Kongo

striolatus	Auriv. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris XVIII, 1912, p. 356. — Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 421; Ann. Mus. Civ. Genova LI, 1924, p. 168.	Engl. Ostafrika
strophosomoides	Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 284 ♂ ♀.	Belg. Kongo: Katanga
subfasciatus	Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 521 ♂ ♀.	Westafrika: Loanda, Gabun
sulcatus	Hustache, Voy. Babault Afr. Or. Angl. 1921, p. 66.	Engl. Ostafrika: Lumbua, Elgon
sulcifrons	Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 520 ♂ ♀; l. c. XLIII, 1899, p. 398 ♂ ♀.	Westafrika: Kongo (Stanley Pool)
suturalis	Hustache, Sbornik ent. odd. ent. Mus. Praze IX, 1931, p. 69.	Ostafrika
sylvaticus	Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 425 ♂ ♀.	Engl. Ostafrika; Kenya, Kikuyu
t-nigrum	Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 519.	Kuilu, Loanda
tsibindanus	Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 272 ♂ ♀.	Belg. Kongo: Kivu
tuberculifer	Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 379 ♂ ♀.	Usambara
uncinatus	Hustache, Rev. Zool. Afr. XI, 1923, p. 167.	Belg. Kongo
uviranus	Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 283 ♂ ♀.	Belg. Kongo: Uvira
variabilis	Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 281 ♂ ♀.	Belg. Kongo: Kivu
variegatus	Auriv. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris XVIII, 1912, p. 358; Voy. Rothschild en Éthiopie II, Col. 1922, p. 734, t. 1, c. 27, f. 4 ♂ ♀.	Aethiopien: Boutta, Barko, Zwischen Yaba und Endessa
vicinalis	Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 399.	Kongo: Stanley Pool
villosus	Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 431 ♂ ♀.	Engl. Ostafrika: Aberdare Berg, Kikuyu, Kijabe, Naivasha
virescens	Auriv. Ark. Zool. 18 A, Nr. 23, 1926, p. 18.	Ostafrika: Elgon
viridulus	Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 285 ♀.	Belg. Kongo: Kikondja, Katanga
vittatus	Auriv. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris XVIII, 1912, p. 354; Voy. Rothschild en Éthiopie II, Col. 1922, p. 731, t. 1, c. 26, f. 5 ♂.	Engl. Ostafrika: Lasami

vulgaris Harold, Monatsber. Ak. Berlin 1880, p. 264. — Auriv. in Sjöstedt, Kilimandjaro-Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 413. — Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 420. — Engl. Ostafrika: Kilimandjaro, Kibonoto, Neu-Moschi, Fort Hall

Weisei Hustache, Sbornik ent. odd. ent. Mus. Praze IX, 1931, p. 72. — Usambara

zukwalanus Hustache, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XVIII, 1936, p. 420 ♂ ♀. — Abessinien: Berg Zukwala

181

Tanycerus Lacord.

Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 58. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg, 1893, p. 36. — Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 415. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 72.

Nematocerus Reiche in Ferret & Galinier, Voy. Abyssinie III, 1850, p. 384 (non Meigen 1818). — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. 1893, p. 36. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 58, Note 1. — Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVII, 1893, p. 36.

metallicus Reiche in Ferret & Galinier, Voy. Abyssinie 1850, p. 384, t. 24, f. 1 *(Nematocerus)*. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 59 *(Tanycerus)*. — Hustache, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XVIII, 1936, p. 428. — Abessinien, Tigré

1

Thinoxenus G. H. Horn.

G. H. Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 74. — J. L. Leconte & G. H. Horn, Class. Col. North Amer. ed. 2, in Smiths. Misc. Coll. 1883, p. 448. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Museum XLV, 1913, p. 423.

nevadensis Casey, Ann. New York Ac. Sc. IV, 1888, p. 267. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 357. — Nevada

squalens G. H. Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 74. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 425. — Kalifornien

2

Thricolepis G. H. Horn.

G. H. Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 68. — J. L. Leconte, Smiths. Misc. Coll. XXVI, 1883, p. 448. — Casey, Ann. New York Ac. Sc. IV, 1888, p. 269. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 424. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. IV, 3, 1911, p. 177.

inornata G. H. Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 69. — Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 177, t. 7, f. 18. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 356; l. c. XLV, 1913, p. 424. — Nordamerika: Kalifornien bis Utah, Mexico

seminuda G. H. Horn, Proc. Calif. Ac. Sc. IV, 1894, p. 443. — Kalifornien

simulator G. H. Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 69. — Pierce, U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 356. — „

3

Xestorhinus Auriv.

Auriv. Ark. Zool. 18 A, 1926, p. 14. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 504.

brevirostris Auriv. l. c. p. 15. — Engl. Ostafrika: Berg Elgon

favosum Auriv. l. c. p. 16. — „

lobeliae Auriv. l. c. p. 14. — „

3

3. Tribus: Mesostylini.

Otiorrhynchinae trib. *Mesostylini* Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 8, 9; Fauna Germ. V, 1916, p. 14.

Mesostylus Faust.

Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 57 *(Celeuthetes)*. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 231 *(Celeuthetes)*. — Reitter, Ent. Blätter IX, 1913, p. 278.

argentatus Reitter, Ent. Blätter IX, 1913, p. 279. — Transkaspien: Dopin-Kiso

Hauseri Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 58. — Transkaspien: Bairam-Ali

ab. *fulvotessellatus* Reitter, Ent. Blätter IX, 1913, p. 278. — Kuschk

ab. *Bangi* Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 243. — Buchara

Schelli Reitter, Ent. Blätter IX, 1913, p. 279. — Syr-Darja: Perowsk

truchmenus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 59. — Transkaspien: Bairam-Ali

4

4. Tribus: Celeuthetini.

Otiorrhynchides Groupe *Celeuthetides*, Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 145.

Otiorrhynchides Gruppe *Celeuthetides*, Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 1.

Celeuthetides Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 230—237 (Gattungstabelle).

Brachyrrhininae trib. *Celeuthetini* Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 421.

Celeuthetiden Heller, Verh. Naturf. Ges. Basel XLV, 1934, p. 25 (Gattungstabelle).

Acoptorhynchus Heller.

Heller, Ent. Blätter XXIX, 1933, p. 149, fig.

sus Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 282 *(Coptorrhynchus)*. — Heller l. c. — Deutsch-Neuguinea, Kaiser-Wilhelmsland, Astrolabe Bay

1

Agraphus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 640, l. c. VII, 1, 1843, p. 398. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 331. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 161. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 282; Otiorrhynchid. 1868, p. 2, 5, Anmerk. 2. — G. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, Nr. 76, 1876, p. 59. — J. L. Leconte, Smiths. Misc. Coll. XXVI, Nr. 507, 1883, p. 446. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 354. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Museum XLV, 1913, p. 421 *(Celeuthetini)*. — Blatchley & Leng, Rhynchophora North Eastern Amer. 1916, p. 108, 109.

bellicus Say, Descr. North Amer. Curcul. 1831, p. 13; ed. Leconte I, 1869, p. 274 *(Peritelus)*. — J. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, Nr. 96, 1876, p. 59 *(Agraphus)*. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 421. — Pennsylvanien bis Florida, Süd-Indiana, New Yersey

leucophoeus Gyllh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 641; l. c. VII, 1, 1843, p. 399 *(Agraphus)*. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 331.

Biologie: Beutenmüller, Journ. New York Ent. Soc. I, 1893, p. 38. — Blatchley & Leng, l. c. (Futterpflanze)

1

Amphionotus Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 231, 237.

Douei Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (3) VIII, 1860, p. 880 *(Geonemus)*. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 127, Note. — Gemm. Harold, Cat. Col. 1871, p. 2238 *(Rhinoscapha)*. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 237. — Neu-Kaledonien

1

Apirocalus Pascoe.

Pascoe, Cist. Ent. II, 1881, p. 590. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 290. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 232 *(Apirocatus)*.

cornutus Pascoe, Cist. Ent. II, 1881, p. 590; Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 209. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 290. — Waterhouse, Aid II, 1883, t. 129, f. 9. — Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 13. — Neu-Guinea: Yule Ins.

var. *ebrius* Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 189. — Neu-Guinea

Gestroi Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 209. — Yule Ins.

Thomsoni Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. (6) IV, 1889, p. 364. — Louisiade Arch.

3

Apotomorhamphus Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 234, 264.

Sarasini Faust, l. c. p. 265. — Süd-Celebes: Loka

splendens Faust, l. c. p. 264 ♂ ♀. — Süd-Celebes: Bua-Kraeng

2

Atactoglymma Heller.

Heller, Abh. Mus. Dresden IX, 1900, p. 22.

spinipes Heller, l. c. p. 22. — Celebes

1

Atactophysis Heller.

Heller, Verh. Naturf. Ges. Basel XLV, 1934, p. 9.

cordata Heller, l. c. p. 9. — Salomon-Ins.

1

Atactus Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. 1897, p. 234, 260.

deplanatus Bohem. Eug. Resa 1859, p. 126 *(Celeuthetes)*. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 150, Note 2. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 261 *(Atactus)*. — Ins. Punipet, Ponapé (Karolinen)

albosetosus Redtb. Reise Novara II, 1868, p. 148. — Heller, Ent. Mitteil. III, 1914, p. 310.

1

Behrensiellus Berg.

Berg, Com. Mus. Buenos Aires I, 1898, p. 17.

Cataphractus Behrens, Stett. Ent. Zeit. 1887, p. 233; l. c. 1897, p. 64.

difficilis Heller, Nova Guinea IX, 1914, p. 649. — Neu-Guinea

elongatus Heller, Abhandl. Mus. Dresden X, 1901, p. 11. — „

glabratus Pascoe, Journ. Linn. Soc. XI, 1871, p. 157; Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 208 *(Siteytes)*. — Malayisch. Arch.; Neu-Guinea

aethiops Behrens, Stett. Ent. Zeit. XLVIII, 1887, p. 233 *(Cataphractus)*. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 70, 233; Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 13.

var. *subvirens* Heller, Nova Guinea IX, 1914, p. 648. — Neu-Guinea

subsp. *moluccanus* Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden XII, 1908, p. 12. — Molukken

substriatus Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden X, 1901, p. 11. — Neu-Guinea

4

Bonthaina Heller.

Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900, p. 20.

Fausti Heller, l. c. p. 21. — Celebes

solitaria Heller, l. c. p. 21. — „

2

Calidiopsis Heller.

Heller, Philipp. Journ. Sc. VII, 1912, p. 379, 381.

affinis Schultze, Philipp. Journ. Sc. XVI, 1920, p. 200. — Mindanao

granosa Heller, Stett. Ent. Zeit. LXXXIV, 1923, p. 8. — Philippinen

lineata Schultze, Philipp. Journ. Sc. XIII, 1918, p. 376, t. 1, f. 5. — Mindanao

speciosa Heller, Philipp. Journ. Sc. VII, 1912, p. 381, t. II, f. 14. — Mindanao

4

Celeuthetes Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 250. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 149. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897 (1898), p. 233, 261, 236. — Heller, Verh. Naturf. Ges. Basel XLV, 1934, p. 26.

Sphaeromus Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 537; l. c. VII, 1, 1843, p. 250, Note 2 (nom. praeocc.). — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 329. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 149, Note 2.

bicristatus Montrouz. Ann. Soc. Agr. Lyon VII, 1857, p. 49 *(Otiorrhynchus)*. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 150, Note 2 *(Celeuthetes)*. — Macleay, Proc. Linn. Soc. New South Wales IX, 1884, p. 715. — Ins. Woodlark, Neu-Guinea, Ins. Fergusson, Ins. Key

Boisduvali Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 262. — Australien

australis Boisd. Voy. Astrolabe II, p. 298 (nec Gyllh.) *(Otiorrhynchus)*. — Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 17. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 329. — Neu-Guinea

cinerascens Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 231, t. 15, f. 6. — Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 210. — Heller, Verh. Nat. Ges. Basel XLV, 1914, p. 31. — Ins. Aru, Ins. Yule, Bismarck-Archipel

echinatus F. Syst. Eleuth. II, 1801, p. 525 *(Curculio)*. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 150. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897 (1898), p. 262. — Australien, Dorey, Salwatty, Fly River, Neuguinea, Morty, Aru, Sarawak

australis Gyllh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 539 *(Sphaeromus)*. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 150, Note 1.

granulosus Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897 (1898), p. 263. — Brit. Neu-Guinea.

granosus Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 17 (err.). — Ins. Fergusson, Ins. Goodenough

hebridarum Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897 (1898), p. 262. — Neue Hebriden

subsp. *rufipes* Heller, Nova Caledonia, Zool. II, 1916, p. 358.

hibisci Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (3) VIII, 1860, p. 882. — Ins. Lifu

incisus Montrouz. Ann. Soc. Agric. Lyon VII, 1857, p. 50 *(Otiorrhynchus)*. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 150, Note 2 (? *Celeuthetes)*. — Ins. Woodlark

impurus Bohem. Eugen. Resa 1859, p. 126. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 150, Note 2. — Ins. Guaham (Mariannen)

insularis Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 251. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 150, Note 2. — „

paganus Gyllh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 539; l. c. VII, 1, 1843, p. 251 *(Sphaeromus)*. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897 (1898), p. 262. — Vanikoro

platypennis Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (3) VIII, 1860, p. 881. — Ins. Art

setiger Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) I, 1885, p. 210. — Ins. Yule

subfasciatus Bohem. Eugen. Resa 1859, p. 126. — Ins. Guaham (Mariannen)

14

Choerorhamphus Faust.

Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 24.

setiger Faust, l. c. p. 25. — Neu-Guinea: Dilo, Ighibirei

1

Cnemidothrix Fairm.

Fairm. Naturaliste I, 3, 1879, p. 3; Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 296. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 234.

barbipes Saund. & Jekel, Ann. Soc. Ent. France (3) III, 1855, p. 293, t. 15, f. 3 *(Isomerinthus)*. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 153, Note *(Coptorrhynchus)*. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 297 *(Cnemidothrix)*. — Neue Hebriden: Lord Howe-Ins.

protensus Fairm. Naturaliste I, 3, 1879, p. 3; Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 296. — Viti-Ins.

2

Colposternum Heller.

Heller, Wien. Ent. Zeit. XXIX, 1910, p. 191; Verh. Nat. Ges. Basel XLV, 1934, p. 26.

malachiticum Heller, l. c. p. 192, 195. — Ins. Salomon; Kieta

laticolle Heller, l. c. p. 193, 195, f. 6. — Ins. Salomon: Bougainville, Kieta

subalatum Heller, l. c. p. 194, 195. — Ins. Salomon

3

Coptorhynchus Guér.

Guér. Rev. Zool. 1841, p. 191. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 152. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 236; Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 17, 18 (Bestimm.-Tab.). — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900—01 (1901), p. 23, 27 (Bestimm.-Tab.); Ent. Mitteil. III, 1914, p. 304.

Isomerinthus Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 242 (pars). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 152, Note.

aeruginosus Faust, apud Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900—1901 (1900), p. 26 *(Coptorhynchus)*. — Patria?

albivarius Lea, Proc. Linn. Soc. New South Wales LII, 1927, p. 354 *(Coptorhynchus)*. — Queensland

altirostris	Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 89 *(Sphaeropterus)*; l. c. LVIII, 1897, p. 293 *(Coptorhynchus)*. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900—1901 (1900), p. 25 *(Coptorhynchus)*.	Celebes: Minahassa; Sumatra
amabilis	Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900, p. 27, 35, f. 7 *(Coptorhynchus)*.	Süd-Celebes
ambiguus	Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 282 *(Coptorhynchus)*.	Neu-Guinea
amplus	Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900, p. 26, 30 ♂ ♀ *(Coptorhynchus)*.	Central-Celebes
asper	Pascoe, Cist. Ent. II, 1881, p. 591 *(Isomerinthus)*.	Tondano
batjanensis	Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 86 ♂ *(Sphaeropterus)*; l. c. LVIII, 1897, p. 293 *(Coptorhynchus)*. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900, p. 25 *(Coptorhynchus)*.	Ins. Batjan, Amboina
Beccarii	Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 213 *(Coptorhynchus)*. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900, p. 24, 25, 29, f. 14 *(Coptorhynchus)*.	Celebes: Kandari
beryllinus	Heller, l. c. p. 26, 33 *(Coptorhynchus)*.	Süd-Celebes: Loka
Blanchardi	Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 282 *(Coptorhynchus)*.	Neu-Guinea
bombicollis	Mac Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886 (1887), p. 185 *(Coptorhynchus)*.	„
bombylius	Guér. Rev. Zool. 1841, p. 192 *(Sphaeropterus)*. — Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 212 *(Coptorhynchus)*. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 153, Note.	Neu-Guinea: Fly River; Aru-Ins.
brevicollis	Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900, p. 25, 28, f. 12 *(Coptorhynchus)*.	Celebes
caesius	Heller, Abh. Ber. Mus. Dresden XVII, 1929, p. 4 *(Coptorhynchus)*.	Philippinen
celeutheticus	Heller, Abh. Mus. Dresden IX, 1900, p. 26, 29 *(Coptorhynchus)*.	Celebes
conifer	Heller, Ent. Blätter III, 1914, p. 303 ♂ ♀ *(Coptorhynchus)*.	Ins. Ceram
crassirostris	Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 213 *(Coptorhynchus)*. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 288.	Neuguinea
cruciatus	Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 280, 281 *(Coptorhynchus)*; Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 17.	Neu-Guinea: Port Moresby, Paumomu-Fluß
cyclophthalmus	Heller, Abh. Mus. Dresden IX, 1900, p. 26, 32 *(Coptorhynchus)*.	Central-Celebes
Demeyeri	Heller, Nova-Guinea IX, 1914, p. 650 *(Coptorhynchus)*.	Neu-Guinea
demissus	Heller, Abh. Ber. Mus. Dresden XVII, 1929, p. 5 *(Coptorhynchus)*.	Philippinen
disjunctus	Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 213 *(Coptorhynchus)*.	Celebes: Kandari
discretus	Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 18 ♀ *(Coptorhynchus)*.	Neu-Guinea: Haveri
distans	Faust, l. c. p. 18 ♂ ♀ *(Coptorhynchus)*.	Neu-Guinea: Paumomu-Fluß

dives	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 246 *(Isomerinthus)*. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 153, Note. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900, p. 27, 36, t. 24, f. *(Coptorhynchus)*.	Süd-Celebes
elegans	Guér. Rev. Zool. 1841, p. 191 *(Sphaeropterus)*. — Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 224, t. 15, f. 11. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 153, Note. — Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 211 *(Coptorhynchus)*. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 83 ♂ ♀ *(Sphaeropterus)*; l. c. LVIII, 1897, p. 293 *(Coptorhynchus)*. — ? Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900, p. 27 *(Coptorhynchus)*.	Ternate, Halmaheira (Oba), Borneo (Baram-Fluß), Jule Ins., Gilolo, Batchian
ellipticus	Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 293 ♂ ♀ *(Coptorhynchus)*.	Neu-Guinea
equinus	Lea, Ent. Mitteil. XVI, 1927, p. 130 *(Coptorhynchus)*.	Queensland
fraterculus	Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 20 ♂ ♀ *(Coptorhynchus)*.	Neu-Guinea: Paumomu-Fluß
fuscipes	Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 215 ♀ *(Coptorhynchus)*.	Neu-Guinea: Maroka
generosus	Faust, l. c. p. 290 ♀ *(Coptorhynchus)*; Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 21.	Neu-Guinea: Milne Bay, Ighibirei, Dilo, Kelesi
Gestroi	Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 211 *(Coptorhynchus)*. — Lea, Deutsche Ent. Zeitschr. 1910, p. 154.	Neu-Guinea: Cape York
globinasus	Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900, p. 25, 28, f. 9 *(Coptorhynchus)*.	Nord-Celebes: Minahassa, Masarang, Tomohon, Sudara
granifer	Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 89 *(Sphaeropterus)*; l. c. LVIII, 1897, p. 293 *(Coptorhynchus)*.	Celebes (Minahassa), Sumatra
gratus	Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 279 *(Coptorhynchus)*.	Neuguinea: Milne Bay
griseus	Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 211 *(Coptorhynchus)*.	Goram
Guérini	Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 85 ♂ ♀ *(Sphaeropterus)*; l. c. LVIII, 1897, p. 293 *(Coptorhynchus)*. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900, p. 25 *(Coptorhynchus)*.	Ternate; Halmaheira
guineensis	nom. nov. *improvidus* Heller, Nova Guinea XVII, 1935, p. 166 *(Coptorhynchus)* (nec Mshl. 1915).	Neuguinea
guttatus	Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 214, t. 2, f. 4 *(Coptorhynchus)*.	Yule-Ins.
guttiger	Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 222, t. 15, f. 9 *(Isomerinthus)*. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 280 *(Coptorhynchus)*.	Neuguinea

Helleri nom. nov. — Philippinen
Blanchardi Heller, Ent. Blätt. XXV, 1924, p. 44 (nec Faust 1897) *(Coptorhynchus)*.
ostentatus Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 234, t. 15, f. 7 (nec Gyllh.).

heteroclavatus Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900, p. 27, 36, f. 14 *(Coptorhynchus)*. — Celebes, Kandari

Hellerianus nom. nov. — Neuguinea
leucostictus Heller, Nova Guinea XVII, 1935, p. 164 *(Coptorhynchus)* (nec Pascoe 1885).

hospes Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XI, 1899, p. 19 ♂ ♀ *(Coptorhynchus)*. — Neuguinea: Paumomu-Fluß

hostis Heller, Nova Guinea XVII, 1935, p. 165 *(Coptorrhynchus)*. — Neuguinea

humilis Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 285 ♂ ♀ *(Coptorrhynchus)*. — Neuguinea: Mailu

hypocritus Faust, l. c. p. 289 ♀ *(Coptorrhynchus)*. — Fergusson Ins.

iliganus Heller, Abh. Ber. Zool. Mus. Dresden XVII, 1929, p. 4 *(Coptorhynchus)*. — Philippinen

immitis Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 212 *(Coptorrhynchus)*. — Neuguinea: Hatam, Korido

improvidus Mshl. Trans. Zool. Soc. London XX, 1915, p. 510 *(Coptorrhynchus)*. — Neuguinea

imuganus Heller, Abh. Ber. Zool. Mus. Dresden XVII, 1929, p. 3 *(Coptorrhynchus)*. — Philippinen

indiscretus Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 18 ♂ *(Coptorhynchus)*. — Neuguinea: Paumomu-Fluß

inornatus Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 211 *(Coptorhynchus)*. — Ternate

interruptus Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XII, 1883, p. 88 *(Isomerinthus)*. — Fiji-Ins.

Jansoni Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) VIII, 1871, p. 90 *(Isomerinthus)*. — Australien: Lizard-Ins.

Kükenthali Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 88 *(Sphaeropterus)*; l. c. LVIII, 1897, p. 293 *(Coptorhynchus)*. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900, p. 25 *(Coptorhynchus)*. — Celebes: Minahassa

lacerta Heller, l. c. p. 25, 29 *(Coptorhynchus)*. — Celebes: Matinang

lacophilus Heller, l. c. p. 27, 35 *(Coptorhynchus)*. — Central-Celebes, Possoa, Mapane
var. *regularis* Heller, l. c. p. 27.

lateralis Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 395 *(Otiorrhynchus)*. — Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 256 *(Psomeles)*. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 153, Note 2 *(? Coptorhynchus)*. — Australien

Leopoldi Mshl. Mém. Mus. Hist. Nat. Belg. IV, Heft 11 (hors sér.) 1935, p. 38 *(Coptorhynchus)*. — Celebes

lepidus Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 397 *(Otiorrhynchus)*. — Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 256 *(Psomeles)*. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 153, Note *(? Coptor-* — Australien, Sunda-Inseln, Neu-Irland

rhynchus). — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900, p. 27 *(Coptorhynchus)*.

leucopleurus Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 277 ♂ ♀ *(Coptorhynchus)*; Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 17. — Neuguinea: Moroka

leucostictus Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 214 *(Coptorhynchus)*. — Neuguinea: Sorong

ligatus Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 212 *(Coptorhynchus)*. — Neuguinea: Dorey, Romoi, Sorong, Saylee

longicollis Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900, p. 27, 34 ♂ ♀ *(Coptorhynchus)*. — Bunggai-Ins.

luhuanus Heller, l. c. p. 27, 34 *(Coptorhynchus)*. — Central-Celebes, Djaladja

manadensis Heller, l. c. p. 26, 31, f. 15 *(Coptorhynchus)*. — Manado

melancholicus Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 396 *(Otiorrhynchus)*. — Schönh. Gen. et Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 256 *(Psomeles)*. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 153, Note *(Coptorhynchus)*. — Australien

metapocyrtoides Heller, Abh. Ber. Zool. Mus. Dresden XVII, 1929, p. 5 *(Coptorhynchus)*. — Philippinen

migrans Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 88 *(Sphaeropterus)*; l. c. LVIII, 1897, p. 293 *(Coptorhynchus)*. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900, p. 26 *(Coptorhynchus)*. — Celebes (Minahassa), Sumatra

moerens Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 212 *(Coptorhynchus)*. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900, p. 26. — Neuguinea: Korido

mutilatus Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 395 *(Otiorrhynchus)*. — Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 256 *(Psomeles)*. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 153, Note *(? Coptorhynchus)*. — Amboina, Buru

narinosus Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900, p. 24, 27 *(Coptorhynchus)*. — Süd-Celebes: Bonthain

nudus Mac Leay, Proc. Linn Soc. N. S. Wales (2) I, 1886 (1887), p. 185 *(Coptorhynchus)*. — Neuguinea

ocularis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LII, 1927, p. 354 *(Coptorhynchus)*. — Queensland

opulentus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 247 *(Isomerinthus)*. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 153, Note. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900, p. 27 *(Coptorhynchus)*. — Celebes

ornatus Schultze, Philipp. Journ. Science LIII, 1934, p. 332, fig. *(Coptorhynchus)*. — Luzon

ostentatus Gyllh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 583 *(Otiorrhynchus)*. — Chevr. Rev. Zool. 1841, p. 227. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 236 *(Coptorhynchus)*. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900, p. 27 *(Coptorhynchus)*. — Philippinen

pectoralis Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 283 ♂ ♀ *(Coptorhynchus)*; Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 17. — Neuguinea: Moroka, Haveri

pellax	Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 21 *(Coptorhynchus)*.	Neuguinea: Paumomu-Fluß, Bujakori
perornatus	Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden XII, 1908, p. 13 *(Coptorhynchus)*.	Neuguinea: Balawa, Mankion
posticus	Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 18 *(Coptorhynchus)*.	Goodenough Ins.
puncticollis	Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 286, 288 ♂ ♀ *(Coptorhynchus)*.	Neuguinea: Humboldt-Bay
quadruplex	Heller, Nova Guinea IX, 1914, p. 649 *(Coptorhynchus)*.	Neuguinea
quattuordecimmaculatus	Chevr. Pet. Nouv. Ent. II, 1877, p. 189 *(Coptorhynchus)*.	,,
quinarius	Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 214 *(Coptorhynchus)*.	Neuguinea: Geelvink Bay
roseipes	Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900, p. 26, 32 *(Coptorhynchus)*.	Nord-Celebes: Toli Toli
semifasciatus	Heller, Abh. Ber. Zool. Mus. Dresden XVII, 1929, p. 4 *(Coptorhynchus)*.	Philippinen
setipennis	Chevr. Rev. Zool. 1841, p. 227 *(Coptorhynchus)*.	,,
servilis	Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 211 *(Coptorhynchus)*. — Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 22 *(Coptorhynchus)*.	Neuguinea: Fly River, Paumomu Fluß
speculatus	Mac Leay, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) I, 1886 (1887), p. 185 *(Coptorhynchus)*.	Neuguinea
sternalis	Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900, p. 27, 33 ♀ *(Coptorhynchus)*.	Süd-Celebes: Bonthain
strigifrons	Heller, Abh. Ber. Mus. Dresden XVII, 1929, p. 5 *(Coptorhynchus)*.	Philippinen
suavis	Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 83 ♀ *(Sphaeropterus)*; l. c. LVIII, 1897, p. 293 *(Coptorhynchus)*. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900, p. 27 *(Coptorhynchus)*.	Malayisch. Archipel: Batjan-Ins.
subacutus	Heller, l. c. p. 26, 30 *(Coptorhynchus)*.	Celebes: Banggai-Ins.
subcylindricus	Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 291 ♂ ♀ *(Coptorhynchus)*.	Neuguinea
subtilis	Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 87, 88 ♂ ♀ *(Sphaeropterus)*; l. c. LVIII, 1897, p. 293 *(Coptorhynchus)*. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900, p. 26 *(Coptorhynchus)*.	Celebes: Minahassa
sulcirostris	Heller, l. c. p. 26, 31 ♀ *(Coptorhynchus)*.	Süd-Celebes: Luhu-Djaladja
subligatus	Mshl. Mém. Mus. Hist. Nat. Belg. IV, Heft 11 (hors sér.), 1935, p. 39 *(Coptorhynchus)*.	Neuguinea
ternatensis	Guér. Rev. Zool. 1841, p. 191 *(Coptorhynchus)*. — Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 234, t. 15, f. 8. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 153, Note. — Pascoe, Ann.	Ternate, Goram, Celebes

Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 213. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900, p. 25 *(Coptorhynchus)*.

terrenus Mshl. Mém. Mus. Hist. Nat. Belg. IV, Heft 11 (hors sér.), 1935, p. 41 *(Coptorhynchus)*. — Misol-Ins.

tessellatus Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 223, t. 15, f. 10 *(Isomerinthus)*. — Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 211 *(Coptorhynchus)*. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 288 ♀ *(Coptorhynchus)*. — Aru-Ins., Neuguinea: Fly River

trivittatus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LII, 1927, p. 355 *(Coptorhynchus)*. — Queensland

turbidus Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 84 ♂ ♀ *(Sphaeropterus)*; l. c. LVIII, 1897, p. 393 *(Coptorhynchus)*. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900, p. 25 *(Coptorrhynchus)*. — Halmaheira, Soakonorra, Batjan

unifasciatus Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 292 ♀ *(Coptorhynchus)*. — Neuguinea: Kaiser-Wilhelms-Land

valens Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden XII, 1908, p. 14, tab. f. 6 *(Coptorhynchus)*. — Neuguinea Astrolabe-Geb.

vittaticollis Heller, Nova Guinea IX, 1914, p. 650 *(Coptorhynchus)*. — Neuguinea:

Waltoni Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 248 *(Isomerinthus)*. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 153, Note. — Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden IX, 1900, p. 26 *(Coptorhynchus)*. — Philippinen

zygopsicus Heller, l. c. p. 26, 33 ♂ ♀ f. 5 *(Coptorhynchus)*. — Süd-Celebes: Toli Toli, Buol, Philippinen

110

Ectemnomerus Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897 (1898), p. 236, 274.

bicristatus Faust, l. c. p. 276. — Mailu, Fergusson Inseln

durianus Heller, Abh. Mus. Dresden IX, 1900, p. 15. — Celebes

elegans Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897 (1898), p. 275; Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 22. — Neu-Guinea: Bujakori, Moroka, zwisch. d. Bergen Alexander und Nisbet

nigroplagiatus Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 23. — Neuguinea: Dilo, Ighibirei, Bujakori, Kapakapa, Paumomu-Fluß, Astrolabe Geb.

pertusicollis Faust, l. c. p. 24. — Neu-Guinea: Haveri, Moroka

viridanus Faust, l. c. p. 23. — Neu-Guinea: Astrolabe Geb.
6

Elytrocheilus Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 182; l. c. LVIII, 1897, p. 233. 248. — Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 70 (Bestimm.-Tab.)

albovittatus Heller, Wien. Ent. Zeit. XXIX, 1910, p. 183. — Neuguinea

Anthonyi Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 250, 253 ♂; Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 16. — Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 71. — ,,

Boviei Heller, l. c. p. 69. — ,,

brevicollis Heller, Nova Guinea XVII, Zool. 1935, p. 163. — ,,

breviusculus Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 70. — ,,

coerulatus Pascoe, Cist. Ent. II, 1881, p. 594; Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 208 *(Siteytes)*. — Waterh. Aid II, 1885, t. 161, f. 5. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 183; l. c. LVIII, 1897, p. 70, 249, 253; Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 16. — Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 71. — Yule-Ins. Neuguinea

confinis Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 249, 251; Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 13. — Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 70. — ,,

crassicornis Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 14 ♂ ♀. — Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 71. — ,,

depressior Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 253 ♂. — Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 71. — ,,

expansus Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 250, 254 ♂ ♀; Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 16 ♀. — Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 72. — ,,

var. *nigripes* Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 16 ♂ ♀.

falsoconfinis Heller, Nova Guinea XVII, Zool. 1935, p. 164. — ,,

graniger Pascoe, Cist. Ent. II, 1881, p. 593; Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 208 *(Siteytes)*. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 70, 249, 252. — Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 71. — Yule-Ins.

Helenae Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 183; l. c. LVIII, 1897, p. 250, 253; Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 16. — Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 71. — Neuguinea

intermedius Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 249, 252; Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 14. — ,,

oxygaster Montr. Ann. Soc. Agr. Lyon (n. s.) VII, 1855, p. 49 *(Otiorrhynchus)*. — Lacord. Gen. — Woodlark-Ins.

Col. VI, 1863, p. 151, Note 1. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 233, Note *(Elytrocheilus)*.

proximus Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 14. — Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 71. — Neuguinea

rhinoceros Heller, Wien. Ent. Zeit. XXIX, 1910, p. 185, f. 1. — Louisiade-Arch.

ruficollis Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 16 ♂. — Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 72. — Neuguinea

rufipes Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 15. — ,,

subcoerulatus Heller, Wien. Ent. Zeit. XXIX, 1910, p. 184. — Louisiade-Arch.

validus Heller, l. c. p. 186, f. 2. — Entrecasteaux, Arch. Woodlark

21

Elytrogonus Guér.

Guér. Rev. Zool. 1841, p. 126. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 148. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897 (1898), p. 231.

Elytrurus Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 238. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 147. — Fairm. Stett. Ent. Zeit. XLI, 1880, p. 207. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897 (1898), p. 230.

acuticauda Fairm. Naturaliste I, 1879, p. 46 *(Elytrurus)*; Stett. Ent. Zeit. XLI, 1880, p. 208; Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 292 *(Elytrurus)*. — Fidji-Ins.: Viti Levu

alatus Saund. & Jek. Ann. Soc. Ent. France (3) III, 1855, p. 290, t. 15, f. 1 *(Elytrurus)*. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 148, Note 1. — Neue Hebriden, Lord Howe-Ins.

bicolor Mshl. Proc. Hawaiian Ent. Soc. IV, 1919—21 (1921), p. 588 *(Elytrurus)*. — Samoa

bivittatus Mshl. l. c. p. 588; Samoa IV, 1931, Heft 5, p. 260.

caudatus Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. X, 1870, p. 471, t. 18, f. 5 *(Elytrurus)*. — Fairm. Stett. Ent. Zeit. XLI, 1880, p. 209; Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 292 *(Elytrurus)*. — Fidji-Ins.

cinctus Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 401 *(Elytrurus)*; in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 240. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 148, Note 1. — Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 511; Stett. Ent. Zeit. XLI, 1880, p. 211; Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 292 *(Elytrurus)*. — Neue Hebriden, Vanikoro, Tanga

Coquereli Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 36, 509 *(Elytrurus)*. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 148, Note 1. — Tahiti

dentipennis Fairm. Naturaliste I, 1879, p. 46 *(Elytrurus)*; Stett. Ent. Zeit. XLI, 1880, p. 209; Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 292 *(Elytrurus)*. — Fidji-Ins.

divaricatus C. O. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 10 *(Elytrurus)*. — Fairm. Stett. — ,,

Ent. Zeit. XLI, 1880, p. 212; Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 292 *(Elytrurus)*.

Durvillei Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 221, t. 13, f. 9 *(Elytrurus)*. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 148, Note 1. — Fairm. Stett. Ent. Zeit. XLI, 1880, p. 210; Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 292 *(Elytrurus)*. — Fidji-Ins., Labouka

expansus Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1877, p. 8 *(Elytrurus)*. — Fairm. Stett. Ent. Zeit. XLI, 1880, p. 207; Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 292 *(Elytrurus)*. — Fidji-Ins.: Ovalan, Viti-Levu

angulatus Waterh. l. c. p. 9. — Fairm. l. c. 1880, p. 208 ♀.

granatus Fairm. Naturaliste I, 1879, p. 116 *(Elytrurus)*; Stett. Ent. Zeit. XLI, 1880, p. 210; Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 292 *(Elytrurus)*. — Fidji-Ins.

griseus Guér. Rev. Zool. 1841, p. 126 *(Elytrogonus)*. — Blanch. Voy. Pôle Sud IV, p. 237, t. 15, f. 1—2. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 149. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 293. — Vavao-Ins., Viti-Ins.

Labrami Montrouz, Ann. Soc. Ent. France (3) VIII, 1860, p. 881 *(Elytrodon)*. — Jekel in Montrouz. l. c. Note 1 *(Elytrogonus)*. — Neu-Kaledonien

Lapeyrousei Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 400 *(Elytrurus)*. — Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 239. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 148, Note 1. — Ins. Vanikoro

maculicollis Heller, Nova Caledonia, Zool. II, L, 3, 1916, p. 358 *(Elytrurus)*. — Neue Hebriden

marginatus Saund & Jek. Ann. Soc. Ent. France (3) III, 1855, p. 291, t. 15, f. 2, a—b ♂ ♀ *(Elytrurus)*. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 148, Note 1. — Neue Hebriden: Lord Howe-Ins.

obtusatus Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 293 ♂ ♀ *(Elytrogonus)*. — Fidji-Ins.

otiorrhynchoides Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 36, 150 *(Elytrurus)*. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 148, Note 1. — Nuckahiwa (Nouka-Hiva)

papuanus Heller, Nova Guinea XVII, Zool. 1935, p. 162 *(Elytrurus)*. — Neuguinea

Risbeci Mshl. Rev. Franc. Ent. IV, 1937, p. 39 ♀. — Neue Hebriden

rusticus Pascoe, Cist. Ent. II, 1881, p. 589 *(Elytrurus)*. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 291. — Fidji-Ins.

samoensis Mshl. Proc. Hawaiian Ent. Soc. IV, 1921, p. 587 *(Elytrurus)*. — Samoa

var. *setiventris* Mshl. l. c. p. 587.

serrulatus C. O. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1877, p. 10. — Fairm. Stett. Ent. Zeit. XLI, 1880, p. 212 *(Elytrurus)*. — Fidji-Ins.

squamatus Rainbow, Mem. Austral. Mus. III, 1897, p. 92 *(Elytrurus)*. — Funafuti

subangulatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 2, 1883, p. 34 *(Elytrogonus)*. — Duke of York Ins.

subvittatus Pascoe, Cist. Ent. II, 1881, p. 589 *(Elytrurus)*. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France — Fidji-Ins.

(6) I, 1881, p. 292. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VI, 1930, p. 573.
horizontalis Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 291 *(Elytrurus)*.

vanikorae Heller, Arb. morphol. taxon. Ent. II, 1935, p. 269 *(Elytrurus)*. — Santa Cruz-Ins.

27

Enaptomias Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897 (1898), p. 234, 266.

immaculatus Faust, l. c. p. 268 ♀; Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 17. — Neuguinea: Milne Bay, Ins. Goodenough

oculatus Faust, l. c. p. 268 ♂ ♀. — Brit. Neuguinea: Mailu, Milne Bay

Rothschildi Faust, l. c. p. 266. — Fergusson-Ins.

3

Epizorus Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XIX, 1887, p. 371. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897 (1898), p. 230.

Simpsoni Pascoe, l. c. p. 371. — Heller, Verh. Nat. Ges. Basel XLV, 1934, p. 33. — Salomon-Ins.

1

Eupyrgops Berg.

Berg, Com. Mus. Buenos Aires I, 1898, p. 17.
Eucyrtus Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 236, 255 (nec Dej.).

granulosus Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 259 ♂. — Philippinen

Maquilingi Heller, Philipp. Journ. Scienc. LIV, 1934, p. 291. — „

Semperi Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 258 ♂. — „
banahaonis Heller, Philipp. Journ. Sc. D X, 1915, p. 222, f. 5. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1922, p. 45.

subannulatus Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 256 ♂ ♀ (Genotypus). — „

4

Gynaria Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XII, 1883, p. 89. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 230, Note.

nasuta Pascoe, l. c. p. 89 ♂ ♀. — Ins. Aru

1

Heteroglymma Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 234, 263. — Heller, Ent. Mitteil. III, 1914, p. 306.

alata Heller, Abh. Mus. Dresden IX, 1900, p. 20. Philippinen
subsp. *concava* Heller, l. c. XVII, 1929, p. 6.

albicans Heller, Abh. Mus. Dresden IX, 1900, p. 17, f. 24. Celebes

basale Heller, Abh. Mus. Dresden XVII, 1929, p. 7. Philippinen

bifasciata Heller, l. c. p. 8. „

bispinosa Heller, Abh. Mus. Dresden IX, 1900, p. 19. Sangi

biramosa Motsch. Étud. Ent. VIII, 1859, p. 102 *(Trigonops)*. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 263 (Genotype). Sunda-Ins., Celebes
Jekeli Pascoe, Journ. of Ent. I, 1860, p. 128, t. 7, f. 9. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 149; l. c. LVIII, 1897, p. 263.

carinicollis Heller, Ent. Mitteil. III, 1914, p. 306. Ins. Bali

carinulifera Heller, l. c. p. 304 ♂ ♀. „

cimex Heller, Abh. Mus. Dresden IX, 1900, p. 18, f. 13. Celebes

echinata Heller, l. c. p. 20. Lombok
subsp. *virescens* Heller, Ent. Mitteil. III, 1914, p. 305 ♂ ♀; l. c. p. 306 (err.: *virens*).

klabatica Heller, Abh. Mus. Dresden IX, 1900, p. 16. Celebes
var. *soputana* Heller, l. c. p. 17.

interruptevittata Heller, Abh. Mus. Dresden XVII, 1929, p. 7. Philippinen

perviride Heller, l. c. p. 6. „

pigra Heller, Ent. Mitteil. III, 1914, p. 306. Ins. Bali

radiolata Heller, Abh. Mus. Dresden XVII, 1929, p. 8. Philippinen

sejuncta Heller, l. c. p. 7. „

setosa Mshl. Treubia VI, 1925, p. 213. Java

sudarae Heller, Abh. Mus. Dresden IX, 1900, p. 18. Celebes
18

Hoplotrigonops Heller.

Heller, Verh. Naturf. Ver. Basel XLV, 1934, p. 21.

chlorizans Heller, l. c. p. 23 ♂ ♀. Salomon-Ins.

nigrocristata Heller, l. c. p. 22. „
2

Idiopsis Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 236, 293.

coerulea Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 295; Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 26. Neuguinea: Haveri, Moroka

excellens Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 27. Neuguinea: Astrolabe-Geb.

gitgita Heller, Ent. Mitteil. III, 1914, p. 306. Ins. Bali

grisea Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 294 ♂ ♀ (Genotypus); Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 26. — Neuguinea: Yule-Ins., Rigo, Port Moresby, Hughibagu, Kapakapa, Paumomu-Fluß, Astrolabe-Geb.

Koki Heller, Nova Guinea IX, 1914, p. 651. — Neuguinea

maculosa Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 26. — Neuguinea: Bujakori, Ighibirei, Paumomu-Fluß

ornata Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 296. — Neuguinea

perplexa Faust, l. c. p. 287 ♀. — Humboldt-Bay

radiatiformis Heller, Ent. Mitteil. III, 1914, p. 307. — Ins. Bali

setosapex Heller, Ent. Mitteil. III, 1914, p. 360. — „

10

Idorhynchus Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 232, 238.

Siteytes Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 146 (nec Schönh.).

lugubris Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 397 *(Siteytes)*. — Lacord. Gen. Col. VI, 1868, p. 147. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 70; l. c. p. 238. — Philippinen

fuscofemoratus (Chevr.) Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 71, 239.

1

Kietana Heller.

Heller, Wien. Ent. Zeit. XXIX, 1910, p. 195; Verh. Nat. Ges. Basel XLV, 1934, p. 26.

episomoides Heller, l. c. p. 196, f. 7. — Ins. Salomon, Bougainville, Kieta

1

Machaerostylus Heller.

Heller, Verh. Naturf. Ges. Basel XLV, 1934, p. 13.

insulanus Heller, l. c. p. 14, t. 1, f. 10. — Neu-Britannien

1

Microgonus Van Dyke.

Van Dyke, Bull. Bishop Mus. Honolulu XCVIII, 1932, p. 51.

oodemaformis Van Dyke l. c. p. 51, fig. — Marquesas-Ins.

1

Neopyrgops Heller.

Heller, Philipp. Journ. Sc. D, VII, 1913, p. 382.
albovaria Heller, l. c. p. 383. Philippinen
Banksi Heller, l. c. p. 382, t. 2, f. 4. „
dives Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1916, p. 290. „
panayensis Schultze, Philipp. Journ. Sc. XXI, 1922, p. 588. „
prasina Heller, Philipp. Journ. Sc. LIV, 1934, p. 292. „
5

Ocynoma Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 233.
antennata Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XII, 1873, p. 234. Swan River
cordipennis Pascoe, l. c. p. 234. „
rhysa Pascoe, Proc. Linn. Soc. New South Wales (2) II, 1888, p. 1007. Norfolk-Ins.
3

Pachyrhynchidius Faust.

Faust, Ent. Stett. Zeit. LVIII, 1897, p. 232, 239.
quadripustulatus Faust, l. c. p. 240 ♂ ♀. Engl.
1 Neuguinea: Moroka

Parasphenogaster Heller.

Heller, Abh. Mus. Dresden X, 1901, p. 15.
gracilicollis Heller, l. c. p. 15. Neuguinea
Ottonis Heller, l. c. XIII, 1910, p. 26. „
2

Paratactus Heller.

Heller, Verh. Naturf. Ges. Basel XLV, 1934, p. 11.
seriatogranosus Heller, l. c. p. 12, t. 1, f. 10. Neu-Irland
virescens Heller, l. c. p. 12. Salomon-Ins.
2

Phraotes Pascoe.

Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) XXII, 1885, p. 209. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 232.
mamillatus Heller, Abh. Mus. Dresden XIII, 1910, p. 25. Neuguinea
tuberculatus Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova XXII, 1885, p. 209, t. 1, f. 4. — Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 13. Neuguinea: Haveri
2

Piezonotus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 477. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 151. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, f. 326. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 236. — Heller, Ent. Mitteil. III, 1914, p. 310 (Bestimm.-Tab.).

Isomerinthus Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 242 (pars).

albosignatus Heller, Nova Guinea XVII, Zool. 1935, p. 166. — Neuguinea

diversus Pascoe, Not. Leyd. Mus., V, 1883, p. 87. — Heller, Ent. Mitteil. III, 1914, p. 310. — Saleyer

gibbus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 249 *(Isomerinthus)*. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 152, Note 1. — Heller, Ent. Mitteil. III, 1914, p. 310. — Java

humeralis Heller, Ent. Mitteil. III, 1914, p. 309 ♂ ♀. — Ins. Bali

javanus Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 138 ♂ ♀. — Heller, Ent. Mitteil. III, 1914, p. 310. — Java: Tengger-Geb

kalidupae Heller, Ent. Mitteil. III, 1914, p. 309 ♂ ♀. — Süd-Celebes: Ins. Kalidupa, Ins. Wantjee

suturalis Gyllh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 478 *(Piezonotus)*. — Lacord. Gen. Col. VI, 1862, p. 151. — Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 210. — Heller, Ent. Mitteil. III, 1914, p. 310. — Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 249 *(Isomerinthus)*. — Cast. l. c. p. 326. — Java, Amboina, Macassar, Banda

7

Platyacus Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 236, 270.

albidoplagiatus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 2, 1883, p. 35 *(Sphaeropterus)*. — Heller, Verh. Naturf. Ges. Basel XLV, 1934, p. 24 *(Platyacus)*. — Duke of York Ins., Neu-Britannien, Neu-Irland

var. *suturalis* Heller, l. c. p. 24.

carbunculus Heller, Abh. Zool. Mus. Dresden XVII, 1929, p. 24 *(Coptorrhynchus)*; Verh. Naturf. Ges. Basel XLV, 1934, p. 24 *(Platyacus)*. — Neuguinea, Neu-Pommern

decoratus Faust, l. c. p. 272. — Ins. Isabel

papillatus Faust, l. c. p. 274 ♂ ♀. — Heller, Verh. Naturf. Ges. Basel XLV, 1934, p. 24. — Neu-Britannien, Neuguinea

ruralis Faust, l. c. p. 273 ♂ ♀. — Heller, Verh. Naturf. Ges. Basel XLV, 1934, p. 24. — Neu-Guinea, Neu-Britannien

Websteri Faust, l. c. p. 270 ♂ (Genotyp.). — Heller, Verh. Naturf. Ges. Basel XLV, 1934, p. 33. — Insel Aru (Salomon Gruppe)

6

Platyspartus Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 235, 247.

latiscapus Heller, Mitteil. Dresden Mus. 1896, p. 18, f. 10 *(Piezonotus)*. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 248. — Süd-Celebes

1

Polycatus Heller.

Heller, Philipp. Journ. Sc. D, VII, 1913, p. 379.
aurofasciatus Heller, Philipp. Journ. Sc. D, VII, 1913, p. 380, t. 2, f. 15. — Philippinen
ab. *dilatisignatus* Heller, Abh. Ber. Mus. Tierk. Völkerk. Dresden XVII, 1929, p. 9, fig.
eupholoides Heller, Philipp. Journ. Sc. D, X, 1916, p. 223, f. 7. — ,,
opulentus Heller, Abh. Ber. Mus. Tierk. Völkerk. Dresden XVII, 1929, p. 9, fig. — ,,
panayensis Schultze, Philipp. Journ. Sc. D XIII, 1918, p. 376, f. 8. — ,,
4

Pseudosphaeropterus Heller.

Heller, Verh. Naturf. Ges. Basel XLV, 1934, p. 14.
simulans Heller, l. c. p. 15. — Neu-Irland
1

Pseudottistira Heller.

Heller, Philipp. Journ. Sc. LIV, 1934, p. 289.
subtuberculata Heller, l. c. p. 290, fig. — Luzon
1

Psomeles Guér.

Guér. Voy. Coquille II, 2, 1830, p. 120. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 154. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1895, p. 6, Note.
irroratus Eydoux, Rev. Zool. 1839, p. 266. — Manila
luctuosus Guér. Voy. Coquille II, 2, 1830, p. 120. — Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 508. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 154. — Tahiti
oblongus Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 229, t. 15, f. 17. — Tasmania
plagiatus Blanch. l. c. p. 229, t. 15, f. 18. — Neu-Guinea
4

Pyrgops Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 240. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 153. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 237.
cyanipes Chevr. Rev. Zool. 1841, p. 227 *(Trigonops)*. — Er. Arch. Naturgesch. VIII, 1842, II, p. 243. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 237, Note. — Philippinen
exigua Heller, Philipp. Journ. Sc. D VII, 1913, p. 387; Ber. Mus. Ethnol. Anthrop. Dresden VII, 1912 (1913), p. 384. — ,,
inops Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 241. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 153. — Heyne & Taschenb. Exot. Käfer, 1908, p. 225, t. 29, f. 57. — ,,
var. *aurocinctus* Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 154, Note 1.

rufipennis Heller, Phil. Journ. Sc. D VII, 1913, p. 386. — Philippinen
stellata Heller, l. c. p. 384. — „
var. *aurocincta* Heller, l. c. p. 385.
5

Rhyncogonus Sharp.

Sharp, Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 176; Proc. Hawaiian Ent. Soc. IV, 1919, p. 81. — Swezey, Proc. Hawaiian Ent. Soc. VIII, 1934, p. 527.

Adamsoni Van Dyke, Bull. Bishop Mus. Honolulu XCVIII, 1932, p. 36. — Marquesas-Ins.
aeneus Van Dyke, l. c. p. 50. — Hawaii
alternatus Van Dyke, Proc. Hawaiian Ent. Soc. V, 1922, p. 49. — „
biformis Perkins, Bryan Bishop Mus. Bull. XXXI, 1926, p. 60. — „
Blackburni Sharp, Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 177, t. 5, f. 28. — Giffard, Proc. Hawaii. Ent. Soc. I, 1907, p. 127—129, t. 3 (Biologie). — „
brevis Van Dyke, Bull. Bishop Mus. Honolulu XCVIII, 1932, p. 45. — Marquesas-Ins.
brunneus Van Dyke, l. c. p. 46. — „
Bryani Perkins, Ent. Month. Mag. LV, 1919, p. 4. — Laysan-Ins.
cinereus Van Dyke, Bull. Bishop Mus. Honolulu XCVIII, 1932, p. 39. — Marquesas-Ins.
corvus Van Dyke, l. c. p. 43. — „
cuneatus Van Dyke, l. c. p. 44. — „
Deae Perkins, Fauna Hawaiiensis III, 1910, p. 652. — Hawaii
depressus Perkins, Fauna Hawaiiensis II, 1900, p. 128, t. 7, f. 6. — Hawaii: Kanai
dubius Perkins, l. c. p. 125. — Hawaii: Molokai
extraneus Perkins, Fauna Hawaiiensis III, 1910, p. 651. — Swezey, Proc. Hawaii. Ent. Soc. VI, 1927, p. 407. — Hawaii
exul Perkins, Bryan Bishop Mus. Bull. XXXI, 1926, p. 59. — „
fallax Perkins, l. c. p. 59. — „
freycinetiae Perkins, Fauna Hawaiiensis II, 1900, p. 126, t. 7, f. 4. — Hawaii: Kanai
funereus Perkins, l. c. p. 123. — Hawaii: Oahu
fuscus Perkins, Fauna Hawaiiensis III, 1910, p. 652; Proc. Hawaii. Ent. Soc. VI, 1927, p. 471. — Hawaii
germanus Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XII, 1893, p. 293. — Neuseeland
Giffardi Sharp, Proc. Hawaiian. Ent. Soc. IV, 1919, p. 81. — Hawaii
gracilis Perkins, Ent. Month. Mag. (2) X, 1899, p. 57. — Marquesas-Ins.
griseus Van Dyke, Bull. Bishop Mus. Honolulu XCVIII, 1932, p. 44. — „
kanaiensis Perkins, Fauna Hawaiiensis II, 1900, p. 127. — Hawaii: Kanai
Koebelei Perkins, l. c. p. 126, t. 7, f. 5. — „
lahainae Perkins, l. c. p. 128. — Hawaii: Maui

lanaiensis Perkins, l. c. p. 128.	Hawaii: Lanai
lateralis Van Dyke, Bull. Bishop Mus. Honolulu XCVIII, 1932, p. 42.	Marquesas-Ins.
minor Perkins, Fauna Hawaiiensis II, 1900, p. 124.	Hawaii: Kanai
molokaiensis Perkins, l. c. p. 125.	Hawaii: Molokai
Mumfordi Van Dyke, Bull. Bishop Mus. Honolulu XCVIII, 1932, p. 40.	Marquesas-Ins.
mutatus Perkins, Proc. Hawaiian Ent. Soc. VI, 1927, p. 467.	Hawaii
navicularis Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VI, 1930, p. 553.	Marquesas-Ins.
nitidus Perkins, Fauna Hawaiiensis II, 1900, p. 122, t. 7, f. 1.	Hawaii: Kanai
obsoletus Perkins, Proc. Hawaiian Ent. Soc. VI, 1927, p. 466.	Hawaii
ochraceus Van Dyke, Bull. Bishop Mus. Honolulu XCVIII, 1932, p. 35.	Marquesas-Ins.
oppositus Van Dyke, l. c. p. 35.	,,
Perkinsi Van Dyke, l. c. p. 46.	,,
planatus Van Dyke, l. c. p. 49.	,,
planidorsis Broun, Trans. New Zeal. Instit. XLII, 1910, p. 296.	Neuseeland
plumbeus Van Dyke, Bull. Bishop Mus. Honolulu XCVIII, 1932, p. 32.	Marquesas-Ins.
pygmaeus Van Dyke, l. c. p. 50.	,,
saltus Perkins, Proc. Hawaiian Ent. Soc. V, 1924, p. 379; l. c. VI, 1927, p. 471.	Hawaii
segnis Perkins, Proc. Hawaiian Ent. Soc. VI, 1927, p. 465.	,,
Sharpi Perkins, Fauna Hawaiiensis III, 1910, p. 650.	,,
silvicola Perkins, Fauna Hawaiiensis II, 1900, p. 130.	Hawaii: Kanai
simplex Perkins, Fauna Hawaiiensis III, 1910, p. 651.	Hawaii
sordidus Perkins, Fauna Hawaiiensis II, 1900, p. 127; Proc. Hawaiian Ent. Soc. VI, 1927, p. 468.	Hawaii: Lanai
squamiger Perkins, Fauna Hawaiiensis II, 1900, p. 123, t. 7, f. 2.	Hawaii: Kanai
stygius Perkins, l. c. p. 124, t. 7, f. 3.	,,
submetallicus Van Dyke, Bull. Bishop. Mus. Honolulu CXIII, 1935, p. 51, fig.	Tahiti
tuberculatus Perkins, Fauna Hawaiiensis II, 1900, p. 129.	Hawaii: Kanai
uniformis Van Dyke, Bull. Bishop Mus. Honolulu XCVIII, 1932, p. 42.	Marquesas-Ins.
vestitus Sharp, Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1885, p. 177.	Hawaii
vittatus Perkins, Fauna Hawaiiensis II, 1900, p. 129, f. 7.	Hawaii: Kanai
Walkeri Perkins, Ent. Month. Mag. (2) X, 1899, p. 56.	Marquesas-Ins.
Welchii Perkins, Proc. Hawaiian Ent. Soc. VIII, 1933, p. 269.	Hawaii

Rhyncholobus Gahan.

Gahan in Andrews, Monogr. Christmas Isl. 1900, p. 108.

Andrewsi Gahan in Andrews, Monogr. Christmas Isl. 1900, p. 111 ♂ ♀. — Christmas Ins.

discoidalis Ch. O. Waterh. Proc. Zool. Soc. London 1887, p. 521, f. 3, p. 511 *(Piezonotus)*. — Gahan in Andrews, Monogr. Christmas Isl. 1900, p. 110 *(Rhyncholobus)*. — Heller, Ent. Mitteil. III, 1914, p. 310. — ,,

himalayensis Stebbing, Indian Forest Ins. 1914, p. 451. — Himalaya

Rossi Gahan in Andrews, Monogr. Christmas Isl. 1900, p. 109 ♂ ♀. — Christmas Ins.

vittatus Gahan, l. c. p. 110 ♂, t. 11, f. 6. — ,,

5

Sphaeropterus Guér.

Guér. Voy. Coquille 1830, p. 122. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 152, Note. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 235, 293.

Isomerinthus Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 242 (pars). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 152, Note.

albolineatus Guér. Voy. Coquille II, 1830, p. 123 *(Sphaeropterus)*. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 243 *(Isomerinthus)*. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 153. — Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 210 *(Coptorhynchus)*. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 235 *(Sphaeropterus)*. — Neuguinea

luctuosus Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 396 *(Otiorrhynchus)*. — Guér. Rev. Zool. 1841, p. 192. — Chevr. Rev. Zool. 1841, p. 227.

var. *scaposus* Pascoe, Cist. Ent. II, 1881, p. 592 *(Isomerinthus)*; Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 210.

subsp. *interruptus* Heller, Nova Guinea XVII, Zool. 1935, p. 164.

artensis Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (3) VIII, 1860, p. 879 *(Sphaeropterus)*. — Art.-Ins.

bituberculatus Kirch, Mitth. Mus. Dresden II, 1877, p. 152 *(Sphaeropterus)*. — Neuguinea, Jobi-Ins.

caudatus Guér. Rev. Zool. 1841, p. 192 *(Sphaeropterus)*. — Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 228, t. 15, f. 16. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 153, Note. — Neuguinea

decipiens Pascoe, Cist. Ent. II, 1881, p. 591 *(Isomerinthus)*. — Tondano

elongatus Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 226, t. 15, f. 13 *(Isomerinthus)*. — Philippinen: Mindanao

gramineus Pascoe, Cist. Ent. II, 1881, p. 591 *(Isomerinthus)*. — Tondano

granosus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 249 *(Isomerinthus)*. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 153, Note. — Philippinen

lineolatus Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 226, t. 15, f. 14 *(Isomerinthus)*. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 293. — Fiji-Ins.

quadrilineatus Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 225, t. 15, f. 12 *(Isomerinthus)*. — Ternate
rufipes Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 227, t. 15, f. 15 *(Isomerinthus)*. — Fiji-Ins.
scabratus F. Syst. El. II, 1801, p. 522 *(Curculio)*. — Oliv. Ent. Syst. V, 1807, p. 373, 442, t. 19, f. 244 *(Curculio)*. — Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 457 (? *Hipporhinus*). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 245 *(Isomerinthus)*. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 153, Note *(Coptorrhynchus)*. — Neu-Britannien
seriegranatus Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 295 *(Sphaeropterus)*. — Ins. Viti-Levu, Ovalan
13

Sphaerorhinus Guér.

Guér. Rev. Zool. 1841, p. 127. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 152. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 235.
aberrans Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 294. — Tonga-Ins.
lineatus Kôno, Ins. Matsum. II, 1928, p. 164. — Japan
Mac Leayi Montrouz. Ann. Soc. Ent. France (3) VIII, 1860, p. 879. — Ins. Art (Mariannen)
mutans Mshl. Ins. Samoa IV, 1931, Heft 5, p. 257. — Samoa
pallescens Perkins in Bryan Bishop Mus. Bull. XXXI, 1926, p. 62. — Hawaii
puncticollis Mshl. Proc. Hawaiian Ent. Soc. IV, 1922, p. 585. — Samoa
rugosicephalus Kôno, Ins. Matsum. II, 1928, p. 163, fig. — Japan
sordidus Perkins in Bryan Bishop Mus. Bull. XXXI, 1926, p. 62. — Hawaii
villosulus Guér. Rev. Zool. 1841, p. 127. — Blanch. Voy. Pôle Sud IV, p. 236, t. 15, f. 19. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 152. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) I, 1881, p. 297. — Ins. Vavao
9

Sphenogaster Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 234, 241.
bipustulata Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 242 ♀. — Neuguinea
carinirostris Heller, Abh. Mus. Dresden XIII, 1910, p. 26. — ,,
nitidula Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 243 ♂ ♀; Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 13. — ,,
3

Trigonops Guér.

Guér. Rev. Zool. 1841, p. 128. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 150. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII. 1897, p. 236. — Heller, Verh. Naturf. Ges. Basel XLV, 1934, p. 21, fig. (Bestimm.-Tab.).
angulata Motsch. Étud. Ent. VIII, 1859, p. 103. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 263. — Sunda-Ins.

bilunulata Motsch. Étud. Ent. VIII, 1859, p. 103. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 263. — Sunda-Ine.

bispina Motsch. Étud. Ent. VIII, 1859, p. 102. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 263. — „

bituberculata Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 137. — Java

carinicollis Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 506. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 151 *(Trigonops)*. — Tahiti

carinithorax Heller, Verh. Naturf. Ges. Basel XLV, 1934, p. 20. — Salomon-Ins.

coerulescens Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 232, t. 15, f. 5. — Heller, Verh. Naturf. Ges. Basel XLV, 1934, p. 21. — „

dispar Saund. & Jekel, Ann. Soc. Ent. France (3) III, 1855, p. 259, t. 15, f. 4 ♀. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 150, Note 3. — Neue Hebriden

exophthalmus Heller, Wien. Ent. Zeit. XXIX, 1910, p. 187, f. 3. — Salomon-Ins.

forticornis Heller l. c. p. 188, f. 5. — „

Froggatti Heller l. c. p. 189, f. 4; Verh. Naturf. Ges. Basel XLV, 1934, p. 21. — „

grisea Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 508. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 151, Note *(Trigonops)*. — Tahiti

impura Boh. Eugen. Resa 1859, p. 126 *(Celeuthetes)*. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 236, Note. — Guam-Ins.

irrorata Heller, Verh. Naturf. Ges. Basel XLV, 1934, p. 20, 21, t. 1, f. 14. — Salomon-Ins.

kombuisana Mshl. Treubia VI, 1925, p. 212. — Sunda-Ins.

longicollis Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 31. — Hainan-Ins.

nodulosa Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 240, t. 15, f. 3. — Patria?

notaticollis Heller, Wien. Ent. Zeit. XXIX, 1910, p. 190. — Tasmanien

Paravicinii Heller, Verh. Naturf. Ges. Basel XLV, 1934, p. 16, 21, t. 1, f. 7. — Salomon-Ins.

penicilligera Heller, l. c. p. 17, t. 1, f. 13. — Neu-Britannien

planicollis Heller, l. c. p. 16, 21. — Salemon-Ins.

platessa Heller, l. c. p. 19. — „

platypennis Montr. Ann. Soc. Ent. France (3) VIII, 1860, p. 881 *(Celeuthetes)*. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 236, Note. — Ins. Art

rotundipennis Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 504 *(Sphaerorhinus)*. — Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 239, t. 15, f. 4. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 151, Note 1 *(Trigonops)*. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 263 *(Celeuthetes)*; Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 25 *(Trigonops)*. — Vavao-Ins., Tenimber, Bangey

rugosa Guér. Rev. Zool. 1841, p. 128. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 150; Abt. VII, t. 64, f. 2 a. — Salomon-Ins.

salomonis Heller, Wien. Ent. Zeit. XXIX, 1910, p. 18, 21. — „

seriatopunctata Heller, Arb. morph. taxon. Ent. II, 1935, p. 269. — Santa Cruz-Ins.

setigera Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 507. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p .151, Note 1 *(Trigonops)*. — Tonga-Tabu

sexmaculata Heller, Nova Guinea XVII, Zool. 1935, p. 167, fig. — Neuguinea

smaragdina Motsech. Étud. Ent. VIII, 1859, p. 104. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 263. — Sunda-Ins.

spongicollis Fairm. Rev. Zool. 1849, p. 505. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 151, Note 1 *(Trigonops)*. — Tahiti

subfasciata Boh. Eugen. Resa 1859, p. 126 *(Celeuthetes)*. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 236, Note. — Guam-Ins.

tuberculata Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 137. — Java

variabilis Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 268 ♂ ♀. — Fergusson-Ins., Tobriand-Ins.

vitticollis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 2, 1883, p. 34. — Duke of York Ins.

35

Trigonospartus Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 235, 245.

rufidorsum Faust, l. c. p. 245 ♂ ♀; Ann. Mus. Civ. Genova XL, 1899, p. 13. — Neuguinea, Moroka—Haveri

1

5. Tribus: Trachyphloeini.

Otiorrhynchides gr. *Trachyphloeides* Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 191.

Otiorrhynchides s. str. Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 1 (pars).

Otiorrhynchinae trib. *Cathormiocerini* Reitter, Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 9, 11; Fauna Germ. V, 1916, p. 14.

Brachyderinae trib. *Trachyphloeini* Reitter, Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 20, 27; Fauna Germ. V, 1916, p. 47, 74.

Otiorrhynchinae gr. *Trachyphloeides* Mshl. Fauna of Brit. India, Rhynchophora 1916.

Brachyrhininae trib. *Trachyphloeini* Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 422.

Otiorrhynchinae trib. *Otiorrhynchini* Blatchley & Leng, Rhynchophora North Eastern America 1916, p. 98, 108 (pars).

Otiorrhynchinae trib. *Trachyphloeini* Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 63 (Curcul. Gallorhén. 181).

Trachyphloeus Germ.

Germar, Mag. Ent. II, 1817, p. 339—341; Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 403. — Latr. Règne Anim. 1825, p. 391. — Schönh. Disp. meth. 1826, p. 189; Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 489; l. c. VII, 1, 1843, p. 109. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 121, 139. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 326. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 106. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XIX, 1847, p. 217-23; Brit. Ins. Curc. 1844—52, p. 79; Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 341—52, 359—69. — Redtb. Gatt. Deutsch. Käferfn. 1849, p. 39; Fn. Austr. 1849, p. 39 e 429; l. c. ed. 2, 1858, p. CXXI, e 733; l. c. ed. 3, I, 1874, p. CXXXIII; l. c. II, 1874, p. 232. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 151, 261. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Curc. 1854, p. 32. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 133; l. c. VII, 1865, p. 130; l. c., X, 1868, p. 171. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 450, 496. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 192. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 282; Otiorrhynchid. 1868, p. 4, 91; Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Gatt. p. 157, Arten p. 591; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 157, Arten p. 652. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 599. — G. H. Thoms. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 78. — Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 430. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1886), p. 33, 39; (1887), p. 234; (1888), p. 423. — J. L. Leconte & G. H. Horn, Class. Col. North American Col. in Smiths. Misc. Coll. XXVI, 1883, p. 489. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 59, 135; Best.-Tab. 13, 1885, p. 3, 79; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1892), p. 238, 257. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 172, 182; l. c. VI, 1913, p. 185. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 534. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 551, 573. — Desbr. Frelon XVII, 1909, p. 85. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, (Best.-Tab. 61), p. 121, 125, 191 (Revision); Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 224 (Best.-Tab.). — Pic, Échange XXIV, 1908, p. 9 (Fundorte). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 908, 945. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1052, 1065. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 27; Fn. Germ. V, 1916, p. 74, 75. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 423. — Blatchley & Leng, Rhynchophora of North East. America 1916, p. 137. — Escalera, Boll. Soc. Españ. Hist. Nat. XXIII, 1923, p. 433 (Best.-Tab.; Arten aus Spanien und Nordafrika). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 64 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 182). — Luigioni. Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (II) XIII, 1929, p. 893 (Katalog). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 110. — Hubenthal, Ent. Blätt. XXX, 1934, p. 177.

Ephradus Megerle in Dahl, Col. & Lepid. 1823, p. 62 (s. descr.).

Lacordairius Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 413; Bol. Soc. Españ. Hist. Nat. XXIII, 1923, p. 433 (*Trachyphloeus* subgen.).

Misomermus Dallas, Record IV, 1867 (1868), p. 275 (err.).

Paratrachyphloeus Desbr. Frelon IV, 1895, p. 80.

Subgen. *Pseudolacordairius* Escalera, Bol. Soc. Españ. Hist. Nat. XXIII, 1923, p. 434.

algerinus Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 94, 119 (*Trachyphloeus*). — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 603, 627. — Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 140; Best.-Tab. 13, 1885, p. 84. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 137, 177. Algier

algesiranus Escalera, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. XXIII, 1923, p. 439, f. 7 *(Lacordairius)*. — Algeciras, Gibraltar

var. *Walkeri* Escalera, l. c. p. 439. — Tetuan

alternans Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 483; l. c. VII, 1, 1843, p. 117 *(Trachyphloeus)*. — Germ. Stett. Ent. Zeit. III, 1842, p. 102. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XIX, 1847, p. 222; Brit. Ins. Curc. 1844—52, p. 84; Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 344. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 93, 108; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 653. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 602, 616. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 233. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 42; (1886), p. 236 *(Trachyphloeus* subg. *Trachyphlocus)*. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 137; Best.-Tab. 13, 1885, p. 81; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1892), p. 257. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 183, 185, 305. — Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 310; Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 813. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 574. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXV, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 132, 157. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 945. — Reitter, Fauna Germ. V, 1916, p. 76, t. 155, f. 26. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 66, 67 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 184, 185). — Hoffmann in Soc. Ent. France, Livre du Centenaire 1932, p. 234, fig. 2 ♂ ♀. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 893. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 111. — Mittel- u. Südeuropa, Holland, Frankreich, Italien, Kaukasus, Bosnien, Herzegovina, Bulgarien (Sofia), Serbien, Pozarevac, Kaspisee-Gebiet

scaber Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 430; l. c. ed. 2, 1858, p. 734 *(Trachyphloeus)*. — C. G. Thoms. Opusc. Ent. IV, 1871, p. 391.

spinimanus Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 123; Man. Brit. Col. 1839, p. 244 *(Trachyphloeus)*.

var. *bilekensis* Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosn. X, 1898, p. 310; Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 813. — Herzegovina: Bilek

Biologie: Tylden, Ent. Month. Mag. IX, 1872—73 (1873), p. 290. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 52; l. c. XVIII, 1886, p. 290.

amplithorax (Desbr.) Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 137, 179 *(Trachyphloeus)*. — Dobrudscha, Bulgarien

Antoinei Escalera, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. XXIV, 1924, p. 353, fig. 1 *(Lacordairius)*. — Casablanca

apuanus A. & F. Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLII, 1905, p. 93 *(Trachyphloeus)*. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 136, 175; Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 626. — Porta, Riv. Col. Ital. VI, 1908, p. 149. — Luigioni, Mem. Pon- — Etrurien

tificia Sc. Accad. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 894. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 112.

argentatus Pic, Echange XXIV, 1908, p. 29. — Algerien

aristatus Gyll. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 613 *(Curculio)*; in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 491; l. c. VII, 1, 1843, p. 116 *(Trachyphloeus)*. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1935), p. 128 *(Curculio)*. — C. G. Thoms, Skand. Col. VII, 1865, p. 131; l. c. X, 1868, p. 175 *(Trachyphloeus)*. — Rye, Ent. Monthly Mag. II, 1865—66 (1865), p. 156—157. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 95, 123; Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 592; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 654. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 604, 632. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 233. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 424; (1886), 235 *(Trachyphloeus* subg. *Trachyphloeus)*. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 140; Best.-Tab. 13, 1885, p. 84; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1892), p. 258. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 182, 183, 305; l. c. VI, 1913, p. 185. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 535. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 573. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 138, 188. — Newberry, Ent. Month. Mag. XLV, 1909, p. 33. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 946. — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 77. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 67, 76 (Curc. Gallo-Rhén. p. 185, 194). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 893. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 112. — Nord- und Mittel-Europa, Schweden, Pommern, Volhynien, Kroatien, Bosnien, Britannien, Österreich, Italien

asphaltinus Gyllh. in Schönh. Gen Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 496; l. c. VII, 1, 1843, p. 119. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 632 *(Trachyphloeus)*.

hispidulus Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 122; Man. Brit. Col. 1839, p. 244 *(Trachyphloeus)*.

setosus Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 107 *(Trachyphloeus)*.

stipulatus Germ. Fauna Ins. Eur. XIII, 1827, t. 15 *(Trachyphloeus)*.

sulculus Rey, Échange 1894, p. 139. — Hustache, Bull. Soc. Ent. France 1920, p. 311.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 52; l. c. XVIII, 1886, p. 290.

ascendens Peyer. Bull. Soc. Ent. France 1918, p. 258. — Algerien: Djurdjura

asperatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 116. — G. H. Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 79. — Blatchley & — U.S.Amer.: Boston, Maine,

Leng, Rhynchophora of North Eastern America 1916, p. 114. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 358. — Massachusetts, Missouri, Kansas, Nebraska

aureocruciatus Desbr. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. III, 1869—72 (1871), p. 342. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 612. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 137; Best.-Tab. 13, 1885, p. 81. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 123. — Deville, Cat. Col. Corse 1914, p. 418. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 70 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 188). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 893. — Hoffmann in Soc. Ent. France, Livre du Centenaire 1932, p. 238, fig. 8 ♂ ♀ (eigene Art). — Süd-Frankreich: La Napoule (Alp. Mar.), Korsika, Sardinien, Italien, Sicilien, Griechenland: Korfu; Tunis, Algier

fusciscapus Desbr. Frelon XVII, 1909, p. 89. — Korsika

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 151; l. c. XVIII, 1886, p. 290.

bifoevolatus Beck, Beitr. Bayer. Ins.-Fn. 1817, p. 22, t. 7, f. 36. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1883), p. 41; (1886), p. 235 *(Trachyphloeus* subgen. *Trachyphloeus)*. — Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 310; Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 813. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 574. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 137, 178. — Wagner in Calwer, Käferb. ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1065, t. 38, f. 4. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 946. — Reitter, Fauna Germ. V, 1916, p. 77, t. 155, f. 28. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 67, 73 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 185, 191). — Hoffmann in Soc. Ent. France, Livre du Centenaire 1932, p. 233, fig. 10 ♂ ♀. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 893. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 112. — Europa, Kaukasus, Canarien, Madeira

Biologie: Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon 1893, p. 43 (163—66) (Metamorphose); Naturaliste XXII, 1900, p. 2; Rev. Ent. XX, 1901, p. 9. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 166 (Nährpflanze). — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 52; l. c. XVIII, 1886, p. 290.

scabriculus Gyllh. var. b Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 303; l. c. I, 4, 1827, p. 613 *(Curculio)*.

squamosus Gyllh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 491; l. c. VII, 1, 1843, p. 114. — Bach, Käfern. II, 1852—54 (1854), p. 263. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 497. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 430; l. c. ed. 2, 1858, p. 734.

scaber Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 117 *(Trachyphloeus)* (non L. 1758). — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XVIII, 1847, p. 217; Brit. Ins. Curc. 1844—52, p. 79; Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 341. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 262. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. Curc. 1854, t. 14, f. 63, 63a. —Woll. Ins. Maderensia 1854, p. 394; Cat. Col. Madeira 1857, p. 118; Cat. Col. Canar. 1864, p. 363; Cat. Col. Atlant. 1865, p. 327. — Gutfleisch ed. Bose, Käferfn. Deutschl. 1859, p. 494. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 131; l. c. X, 1868, p. 175. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 117; Fauna Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 592; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 654. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 603, 625. — Redtenb. Fauna Austr. ed. 3, II, 1874, p. 233. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 139; Bestimm.-Tab. 13, 1885, p. 83; Fauna Col. Helv. II, 1886—98 (1892), p. 258. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 182, 184, 305. — Lameere, Man. Faune Belg. II, 1900, p. 535.

rostratus C. G. Thoms. Skand. Col. X, 1868, p. 175. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 638.

var. *tessellatus* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 307 *(Curculio)*. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 121; Man. Brit. Col. 1839, p. 243 *(Trachyphloeus)*. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 114. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 139; Best.-Tab. 13, 1885, p. 83. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 945. — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 76. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 893.

confinis Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 121; Man. Brit. Col. 1839, p. 243. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 114.

septentrionis C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 123 *(Otiorrhynchus)*.

angustisétulus Hansen, Ent. Meddel X, 1915, p. 329. — Hoffmann, Bull. Soc. Ent. France 1930, p. 105. — Hustache, Bull. Soc. Ent. France 1930, p. 192. — Hoffmann in Soc. Ent. France, Livre du Centenaire 1932, p. 240 *(angustisetulosus)*.

biskrensis Pic, Échange 1903, p. 130. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 134, 164 ♂ ♀. Algier

bonensis Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 131, 155. Algier: Bône

bosnicus Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 310; Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 813 *(Trachyphloeus)*. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 135, 171. — Bosnien, Südherzegovina, Dalmatien, ? Bulgarien

brevicornis Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLII, 1906, p. 92. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 132, 158. — Tunis: Sfax

brevirostris Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 407 *(Peritelus)*. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 94, 121 *(Trachyphloeus)*. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 603, 630. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 140; Best.-Tab. 13, 1885, p. 84. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 138, 183. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 11, Note 1 *(Cathormiocerus*, subgen. ?). — Spanien

picturatus Fuente, Bol. Soc. Españ. Hist. Nat. 1902, p. 106. — Formánek l. c. p. 123.

brevis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 113 *(Trachyphloeus)*. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 93, 99 *(Trachyphloeus)*. — Kap

canaliculatus Schauf. Col. Hefte II, 1867, p. 20 *(Mitomermus)*. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 95, Note *(Trachyphloeus)*. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 638. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 142; Best.-Tab. 13, 1885, p. 86. — Balearen

cecyropioides Broun, Man. New Zeal. Col. III/IV, 1886, p. 905 *(Trachyphloeus)*. — Neuseeland: Port Chalmers

Championi Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 135, 171. — Griechenland: Saloniki

cinereus A. F. Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLII, 1906, p. 90. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best. Tab. 61), p. 131, 154 ♂ ♀. — Tunis

clarus Broun. Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 431. — Neuseeland

coloratus Allard, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 325 *(Trachyphloeus)*. — Seidlitz, Nouv. et Faits 1870, nr. 16. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 626. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 139; Best.-Tab. 13, 1885, p. 83. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 137, 179. — Algier: Constantine

Beauprei Pic, Échange XXI, 1905, p. 155. — Formánek, l. c. p. 123.

caenopsiformis Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 140. — Kleinasien: Smyrna

complutensis Escalera, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. XXIII, 1923, p. 436, f. 4 *(Lacordairius)*. — Alcalá de Henares

corpulentus Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 431. — Neuseeland

cruciatus Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 93, 103 *(Trachyphloeus)*. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 601, 611. — Stierl. Mittheil. Schweiz. — Algier: Oran

Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 136 (Best.-Tab. 13), p. 80. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 129, 144 ♂ ♀.

Davisi Blatchley & Leng, Rhynchoph. of North East. America 1916, p. 115. — Nordamerika: Staten Island (N. Y.)

denticulatus Escalera, Trab. Mus. Madrid XI, 1914, p. 414; Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. XXIII, 1923, p. 439, f. 8 *(Lacordairius)*. — Marokko: Mogador

Desbrochersi Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 141; Best.-Tab. 13, 1885, p. 85. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 190. — Algier: Oran

difformis Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 130, 149. — Tunis: Sfax

digitalis Gyll. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 615 *(Curculio)*; in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 494; l. c. VII, 1, 1843, p. 118 *(Trachyphloeus)*. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 123; Man. Brit. Col. 1839, p. 244. — Bach, Käferfn. II, 1852—1854 (1854), p. 262. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 497. — G. C. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 134; l. c. X, 1868, p. 175. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 94, 110; Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 592; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 653. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 602, 618. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 735. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 138; Best.-Tab. 13, 1885, p. 82. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 133, 163. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 946. — Newberry, Ent. Month. Mag. (2) XXIV, 1913, p. 126. — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 76. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 112. — Schweden, England, Rußland, ?Sardinien

dilatatus J. L. Leconte, Rep. Explor. Mississippi River IX, 1857, App. I, p. 21. — Californien

distans Rey, Échange 1894, p. 139. — Provence

distinguendus Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 131, 152. — Tunis: Souk-el-Arba

elephas Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 394. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 134, 167. — Griechenland: Morea (Hagios Wlassis), Korfú

Escalerae nom. nov. — Marokko

parallelus Escalera, Trab. Mus. Madrid XI, 1914, p. 413 (nec Seidlitz).

Fairmairei Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XII, 2, 1873 (1874), p. 12. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 130, 150. — Algier: Oran

Fleischeri Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXX, 1911, p. 204. — Rumänien

Frivaldszkyi Kuthy, Termész. Füzet. XI. 1887, p. 27. — Formánek. Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 136, 174. — Ungarn

globicollis Stierl. Frelon V, 1895—96 (1895), p. 43; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1893—97 (1897), p. 478 *(Trachyphloeus)*. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 138, 184. — Spanien: Ciudad-Real

globipennis Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 106 ♂ *(Trachyphloeus)*. — Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 3, 11; Wiss. Mittheil. Bosnien VI, 1899, p. 814 ♂ ♀. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 133, 165 ♂ ♀. — Varna

Godarti Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 93, 102 *(Trachyphloeus)*. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 601, 610. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 136; Best.-Tab. 13, 1885, p. 80. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 130, 147 ♂ ♀. — Algier: Oran

impressicollis Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 136; Best.-Tab. 13, 1885, p. 80 *(Trachyphloeus)*. — Marseul, Cat. Col. Anc. Monde 1881 (s. descr.). — Desbr. Frelon VII, 1898—99 (1898), p. 7, Note. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 123.

gracilicornis Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 94, 115 *(Trachyphloeus)*. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 603, 623. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 139; Best.-Tab. 13, 1885, p. 83. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61, p. 134, 168. — Syrien: Beirut

granulatus Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 95, 127 *(Trachyphloeus)*. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 141; Best.-Tab. 13, 1885, p. 85. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 136, 175; Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 626. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 67, 78 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 185, 196). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 894. — Hoffmann in Soc. Ent. France, Livre du Centenaire 1932, p. 234, fig. 1 ♂ ♀. — Süd-Frankreich

granulus Marseul, Abeille XI, 1873, p. 604, 635.

atrictirostris Rey, Échange 1894, p. 139. — Hustache, Bull. Soc. Ent. France 1920, p. 311.

guadarramus Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 95, 125 ♂ ♀ *(Trachyphloeus)*. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 604, 634 ♂ ♀. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 141; Best.-Tab. 13, 1885, p. 85. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 138, 184; l. c. XXVII, 1908, p. 143. — Mittelspanien: Sierra Guadarrama

Hardenbergi Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XI, 1923, p. 542 figs. — Portug. Ostafrika

Herrerai Escalera, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. XXIV, 1924, p. 354, f. 2 *(Lacordairius)*. — Marokko

Heymesi Hubenthal, Ent. Blätt. XXX, 1934, p. 178. — Deutschland: Harz, Kyffhäusergeb.

Hustachei Hoffmann in Soc. Ent. France, Livre du Centenaire 1932, p. 240. — Frankreich: Hautes Alpes; Nizza, Alp. Mar., Bass. Alpes

inermis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 119 *(Trachyphloeus)*. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 264. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 735; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 233. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 497. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 95, 126; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 654. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 604, 634. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 141; Best.-Tab. 13, 1885, p. 85; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1892), p. 258. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 137, 180. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 945. — Reitter, Fauna Germ. V, 1916, p. 77. — Deutschland, Österreich, Mähren, Ungarn, Rumänien, Südrußland, Kaukasus

sabulosus Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 431; l. c. ed. 2, 1858, p. 735 *(Trachyphloeus)*. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 263. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 498. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 634.

laticollis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 118. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 93, 106 ♂ ♀; Nouv. et Faits 1870; Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 592; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 653. — Crotch, Trans. Ent. Soc. London 1870, Proc. p. XX. — Lennon, Ent. Monthly Mag. XIV, 1877—78 (1878), p. 278. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 602, 615 ♂ ♀. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 232. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 137; Best.-Tab. 13, 1885, p. 81. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 182, 185, 305. — Guillebeau, Échange 1893, p. 28; Bull. Soc. Ent. France LXI, 1892, p. CCLIV. — Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 310; Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 813. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 574. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 187). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 893. — 132, 161 ♂ ♀. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 946. — Reitter, — Europa: Britannien, Herzegovina, Korsika, Sardinien, Sizilien, Korfu, Anatolien (Ismir); Kaspisee-Gebiet

Fauna Germ. V, 1916, p. 76, t. 155, f. 25. — Hustache. Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 66, 69 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 184, Hoffmann in Soc. Ent. France, Livre du Centenaire 1932, p. 238 ♂ ♀ fig. 6. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 111.

Hybride: *laticollis* ♂ × *scabriculus* ♀, Hoffmann in Soc. Ent. France, Livre du Centenaire 1932, p. 237, fig. 5.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 52; l. c. XVIII, 1886, p. 290. — Vitale, Riv. Ital. Sc. Nat. XXIV, 1904, p. 15 (Schutzfärbung).

Morphologie: Schneider, Sitzungsber. Nat. Ges. Isis (Dresden) 1902, Abh. p. 54 (Melanismus aus Corsica: *fusciscapus* Desbr.).

♂ *anoplus* Förster, Verh. Nat. Ver. preuß. Rheinl. VI, 1849, p. 30 *(Trachyphloeus)*. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 263. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 497.

♂ *rectus* C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 132; l. c. X, 1868, p. 175.

♀ *spinimanus* C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 133; l. c. X, 1868, p. 175 (non Germar 1824).

spinosulus Gautier, Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 99.

distans Rey, Échange 1894, p. 139. — Hustache, Bull. Soc. Ent. France 1920, p. 311; Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 69 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 187).

proletarius Vitale, Natural. Sicil. XVIII, 1908, p. 132. — Porta, Riv. Col. Ital. IV, 1906, p. 179. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 123. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 111.

var. *notatipennis* Pic, Échange XIX, 1903, p. 130. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 62), p. 162. — Algier, Tunis

var. *confusus* Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 161. — Hoffman in Soc. Ent. France, Livre du Centenaire 1932, p. 239, Obs. — „

latitarsis Penecke, Koleopt. Rundsch. XXI, 1936, p. 206. — Ost-Rumelien

longirostris Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXIX, 1910, p. 243 ♀. — Algier: El-Affroum

lucusensis Escalera, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. XXIII, 1923, p. 437, f. 5 *(Lacordairius)*. — Larache

mamillosus Formánek, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 625 ♀. — Porta, Riv. Col. Ital. VIII, 1910, p. 151. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 67 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 185). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 894. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 112. — Italien: Cottische Alpen (Monviso)

monspeliensis Hustache, Bull. Soc. Ent. France 1932, p. 137. — Süd-Frankreich:

	confusus Hustache, l. c. 1923, p. 246, fig.; Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 66 (Curcul. Gallo-rhén. p. 184, 187) (nec Formánek). — Hoffmann in Soc. Ent. France, Livre du Centenaire 1932, p. 235, fig. 3 ♂. *Hustachei* Winkler, Cat. Col. reg. pal. 1932, col. 1437.	Hérault (Montpellier, Latte), Italien: Vallombrosa
muralis	Bedel, Abeille XXVIII, 1893, p. 103 *(Lacordairus)*. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 128, 141. — Escalera, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. XXIII, 1923, p. 440, f. 9.	Spanien (Kastilien), Algier (Nemours), **Marokko**
muricatus	Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 141; Best.-Tab. 13, 1885, p. 80. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best. Tab. 61), p. 191.	Südspanien
nanus	Fåhrs. Oefv. Vet.-Åk. Förh. XXVIII, 1871, p. 37 *(Trachyphloeus)*.	Kaffern-gebiet
nodipennis	Chevr. Rev. Mag. Zool. 1860, p. 450 *(Trachyphloeus)*. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 93, 103. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 601, 610. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 136; Best.-Tab. 13, 1885, p. 80. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 129, 146. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 893. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 111.	Spanien, Sizilien, (M. Pellegrino); Algier
notatipennis	Pic, Échange 1903, p. 130.	Tunis
notulatus	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 109 *(Trachyphloeus)*. — Seidl., Otiorrhynchid. 1868, p. 98, Note *(? Trachyphloeus)*.	Kap
Olivieri	Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 41; (1886), p. 235 *(Trachyphloeus* subg. *Trachyphloeus)*. — Fauvel, Rev. d'Ent. VII, 1888, p. 247. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 573. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 138, 189. — Newberry, Ent. Monthly Mag. XLV, 1909, p. 33. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 945. — Fowler, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 185. — Reitter, Fauna Germ. V, 1916, p. 77. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 67, 77 *(spinosus* Goeze) (Curcul. Gallo-rhén. p. 185, 195).	Mittel- und Südeuropa; Italien
	? spinosus Goeze, Ent. Beitr. I, 1777, p. 412. — Geoffr. Ins. Paris I, p. 290. — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1805. — Gemm.-Har. Cat. Col. VII, 1871, p. 2612. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 212 *(Trachyphloeus)*. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 327; l. c. XIX, 1887, p. 22 (Futterpflanzen). — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 189.	
	squamulatus Oliv. Ent. V, 1807, p. 363, t. 31, f. 477 *(Curculio)*. — Gyllh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 492; l. c. VII, 1, 1843, p. 117 *(Trachyphloeus)*. —	Mitteleuropa, Frankreich, Bosnien, Dalmatien

Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XVIII, 1847, p. 221 (Sep. p. 83); Brit. Ins. Curc. 1844—1852, p. 83; Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 344. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 263. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 734; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 233. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 497. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 95, 124; Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 572; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 654. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 604, 633. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 140; Best.-Tab. 13, 1885, p. 84; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1892), p. 259. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 182, 183, 305. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 535.

elegantulus Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 309; Wiss. Mitteil. Bosnin XI, 1899, p. 812. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1907, p. 189. — Herzegovina

Moroderi Escalera, Trab. Mus. Cienc. Nat. Madrid Zool. XXXVIII, 1918, p. 34, f. 38 *(Cathormiocerus(*. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 77.

orbipennis Desbr. Frelon IX, 1901, p. 136. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 128, 143. — Escalera, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. XXIII, 1923, p. 441, f. 11 *(Pseudolacordairius)*. — Portugal: Martinho d'Antas

orbitalis Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 93, 104 *(Trachyphloeus)*. — Marseul, Abeille XI, 1874, p. 601, 612. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 137; Best.-Tab. 13, 1885, p. 81. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 189. — Algier

ontigolensis Escalera, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. XXIII, 1923, p. 436, f. 3 *(Lacordairius)*. — Aranjuez

ovipennis Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 134, 165. — Algier: Bône

parallelus Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 93, 106 *(Trachyphloeus)*; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 653. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 602, 614. — Stierl. Wien. Ent. Zeit. VII, 1884—87 (1885), p. 137; Best.-Tab. 13, 1885, p. 81. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 132, 160. — K. Schenkling, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 463. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 945. — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 75. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 111. — Ungarn, Galizien, Niederösterreich, Deutschland

Peyerimhoffi Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXIX, 1910, p. 199 ♀. — Algier: Mouzaiaville

Pici Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 127, 139. — Algier: Berg Quarsenis

planophthalmus Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 41. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 129, 145. — Kaukasus: Araxestal, Ordubad

pollicatus Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 130, 151. — Algier: Nemours

porculus Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVIII, 1876, p. 59. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 430. — Neuseeland

proximus A. F. Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLII, 1906, p. 91. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 61), p. 131, 155. — Tunis

pustulatus Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 93, 101 *(Trachyphloeus)*. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 136; Best.-Tab. 13, 1885, p. 80. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 128, 142. — Escalera, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. XXIII, 1923, p. 442 *(Pseudolacordairius)*. — Spanien

pustulifer Marseul, Abeille XI, 1873, p. 601, 609.

var. *alicantinus* Escalera, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. XXIII, 1923, p. 443, fig. 14. — Torrevieja

var. *centralis* Escalera, l. c. f. 12. — Pozuelo de Calatrava, Burjasot, Porta Coeli, Bétera, Segorbe

var. *valentinus* Escalera, l. c. f. 13.

Rambouseki Purkyne, Acta Soc. Ent. Bohem. XXVII, 1930, p. 119. — Jugoslavien

recognitus Hoffmann in Soc. Ent. France, Livre du Centenaire 1932, p. 242, fig. 9. — Frankreich: Basses Alpes

Reichei Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 93, 102 *(Trachyphloeus)*. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 136; Best.-Tab. 13, 1885, p. 80. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 128, 140 ♂ ♀. — Escalera, Bol. Soc. Esp. Historia Natur. XXIII, 1923, p. 438, f. 6 (subg. *Lacordairius*). — Marocco: Tanger

Reicheianus Marseul, Abeille XI, 1873, p. 601, 609.

variegatus Desbr. Frelon IV, 1895, p. 80 *(Paratrachyphloeus)*. — A. F. Solari, Ann. Mus. Civ. Genova XLII 1906, p. 94. — Escalera, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 1923, p. 438.

Reitteri Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 143; Best.-Tab. 13, 1885, p. 87 *(Cathormiocerus)*. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 138, 185 ♀ *(Trachyphloeus)*. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. 38, 1918, p. 28 (? = *Cathormiocerus myrmecophilus* Seidl.). — Südspanien

rugicollis Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 94, 114 ♀; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 653 *(Trachyphloeus)*. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 138; Best.-Tab. 13, 1885, p. 82. — Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 311 ♂ ♀; Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 814 ♂ ♀. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 134, 166 ♂ ♀. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 112. Dalmatien, Türkei, Rumelien, Herzegovina

rugaticollis Marseul, Abeille XI, 1873, p. 603, 622.

rugosus Broun, New Zeal. Journ. of Sc. II, 1885, p. 386; Man. New Zeal. Col. III—IV, 1886, p. 930. Neuseeland: Mokohinau Insel

scabriculus L. Mant. Plant. II, 1771, p. 531 *(Curculio)*. — F. Syst. Ent. 1775, p. 149; Spec. Ins. I, 1781, p. 189; Mant. Ins. I, 1787, p. 117; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 469; Syst. El. II, 1801, p. 527. — Bonsdorff, Hist. Nat. Curc. Suec. II, 1785, p. 32, f. 21. — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 2, II. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1785. — Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 130; ed. Hellwig, I, 1795, p. 138; Mant. Fn. Etr. I, 1792, p. 41; ed. Hellwig I, 1795, p. 379. — Payk. Monogr. Curc. Suec. 1792, p. 91; Fn. Suec. III, 1800, p. 285. —? Preyßler, Mayer's Samml. physik. Auff. III, 1793, p. 196. — Panz. Deutschl. Ins.-Fn. 1795, p. 327. — Schrank, Fn. Boica I, 1798, p. 503. — Marsh. Brit. Ent. I, 1802, p. 304. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 168 *(Brachyrhinus)*. — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 309; l. c. I, 4, 1827, p. 613 *(Curculio)*; in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 490; l. c. VII, 1, 1843, p. 114 *(Trachyphloeus)*. — Zetterst, Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 336; Ins. Lapp. I, 1838 (1840), p. 188 *(Curculio)*. — Gebler in Ledebour, Reise Altai-Gebirge II, 1830, p. 170 (var.); Bull. Soc. Nat. Moscou XXI, 1848, p. ..... — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 122 *(Trachyphloeus)*; Man. Brit. Col. 1839, p. 244. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1835), p. 128 *(Curculio)*. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 326. — Germ. Stett. Ent. Zeit. III, 1842, p. 103. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 120. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XIX, 1847, p. 220 (Sep. p. 82); Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 343. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 430; l. c. ed. 2, 1858, p. 734; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 232. — Bach, Käfern. II, 1842—54 (1854), p. 262 ♂ ♀. — Kolen. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 417. — Gutfleisch, ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 497. — C. G. Thoms, Skand. Col. VII, 1865, p. 133; l. c. X, 1868, p. 175. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 94, 111 ♂ ♀; Europa

Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 592; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 653. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 602, 619 ♂ ♀. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 41 ♂ ♀ (1886), p. 235 *(Trachyphloeus* subg. *Trachyphloeus)*. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 138; Best.-Tab. 13, 1885, p. 82; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1892), p. 258. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 182, 184, 305. — Guillebeau, Ann. Soc. Ent. France LXI, 1892, Bull. p. CCLIV—CCLV; Échange 1893, p. 28. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 535. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 574. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 132, 158 ♂ ♀. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 945. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1065, t. 38, f. 3. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 423. — Reitter, Fauna Germ. V, 1916, p. 76. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 66, 72 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 184, 190). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 893. — Hoffmann in Soc. Ent. France, Livre du Centenaire 1932, p. 236 ♂ ♀. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 111.

viverra Herbst in Archiv Ins.-Gesch. IV—V, 1784—85, p. 83 *(Curculio)*. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1799. — Oliv. Enc. méthod. V, 1790, p. 571.

hispidulus Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 354, t. 87, f. 14 *(Curculio)*.

scabriculus Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 351, t. 87, f. 10 *(Curculio)*. — Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 405 *(Trachyphloeus)*.

♀ *spinimanus* Gyllh. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 614 *(Curculio)*; in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 117 *(Trachyphloeus)*.

nigricans Steph. Ill. Brit. Ent. Mand. IV, 1831, p. 128; Man. Brit. Col. 1839, p. 245 *(Strophosomus)*. — Germ. Stett. Ent. Zeit. III, 1842, p. 103.

♂ *setarius* Gyllh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 492; l. c. VII, 1, 1843, p. 116 *(Trachyphloeus)*. — Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 430; l. c. ed. 2, 1858, p. 734.

♀ *erinaceus* Redtenb. Fauna Austr. 1849, p. 430; l. c. ed. 2, 1858, p. 733 *(Trachyphloeus)*. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 496.

Hybriden: *laticollis* ♂ × *scabriculus* ♀, Hoffmann in Soc. Ent. France, Livre du Centenaire 1932, p. 237, fig. 5.

Biologie: Schilling, Arbeit. Schles. Ges. Vaterl. Kultur 1828, p. 73 (Larve). — Bar-

gagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 52; l. c. XVIII, 1886, p. 290.

Seidlitzi Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 413 *(Lacordairius)*. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 93, 100 *(Trachyphloeus)*. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 601, 607. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 135; Best.-Tab. 13, 1885, p. 79. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 128, 142. — Escalera, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. XXIII, 1923, p. 435, f. 1. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 67, 74 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 185, 192). — Spanien: Escorial

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 52; l. c. XVIII, 1886, p. 290.

setiger Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 118 *(Trachyphloeus)*. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 140, Best.-Tab. 13, 1885, p. 84. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 136, 176. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 893. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 112. — Spanien, Sardinien, Sizilien, Algier (Oran, Constantine), ?Frankreich (Metz, Montpellier)

maculatus Perris, Abeille VII, 1870, p. 21; l. c. XIII, 1875, p. CLIV *(Trachphloeus)*. — Seidlitz, Nouv. et Faits 1870, p. —. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 620. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 140; Best.-Tab. 13, 1885, p. 84.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 52; l. c. XVIII, 1886, p. 290 *(maculatus)*.

setermis Marseul, Abeille XI, 1873, p. 603, 627 *(Trachyphloeus)*.

? setiger Fåhrs. Oefv. Vet.-Akad. Förh. XXVIII, 1871, p. 36 *(Trachyphloeus)*. — Kaffern-gebiet

skopljensis Purkyne, Acta Soc. Ent. Bohem. XXVII, 1930, p. 120. — Jugoslavien: Skoplje

Solariorum Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Teb. 61), p. 129, 147. — Tunis

solitarius Sharp, Biol. Centr.-Amer. IV, 3, p. 177, t. 7, f. 19. — Mexico

? spathulatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 111 *(Trachyphloeus)*. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 193. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 93, 98 ♂ ♀ *(? Trachyphloeus)*. — Kap

♀ *squamifer* Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 112 *(Trachyphloeus)*. — Kap, Kaffrarien

spinimanus Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 405, 550 *(Trachyphloeus)*. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XVIII, 1847, p. 222 (sep. p. 85); Brit. Ins. Curc. 1844—52, p. 85; Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 345. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 262. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 497. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1858, p. 109; Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 592; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 653. — Mitteleuropa: Frankreich, Deutschland, Österreich, Schweiz, Podolien, Herzegovina, Türkei; Kaukasus

C. G. Thoms. Skand. Col. X, 1868, p. 341. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 602, 617. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 41; (1886), p. 236 *(Trachyphloeus* subg. *Trachyphloeus)*. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 138; Best.-Tab. 13, 1885, p. 82; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1892), p. 257. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 182, 183, 305; l. c. VI, 1913. — Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 310; Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 813. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 574. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 133, 162. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 946. — Newberry, Ent. Month. Mag. (2) XXVI, 1913, p. 126. — Reitter, Fauna Germ. V, 1916, p. 76, t. 155, f. 27. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 66, 71 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 184, 189). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2), XIII, 1929, p. 893. — Hoffmann in Soc. Ent. France, Livre du Centenaire 1932, p. 236, fig. 7. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 111.

Biologie: Hoffmann in Soc. Ent. France, Livre du Centenaire 1932, p. 240.

scabriculus Oliv. Encycl. méthod. V, 1790, p. 532; Entom. V, 1807, p. 362, t. 31, f. 476 *(Curculio)*.

lanuginosus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 494; l. c. VII, 1, 1843, p. 119 *(Trachyphloeus)*. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 734; ed. 3, II, 1874, p. 232. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 418. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 497.

Stierlini (Guillebeau) Stierlin, Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93 (1890), p. 166; Fauna Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 258 *(Trachyphloeus)*. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. 1907, p. 123.

var. *retusus* Rey, Échange 1894, p. 139. — Hustache, Bull. Soc. Ent. France 1920, p. 311. — Frankreich

squalens Leconte, Rep. Explor. Mississippi River IX, 1857, App. I, p. 21 *(Trachyphloeus)*; Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 437 *(Thinoxenus)*. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 193, Note *(Trachyphloeus)*. — Oregon

? squalidus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 110 *(Trachyphloeus)*. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 97 Note. — Kafferngebiet

subsetulosus (Dan.) Escalera, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. XXIII, 1923, p. 441, f. 10 *(Lacordairius)*. — Pozuelo de Calatrava

syriacus Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 95, 128 *(Trachyphloeus)*. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 141; — Syrien

Best.-Tab. 13, 1885, p. 85. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 190.

syrus Marseul, Abeille XI, 1873, p. 604, 636.

tenuipes Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 30. — Balearen

thessalicus Penecke, Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924, p. 85. — Thessalien

Truquii Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 94, 109 *(Trachyphloeus)*. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 602, 617. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 137; Best.-Tab. 13, 1885, p. 81. — Formánek, Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 133, 162. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 111. — Cypern

turcicus Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 116 *(Trachyphloeus)*. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 624. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 139; Best.-Tab. 13, 1885, p. 83. — Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 267, 311; Wiss. Mitteil. Bosnien XI, 1899, p. 775, 814. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 136, 173. — Türkei, Bulgarien

gibbifrons Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 311 ♂ ♀; Wiss. Mitteil. Bosnien XI, 1899, p. 815 ♂ ♀. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 123.

Uhagoni Escalera, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. XXIII, 1923, p. 435, f. 2 *(Lacordairius)*. — Badajoz

Biologie: Vitale, Riv. Ital. Sc. Nat. XXIV, 1904, p. 141 (Schutzfärbung).

ventricosus Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 405 *(Trachyphloeus)*. — Stev. Mus. Mosq. II. 1829, p. 94 *(Omias)*. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 490; Boh. l. c. VII, 1, 1843, p. 109. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 735. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 94, 113; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 653. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 602, 621. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 138; Best.-Tab. 13, 1885, p. 82. — Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 310; Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 813. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 135, 169 ♂ ♀. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 945. — Österreich, Ungarn, Siebenbürgen, Serbien

ypsilon Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 94, 116; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 654 *(Trachyphloeus)*. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 603, 623. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 139; Best.-Tab. 13, 1885, p. 83. — Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 311; Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 818. — Ungarn, Türkei, Serbien

Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 135, 172 ♂ ♀.
102

Trachyphloeoides Formánek.

Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 124, 126.
sordidus Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXVI, 1890, p. 430 *(Trachyphloeus)*. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 126 *(Trachyphloeoides)*. — China: Kadigar, Gan-ssu
1

Trachyphilus Faust.

Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 164. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 124. — Reitter, Verh. Naturf. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 27.
saluber Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 164. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 125. — Amurgebiet Pogkrofka, Wladiwostok
1

Trachyphloeosoma Woll.

Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) IV, 1869, p. 414; Col. St. Helena 1877, p. 169. — Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 83, 92. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 275.
Trachyphloeops Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 165.
alternatum Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 276, fig. 85. — Madras
Roelofsi Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 92. — Japan
setosum Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 166, t. 2, f. 5 *(Trachyphloeops)* (non Woll. 1869).
setosum Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (4) IV, 1869, p. 415; in Melliss, St. Helena 1875, p. 154; Col. St. Helena 1877, p. 170. — St. Helena
3

Rhinodontus Faust.

Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 455. — Reitter, Verh. Naturf. Verein. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 27.
hirsutus Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 33. — Thibet: Kuku-Noor
ignarus Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 455. — China: Gan-ssu
2

Cathormiocerus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 120. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. CXXI, 735; l. c. ed. 3, I, 1874, p. CXXXIII; l. c. II, 1874, p. 233. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 194. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 282; Otiorrhynchid. 1868, p. 4, 128; Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Gatt. p. 157; Fn. Transsylv.

1888—91 (1891), Gatt. p. 157. — Rye, Ent. Monthly Mag. VII, 1870—71 (1870), p. 149—151 (Britannien). — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 639. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88(1883), p. 39; (1886), p. 234 *(Trachyphloeus* subg. *Cathormiocerus)*. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 59, 142; Best.-Tab. 13, 1885, p. 3, 86. — Desbr. Frelon VIII, 1899—1900 (1900), p. 44, 46 (Frankreich). — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 125. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 11; Fn. Germ. V, 1916, p. 75. — Escalera, Trab. Mus. Cienc. Nat. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 5—64 (Revision Arten aus Spanien und Marokko). — Champion, Ent. Month. Mag. LV, 1919, p. 67. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 81 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 199). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 58.

Scoliocerus Woll. Ins. Mader. 1854, p. 391. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 195. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 39.

Scoliacerus Weise in Heyden, Reitter, Weise, Cat. Col. Eur. ed. 2, 1906, p. 628.

Subgen. *Cathormiocerus* s. str. Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 9, f. 3, 4.

Subgen. *Cathormiocerinus* Escalera, l. c. p. 8, f. 1.

Subgen. *Mitomermus* Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. Curc. 1854, p. 33, t. 15, f. 63. — Redtenb. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. CXXI, 735. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, p. 918, p. 8, f. 2.

Subgen. *Schaumius* Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 411. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 9, f. 5, 6.

Biologie: Mars. Abeille XI, 1873, p. 647.

Morphologie: Corrêa de Barros, Mém. Mus. Zool. Univ. Coimbra I, 1934, 12 pp., figg.

alticola Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 34, f. 37. — Marokko: Glaui (Atlas)

alveolatus Desbr. Frelon VIII, 1899—1900 (1900), p. 15. — Escalera, l. c. p. 60. — Tanger

angustulus Pic, Miscell. Ent. IV, 1896, p. 115 ♂. — Algier: Ras Chergui (Ain Sefra)

atlanticus Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 15, f. 9 *(Mitomermus)*. — Marokko

histrix Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XI, 1914, p. 416.

var. *marraquensis* Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 13.

attaphilus Bris. Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, p. 233; l. c. Bull. p. XXIV. — Bedel, Faune Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 40, Note *(„attiphilus")*. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 143; Best.-Tab. 13, 1885, p. 87. — Fauvel, Rev. d'Ent. XIV, 1895, p. 115. — Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 30; l. c. VIII, 1899—1900 (1900), p. 46. — Keys, Ent. Month. Mag. LVII, 1921, p. 100, t. c. — West-Frankreich: Belle-Ile-en-Mer, La Bernerie; England

aurasiacus Peyerh. Bull. Soc. Ent. France 1931, p. 287. — Berberie: Causse Mahmel (Aurès)

avenionensis Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 82, 87, p. 80, fig. 59 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 200, 206, p. 198, fig. 59). — Süd-Frankreich: Vaucluse

bacaresensis Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. 1918, p. 50, f. 54 (Subg. *Schaumius*). — Sierra de Bacares

balearicus Desbr. Frelon XVII, 1909, p. 111. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 59. — Balearen

Barrosi (Solari) Pic, Échange XXV, 1909, p. 162. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 35, f. 39 (Subg. *(Schaumius)*. — S. Martinho d'Anta

biseriatus Escalera, l. c. p. 47, f. 52 (Subg. *Schaumius*). — Spanien: Torrevieja, El Pardal

Bolivari Uhagon, Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. XIV, 1885, p. 370 ♂ ♀. — Escalera, l. c. 22, f. 18. — Spanien: Olivenza (Bajadoz)

var. *malacensis* Escalera, l. c. — Malaga

brevis Hustache, Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc III, 1923, p. 68. — Marokko

brevithorax Desbr. Frelon, V, 1895—96 (1896), p. 29 ♀; l. c. VIII, 1899—1900 (1900), p. 46. Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 82, 85 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 200, 203). — Französische Pyrenäen

britannicus Blair, Ent. Month. Mag. LXX, 1934, p. 26. — England

cancellatus Desbr. Frelon VII, 1898—99 (1899), p. 78. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 59. — Tanger

carpetanus Uhagon, Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. XIV, 1885, p. 365. — Escalera, l. c. p. 26, f. 23—25. — Spanien: Escorial, La Granja, Villa Real; Vargellas

Championi Escalera, l. c. p. 36, f. 41 (Subg. *Schaumius*). — Spanien: Guadalavial, Sierra del Toro

Chevrolati Seidl. Otiorrhynchid. 1868, p. 135 ♂ ♀. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 143; Best.-Tab. 13, 1885, p. 87. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 33, f. 36. — Spanien

mutandus Marseul, Abeille XI, 1873 (1874), p. 643, 647 ♂ ♀.

socius Chevr. Rev. Mag. Zool. 1866, p. 26 (non Boh. 1843).

Biologie: Marseul, Abeille XI, 1873, p. 647. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 149; l. c. XVIII, 1886, p. 291.

crassiscapus Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 57, f. 61 (Subg. *Schaumius)*. — Huescar, Puebla de Don Fadrique

cherchevillei Desbr. Frelon VIII, 1899—1900 (1900), p. 44, 46; l. c. XVI, 1908, p. 91. — Deville, Abeille XXX, 1906, p. 265. — Hustache, Ann. — Spanien, Frankreich

Soc. Ent. France XCIII, 1929, p. 89, 90 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 207, 208). — Hoffmann, Bull. Soc. Ent. France 1931, p. 155, figg. (eigene Art).

curvipes Woll. Ins. Mader, 1854, p. 393 *(Scoliocerus)*; Cat. Col. Madeira 1857, p. 118; Col. Atlant. 1865, p. 327. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 134 *(Cathormiocerus)*. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 644, 648. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 40 Note. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 144; Best.-Tab. 13, 1885, p. 88. — Desbr. Frelon VI, 1895—96 (1896), p. 30; l. c. VIII, 1899—1900 (1900), p. 46. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 30, f. 31. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 82, 84; p. 80, fig. 63 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 200, 202; 198, fig. 63). — Frankreich, Spanien, Portugal, Algier, Madeira

discors Desbr. Opusc. Ent. I, 1874—75, p. 13. — Corsica

var. *fastidiosus* Desbr. Rev. Zool. (3) VII, 1879, p. 210. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 31. — Marokko: Tanger, Beni Msnar

Raymondi Gautier, Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 99 *(Mitomermus)*. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 95, Note *(Trachyphloeus)*. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 636.

Ragusae Vitale, Riv. Col. Ital. II, 1904, p. 127; Atti Accad. Pelorit. XX, 1905, p. 187. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 59. — Sizilien, Sardinien, Korsika

Biologie: Woll. Ins. Mader. 1854, p. 393. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 134. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 648. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 149; l. c. XVIII, 1886, p. 291.

curviscapus Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 134. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 644, 648 ♂. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 144; Best.-Tab. 13, 1885, p. 88. — Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 30. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 20, f. 14. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 82, 88 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 200, 206). — Ost-Pyrenäen: Canigou, Südspanien, Portugal, Algerien

var. *insularis* Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 20.

densestriatus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 201. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 38 (subg. *Schaumius*). — Spanien: Toledo

Diecki Seidl. in Marseul, Abeille XI, 1873, p. 643, 647. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 143; Best.-Tab. 13, 1885, p. 87. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 29, f. 29. — Südspanien

elongatulus Uhagon, Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. XIV, 1885, p. 374 ♂ ♀. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 27, f. 26. — Spanien: Badajoz, Olivenza

estrellanus Escalera, l. c. XXXVIII, p. 25, f. 20—22. Portugal: S. Martinho d'Anta, Covas, Vargellas, Chancelleira

excursor Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 363 *(Otiorrhynchus)*; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 145 *(Cathormiocerus)*; Best.-Tab. 13, 1845, p. 89. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 139 ♀ (excl. ♂). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 218; l. c. XI, 1873, p. 653. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 53, f. 57 (Subg. *Schaumius*). Südspanien, Algier

Fuentei Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 28 ♂ ♀. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 41, f. 46, 47 (Subg. *Schaumius*). Spanien: Pozuelo de Calatrava, Almagro

graditanus Escalera, l. c. p. 21, f. 16. Marokko: Grazalema

globulosus Escalera, Trab. Mus. Madrid XI, 1914, p. 420; l. c. Zool. XXXVIII, 1918, p. 10, f. 7 *(Cathormiocerinus)*. Mogador

gracilior Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) X, 1870, p. 400. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 650. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 145; Best.-Tab. 13, 1885, p. 89. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 44, f. 49 (subg. *Schaumius*). Gibraltar, Marokko, Tanger, Beni Msuar

gracilis Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 140 ♂ ♀. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 145; Best.-Tab. 13, 1885, p. 89. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 50, f. 55 (Subg. *Schaumius*). Spanien: Sierra Nevada, Huejar

gracens Marseul, Abeille XI, 1873, p. 645, 653 ♂ ♀.

Biologie: Marseul, Abeille XI, 1873, p. 653. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 149; l. c. XVIII, 1886, p. 291.

Grandini Desbr. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. III, 1869—72 (1871), p. 343. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 656. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 143; Best.-Tab. 13, 1885, p. 87. Algier: Mostaganem

hircus Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 31. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 59. Sardinien

hirticulus Seidlitz, Abeille XI, 1873, p. 644, 642. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 145 ♂ ♀; Best.-Tab. 13, 1885, p. 89 ♂ ♀. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 46 (subg. *Schaumius*). Südspanien, Algier

var. *beterensis* Escalera, l. c. Spanien: Bétera

excursor Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 139 ♂ (excl. ♀).

horrens Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 495 *(Trachyphloeus)*; l. c. VII, 1, 1843, p. 121 *(Cathormiocerus)*. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 736; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 233. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 136 ♂ ♀. — Marseul, Abeille XI, 1873. p. 644, 649 ♂ ♀. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 144 ♂ ♀; Best.-Tab. 13, 1885, p. 88 ♂ ♀. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 33, f. 34, 35. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1929, p. 82, 89; p. 80, fig. 60, 61 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 200, 207; p. 198, fig. 60, 61). — Hoffmann, Bull. Soc. Ent. France 1931, p. 155, figg. — Spanien

? erinaceus F. Syst. El. II, 1801, p. 527 *(Curculio)*. — Latr. Hist. Nat. Crust. Ins. XI, 1804, p. 169 *(Brachyrhinus)*.

sulcirostris Chevr. Rev. Mag. Zool. 1866, p. 104 *(Peritelus)*. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 649 *(Cathormiocerus)*.

var. *alternans* Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 32. — Spanien: Escorial

impunctatus Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 14 *(Mitomermus)*. — Mogador

inflatiscapus Escalera, l. c. p. 56, f. 60 (Subgen. *Schaumius*). — Spanien: Canales (Logroño)

inflatipennis Escalera, Bol. R. Soc. Espan. Hist. Nat. XXVI, 1926, p. 469. — Spanien

inhumeralis Pic, Échange XXI, 1905, p. 155. — Algerien

irrasus Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 142. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 645, 655. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 145; Best.-Tab. 13, 1885, p. 89. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 42 (subg. *Schaumius*). — Spanien: La Granja, Escorial, Guadarrama, Alcuéscar

var. *cantabricus* Escalera, l. c. — Andara

var. *arragonicus* Escalera, l. c. — Moncayo

Biologie: Marseul, Abeille XI, 1873, p. 655. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 149; l. c. XVIII, 1886, p. 291.

lapidicola Chevr. Rev. Mag. Zool. 1866, p. 322; Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 322. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 138. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 644, 651 ♂ ♀. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 144; Best.-Tab. 13, 1885, p. 88. — Uhagon, Anal. Soc. Espan. Hist. Nat. 1899, Art. p. 56—58 (Geschlechtsdifferenz). — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 55, f. 58, 59 (Subg. *Schaumius*). — Spanien

cordatus Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 27 ♀; l. c. XVI, 1908, p. 91. — W.-Algier: Mecheria

Korbi Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93 (1888), p. 15. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 55. — Spanien

Vuillefroyi Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 412 *(Schaumius)*. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 651 *(Cathormiocerus)*.

var. *curtipilis* Escalera, Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. XXVI, 1926, p. 469. — Spanien

latirostris Échange XXI, 1905, p. 147. — Algerien

Lethierryi Chevr. Rev. Mag. Zool. 1866, p. 104 *(Otiorrhynchus)*. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 141 *(Cathormiocerus)*. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 645, 654. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 145; Best.-Tab. 13, 1885, p. 89. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 48. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 82, 90, fig. 58 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 200, 208; p. 198, fig. 58) *(Schaumius)*. — Spanien: Escorial, Piedralabes; Algerien

var. *Capiomonti* Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 141. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 654. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 145; Best.-Tab. 13, 1885, p. 89. — Desbr. Frelon VIII, 1899—1900 (1900), p. 46, Note. — Algerien, ?Süd-Frankreich (Toulon)

longiscapus Pic, Échange XXVIII, 1913, p. 66. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 62. — Marokko

lusitanicus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 145; Best.-Tab. 13, 1885, p. 89. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 52 (Subg. *Schaumius*). — Portugal

Maderae Woll. Ins. Mader. 1854, p. 392, t. 8, f. 2 *(Scoliocerus)*; Cat. Col. Madeira 1857, p. 117; Col. Atlant. 1865, p. 327. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 136 ♂ ♀ *(Cathormiocerus)*. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 644, 650 ♂ ♀. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 144; Best.-Tab. 13, 1885, p. 144. — Madeira

Biologie: Woll. Ins. Mader. 1854, p. 392. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 149; l. c. XVIII, 1886, p. 291.

maritimus Rye, Ent. Monthly Mag. X, 1873—74 (1874), p. 176 ♂ ♀. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 142; Best.-Tab. 13, 1885, p. 86. — Champ. & Sharp, Ent. Monthly Mag. XXV, 1887—88 (1888), p. 121. — Desbr. Frelon VIII, 1899—1900 (1900), p. 46. — Fowler, Col. Brit. Isl. 1891, p. 186; l. c. VI, 1913, p. 305. — Butler, Ent. Monthly Mag. XLV, 1909, p. 29—31, 63. — Sharp, l. c. XLVI, 1910, p. 71, 90 (Cornwall). — Walker, l. c. XLVI, 1910, p. 191. — Escalera, Trab. Mus. Zool. Madrid, Zool. XXXVIII, p. 17. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 81, 84; p. 80, fig. 55 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 199, 202; p. 198, fig. 55). — England

socius Rye, Ent. Monthly Mag. 1868—69 (1868), p. 68; Ent. Annual 1869, p. 43, fig. 6; Ent. Monthly Mag. X, 1873—74 (1874), p. 177 (non Boh.). — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1883—88 (1883), p. 40; (1886), p. 234 *(Trachyphloeus* subg. *Cathormiocerus)* (non Boh.). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 82 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 200).

var. *armoricus* Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 17. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 81, 84 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 202). — Bretagne: Morlaix, Roscoff; ?Calvados: Noron

Biologie: Croissandeau, Coléoptériste I, 1891, p. 245—247 (Metamorphose). — Rupertsberger, Biol. Lit. Käfer Eur. 1894, p. 205.

maroccanus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 139; Best.-Tab. 13, 1885, p. 83 *(Trachyphloeus)*. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 123 *(Caenopsis)*; l. c. XXVIII, 1909, p. 31 *(Trachyphloeus)*. — Hustache, Bull. Soc. Ent. Égypte 1935, p. 203, Note 5. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 22, f. 17 (sub: *Cathormiocerus* s. str.). — Tanger

Marqueti Desbr. Opusc. Ent. I, 1874—75, p. 13. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 144; Best.-Tab. 13, 1885, p. 88. — Algerien: Oran

Martinezi Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 39, f. 44 (subg. *Schaumius*). — Spanien: Villarejo del Valle

Méquignoni Hoffmann, Bull. Soc. Ent. France 1930, p. 166. — Frankreich: Finistère

minutus Pic, Échange XXIV, 1908, p. 90. — Spanien

mogadoricus Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 18. — Mogador, Marrakesch

Moraguesi Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 33. — Escalera, l. c. 58. — Balearen: Majorka

myrmecophilus Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 95, 125 *(Trachyphloeus)*. — Rye, Ent. Monthly Mag. VII, 1870—71 (1870), p. 149. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 604, 633. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 41; (1886), p. 235 *(Trachyphloeus* subg. *Trachyphloeus)*. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 140; Best.-Tab. 13, 1885, p. 84. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 182, 183, 305. — Croissandeau, Coléoptériste I, 1891, p. 245—247 (Metamorphose). — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 138, 186. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 28, f. 28 *(Cathormiocerus)*. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 83, 86; p. 80, fig. 57 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 201, 204; p. 198, fig. 57) *(Cathormiocerus)*. — Britannien, Belgien, Frankreich, Spanien, Portugal

nevadensis Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 32. — Spanien: Huéjar (Sierra Nevada)
socius Seidl. Otiorrhynchid. 1868, p. 133 ♀ (nec Boh.). — Escalera, l. c.

nodiscapus Escalera, Trab. Mus. Madrid XI, 1914, p. 418; l. c. XXXVIII, 1918, p. 17, f. 12. — Marokko: Hoch-Atlas

oblongicollis Hustache, Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc III, 1923, p. 67. — Marokko

Pici Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 32. — Algier: Nemours

picturatus Desbr. Frelon XIV, 1905—06 (1905), p. 21. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 30, f. 30. — Spanien: Pozuelo

porculus Uhagon, Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. XIV, 1885, p. 367. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 31, f. 32. — Spanien: Escorial; S.Martinho d'Anta

proximus Uhagon, Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. XIV, 1885, p. 372 ♂ ♀. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 52, f. 56 (Subg. *Schaumius*). — Spanien: Ciudad Real, Badajoz

pygmaeus Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 143. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 145; Best.-Tab. 13, 1885, p. 89. — Pic, Échange XXIV, 1908, p. 82. Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 36, f. 40 (subg. *Schaumius*). — Spanien: Aranjuez, Quero
liliputanus Marseul, Abeille XI, 1873, p. 645, 655.
var. *rufescens* Pic, Échange XXIV, 1908, p. 82. — Oran

rotundipennis Escalera, Trab. Mus. Madrid XI, 1914, p. 417; l. c. XXXVIII, 1918, p. 15, f. 10 *(Mitomermus)*. — Marocco

sagrensis Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 49, f. 53 (subg. *Schaumius*). — Spanien: Puebla de Don Fadrique

salinus Escalera, l. c. p. 40 (subgen. *Schaumius*). — Spanien: Torrevieja

seguranus Escalera, l. c. p. 37, f. 42 (subg. *Schaumius*). — Sierra de Segùra (El Pardal)
var. *cordubensis* Escalera, Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. XXVI, 1926, p. 467. — Spanien
var. *pozuelensis* Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 38, f. 43. — Pozuelo de Calatrava

semidepressus Pic, Échange XX, 1904, p. 92. — Algerien

serrator Peyerimh. Bull. Soc. Ent. France 1926, p. 218, fig. 1 ♂ *(Schaumius)*. — Marokko: Oudjda

similipictus Desbr. Frelon XVIII, 1910, p. 109 ♀. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France 1924, p. 79 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 197). — Süd-Frankreich

simplex Desbr. Frelon XVII, 1909, p. 108. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 60. — Tanger

sinuatiscapus Pic, Échange XXXI, 1915, p. 26. — Spanien

sinuosiscapus Escalera, Trab. Mus. Madrid XI, 1914, p. 417; l. c. XXXVIII, 1918, p. 21, f. 15. — Marokko

socius Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 121. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 643, 646 ♂ ♀. — Rye, Ent. Monthly Mag. X, 1874, p. 177. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 142; Best.-Tab. 13, 1885, p. 86. — Champ. & Sharp, Ent. Monthly Mag. XXV, 1888—89 (1888), p. 121. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 186; l. c. VI, 1913, p. 305. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 18. — Picard, Feuille jeun. Nat. Paris XLV, 1924, p. 49. — ? Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 82 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 200). — Spanien: Escorial, England: Sandow (Ins. W.)

Biologie: Marseul, Abeille XI, 1873, p. 646. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 149; l. c. XVIII, 1886, p. 291.

spalatensis Ulanowski, Kosmos (Lemberg) XII, 1887, p. 337. — Dalmatien: Spalato

Stierlini Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 30. — Algerien

tenuicornis Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 40, f. 45 (subg. *Schaumius*). — Spanien: Huelva

tenuiscapus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1884, Compt. rend. p. CXXI. — Escalera, Trab. Mus. Madid, Zool. 1918, p. 27, f. 27. — Marokko, Gibraltar

terolensis Escalera, l. c. XXXVIII, p. 45, f. 50 (subg. *Schaumius*). — Spanien: Casas de Herreros, Segorbe, Gea

Tizin'Testi Escalera, Trab. Mus. Madrid XI, 1914, p. 419; l. c. XXXVIII, 1918, p. 23, f. 19. — Marokko: Tizi n'Test (Atlas)

transmontanus Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 43, f. 48 (subg. *Schaumius*). — S. Martinho d'Anta

validiscapus Rouget, Mém. Acad. Sc. Dijon (2) VI, 1857, p. 59, Note; Cat. Col. Dep. Côte d'Or 1854—61 (1867), p. 210, Note. — Bedel, Ann. Soc. Ent. France (6) II, 1882, Bull. p. CXLIV; Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 40; (1886), p. 234 (*Trachyphloeus* subg. *Cathormiocerus*). — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 142; Best.-Tab. 13, 1885, p. 86. — Escalera, Trab. Mus. Zool. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 16, f. 11 (subg. *Mitomermus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 81, 83, p. 65, fig. 49 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 199, 201), p. 183, fig. 49). — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XLIV, 1927, p. 45. — Peyerimhoff, Bull. Soc. Ent. France 1931, p. 287. — Süd-Frankreich, Pyrenäen, Spanien; Deutschland: Ulm

cordicollis Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 132 ♂ ♀. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 643, 645 ♂ ♀. — Desbr. Frelon VIII, 1899—1900 (1900), p. 45. — Franz. Pyrenäen

var. *notatipennis* Pic, Échange IX, 1912, p. 66. — Frankreich: Drome (Luz-la-Croix Haute)

variegatus Küster, Käfer Eur. XVIII, 1849 *(Cathormiocerus)*. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 94, 120 *(Trachyphloeus)*. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 603, 629. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 140; Best.-Tab. 13, 1885, p. 84. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907 (Best.-Tab. 61), p. 137, 181. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 893. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 11, f. 8 *(Mitomermus)*. — Südeuropa: Sardinien, Spanien; Algier, Marokko

histrix Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. Curc. 1854, p. 33, Note, t. 14, f. 64 *(Mitomermus)*. — Redtenb. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 735.

Biologie: Vitale, Riv. Ital. Sc. Nat. XXIV, 1904, p. 141 (Schutzfärbung).

Vaulogeri Pic, Échange XX, 1904, p. 93. — Algerien

?porculus Desbr. Frelon XVII, 1909, p. 111. — Escalera, Trab. Mus. Madrid, Zool. XXXVIII, 1918, p. 61 (? nec Uhagon).

87

Stierlinia Desbr.

Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1909), p. 4.

syriaca Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—1887 (1885), p. 142 *(Cathormiocerus)*; Best. Tab. 13, 1885, p. 86; Miscell. Ent. XIII, 1905, p. 29. — Desbr. Frelon XVII, 1909—1911 (1909), p. 4 *(Stierlinia)*. — Syrien

1

Anemophilus Woll.

Woll. Ins. Mader. 1854, p. 385. — Marseul, Abeille 1873, p. 501.

crassus Woll. Ins. Mader. 1854, p. 386, t. 7, f. 7; Col. Atlant. 1865, p. 326. — Madeira: Porto Santo

subtessellatus Woll. l. c. 1854, p. 387; Col. Atlant. 1865, p. 326. — „

trossulus Woll. l. c. 1854, p. 388, t. 7, f. 9; Col. Atlant. 1865, p. 327. — „

3

Exotische Gattungen.

Cercopeus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 154. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 192. — Seidl. Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 277. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 422. — Blatchley & Leng, Rhynch. of North East. Amer. 1916, p. 109.

Cercopius Gemm. Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2287 (emend.).

Cerpoceus Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 192 (err.).

artemisiae Pierce, Journ. Econ. Ent. III, 1910, p. 365. — Montana
chrysorrhoeus Say, Descr. Curc. N. Amer. 1831, p. 13 *(Curculio)*. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 517 *(Peritelus)*. — Blatchley & Leng, Rhynch. of North East Amer. 1916, p. 109, 113. — Nordamerika: Indiana, New York (Cold Spring); von Massachusetts bis Michigan, nach Süden und Südwest bis Georgien und Missouri
chryorhoeus Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 155 (err.).
2

Chaetechus G. H. Horn.

G. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 77. — J. L. Leconte & G. H. Horn, Class. Col. North Amer. ed. 2, in Smithson. Misc. Coll. XXVI, 1883, p. 449. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 422. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. North Eastern Amer. 1916, p. 109, 113.

setiger G. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 78. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 422. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. North Eastern Amer. 1916, p. 114. — Massachusetts, New Scotia
1

Notiopatae Broun.

Broun, Man. New Zealand Col. V—VII, 1893, p. 1186.

setifer Broun, l. c. p. 1186. — Neuseeland
sternalis Broun, l. c. p. 1462. — „
terricola Broun, Trans. New Zealand Instit. XLVI, 1913, p. 105. — „
3

Paelocharis Broun.

Broun, Man. New Zealand Col. V—VII, 1893, p. 1187.

inflata Broun, l. c. p. 1188. — Neuseeland: Mount Manaia
vestita Broun, l. c. p. 1463. — Neuseeland: Maketu
2

Panormus Casey.

Casey, Ann. New York Acad. Science IV, 1888, p. 269. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 423.

setosus Casey, Ann. New York Acad. Science IV, 1888, p. 270. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 423. — Buchanan, Canad. Ent. LIX, 1927, p. 184. — Kalifornien
1

Thamiras Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 343.

undulatus Champ. l. c. p. 343, t. 15, f. 32. — Guatemala
1

Timareta Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XI, 1872, p. 445. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VIII, 1893 (1894), p. 202. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXVIII, 1904, p. 123.

concolor Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VIII, 1893 (1894), p. 264. — S.Australien

crinita Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII, 1874, p. 383. — Australien

duplicata Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 154 ♂ ♀. — Neu-Süd-Wales

figurata Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XI, 1872, p. 445, f. 12, f. 8. — Swan River

var. *satellina* Pascoe, l. c. p. 446. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXVIII, 1904, p. 123.

granicollis Lea, Mitteil. Zool. Mus. Berlin V, 1911, p. 177. — W.-Australien

hamata Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XLVI, 1922, p. 300, fig. — S.Australien

incisipes Lea, l. c. p. 301, fig. — „

inconstans Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 151, 152. — Tasmanien

infortunata Lea, Trans. Roy. Soc. South Austral. LV, 1931, p. 50. — S.Australien

pusilla Lea, Rec. South Austral. Mus. III, 1926, p. 163 *(Mandalotus)* (nec Blackb.).

intermixta Lea, l. c. p. 151. — Australien

lineata Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VIII, 1893 (1894), p. 263. — „

munda Blackb. l. c. p. 264. — S.Australien

nodipennis Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 153 ♂ ♀. — W.Australien

pilipes Pascoe, Trans. Ent. Soc. London 1870, p. 456 ♂ *(Disostinus)*. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 66 *(Timareta)*. — King Georges Sound

pustulata Pascoe, l. c. p. 456 ♀ *(Dysostinus)*. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 66; l. c. X, 1911, p. 224.

pilosus Lea, Rec. South Austral. Mus. III, 1926, p. 163. — Australien

pinguis Lea, Trans. Roy. Soc. South Austr. XXVIII, 1904, p. 120 *(Mandalotus)*; Rec. South. Austr. Mus. III, 1926, p. 163 *(Timareta)*. — „

puncticollis Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 150, 151. — Tasmanien

pusilla Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VIII, 1893 (1894), p. 625. — Australien, Victoria

setestriata Lea, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XV, 1915, p. 394. — Australien

subfasciata Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VIII, 1893 (1894), p. 266. — S.Australien

subterranea Lea, Proc. Linn. Soc. Victoria XX, 1908, p. 169; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 151. — King Island

swanseaensis Lea, l. c. p. 151, 152. — Tasmanien

xanthorhoeae Lea, l. c. p. 155 ♂ ♀. — W.Australien

Trachyodes Mshl.

Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 277.
horrescens Mshl. l. c. p. 277, f. 86. — Madras
Marshalli Heller, Wien. Ent. Zeit. XLVIII, 1931, p. 98. — Formosa
2

Trachyphloeomimus Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 342.
solitarius Sharp, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 177, t. 7, f. 19 *(Trachyphloeus)*. — Champ. l. c. p. 343 *(Trachyphloeomimus)*. — Mexiko
spurcus Champ. l. c. p. 342, t. 15, f. 31. — „
2

6. Tribus: Oosomini.

Otiorrhynchides groupe *Oosomides* Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 145, 164.
Otiorrhynchides groupe *Oosomides* Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 1.
Oosominae Kolbe, Arch. f. Nat. LXIV, 1, 1898, p. 256—257 (Genera).

Adorhabdotus Faust.

Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 133; Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 98.
bilineellus Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXV, 1881, p. 88 *(Peribrotus)*. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 133. — Zanzibar
delta Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 21. — Kamerun
Sjöstedti nom. nov. — Usambara: Mombo
bilineellus Auriv. in Sjöstedt, Kilim.-Meru Exped. I, 7, 21, 1927, p. 409 (nec Chevr.).
3

Amphitmetus Kolbe.

Kolbe, Archiv Naturgesch. LXIV, 1898, p. 251. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 503.
brevicornis Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 260. — Belg. Kongo: Kivu
Burgeoni Hustache, l. c. p. 261. — „
concavirostris Hustache, Rev. Zool. Afr. XI, 1923, p. 174. — Kongo
convexus Hustache, Rev. Zool.-Bot. Afr. XI, 1923, p. 174. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 503. — „
elgonensis Auriv. Arkiv Zool. XVIII A, 1926, p. 8. — Elgon
foveipennis Mshl. Trans. Zool. Soc. Lond. XIX, 1909, p. 228, t. 7, f. 16. — Tropisches Afrika
gibbosus Hustache, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XVIII, 1936, p. 369 ♂ ♀, f. 4. — Abessinien: Berg Chillalo
griseus Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 384. — Kenya

Kenyae Auriv. Arkiv Zool. VIII, 1913, p. 3. Kenya
kivuensis Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 259. Belg. Kongo
Leggei Mshl. Trans. Zool. Soc. Lond. XIX, 1909, p. 227, t. 7, f. 15. Tropisches Afrika
regularis Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 262. Belg. Kongo: Angusa
Scotti Hustache, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XVIII, 1936, p. 367 ♂ ♀. Abessinien: Djem-Djem
sulcipennis Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Orient. XIX, 1929, p. 385. Kenya
sylvicola Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 264. Belg. Kongo
transversus Kolbe in Stuhlmann, Ost-Afrika, Zool. IV, 1897, p. 270, t. 3, f. 34 *(Diatmetus)*; Archiv Naturgesch. LXIV, 1898, p. 246, 251 *(Amphitmetus)*. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 503. Albert-Edward-See: Kirewia, Victoria Nyanza: Kafuro
triimpressus Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 263. Mombasa
vicinus Hustache, l. c. p. 266. Belg. Kongo
subsp. *alticola* Hustache, l. c. p. 266.
18

Anaplesius Mshl.

Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 513.
granulicollis Hustache, Voy. Alluaud & Jeann. Afr. Or. XIX, 1929, p. 404 ♂ ♀ *(Leptospyris)*. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 513. Engl. Ostafrika: Berg Kenya
1

Barianus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXI, 1902, p. 354. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 507 (Revision); Bull. Acad. Malgache (n. s.) VII, 1924, p. 112, Suppl. p. 29. — Olsoufieff, Mém. Acad. Malgache XIV, 1933; Addendum p. VII.
Epiramphus Champ. Trans. Linn. Soc. London 1914, p. 398. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 507, Note.
brevisetis Hustache, Mém. Acad. Malgache XIV, 1933, p. 31. Madagaskar
centralis Hustache, Voy. Alluaud & Jeann. Afr. Or. XIX, 1929, p. 399. Engl. Ostafrika: Nairobi
gibbosus Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 508. Madagaskar
latiscapus Hustache, Mém. Acad. Malgache XIV, 1932 (1933), p. 30. „
scabrosus Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXII, 1903, p. 221. „
striatus Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 509. „
uniformis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. LXXI, 1902, p. 354. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 508. „

litoralis Champ. Trans. Linn. Soc. London 1914, p. 388, t. 22, f. 4, 4a *(Epiramphus)*. — Comores: Cosmolado; Aldabra

var. *Coquereli* Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXI, 1902, p. 355. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 508. — Mascareignes: Jean de Nove

7

Babaultia Hustache.

Hustache, Voy. Babault Afr. Or. Angl. 1921, p. 25.

ebenina Hustache, l. c. p. 26. — Engl. Ostafrika

minor Hustache, l. c. p. 28, fig. — „

subnuda Hustache, Sborn. ent. odd. Narod. Mus. Praze X, 1932, p. 31. — Engl. Ostafrika: Uassi, Gurni Vulkan

3

Brachycyrtus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VI, 1886, p. 76.

apicicornis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 220. — Madagaskar

minor Fairm. l. c. p. 220. — „

Championi nom. nov. — Aldabra

minor Champ. Trans. Linn. Soc. Lond. XVI, 1914, p. 397, t. 22, f. 3 (nec Fairm.).

setosofasciatus Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VI, 1886, p. 77, t. 2, f. 10. — Madagaskar

4

Cadoderus Mshl.

Mshl. Ann. Govt. Mus. Pietermaritzburg V, 1926, p. 249.

amoenus Hartmann, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 386 *(Ellimenistes)*. — Mshl. l. c. *(Cadoderus)*. — Ost-Afrika: Usambara, Kwai

bellus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 121 *(Ellimenistes)*. — Mshl. l. c. p. 249 *(Cadoderus)*. — Ost-Afrika

scutellatus Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 447 *(Meira)*. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 515 *(Cadoderus)*. — Engl. Ostafrika: Shimoni, Ramisi-Fluß

3

Calidiopsis Heller.

Heller, Philipp. Journ. Sc. VII, 1912, p. 379, 381.

affinis Schultze, Philipp. Journ. Sc. XVI, 1920, p. 200. — Mindanao

granosa Heller, Stett. Ent. Zeit. LXXXIV, 1923, p. 8. — Philippinen

lineata Schultze, Philipp. Journ. Sc. XIII, 1918, p. 376, t. 1, f. 5. — Mindanao

speciosa Heller, Philipp. Journ. Sc. VII, 1912, p. 381, t. II, f. 14. — Mindanao

4

Catalalus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 99. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 169. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 501 (Revision); Bull. Acad. Malgache N. S. VII, 1924, p. 112, Suppl. p. 29. — Olsoufieff, Mém. Acad. Malgache XIV, 1933, Addendum p. VII.

Proictidius Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 212. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 501.

cinereus Hustache, Mém. Acad. Malgache XIV, 1933, p. 29. — Madagaskar

fasciatus Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 506; Bull. Acad. Malgache (n. s.) VII, 1924, p. 118 *(Catalalus)*.

globulus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. LVII, 1903, p. 239 *(Platycopes)*. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 503 *(Catalalus)*. — „

lateritius Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXI, 1902, p. 353 *(Platycopes)*. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 504 *(Catalalus)*. — „

latiscapus Hustache, Sbornik ent. odd. nar. Mus. Praze 1931, p. 66 *(Catalalus)*. — Ostafrika: Quilimane

maculosus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 213 *(Proictidius)*. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 503. — Madagascar

madagascariensis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 100 *(Catalalus)*. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 169. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 503, 505 *(Catalalus)*. — „

latipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXI, 1902, p. 352 *(Platycopes)*. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 505 *(Catalalus)*.

madagascariensis Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXI, 1902, p. 353 *(Platycopes)*. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 505 *(Catalalus)*.

submaculatus Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXI, 1902, p. 353 *(Platycopes)*. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 505 *(Catalalus)*.

minutus Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 505, Bull. Acad. Malgache (n. s.) VII, 1924, p. 117 *(Catalalus)*. — „

? obscurus Germ. Linn. Ent. III, 1848, p. 218 *(Catalalus)*. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 199, Note 3. — Adelaide

pictidorsis Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXI, 1902, p. 354 *(Platycopes)*. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 504 *(Catalalus)*. — Kap

Chalepoderus Mshl.

Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XI, 1923, p. 539.

hiaticollis Mshl. l. c. p. 540, fig. — Kap

1

Cissodicasticus Hust.

Hustache, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XVIII, 1936, p. 360.

morulus Hustache, l. c. p. 360, f. 2 ♂ ♀. — Abessinien: Djem-Djem

1

Cosmorhinus Schönh.

Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 196; Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 520; l. c. VII, 1, 1843, p. 169. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 173. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 328.

cervinus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 169. — Kaffern-gebiet

cristirostris Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 196. — Kap

cristatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 521; l. c. VII, 1, 1843, p. 169. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 328.

setulifer Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 151 *(Peritelus)*. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 184 Note. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 277 (? *Cosmorhinus)*.

3

Cycliscus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 185. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 170.

caecicollis Boh. l. c. p. 188. — Kaffern-gebiet

flavulus Boh. l. c. p. 189. — Kap

plicicollis Boh. l. c. p. 187. — Kaffern-gebiet

rugicollis Boh. l. c. p. 186. — „

vulneratus Boh. l. c. p. 188. — „

8

Diatmetus Gerst.

Gerst. Archiv Naturgesch. XXXVII, 1871, I, p. 69. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) VIII, 1888, Bull. p. CLXXV. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 227; l. c. LIX, 1898, p. 219; Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 98. — Kolbe, Archiv Naturgesch. LXIV, I, 1898, p. 245, 256.

affinis Hartmann, Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 278. — Ost-Afrika

praemorsus Gerst. Archiv Naturgesch. XXXVII, 1871, I, p. 70; Decken's Reise III, 1873, p. 223, t. 11, f. 4. — Kolbe, Archiv Naturgesch. LXIV, I, 1898, p. 246. — Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 395. — Kisuani- und Ugono-Berge, Engl. Ost-Afrika: Ukamba, Bura

vicinus Hustache, l. c. p. 395. — Kilimandjaro

3

Dicasticus Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XIX, 1886, p. 327. — Fairmt Ann. Soc. Ent. France (6) VIII, 1888, Bull. p. CLXXV. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 227; l. c. LVIII, 1897, p. 229, Note. — Kolbe, Archiv Naturgesch. LXIV, I, 1898, p. 253, 257.

albonotatus Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) I, 1928, p. 403.	Tanganyika
brevipennis Hustache, Rev. Zool. Afr. XI, 1923, p. 176.	Kongo
celatus Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XIX, 1886, p. 327. — Kolbe, Archiv Naturgesch. LXIV, I, 1898, p. 255.	Mamboia
curtus Hustache, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XVIII, 1936, p. 359.	Abessinien: Djem-Djem
funicularis Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXV, 1881, p. 87 *(? Systates)*. — Auriv. in Sjöstedt, Kilim.-Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 408 *(? Dicasticus)*. — Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel, Afr. Or. XIX, 1929, p. 393 *(Dicasticus)*.	Zanzibar, Usambara (Derema), Kilimandjaro, Meru, Lindi, Tanga
Gerstaeckeri Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 222 ♂ *(Diatmetus)*. — Kolbe, Archiv Naturgesch. LXIV, I, 1898, p. 245, 255 *(Dicasticus)*. — Auriv. in Sjöstedt, Kilim.-Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 408. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) I, 1928, p. 406. — Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 393.	
var. *laevior* Auriv. l. c. p. 408. — Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 393.	
Biologie: Ann. Rep. Departm. Agric. Tanganyika 1932, p. 73—75 (Kaffeeschädling).	
geminatus Kolbe, Archiv Naturgesch. LXIV, I, 1898, p. 254.	Ostafrika: Uruguru-Berge bei Kifuru (Ukami)
haemorrhoidalis Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 325 ♀.	Ostafrika: Ukami
impressus Hustache, Ann. Soc. Ent. France CIV, 1935, p. 187 ♂ ♀.	Engl. Ostafrika: N.W.-Rhodesia (Upangva, Njassa)
lateralis Hartmann, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 375 ♂ ♀.	Usambara
laticollis Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XIX, 1886, p. 328. — Kolbe, Archiv Naturgesch. LXIV, I, 1898, p. 255.	Mamboia
mlanjensis Mshl. Bull. Ent. Research XVII, 1927, p. 212 ♂ ♀.	Nyassaland: Mlanje Berg; Portug. Ostafrika: Kola
nodulosus Hustache, Sbornik ent. odd. Nar. Mus. Praze IX, 1931, p. 82.	Uganda

quadrinus Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XIX, 1886, p. 328, t. 41, f. 2. — Kolbe, Archiv Naturgesch. LXIV, I, 1898, p. 254. — Mamboia

Ritchiei Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) I, 1928, p. 404. — Tanganyika

subcostatus Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 394. — Engl. Ostafrika: Kenya

triangulum Hustache, Rev. Zool.-Bot. Afr. XXV, 1934, p. 256. — Belg. Kongo

tuberculatus Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 223 ♀ *(Diatmetus)*. — Kolbe, Archiv Naturgesch. LXIV, I, 1898, p. 246, 256 *(Dicasticus)*. — Hustache, Voy. Alluaud. & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 393. — Usambara: Derema; Kilimandjaro: Bismarck-Hügel

verruculatus Karsch, Sitzungsber. Ges. Nat. Fr. Berlin 1881, p. 61 *(Phyllobius)*. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 515 *(Dicasticus)*. — Guinea Ins. (S. Thomé)

Ellimenistes Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 174. — Bohem. in Schönh. l. c. p. 175, obs. — Lacord. Gen. Curc. VI, 1863, p. 172. *Diethicus* Pascoe, Cist. Ent. II, 1881, p. 594. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 98.

albidus Fåhraeus, Oefv. Vet.-Ak. XXVIII, 1871, p. 34. — Kaffernland

bidentatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 176. — Kap

callosicollis Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906, p. 922. — Südafrika

clitellarius Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 182. — Kap

constrictus Fåhraeus, Oefv. Vet.-Ak. XXVIII, 1871, p. 35. — Kaffernland

cornutus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 177. — „

costicollis Boh. l. c. p. 184. — Kap

cyclops Mshl. Ann. Natal Govt. Mus. V, 1926, p. 244. — Natal

dorsatus Fåhraeus, Oefv. Vet.-Ak. XXVIII, 1871, p. 32. — Kaffernland

echinatus Mshl. Bull. Ent. Research XVII, 1926—27, p. 211, t. 3, f. 14 ♂ ♀. — Transvaal

fissirostris Mshl. Ann. Natal Govt. Mus. V, 1926, p. 244. — Natal

horridus Mshl. Bull. Ent. Research XVII, 1926—27, p. 212 ♂ ♀. — Portug. Ostafrika: Tenga

laesicollis Fåhraeus, Oefv. Vet.-Ak. XXVIII, 1871, p. 33. — Kaffernland

mysticus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 236. — Ostafrika

ostentatus Péringuey, Trans. South. Afr. Phil. Soc. VI, 2, 1892, p. 70. — S.W.Afrika

pilifer Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 182. — Kaffernland

pulvinaticollis Boh. l. c. p. 176 (Gattungstyp). — Kap, Kaffernland

rusticus Boh. l. c. p. 178. Kap
seriehispidus Boh. l. c. p. 180. „
setulosus Fåhraeus, Oefv. Vet. Ak. XXVIII, 1871, p. 34. Kaffernland
squamifer Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 181. Kap
trivialis Boh. l. c. p. 183. „
tumens Pascoe, Cist. Ent. II, 1881, p. 594 *(Diethicus)*. Delagoa Bay
tumidiceps Pascoe, l. c. p. 595 *(Diethicus)*. Natal
vecors Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 179. Kaffernland
virens Mshl. Ann. Natal Govt. Mus. V, 1926, p. 247. Natal
viridanus Fåhraeus, Oefv. Vet.-Ak. XXVIII, 1871, p. 34. Kaffernland
27

Ellimorrhinus Kolbe.

Kolbe, Abh. Senckenb. Ges. XXVI, 1902, p. 581.
insularis Kolbe, l. c. p. 582. Aldabra-Ins.
1

Embrithes Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 392. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 170.
agnatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 393. — Lacord. Gen. Col. Atl. VII, t. 64, f. 5. Kafferngebiet
albulus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 395. „
cirricollis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 575 *(Otiorrhynchus)*. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VI, 1930, p. 573 *(Embrithes)*. Kap
multicarinatus Boh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 573 *(Otiorrhynchus)*. — Schönh. l. c. VII, 1, 1843, p. 398 *(Syteites)*. — Mshl. l. c. p. 573 *(Embrithes)*.
plicicollis Germ. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 574 *(Otiorrhynchus)*. — Schönh. l. c. VII, 1, 1843, p. 398 *(Syteites)*. — Mshl. l. c. p. 573 *(Embrithes)*.
concinnus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 120. Engl. Ostafrika: Bura, Taveta, Tanga
egenus Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 236 ♂ ♀. — Gestro, l. c. p. 403. Gallaland: Arussi Galla, Cormoso
erinaceus Faust, l. c. p. 238. — Gestro, l. c. p. 403. Gallaland: Boran Galla
irregularis Faust, l. c. p. 235 ♂ ♀. — Gestro, l. c. p. 403. Gallaland: Arussi Galla, Cormoso
lateritius Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 400. Congo

miser Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 71.	Engl. Ostafrika: Ikutha
muscosus Gerst. Arch. Naturg. XXXVII, 1871, p. 71.	See Jipe
obesus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 394.	Kafferngebiet
plagiatus Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 70.	Engl. Ostafrika: Ikutha
suturalis Har. Mon.-Ber. Akad. Berlin 1880, p. 264.	Ostafrika
vinculatus Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 237. — Gestro, l. c. p. 403. 14	Gallaland: Arussi Galla, Cormoso; Boran Galla

Entypotrachelus Kolbe.

Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LII, 1891, p. 26; Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, p. 253, 256. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 133, Anm. 2. — Auriv. Arkiv Zool. XVIII A, 1926, p. 11 (Best.-Tab.).

Bryki Auriv. Ark. Zool. XVIII A, 1926, p. 10.	Engl. Ostafrika
costatus Auriv. l. c. p. 11.	,,
foveatus Auriv. l. c. p. 10.	Uganda
maculatus Auriv. l. c. p. 11.	Engl. Ostafrika: Elgon
Meyeri Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LII, 1891, p. 27; Archiv Naturgesch. LXIV, 1898, p. 253. — Auriv. in Sjöstedt, Kilim.-Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 406; Res. Scient. Voyage Rothschild en Ethiopie II, 1922, p. 729; Arkiv Zool. XVIII A, 1926, p. 11. — Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel, Afr. Or. XIX, 1929, p. 322.	Engl. Ostafrika: Kilimandjaro, Meru
subsp. *alpinus* Hustache, l. c. p. 382.	Kilimandjaro (Bismarck-Hügel), Kikuyu, Kijabe, Kenya-Berg Aberdare, Berg Kinangop
subsp. *micans* Hustache, l. c. p. 383; Voy. Babault Afr. Or. Angl. 1921, p. 6.	Nairobi-Wald
niger Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 383.	Engl. Ostafrika: Rift Tal, Berg Longonot
obscurus Auriv. Arkiv Zool. XVIII A, 1926, p. 9.	Engl. Ostafrika
rufipes Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 255. 8	Kenya

Epipedosoma Chevr.

Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXV, 1881, p. 86. — Kolbe, Archiv Naturgesch. LXIV, 1898, p. 246, 256. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 217, 219.

laticolle Kolbe, Archiv Naturgesch. LXIV, 1898, p. 248.	Dar-es-Salaam, Deutsch-Ost-Afrika
dilaticolle Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 222 ♂. — Faust, l. c. p. 233, Anm.	
tuberculatum Hartmann, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 197. — Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 397.	Kilimandjaro: Amani, Neu-Moschi
viridisquamosum Kolbe, Archiv Naturgesch. LXIV, 1898, p. 248 ♂ ♀.	Deutsch-Ostafrika: Usambara
impressicolle Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 221 ♂ ♀. — Faust, l. c. p. 233, Anmerk.	
zanguebaricum Chevr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXV, 1881, p. 87 ♂. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 220 ♂ ♀.	Zanzibar, Usegua, Dar-es-Salaam, Deutsch-Ost-Afrika
zanzibaricum Kolbe, Archiv Naturgesch. LXIV, 1898, p. 247.	
4	

Eupiona Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XI, 1871, p. 161. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 227; Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 134; Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1897, p. 98. — Heller, Ent. Tidskr. XXV, 1904, p. 180.

attalica Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XI, 1871, p. 161.	Altkalabar
ophthalmicus Chevr. Rev. mens. Ent. I, 1883, p. 84 *(Syntaphocerus)*. — Heller, Ent. Tidskr. XXV, 1904, p. *180 (Eupiona)*.	
brevicollis Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 19.	Kamerun
celata Faust, l. c. 1899, p. 328 ♀.	D.O.Afrika
conicollis Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XCIII, 1899, p. 400.	Kongo
granicollis Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 73.	West-Afrika: Kamerun
opposita Faust, l. c. p. 74.	West-Afrika: Gabun, Kongo
soror Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 19 ♂ ♀.	Kamerun
tripartita Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 225.	Gabun,
vetula Faust, l. c. p. 226; Deutsche Ent. Zeitschr. Zeitschr. 1898, p. 19.	Gabun, Kamerun
9	

Eurhynchomys Hustache.

Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 519, Note; Bull. Acad. Malgache (n. s.) VII, 1924, p. 113.

Rhynchomys Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXII, 1903, p. 221 (nec Thoms.). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 501. — Olsoufieff, Mém. Acad. Malgache XIV, 1933, p. VIII.

Decorsei Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 501; Bull. Acad. Malgache (n. s.) VII, 1924, p. 114. — Madagascar

longicornis Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXII, 1903, p. 222; l. c. LXXXVII, 1919, p. 500. — „

2

Hadrorrhinus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 479; l. c. VII, 1, 1843, p. 103. — Lacord. Gen. Col. 1863, p. 168. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 326.

ampliatus Pascoe, Proc. Linn. Soc. Lond. X, 1870, p. 447 *(Polyphrades)*. — Lea, Proc. Linn. Soc. New South Wal. XL, 1915, p. 500. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VI, 1930, p. 554 *(Hadrorrhinus)*. — N.-West-Australien

setosus Lea, Trans. R. Soc. South Austr. XXVIII, 1904, p. 90; Proc. Linn. Soc. New South Wales XL, 1915, p. 500 *(Polyphrades)*.

basirostris Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVIII, 1914, p. 312—316 *(Polyphrades)*. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VI, 1930, p. 554 *(Hadrorrhinus)*. — Australien

collaris Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXXVIII, 1914, p. 312—316 *(Polyphrades)*. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VI, 1930, p. 554 *(Hadrorrhinus)*. — „

lepidopterus Gyllh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 480. — Schönh. Gen. Spec. Col. VII, 1, 1843, p. 103. — Cast. l. c. p. 326. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VI, 1930, p. 554. — „

squamosus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 103. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VI, 1930, p. 554. — „

5

Lalagetes Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 125. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 171.

hispidus Hartmann, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 70. — Transvaal

leurops Mshl. Bull. Ent. Res. XXII, 1931, p. 418, fig. — Kap

pallipes Fåhraeus, Oefv. Vet.-Ak. XXVIII, 1871, p. 32. — Kaffernland

pusio Fåhraeus, l. c. p. 31. — „

seminulum Fåhraeus, l. c. p. 31. — „

setosus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 436. — „

signatus Hartmann, Deutsche Ent. Zeitschr. 1906, p. 71. — Transvaal

squamulatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 126. — Kap

subfasciatus Boh. l. c. p. 125. — „

variegatus Boh. l. c. p. 437. Port Natal
viridulus Fåhraeus, Oefv. Vet.-Ak. XXVIII, 1871, p. 32. Kaffernland
11

Mecomerinthus Faust.

Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 131; Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 98; Stett. Ent. Zeit. LIX, 1898, p. 219.

depressus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 131. — Auriv. in Sjöstedt, Kilim.-Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 407. Kilimandjaro
1

Mecostylus Kolbe.

Kolbe, Archiv Naturgesch. LXIV, 1898, p. 249.

acuminatus Mshl. Bull. Ent. Research XVI, 1925, p. 71, fig. Kenya
Buchwaldi Kolbe, Archiv Naturgesch. LXIV, 1898, p. 250 ♂ ♀ (Gattungstype). West-Usambara
lateralis Hustache, Sbornik ent. odd. nar. Mus. Praze X, 1932, p. 30. Engl. Ostafrika
vittaticollis Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 224 *(Diatmetus)*. — Kolbe, Archiv Naturgesch. LXIV, 1898, p. 246, 250 *(Mecostylus)*. Usambara: Derema
4

Neobryocheta Hustache.

Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 253.

hystrix Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 254. Belg. Kongo
setosa Hustache, Ann. Soc. Linn. Lyon LXVI, 1919, p. 61 *(Eupiona)*. — Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 253 *(Neobryochaeta)*. „
trapezicollis Hustache, l. c. p. 253. „
3

Oosomus Schönh.

Schönh. Curc. Disp. meth. 1826, p. 195 *(Peritelus* subg. *Oosomus)*; Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 525 *(Phlyctinus* grex *Oosomus)*; l. c. VII, 1, 1843, p. 163 *(Phlyctinus*, stirps 2). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 172.

horridus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 525 *(Phlyctinus)*; l. c. VII, 1, 1843, p. 166 *(Phlyctinus)*. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 172. Kap
metallescens Boh. l. c. VII, 1, 1843, p. 163 *(Phlyctinus)*. Kafferngebiet
oblongus Boh. l. c. p. 166 *(Phlyctinus)*. Kap
pauper Boh. l. c. p. 165 *(Phlyctinus)*. „
testatus Boh. l. c. II, 2, 1834, p. 526 *(Phlyctinus)*; l. c. VII, 1, 1843, p. 166 *(Phlyctinus)*. „
varius Boh. l. c. VII, 1, 1843, p. 164 *(Phlyctinus)*. „
6

Opseotrophus Faust.

Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 129; Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 98.

impressicollis Hustache, Sbornik ent. odd. Nar. Mus. Praze IX, 1931, p. 80. — Elfenbeinküste

obesus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 129. — Ostafrika

Seidlitzi Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 327. — D.Ostafrika

sufflatus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 130. — Ostafrika

4

Paraplesius Hartmann.

Hartmann, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 376. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 514.

plebejus Hartmann, l. c. p. 376 ♂ ♀. — Usambara

1

Peribrotus Gerst.

Gerst. Archiv f. Nat. XXXVII, 1, 1871, p. 72; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 234. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 98; Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 225, Note 1.

Euperitelus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 341.

albovarius Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 341, t. 15, f. 20 *(Euperitelus)*; Ent. Month. Mag. L, 1914, p. 275 *(Peribrotus)*. — Mexico

audax Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 128. — Ost-Afrika

brunneus Hustache, Voy. Babault Afr. Or. Angl. 1921, p. 63. — Brit. Ost-Afrika

brevicollis Hustache, Sborn. ent. odd. narod. Mus. Praze X, 1932, p. 30. — Brit. Ost-Afrika: Usegua

finitimus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 128. — Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. 1929, p. 369. — Ostafrika

minor Kolbe, Stett. Ent. Zeit. LII, 1891, p. 35. — Engl. Ostafrika

mixtus Hustache, Voy. Babault Afr. Or. Angl. 1921, p. 15, figs. — Brit. Ost-Afrika

prolixus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 126, 128. — Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. Angl. 1929, p. 397. — Ost-Afrika

pustulosus Gerst. Arch. f. Nat. XXXVII, 1, 1871, p. 72; Decken's Reise III, 2, 1873, p. 234, t. 11, f. 9. — Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XVIII, 1895 (1896), p. 715. — Mombasa, Tana-Fluß

variolosus Gerst. Jahrb. Wiss. Anstalt. Hamburg I, 1884, p. 58. — Auriv. in Sjöstedt, Kilim.-Meru Exped. I, 7, 21, 1927, p. 409. — Massai, Usambara

10

Paratmetus Auriv.

Auriv. Arkiv Zool. VIII, 1913, p. 2.

Loennbergi Auriv. l. c. p. 3. — Engl. Ostafrika
1

Peritelomus Faust.

Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 69.

bicruciatus Faust, l. c. p. 70. — Engl. Ostafrika: Ikutha
1

Peritmetus Kolbe.

Kolbe, Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, p. 252.

abyssinicus Hustache, Ann. Soc. Linn. Lyon LXVI, 1919, p. 61. — Abessinien

alpinus Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 387. — Engl. Ostafrika: Berg Kenya

difficilis Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 389. — Engl. Ostafrika: Kijabé

glaucus Hustache, Sbornik ent. odd. Nar. Mus. Praze X, 1932, p. 28. — Ost-Afrika Ufiomi-Berg

oblongus Hustache, Rev. Zool. Afr. XI, 1923, p. 175. — Belg. Kongo

Raffrayi Hustache, Sbornik ent. odd. Nar. Mus. Praze X, 1932, p. 29. — Abessinien

rugosipennis Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 258. — Belg. Kongo

rugosus Hustache, Ann. Soc. Ent. France CIV, 1935, p. 188. — Engl. Ostafrika: Upangwa

Sjöstedti Auriv. Kilim.-Meru Exped. I, 7, 21, 1910, p. 406 (? *Peritmetus*). — Ostafrika

scintillans Hustache, Sbornik ent. odd. Nar. Mus. Praze X, 1932, p. 28. — Kamerun

viridulus Kolbe, Deutsch-Ostafrika VI, Col. 1897, p. 270, t. 3, f. 34 *(Diatmetus)*; Arch. Naturgesch. LXIV, 1898, p. 246, 252 *(Peritmetus)*. — Deutsch-Ost-Afrika Albert-Edward-See (Kirewia); Albert-Nyansa (Ituri-Fähre, Undussuma)

var. *minor* Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 259. — Belg. Kongo: Kivu, Kirwa-See, Katana, Mombasa, Lulenga, Nyamukubi, Ngoma

Piezoderes Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 167. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 167.

Winthemi Boh. l. c. p. 168. Kap
1

Polyrhabdotus Faust.

Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 133.

notabilis Hartmann, Wien. Ent. Zeit. XVI, 1897, p. 279 (? *Polyrhabdotus*). Ostafrika

transversalis Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 134. Tanga
2

Porpacus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 106. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 166.

Propacus (Schönh.) Heyne & Taschenberg, Exot. Käfer 1908, p. 225 [err.].

cornirostris Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 108. Kap

horridus Boh. l. c. p. 107. — Lacord. Gen. Col. Atl VII, t. 64, f. 4, a, b. — Heyne & Taschenberg, Exot. Käfer 1908, p. 226, t. 30, f. 4. Kafferngebiet

vesiculatus Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XI, 1923, p. 540, figg. Kap
3

Pyctoderes Schönh.

Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 194 (*Peritelus* subg. *Pyctoderes*); Gen. Spec. Curc. II, 1834, p. 522 (*Phlyctinus*); l. c. VII, 1, 1843, p. 159 (*Phlyctinus* stirps I). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 165.

albomixtus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 161 (*Phlyctinus*). Kap

egenus Boh. l. c. p. 162 (*Phlyctinus*). „

gallina Sparrm. Acta Holm. I, 1875, p. 56, t. 3, f. 37 (*Curculio*). — Oliv. Enc. méth. V, 1807, p. 570 (*Curculio*). — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1794 (*Curculio*). — Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 195 (*Peritelus* subg. *Pyctoderes*); Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 525 (*Phlyctinus*); Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 160 (*Phlyctinus*). „
pleuroleucus Wiedem. Zool. Mag. II, 1, 1823, p. 127 (*Curculio*).

inaequalis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 159 (*Phlyctinus*). „

monstrosus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 522 (*Phlyctinus*); l. c. VII, 1, 1843, p. 159 (*Phlyctinus*). „

murinus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 162 (*Phlyctinus*). „

plicatus Gerst. Arch. Naturgesch. XXXVII, 1871, I, p. 71 (*Pyctoderes*). Moschi
7

Rhadinoscapus Kolbe.

Kolbe, Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 506.

nociturus Kolbe, l. c. p. 506. — Ostafrika
1

Sphrigodes Gerst.

Gerst. Archiv Naturg. XXXVII, 1871, I, p. 70. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 514.

Babaulti Hustache, Voy. Babault Afr. Or. Angl. Curcul. 1921, p. 40 *(Lecanophora)*; Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 399 *(Sphrigodes)*. — Engl. Ostafrika

crinitus Mshl. Bull. Ent. Research XXV, 1934, p. 495. — Tanganyika

depressifrons Mshl. Mem. Mus. Zool. Univ. Coimbra (I), nr. 81, 1935, p. 14. — Portug. Ostafrika

globulus Mshl. l. c. p. 495. — „

griseus Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 399. — Engl. Ostafrika

margaritaceus Hustache, Voy. Babault Afr. Or. Angl. Curcul. 1921, p. 41 *(Lecanophora)* (nec Gerst.).

margaritaceus Gerst. Arch. Naturg. XXXVII, 1871, I, p. 70; Decken's Reise III, 2, 1873, t. 11, f. 6. — Auriv. in Sjöstedt, Kilim.-Meru Exped. I, 7, 21, 1927, p. 409. — Mombo Endara; Usambara:

mixtus Hustache, Voy. Babault Afr. Or. Angl. Curcul. 1921, p. 38, 41 *(Lecanophora)*; Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 399 *(Sphrigodes)*. — Kilimandjaro

plagiatus Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XL, 1896, p. 70 *(Embrithes)*. — Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 399 *(Sphrigodes)*. — Engl. Ostafrika

subdenudatus Hustache, Ann. Mus. Civ. Genova LI, 1924, p. 168. — Engl. Ostafrika Fort Hall

variegatus Hartmann, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 383. — Ostafrika:

vicinus Hartmann, l. c. p. 385. — Ostafrika: Mikindani, Ikutha
11

Syntaphocerus Thoms.

Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 128. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 98. — Heller, Ent. Tidskr. XXV, 1904, p. 180. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 178.

Bryochaeta Pascoe, Proc. Linn. Soc. XI, 1871, p. 160; Ann. Mag. Nat. Hist. (5) X, 1882, p. 444, t. 18, f. 3. — Chevr. Rev. Mens. Ent. I, 1883, p. 83. — Heller, Ent. Tidskr. XXV, 1904, p. 180 (Tabelle).

acanthoides (Oliv.) Heller, Ent. Tidskr. XXV, 1904, p. 181 *(Bryochaeta)*. — Trop. Afrika

apicalis Heller, l. c. p. 182, 183 *(Bryochaeta)*. — Kamerun

interrupta Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 20 ♂ ♀. — Heller, Ent. Tidskr. XXV, 1904, p. 183 *(Bryochaeta)*. — „

hispidulus Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 128 *(Syntaphocerus)*. — Gaboon

viridis Pascoe, Proc. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 160 *(Bryochaeta)*. — Chevr. Rev. Mens. Ent. I, 1883, p. 84. — Calabar

nigritus Chevr. Rev. Mens. Ent. I, 1883, p. 84 *(Syntaphocerus)*. — Heller, Ent. Tidskr. XXV, 1904, p. 182 *(Bryochaeta)*.

lineatus Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 514 *(Bryochaeta)*. — Heller, Ent. Tidskr. XXV, 1904, p. 182 *(Bryochaeta)*. — Westafrika:

obsoletus Hustache, Rev. Zool. Afr. XI, 1923, p. 178 *(Syntaphocerus)*. — Tanganyika

palliatus Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) X, 1882, p. 444, t. 18, f. 3 *(Bryochaeta)*. — Westafrika

subcruciatus Chevr. Rev. mens. Ent. I, 1883, p. 83 *(Syntaphocerus)*. — Heller, Ent. Tidskr. XXV, 1904, p. 182 *(Bryochaeta)*. — Old Calabar

Pascoei Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 515 *(Bryochaeta)*. — Heller, Ent. Tidskr. XXV, 1904, p. 181 *(Bryochaeta)*. — Westafrika Gaboon, Aschanti

pusillus Pascoe, Proc. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 161 *(Bryochaeta)*. — Westafrika

terrenus Hustache, Ann. Soc. Linn. Lyon LXVI, 1920, p. 60 *(Syntaphocerus)*. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XV, 1935, p. 315. — Kongo

quadrimaculatus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 20 *(Bryochaeta)*. — Heller, Tidskr. Ent. XXV, 1904, p. 163 *(Bryochaeta)*. — Kamerun

sellatus Heller, l. c. p. 181, 183 *(Bryochaeta)*. — ,,

semiviridus Chevr. Rev. mens. Ent. I, 1883, p. 83 *(Syntaphocerus)*. — Heller, Tidskr. Ent. XXV, 1904, p. 180, 181 *(? Bryochaeta)*. — Old Calabar

Sjöstedti Heller, l. c. p. 182, 184, fig. *(Bryochaeta)*. — Kamerun

sulcipennis Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 139 *(Episomus)*. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 101 *(Syntaphocerus)*.

suffiata Pascoe, Proc. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 160, t. 4, f. 7 *(Bryochaeta)*. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXVI, 1897, p. 148. — Heller, Ent. Tidskr. XXV, 1904, p. 182. — Old Calabar

trigonocephalus Hustache, Sbornik Ent. odd. Nar. Mus. Praze IX, 1931, p. 82 *(Bryochaeta)*. — Kamerun

transversolineatus Hustache, l. c. p. 81 *(Bryochaeta)*. — ,,

virgulatus Hustache, l. c. p. 80 *(Bryochaeta)*. — ,,

17

Trepimetus Hustache.

Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 257.

Burgeoni Hustache, l. c. p. 257. — Belg. Kongo: Kivu

1

7. Tribus: Episomini.

Otiorrhynchides gr. *Episomides* Lacord. Gen. Col. VI, 1836, p. 145, 175.
Otiorrhynchides gr. *Episomides* Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 1.
Otiorrhynchinae gr. *Episomides* Mshl. Fauna of Br. India, Col. Curcul. 1916, p. 204.

Ceratocrates Harold.

Harold, Monatsber. Akad. Berlin 1880, p. 264. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 97.

dubius Harold, l. c. p. 265. — Ost-Afrika
Haroldi Faust, Deutsche Entom. Zeitschr. 1896, p. 126. — „
Hildebrandti Harold, l. c. p. 265. — „
granulosus Auriv. in Sjöstedt, Kilim.-Meru Exped. I, 7, 21, 1927, p. 408. — Kilimandjaro
nigricornis Auriv. l. c. p. 408. — „
regularis Hustache, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XVIII, 1936, p. 371, f. 5. — Abessinien: Berg Zukwala
tuberculosus Hustache, Voy. Babault Afr. Orient. Angl. 1921, p. 13, fig. — Brit. Ost-Afrika

7

Chaunoderus Gerst.

Gerst. Archiv Naturgesch. XXXVII, 1871, I, p. 70. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 227.
Demenica Pascoe, Proc. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 159. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France 1888, Bull. p. CLXXV. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 227; Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 18.

ancora Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 218 ♀. — Loango
antennatus Hustache, Ann. Soc. Linn. Lyon LXVI, 1920, p. 58. — Gabon
apicalis Hartmann, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 382 ♂ ♀. — Ost-Afrika
brevicollis Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 117. — „
compressa Pascoe, Proc. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 159 *(Demenica)*. — West-Afrika
congoanus Hustache, Ann. Soc. Linn. Lyon LXVI, 1920, p. 57. — Gabon
Duvivieri Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XLIII, 1899, p. 395. — Kongo
foveolatus Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 217 ♂. — Süd-Afrika: Transvaal, Zambesi
marginalis Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 119. — Ost-Afrika
semipolitus Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 220 *(Chaunoderes)*; Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 19 *(Demenica)*. — Heller, Ent. Tidskr. XXV, 1904, p. 163 *(Demenica)*. — Alt-Calabar Kamerun: Joh.-Albrechts-Höhe

setiger Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 221 *(Chaunoderes)*; Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 19 *(Demenica)*. — Gaboon

sternalis Hartmann, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 381 ♂. — Ost-Afrika

stupidus Gerst. Archiv Naturgesch. XXXVII, 1871, p. 70; Decken's Reise III, 1873, p. 2, t. 11, f. 5. — Endara, Brit. Ost-Afrika

subglaber Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 118. — Ost-Afrika

t-album Hustache, Ann. Soc. Linn. Lyon LXVI, 1920, p. 58. — ,,

transversalis Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1893, p. 219 ♀. — Gaboon

16

Episomus Schönh.

Schönh. Disp. meth. Curc. 1826, p. 185; Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 474; l. c. VII, 1, 1843, p. 88. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 325. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 106, 120. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 175. — Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XI, 1871, p. 163. — Chevr. Rev. mens. Ent. I, 3, 1883, p. 74—76. — Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 92. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 90—201 (Revision); l. c. p. 682—684 (Index). — Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1907, Proc. p. XXXI—XXXII (Mimikry). — Matsumura, Zeitschr. wissens. Ent. VI, 1910 (Zuckerrohrschädling). — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 205, 207 (Best.-Tab. indisch. Arten p. 208—215).

Subg. *Episomus* Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897. p. 123.

Subg. *Simallus* Pascoe, Journ. of Ent. II, 1865, p. 420. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 194, Note. — Mshl. Fauna of Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 207.

aemulus Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 110, 180 ♀. — Malakka

albarius Faust, l. c. p. 110, 172. — Iava

var. *immaculatus* Faust, l. c. p. 11, 173.

Andrewesi Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 221, 229 ♂ ♀, fig. 71, 66 g. — Madras

apicalis Chevr. Rev. mens. d'Ent. I, 1883, p. 75, 79. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 200. — Malakka

appendiculatus Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 117, 139 ♂ ♀. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 211, 226 ♂ ♀. — Indien (Allahabad), Tibet, Malakka

arcuatus Mshl. l. c. p. 209, 219 ♂ ♀, fig. 66 l. — Madras: Nilgiri Hills

arduus Mshl. l. c. p. 213, 239 ♀. — Assam

arrogans Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 90 *(Episomus)*. — Chevr. Rev. mens. d'Ent. I, 1883, p. 75. — Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 185. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 214, 244 ♂ ♀, fig. 66 p. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 122, 198 (subg. *Simallus*). — Bombay

cataleucus Chevr. Rev. mens. Ent. I, 1883, p. 74, 77. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 198.

avuncularis Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 212, 232 ♀. — Assam

bicuspis Mshl. l. c. p. 208, 215 ♂ ♀, fig. 67 ♀. — Burma: Ruby Mines

bilineatus Chevr. Rev. mens. d'Ent. I, 3, 1883, p. 76—80. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 106, 186. — Malakka, Singapore

binodosus Chevr. Rev. mens. d'Ent. I, 3, 1883, p. 75, 78. — Faust, Horae Soc. d'Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 109, 173 ♀. — Penang

brevipennis Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 119, 137 ♀. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph 1916, p. 214, 241 ♀. — Burma

Castelnaui Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 115, 149 ♂ ♀. — Malakka

celebensis Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 89 ♂; Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 104, 192. — Celebes, ?Dongola

chlorostigma Wiedem. Zool. Mag. I, 3, 1819, p. 177 *(Curculio)*. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 475 *(Episomus)*; l. c. VII, 1, 1843, p. 92. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 109, 170 ♂ ♀. — Java

pauperatus Gyllh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 475, var. γ (♂) und var. δ (♀). — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 170.

var. *adumbratus* Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 171.

var. *albostigma* Faust, l. c. p. 171.

pauperatus Gyllh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 475, var. β.

cochinchinensis Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 120, 130 ♂. — Cochinchina

connexus Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 210, 225 ♂ ♀. — Tenasserim

decipiens Mshl. l. c. p. 212, 234 ♂, fig. 66 e. — Assam

Dejeani Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 103, 126 ♂ ♀. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 209, 220. — Madras: Nilgiri Hills: Utakamand

distans Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 109, 175 ♂ ♀. — Sumatra

distinguendus Faust, l. c. p. 110, 172. — Java: Sukabumi

var. *obsoletus* Faust, l. c. p. 111, 172.

diutinus Faust, l. c. p. 116, 156 ♂ ♀. — Java

var. *confinis* Faust, l. c. p. 116, 158.

Dohertyi Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 212, 233 ♂ ♀, fig. 66 a, 72. — Assam

dorsalis Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 116, 155. — Sumatra

pauperatus Gyllh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 475 (nec F.). — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 156.

exaratus Faust, l. c. p. 115, 150 ♂ ♀. — Java: Buitenzorg

Fabricius! Faust, l. c. p. 106, 187, 255. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 212, 231 ♂ ♀, fig. 66 d. — Ramnad

Fausti Hartmann, Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 175 ♀. — Sumatra: Palembang

figulus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 476 *(Episomus)*; l. c. VII, 1, 1843, p. 92. — Chevr. Rev. mens. d'Ent. I, 1883—84, p. 75. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 119, 136 ♂ ♀. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchop. 1916, p. 213, 236 ♂ ♀, fig. 66 j. — Indien, Bengal

griseus Chevr. Rev. mens. d'Ent. I, 3, 1883, p. 76. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 137. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 236. — ? Java

var. *nigrosparsus* Chevr. Rev. mens. d'Ent. I, 3, 1883, p. 75, 79. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 119, 136 ♂ ♀. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 236. — Assam, Saharampur, Ilhasia Hills

figuratus Karsch, Berl. Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 387. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 105, 165 ♂. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 210, 221, fig. 66 s. — Ceylon

annulipes Chevr. Rev. mens. d'Ent. I, 3, 1883, p. 75, 77. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 165. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 221.

ceylonicus Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 113, 161 ♂ ♀. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 221.

fimbriatus Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XI, 1871, p. 151. — Chevr. Rev. mens. d'Ent. I, 3, 1883, p. 76. — Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 215. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 90; Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 103, 190 ♂ ♀. — Sarawak, Ceylon, Bankajang

frenatus Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 211, 230 ♂ ♀, fig. 661. — Madras

gracilicornis Rits. Notes Leyden Mus. IV, 1882, p. 178 ♂. — Chevr. Rev. mens. d'Ent. I, 3, 1883, p. 76. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 116, 158 ♂ ♀. — Sumatra: Solok

? *gemmeus* Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XX, 1887, p. 349. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 158.

gryphus Faust, l. c. p. 111, 166. — Sumatra

guttatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 435. — Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 185; Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 138 ♂ ♀. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 208, 217 ♂ ♀, fig. 68 ♂. — Assam, Burma, Penang

ocellatus Chevr. Rev. mens. d'Ent. I, 3, 1883, p. 75. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1907, p. 138, Note 13.

Gyllenhalli Faust, l. c. p. 111, 168. — Java: Tengger Berge

var. *socors* Faust, l. c. p. 169. — Java: Berg Gede, Tjikorai, Pengalengan

humeralis Chevr. Rev. mens. d'Ent. I, 3, 1883, p. 76, 81. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 118, 130 ♂ ♀. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 214, 241 ♂ ♀, fig. 66 f. — Java

Aurivilliusi Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 119, 132 ♂. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 241. — Indien (Unit. Prov. Assam)

Schönherri Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 118, 132 ♂ ♀. — Indien: Saharampur, Assam, Calcutta

iconicus Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XI, 1871, p. 159. — Chevr. Rev. mens. d'Ent. I, 3, 1883, p. 76. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 200. — Cambodia

illustris Faust, l. c. p. 107, 184. — Malakka, Singapore

? intercalaris Faust, l. c. p. 173. — Java

incisipes Chevr. Revue mens. d'Ent, I, 3, 1883, p. 75, 78. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 109, 179 ♂. — Penang, Pulopenang

incomptus Faust, l. c. p. 113, 142 ♂. — Ins. Salanga

inermicollis Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 211, 226 ♂ ♀. — Assam: Khasia Hills

irregularis Mshl. l. c. p. 209, 211 ♀, fig. 69. — Madras: Malabar District

Kraatzi Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 90; Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 104, 192 ♀. — Borneo, Bankajang

kwanhsiensis Heller, Ent. Blätt. XIX, 1923, p. 75. — China

lacerta F. Spec. Ins. I, 1781, p. 190; Mant. Ins. I, 1787, p. 117; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 470; Syst. El. II, 1801, p. 528 *(Curculio)*. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1781. — Oliv. Encycl. Méthod. V, 1790, p. 539; Ent. V, 1807, p. 354, t. 6, f. 68, t. 12, f. 148, t. 19, f. 239. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 388, t. 90, f. 13. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 476 *(Episomus)*; l. c. VII, 1, 1843, p. 92. — Chevr. Rev. mens. d'Ent. I, 3, 1883, p. 75. — Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 214. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 112, 159 ♂ ♀. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 211, 223, fig. 66 k. — Hustache, Res. Scient. Miss. Guy Babault Inde-Himalaya 1928, Curcul. p. 9. — Java, Pondicherry, Bengal, Bombay, Madras

var. *nubeculosus* Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 92. — Ostindien

? *avarus* F. Syst. El. II, 1801, p. 510. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 159, 160. — Java

crenatus Guér. in litt. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 159. — Pondicherry

var. *Bohemani* Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 112, 160. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 224. — Bengal

var. *piger* Mshl. l. c. p. 224 ♂. — Nilgiri

Biologie: Maxwell Lefroy, Indian Ins. Life 1909, p. 384. — Bainbrigge Fletcher, Some South Indian Ins. 1914, p. 327. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 225.

laticollis Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XX, 1887, p. 350. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 201. — Pachebon

lentus Er. Nova Acta Acad. Leopold. XVI, Suppl. 1, 1834, p. 263. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 94 *(Episomus)*. — Chevr. Rev. mens. d'Ent. I, 1883, p. 76. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 122, 197 (subg. *Simallus*). — Luzon: Manila

lateralis Eydoux, Rev. Zool. 1839, p. 266. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 88 *(Episomus)*. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, p. 197.

limbaticollis Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 214, 243, fig. 66 u. — Hustache, Res. Scient. Miss. Guy Babault Inde-Himalaya 1928, Curcul. p. 9. — Burma

lucidus Hartmann, Wien. Ent. Zeit. XIX, 1900, p. 176 ♀. — Sumatra: Palembang

malaccensis Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 151 ♂ ♀. — Perak

manipurensis Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 210, 225 ♂ ♀, fig. 66 c. — Assam: Manipur

Marshalli Heller, Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 130. — Tonkin: Mouson

montanus Guér. Voy. Delessert II, 1843, p. 52. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 88. — Chevr. Rev. mens. d'Ent. I, 3, 1883, p. 74. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 103, 125 ♂ ♀. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 209, 219, fig. 66 b. — Madras: Coonor, Nilgiri Hills, Naduvatum, Utakamand, Pondicherry

clathratus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 89 ♂. — Chevr. Rev. mens. d'Ent. I, 3, 1883, p. 75. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 126.

var. *laevicollis* Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 209, 219. — Nilgiri

mori Kôno, Ins. Matsum. II, 1928, p. 166. — Japan

mundus Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 93. — „

nebulosus Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 212, 232 ♂ ♀. — Assam

nigropustulatus Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 191; Horae Soc. Ent. Ross. — Birma: Palon

XXXI, 1897, p. 119, 135. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 212, 235 ♂ ♀.

nilgirinus Heller, Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, p. 131 ♂ ♀. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 210, 222 ♂ ♀, fig. 66 r. — Madras: Nilgiri Hills

nobilis Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 90; Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 104, 191 ♂ ♀. — Borneo

obesulus Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 121, 194 ♂ ♀ (subgen. *Simallus*). — Cambodja

obliquus Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 215, 246 ♀. — Burma

oblongus Mshl. l. c. p. 214, 243 ♂, fig. 66 t. — „

obstrusus Mshl. l. c. p. 213, 240 ♀. — „

obuncus Mshl. l. c. p. 211, 231 ♂. — Madras

omisiensis Heller, Ent. Blätter XIX, 1923, p. 75. — China

pauperatus F. Syst. El. II, 1801, p. 509 *(Curculio)*. — Chevr. Rev. mens. d'Ent. I, 1883—84, 1883, p. 75. — Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 215. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 114, 143 ♂ ♀ (subg. *Episomus*). — Heyne & Taschenb. Exot. Käfer 1903—08 (1908), p. 226, t. 30, f. 5. — Sumatra, Java, Malakka, Borneo

platina Sparrm. Vetensk. Ak. Nya Handl. VI, 1785, p. 55, t. 3, f. 36 *(Curculio)*. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1794. — Oliv. Encycl. méthod. V, 1790, p. 570. — Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 475 *(Episomus)*; Boh. l. c. VII, 1, 1843, p. 91. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 325. — Chevr. Rev. mens. d'Ent. I, 1883, p. 75. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 121, 195 ♂ ♀ (subg. *Simallus*). — Kap, Java, Cochinchina

? *avarus* F. Syst. El. II, 1801, p. 510. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 195, 197.

nigrolineatus Wiedem. Zool. Mag. II, 1, 1823, p. 125 *(Curculio)*. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 196. — Madras

praecanus Faust, l. c. p. 107, 176. — Sumatra, Nias

profanus Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894 (1895), p. 189 ♂ ♀; Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 118, 141. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 213, 237. — Birma: Carin Chebá

var. *punctiger* Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894 (1895), p. 189.

pudibundus Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 185 ♂ ♀; Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 121, 194 (subg. *Simallus*). — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 214, 242, fig. 66 n. — Birma: Carin Chebá, Tikekee, Pegú: Cambodge

pudicus Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 114, 147 ♀. — Borneo

pyriformis Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 213, 239 ♀. — Ceylon

quadrimaculatus Mshl. l. c. p. 213, 237 ♂ ♀, fig. 66 q. — Assam

quatuornotatus Desbr. Journ. Asiat. Soc. Bengal LIX, 2, 1890, p. 212. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 117, 141 ♂ ♀. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 211, 228 ♂ ♀, fig. 70. — Indien: Assam, Sikkim, Unit. Province: (Allahabad)

Prainae Faust, Stett. Ent. Zeit. LII, 1891, p. 265 ♂ („*pracuae*" err.); l. c. 1892, p. XVIII; Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 117, 141 ♂ ♀.

raucus Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 113, 162 ♂ ♀. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 210, 222, fig. 66 m. — Indien: Madras

repandus Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894 (1895), p. 193 ♂ ♀; Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 120, 126. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 212, 233 ♂ ♀. — Birma: Carin Chebá

sagax Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 119, 134 ♂ ♀. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 212, 235 ♂ ♀, fig. 66 h. — Nord-Indien Assam

saitus Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 115, 153 ♂. — Java

Sennae Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894 (1895), p. 186 ♀; Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 122, 198 (subg. *Simallus*). — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 215, 245 ♀, fig. 74. — Birma: Bhamò

siamensis Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 120, 127 ♂ ♀. — Indien; Malakka, Cambodge, Siam

simulator Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 107, 178. — Sumatra: Deli, Liangagas; Malakka

singularis Faust, l. c. p. 105, 163 ♂ ♀. — Siam

sobrinus Faust, l. c. p. 114, 145 ♀. — Malakka

stellio Vollenh. Tijdschr. v. Ent. VII, 1864, p. 169, t. 12, f. 5. — Chevr. Rev. mens. d'Ent. I, 1883—84 (1883), p. 76. — Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 215. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 114, 146 ♀. — Sumatra

suavis Faust, l. c. p. 107, 182 ♀. — Salang-Ins.

subnitens Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 215, 245 ♂ ♀, fig. 66 o. — Burma, Java

sulcicollis Pascoe, Journ. of Ent. II, 1865, p. 420, t. 17, f. 8 (*Simallus*). — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 247 ♀, fig. 75 (*Episomus*). — Burma

auriculatus Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894 (1895), p. 187; Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 199 (subgen. *Simallus*).

subtuberculatus Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1922, p. 3. — Tonkin

Takahashii Kôno, Ins. Matsum. II, 1928, p. 166. — Formosa

timidus Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 108, 182 ♂ ♀. — Borneo, Sumatra, Deli, Malakka

truncatirostris Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) IX, 1889, p. 51 *(Dermatodes)*. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 120, 128 ♂ ♀ (subgen. *Episomus)*. — Kui Tschen

turritus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 613 *(Lagostomus)*; l. c. V, 2, 1840, p. 896 *(Dermatodes)*. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 109, Note *(Dermatodes)*. — Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 164 *(Episomus)*. — Jekel, Col. Jekel. II, 1875, p. 139. — Chevr. Rev. mens. d'Ent. I, 1883, p. 96. — Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 92. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 102, 123 ♂ ♀ (subg. *Episomus)*. — Japan, Nordchina, Korea

var. *chinensis* Faust, l. c. p. 102, 124. — Hongkong

turritus Chevr. in Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 176, Note 12.

var. *declivis* Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 102, 124 ♀. — Tschifu, Nordchina

turritus Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XI, 1871, p. 158.

subsp. *Jamamurai* Kôno, Ins. Matsum. II, 1928, p. 166, fig. — Korea

uncatus Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 106, 188 ♂. — Borneo

uniformis Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XX, 1887, p. 349. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 120, 129 ♂ ♀. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph 1916, p. 213, 238 ♂ ♀, fig. 7 n. — Andamanen

versutus Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894 (1895), p. 191 ♂ ♀; Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 117, 141. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 211, 227 ♂ ♀. — Birma: Bhamò, Teinzo; Assam

Vethi Hartmann, Tijdschr. Ent. LVII, 1914, p. 123. — Sumatra

viriosus Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 109, 177. — Nias

Watanabei Kôno, Ins. Matsum. VI, 1932, p. 181, fig. — Formosa

Wiedemanni Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 101 — Java

Lachnotarsus Mshl.

Mshl. Fn. Brit. Ind. Rhynchoph. I, 1916, p. 205, 248. 1897, p. 111, 170.

Stevensi Mshl. l. c. p. 249 ♂, fig. 76. — Sikkim
1

Parapionus Mshl.

Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 204, 205.

varicolor Mshl. l. c. p. 206 ♂ ♀, fig. 65. — Bombay
1

Platyomicus Thoms.

Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 126. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 177. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 97. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 67.

Episomus Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 477; l. c. VII, 1, 1843, p. 95.

angolanus Hustache, Bull. Soc. Neuchât. Sc. Natur. LX, 1935, p. 181. — Angola

annulicornis Hustache, Sbornik ent. odd. Nar. Mus. Praze IX, 1931, p. 79. — Kamerun

aridus Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. XIX, 1886, p. 326, t. 41, f. 5. — Mamboia

cavicollis Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 190. — Zentralafrika (Baluba)

cordipennis Pascoe, Proc. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 162. — N'Gami

echinus F. Syst. El. II, 1801, p. 519 *(Curculio)*. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 477 *(Episomus)*. — Heyne & Taschenberg, Exot. Käfer 1908, p. 226, t. 30, f. 6. — Guinea, Gaboon

sulcicollis Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 127 *(Platyomicus)*. — Chevr. Rev. mens. d'Ent. I, 1883 .— Heyne & Taschenberg, l. c. p. 226.

Fabricii Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 512. — Gaboon

funicularis Hustache, Sborn. ent. odd. Nar. Mus. Praze IX, 1931, p. 79. — Kamerun

graciliscapus Hustache, Bull. Soc. Neuchât. Sc. Natur. XC, 1935, p. 180. — Angola: Bimbi

humeralis Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 227. — Togo: Bismarckburg

laesipes Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 189, 283, t. 6, f. 6. — Zentralafrika (Kassai)

Neavei Mshl. Ann. Soc. Ent. Belg. LIII, 1909, p. 240. — Kongo

nigrodorsum Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 325. — Belg. Kongo

obesus Hustache, Rev. Zool. Afr. XI, 1923, p. 173. — „

pedestris Pascoe, Proc. Linn. Soc. Lond. XI, 1871, p. 162, t. 6, f. 8. — Heller, Ent. Tidskr. XXV, 1904, p. 163. — West-Afrika, Kamerun

punctipennis Thoms. Arch. Ent. II, 1858, p. 127. — Gaboon

quadrituberculatus Faust, Ent. Nachr. XI, 1885, p. 75. — Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 282. — Quango-Fluß

rivalis Faust, Ann. Soc. Ent. Belg. XXXVIII, 1894, p. 514. — Gaboon

serietuberculatus Hustache, Ann. Soc. Ent. France CIV, 1935, p. 328. — Nyassaland

sextuberculatus Hustache, Rev. Zool. Afr. XI, 1923, p. 172. — Belg. Kongo

tuberosus Quedf. Berl. Ent. Zeitschr. XXXII, 1888, p. 283. — ? Angola

Zyrcosa Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. X, 1870, p. 438. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXI, 1897, p. 96.

brunnea Hustache, Sbornik ent. odd. Nar. Mus. Praze IX, 1931, p. 74. — Westafrika

Murrayi Pascoe, Journ. Linn. Soc. Lond. X, 1870, p. 439, t. 17, f. 7 a—c. — Old Calabar

2

8. Tribus: Nothognathini.

Otiorrhynchinae trib. *Nothognathides* Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 250.

Nothognathus Mshl.

Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 250.

Schoutedeni Mshl. l. c. p. 251, fig. 77. — N.-Indien

varius Mshl. l. c. 252. — „

2

9. Tribus: Ptochini.

Otiorrhynchinae trib. *Ptochini* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 8, 12; Fn. Germ. V, 1916, p. 14, 34.

Ptochini subtrib. *Mylacorrhynchina* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 12; Fn. Germ. V, 1916, p. 34, 35.

Ptochini subtrib. *Ptochina* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 12; Fn. Germ. V, 1916, p. 34.

Corigetini Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 164—167.

Anosimus Roelofs.

Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 173. — Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 97.

decoratus Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 174 ♂, t. 3, fig. 8—8a. — Sharp, Trans. Ent. Soc. London, 1896, p. 110. — Japan

♀ *pallidus* Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 174.

pallidus Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 174. — „

2 Fukien

Arrhines Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 465; l. c. VII, 1, 1843, p. 47. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 324. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 214. — Mshl. Fauna Brit. Ind. Rhynch. I, 1916, p. 279, 355.

callizonatus Fairm. Ann. Soc. Ent. France (5) III, 1873, p. 392. — Algerien

frenatus Fairm. l. c. (6) VIII, 1888, p. 369. — Tonkin

hirtus Faust, Ann. Soc. Ent. France LXI, 1892, p. 506; Ann. Mus. Civ. Genova 1894, p. 194. — Mshl. Fauna British India, Rhynchoph. I, 1916, p. 356, 357. — Burma, Cochinchina

languidus Gyllh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 466; l. c. VII, 1, 1843, p. 47. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 324. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. 1916, p. 355, 356. — Bengal, Kaschmir

brunneus Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVII, 1886, p. 142.

lanugineus Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 195. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 356, 359. — Burma: Bhamò

posthumus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curcul. VII, 1, 1843, p. 47. — Assam, Java

sirbenus Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 194, Note. — Cochinchina

tutus Faust, l. c. p. 194. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 356, 358. — Burma

vitticollis Mshl. l. c. p. 355, 357. — ,,

9

Ectmetaspidus Formánek.

Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 224.

daghestanicus Formánek, l. c. p. 224. — Kaukasus: Daghestan

1

Emperorrhinus Mshl.

Mshl. Bull. Ent. Research VI, 4, 1916, p. 365; Fauna of Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 278, 286.

defoliator Mshl. Bull. Ent. Research VI, 4, 1916, p. 366, fig. 1; Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 286. — Punschab, Sikkim, Assam

1

Eumyllocerus Sharp.

Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 97, 109. — Kôno, Journ. Fac. Agr. XXIV, 1930, p. 201, 209.

gratiosus Sharp, l. c. 109. — Japan

1

Holorrhynchus Mshl.

Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 359.

integrirostris Mshl. l. c. p. 360. — Assam

1

Hyperstylus Roelofs.

Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 171. — Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 97. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 279, 352. — Kôno, Journ. Fac. Agr. XXIV, 1930, p. 201, 209.

chloris Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 353. — Hustache, Res. Scient. Miss. Guy Babault Inde-Himalaya 1928, Curcul. p. 11. — Punschab

cinereus Mshl. l. c. p. 353. — Assam

hispidulus Mshl. l. c. p. 353, 354, fig. 107. — Madras

pallipes Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 172, t. 276. — Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 110. — Japan

plebejus Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 353, 354. — Madras

5

Mylacorhina Reitter.

Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 13; Fauna Germ. V, 1916, p. 35.

Reitteri Stierl. Mitteil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 36 *(Mylacus)*. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 211; l. c. LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 13 *(Mylacorhina)*. — Syrien: Haifa

villosus Reitter, l. c. XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 217 *(Mylacus)*; l. c. LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 13 *(Mylacorhina)*. — Kleinasien

2

Myllocerops Reitter.

Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 209, 253; l. c. LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 13; Fn. Germ. V, 1916, p. 35. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 44—56 (Revision).

cinereus Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXXIX, 1922, p. 77. — Vorderindien: Rawalpindi, Punjab

conirostris Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 21. — Buchara

filicornis Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 119. — Formánek, l. c. XXXV, 1916, p. 45, 48. — Ussuri

fortis Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 120. — Formánek, l. c. XXXV, 1916, p. 47, 58. — China: Canton, Kiangsi, Kiautschau

Holdhausi Formánek, l. c. p. 48, 56. — China: Yunnan

imbricatus Formánek, l. c. p. 46, 51. — China: Kiautschau

minutus Formánek, l. c. p. 46, 50. — ,,

obliquesignatus (Reitt.) Formánek, l. c. p. 45, 49. — Mandschurei

pennatus Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXXIX, 1922, p. 78. — Kashmir

plumbeus Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXXV, 1916, p. 47, 52. — China: Kiautschau

psittacinus Redtb. Reise Novara, Zool. II, 1868, Col. p. 150 *(Myllocerus)*. — Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 198 ♀ *(Corigetus)*. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 253 *(Myllocerops)*. — China: Canton, Kiangsi, Kiautschau. Tsingtau

sectator Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 121. — Formánek, l. c. XXXV, 1916, p. 46, 49. — Mandschurei

mitis Reitter, l. c. p. 121. — Formánek, l. c. p. 49.

setarius Reitter, l. c. p. 123. — Formánek, l. c. p. 47, 53. China: Kiangsi, Kiautschau

setosus Formánek, l. c. p. 46, 50. „

splendens Formánek, Wien. Ent. Zeit. XLII, 1925, p. 22. Kashmir

14

Neoptochus G. H. Horn.

G. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 64. — J. L. Leconte & G. H. Horn, Class. Col. North America ed. 2, in Smithson. Miscell. Coll. XXVI, 1883, p. 447. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 355; l. c. XLV, 1913, p. 422. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. North East Amer. 1916, p. 108, 112.

adspersus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 486 *(Ptochus)*; l. c. VII, 1, 1843, p. 106. — Seidlitz, Otiorrhynch. 1868, p. 41. — J. L. Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 437 *(Neoptochus)*. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 355; l. c. XLV, 1913, p. 422. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. North East America 1916, p. 108, 112. Florida, Georgia

tessellatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 486 *(Ptochus)*; l. c. VII, 1, 1843, p. 106.

Biologie: Beutenmüller, Journ. New York Ent. Soc. I, 1893, p. 38. — Blatchley & Leng, l. c. p. 112.

1

Phyllolytus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. France (6) IX, 1889, p. 52.

longicornis Fairm. l. c. p. 52. — Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894 (1895), p. 200, Note. China: Kiengsi

1

Ptochella Reitter.

Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906), p. 209, 240; l. c. LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 12; Fn. Germ. V, 1916, p. 34.

Gudini Reitter, Ent. Blätter XII, 1916, p. 120. Asien

latirostris Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 115 *(Ptochus)*; Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906), p. 209, 240 *(Ptochella)*. Turkestan

2

Stelorrhinus Mshl.

Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 279, 289.

carinirostris Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 184 *(Myllocerus)*; Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 290, fig. 92 *(Stelorrhinus)*. Assam, Burma

1

Myllocerus Schönh.

Schönh. Disp. meth. Curc. 1826, p. 178; Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, l. c. VII, 1, 1843, p. 3. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 323. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 105. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 213. — Pascoe, Ent. Monthly Mag. VI, 1869—70 (1869), p. 102. — Marseul, Abeille XI, 1873 (1874), p. 662, 743. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, 1879, p. 109—114 (Monographie). — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 49, Note. — Stierl. Mitteil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 407, 632; Best.-Tab. 9, 1883, p. 7, 230. — Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 97. — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 60—61; Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 209, 242; l. c. LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 13; Fn. Germ. V, 1916, p. 34. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 209. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 268. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 279, 291.

Macrocorynus Schönh. Disp. meth. Curc. 1826, p. 178; Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 433; l. c. VII, 1, 1843, p. 12. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 324. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 105, 120. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 213. — Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 97. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 279, 291.

aberrans	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XLI, 1917, p. 588.	N.-Australien
abnormalis	Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 108.	Japan
abyssinicus	Hustache, Ann. Soc. Linn. Lyon LXVIII, 1921—1922, p. 2.	Abessinien
acaciae	Stebbing, Forestry Ins. II, 1903, p. 184.	India
aceri	Kôno, Journ. Fac. Agric. Sapporo XXIV, 1930, p. 217.	Japan
acutidens	Lea, Trans. Roy. Soc. South Austral. XXXVIII, 1914, p. 269, 281.	Australien: Sherlock River
aeruginosus	Lea, Proc. Linn. Soc. New South Wales L, 1925, p. 424.	Australien
aidebus	Hustache, Bull. Soc. Ent. Egypte 1934, p. 140.	Sudan: Gebel Elba
alboscutellatus	Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 330.	Belg. Kongo: Park Albert, Ruanda
alternans	Voss, Wien. Ent. Zeit. XLIX, 1932, p. 57.	Yunnan
amblyrhinus	Lea, Trans. Roy. Soc. South Austral. XXIX, 1905, p. 212, 218; XXXVIII, 1914, p. 271.	N.W.-Australien
amoenus	Hartmann, Tropenpflanzer XVIII, 1915, p. 532.	Kamerun, Fernando Poo
anamalainus	Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 293, 385.	Madras
Andrewesi	Mshl. l. c. p. 301, 346, f. 105.	„
angolanus	Hustache, Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1923, p. 150.	Angola
angulatipes	Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 296, 316 ♂ ♀.	Ceylon
angustibasis	Lea, Trans. Roy. Soc. South Austral. XXXVIII, 1914, p. 272, 288.	N.W.-Australien

angustipennis	Lea, Trans. Roy. Soc. South Austral. XLI, 1917, p. 587.	N.-Australien
anoplus	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XL, 1915, p. 655; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 272.	Australien
aphthosus	Pascoe, Ent. Monthly Mag. VI, 1869, p. 103, 105; Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 216. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 269, 273.	Cap York
arabicus	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 7. — Marseul, Abeille XI, 1873 (1874), p. 744. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, 1879, p. 111. — Stierl. Mitteil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—84 (1883), p. 633; Best.-Tab. 9, 1883, p. 231.	Arabien
aristatus	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 430; l. c. VII, 1, 1843, p. 8.	Java
armipectus	Lea, Trans. Roy. Soc. South Austral. XXXVIII, 1914, p. 269, 292.	N. Territorium
armipes	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales L, 1925, p. 425.	Australien
Ashi	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XLI, 1917, p. 586.	S.-Australien
atjehensis	Ritsema, Tijdschr. v.Ent. XIX, 1876, p. 45.	Atchin (Nord-Sumatra)
auriceps	Fåhr. Öfv. Vet.-Akad. Förh. XXVIII, 1871, p. 17.	Kafferngebiet
aurifex	Pascoe, Ent. Monthly Mag. VI, 1869, p. 103. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 270, 274.	W.-Australien
abundans	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 211, 218; XXXVIII, 1914, p. 274.	N.W.-Australien
australis	Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 367. — Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 12.	Australien
baeodontomerus	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXVIII, 1914, p. 271; XXXIX, 1915, p. 653.	,,
basicollis	Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1911, p. 63; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 270.	Queensland
Bayeri	Hustache, Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 47.	Zentralafrika
benignus	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 60. — Reittter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 61; Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 245.	Transkaspien Aschabad, Buchara
var. *hinnulus*	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 60. — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 61; Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905, (1906) (Best.-Tab. 58), p. 245.	Turkomenien: Mursarabad, Merw
bidentatus	Pic, Bull Soc. Ent. Égypte XVIII, 1926, p. 230.	Ägypten
bifasciatipennis	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales L, 1925, p. 420.	Südaustralien
fasciatus	Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888 (1889), p. 1442 (non Faust 1887). — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 271.	

bilineater	Lea, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XV, 1915, p. 395; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 270.	Port Darwin
Blackburni	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 269, 276.	N.-Queensland
blandus	Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 197. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 299, 333, f. 101. — Hustache, Res. Scient. Miss. Guy Babault Inde-Himalaya 1928, p. 10.	Birma: Yenang-Gyaung, Mandalay; Indien: Madras, Bengal
boranus	Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 403.	Äthiopien: Uelmal (Gallaland)
Boviei	Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 295, 313.	Bengal
Bovilli	Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VIII, 1893 (1894), p. 267. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 269.	Australien
Bozasi	Hustache, Ann. Soc. Linn. Lyon LXVIII, 1921—1922, p. 7.	Somaliland
brachycollis	Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 195. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 297, 324.	Birma: Carin Cheba
brunneus	Matsumura, Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1911, p. 141.	Formosa
calosicollis	Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 328 ♂ ♀.	Belg. Kongo: Baudouinville
camerunensis	Hustache, Sborn. ent. odd. nár. Mus. Praze X, 1932, p. 36.	Kamerun
	erubescens Faust, in litt.	
canalicornis	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 145; XXXVIII, 1914, p. 269.	N.W.-Australien
canaliculatus	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 5.	Nubien
canoixoides	Kôno, Journ. Fac. Agric. Sapporo XXIV, 1930, p. 213.	Japan
Cardoni	Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 299, 339.	Madras, United Provinces
carinatus	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXVIII, 1904, p. 85; XXXVIII, 1914, p. 272. — Froggatt, W. Australian Ins. 1907, p. 182.	W.-Australien
caspius	Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1883, p. 632; Best.-Tab. 9, 1883, p. 230.	Scharud
castaneus	Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 168. — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 60; Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 242.	Japan, Amurgebiet
castor	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 148; XXXVIII, 1914, p. 270.	Queensland
catechu	Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XII, 1913, p. 185. — Stebbing, Forestry Ins. 1914, p. 403. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 294, 310.	Bengal, Bombay
cephalotes	Hustache, Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 48.	Centralafrika
	var. *perplexus* Hustache, l. c. p. 49.	

ceratorhinus	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 269, 281.	W.-Australien
chaunoderus	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales L, 1925, p. 421.	Australien
Chevalieri	Hustache, Ann. Soc. Linn. Lyon LXVII, 1921, p. 19.	Franz. Sudan: Volta
chlorizans	Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 33.	Peking
Chobauti	Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1897), p. 16 ♂ ♀. — Peyerimh. Mém. Soc. Hist. Nat. Afrique Nord II, 1931, p. 119.	Algier: Ain Sefra, Tifedest, West Tassili
Christophi	Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—84 (1883), p. 632; Best.-Tab. 9, 1883, p. 230.	Scharud
cinerascens	Pascoe, Ent. Monthly Mag. VI, 1869, p. 103, 104. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 270.	West-Australien
cinereidorsum	Desbr. Frelon XI, 1902—03 (1903), p. 115. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 243.	Kleinasien: Tokat, Adana
cinereus	Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXXIX, 1922, p. 77.	Indien: Punjab, Rawalpindi
circumcinctus	Hustache, Ann. Soc. Linn. Lyon LXVIII, 1921—22, p. 3.	Franz. Kongo: Fort Crampel
confinis	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 269, 270, 280.	S.-Australien
congoanus	Hustache, Ann. Soc. Linn. Lyon LXVII, 1921, p. 24.	Franz. Kongo: Ouahme
Conradti	Hustache, Sborn. Ent. Odd. Narod. Mus. Praze X, 1932, p. 33.	Kamerun
consocius	Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 295, 313.	Madras
conspersus	Mshl. l. c. p. 297, 321.	„
constricticollis	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 272, 287.	N. Territorium
convexifrons	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 356.	Indien: Paungdé
corycaeus	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 3.	Java
crinitus	Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 296, 322 ♂ ♀.	Madras
curtipennis	Pic, Échange XVII, 1903, p. 163.	Syrien: Cilic. Taurus
curvicornis	F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 488; Syst. El. II, 1801, p. 343 *(Curculio)*. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 520. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 301, 343.	Madras, Ceylon
	transmarinus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 429 *(Myllocerus)*; l. c. VII, 1, 1843, p. 9 ♀ (non Herbst 1797).	Ostindien
cuspidaticollis	Voss. Ent. Nachrichtenbl. VIII, 1934, p. 72.	China
cyrtops	Lea, Trans. Roy. Soc. South Austral. XXXVIII, 1914, p. 271, 290.	N.W.-Australien

damascenus Miller, Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 208, t. 4, f. 9. — Marseul, Abeille XI, 1873 (1874), p. 743. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, 1879, p. 111. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1883, p. 632; Best.-Tab. 9, 1883, p. 230. — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 61; Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 245.	Kaukasus, Taurus, Armenien, Syrien, Cypern
var. *robusticeps* Pic, Échange XVIII, 1903, p. 163. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 245.	Syrien, Cilic. Taurus
Darwini Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III, 1888 (1889), p. 1443. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 272.	Südaustralien
debilis Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 117 ♂ ♀.	Franz. Somaliland: Obock
decipiens Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales L, 1925, p. 424.	Australien
Decorsei Hustache, Ann. Soc. Linn. Lyon LXVII, 1920, p. 4.	Trop. Afrika: Oubangui
decretus Pascoe, Ent. Monthly Mag. VI, 1869, p. 103, 104.	Champion Bay
delicatulus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 6. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 293, 304.	Pondicherry Madras, Ceylon
mimicus Walk. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 263 *(Phyllobius)*. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 304.	
viridanus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 357, Note (non F.). — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 304.	
denigrator Hustache, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XVIII, 1936, p. 440.	Abessinien: Maraca
dentifer F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 488 *(Curculio)*; Syst. El. II, 1801, p. 543. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 519. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 430 *(Myllocerus)*; l. c. VII, 1843, p. 11. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 301, 347.	Tranquebar, Madras, Bengal, Ceylon
desquamatus Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 295, 315 ♀.	Bombay
discoideus Ol. Entom. V, 1807, p. 418, t. 26, f. 379 *(Curculio)*. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 433 *(Macrocorynus)* (excl. synon.); l. c. VII, 1, 1843, p. 12. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 324. — Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 106. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 296, 318, f. 97 *(Myllocerus)*.	Bengal, Japan, China
discolor Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 428; l. c. VII, 1, 1843, p. 9. — Hustache, Res. Scient. Mission Guy Babault Inde-Himalaya 1928, p. 10.	Bengal, Pundschab, United Provinces

var. *variegatus* Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 9. — Stebbing, Indian Forest Ins. 1914, p. 403. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 349. — Bombay, Madras, Ceylon
var. *canescens* Mshl. l. c. p. 350. — Ceylon
var. *uniformis* Mshl. l. c. p. 349. — United Provinces

Doddi Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 270, 282. — N.W.-Australien

Dohrni Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 262. — China: Shanghai

dorsatus F. Ent. Syst. Suppl. 1798, p. 173 *(Curculio)*; Syst. El. II, 1801, p. 543. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 11 *(Myllocerus)*. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 296, 320. — Pondicherry, Madras, Bombay
tesserula Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 356 ♀. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 320. — Indien: Belgaum

duplicatus Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 215. — Lea, Trans. Linn. Soc. S. Austral. Soc. XXIX, 1905, p. 210. — Somerset, Cap York

echinarius Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 298, 332 ♂ ♀. — Burma

echinatus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 215, 218; XXXVIII, 1914, p. 270. — N.-Queensland

elegans Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 214, 218; XXXVIII, 1914, p. 272. — N.W.-Australien

elegantulus Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 170. — Japan

elendeensis Hustache, Bull. Soc. Neuchât. Sc. Natur. LX, 1935, p. 182. — Angola

erinaceus Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 191 *(Cyphicerus)*. — Sumatra

evasus Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 293, 304 ♂ ♀. — Madras

exilis Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 217, 218; XXXVIII, 1914, p. 271, 274. — N.W.-Australien

eximius Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 432; l. c. VII, 1, 1843, p. 12. — Senegal

Fabricii Guér. Voy. Delessert II, 1843, p. 53. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 8. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 298, 328, f. 99. — Pondicherry, Madras, Bengal
exaptus Faust, Stett. Ent. Zeit. 1886, p. 143 (n. syn.) *[Corigetus]*. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 328.

fasciatus Faust, Wien. Ent. Zeit. VI, 1887, p. 66. — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 60; Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 242. — Suyfun

Fieldi Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 269, 275. — N. Territorium

foveiceps Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 146; XXXVIII, 1914, p. 272, 273. — N.W.-Australien

foveicollis Voss, Wien. Ent. Zeit. XLIX, 1932, p. 286. — Szetschwan

foveifrons Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXV, 1911, p. 64; XXXVIII, 1914, p. 270. — Queensland

fringilla (Dohrn) Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 356, Note. — Mshl. Faune Brit. India, Rhyncaph. 1916, p. 303. — Malakka, Ceylon

fugitivus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 270, 279. — N. Territorium

fuscomaculatus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XXXIX, 1915, p. 654; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 272. — Australien

ganalensis Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 404. — Abessinien: Cormoso (Gallaland)

ginfushanensis Voss, Ent. Nachr.-Bl. VII, 1933, p. 29. — China

glaucinus Pascoe, Ent. Monthly Mag. VI, 1869, p. 103, 104. — Champion Bay

gnopholotus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales L, 1925, p. 420. — Australien

gracilis Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 296, 323 ♂ ♀. — Madras

gratus Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 216. — Lea, Trans. Roy. Soc. Sc. Austral. XXXVIII, 1914, p. 272. — Somerset, Cap York

griseolus nom. nov. — N.W.-Australien

griseus Lea (nec Roel. 1873), Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 271, 284.

griseus Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 170. — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 60; Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 243. — Japan

guttulus Matsumura, Zeitschr. f. wiss. Ins.-Biol. VI, 1910, p. 137; Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1911, p. 141. — Formosa

Biologie: Matsumura, l. c. 1910, p. 137 (Schädling an Zuckerrohr auf Formosa).

Hardcastlei Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXV, 1911, p. 65; XXXVIII, 1914, p. 269. — Queensland

herbaceus Pascoe, Ent. Monthly Mag. VI, 1869, p. 103. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XLII, 1918, p. 263. — Champion Bay

herbivorus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales L, 1925, p. 423. — Australien

Hilleri Faust, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 222. — Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 107. — Japan

Hilli Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 271, 275, 291. — N. Territorium

hirtipennis Hustache, Ann. Soc. Linn. Lyon LXVII, 1921, p. 21. — Trop. Afrika: Oubangui

hispidus Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 295, 316. — Madras

hoplosternus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LIV, 1929, p. 525. — Australien

Hustachei nom. nov. — Centralafrika

amoenus Hustache, Rev. Zool. Afric. XII, 1924, p. 49 (non Hartmann 1915).

ignavus Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 294, 312. — Madras

illitus Reitter Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 122. — China: Kiautschou

impallescens Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 300, 342.	Madras
impeditus Hustache, Sbornik ent. odd. narod. Mus. Praze X, 1932, p. 38.	Kamerun
impressicollis Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 289, 331.	Assam
var. *ephippiatus* Mshl. l. c. p. 331.	Bengal
var. *Gestroi* Mshl. l. c. p. 332.	Birmanien: Teinzo
impressithorax Hustache, Rev. Zool. Afric. XII, 1924, p. 50.	Centralafrika
improvidus Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 300, 343.	Madras
incurvus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 147; XXXVIII, 1914, p. 269.	N.W.-Australien
ineptus Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 299, 334.	Madras
inermis Auriv. Arch. f. Zool. VIII, 1913, p. 5.	Brit. Ostafrika: Njoro, Gwasso Nyiro
inermipes Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LIV, 1929, p. 526.	Australien
intercoxalis Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 270, 278.	N. Territorium
interruptus Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 1.	Philippinen: Luzon
Jacobsoni Suvorov, Rev. Russe Ent. XV, 1915, p. 328.	Amur
Kaeshoveni Mshl. Treubia VIII, 1926, p. 343.	Java
kalukembensis Hustache, Bull. Soc. Neuchât. Sc. Natur. LX, 1935, p. 183.	Angola
kashmirensis Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 308. — Hustache, Rés. Scient. Miss. Guy Babault Inde-Himalaya 1928, Curcul. p. 11.	Kashmir, Indien
katanganus Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 327.	Kongo: Katanga
khayesicus Hustache, Sbornik ent. odd. narod. Mus. Praze X, 1932, p. 35.	Senegal
kuchibutonus Kôno, Journ. Fac. Agric. Sapporo XXIV, 1930, p. 219.	Japan
laetevirens Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 298, 330, f. 100.	Punschab
lateralis Chevr. Naturaliste II, 4, 1882, p. 93. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 298, 329.	Andamanen
latibasis Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 269, 275.	N.-Territorium
laticollis Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 210, 218; XXXVIII, 1914, p. 269.	Queensland
laticornis Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 121.	China: Kiautschou
Lefroyi Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 300, 340 ♂ ♀.	Bengal, United Provinces

lineatocollis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 23 *(Phyllobius)*. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 296, 317 *(Myllocerus)*. — Stebbing, Ind. Forest Ins. 1914, p. 400.	Indien: Nilgheeries, Bombay, Madras, Assam
var. *frontalis* Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 356, 363. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 317.	Indien: Kanara
var. *divisus* Mshl. l. c. p. 318.	Madras
longipilis Hustache, Ann. Soc. Linn. Lyon LVIII, 1921—1922, p. 1.	Franz. Kongo: Fort Crampel
longus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 270, 282.	N. Territorium
luctuosus Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLVII. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 297, 326, f. 98.	West-Bengal: Konbir
madurensis Mshl. l. c. p. 297, 325.	Madras
magnificus Hustache, Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 47.	Centralafrika
malignus Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXI, 1887, p. 34.	Korea
manipurensis Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 298, 333.	Assam
Marshalli nom. nov.	Assam
viridulus Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 294, 309 (nec Roelofs 1873).	
massaicus Hustache, Voy. Babault Afr. Orient. Angl. 1921, p. 31.	Brit. Ostafrika
Mastersi Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1911, p. 65; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 272, 274.	N.W.-Australien
melvillensis Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 271, 285.	N. Territorium
micros Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 333.	Belg. Kongo: Baudouinville
minusculus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Ausstral. XXXVIII, 1914, p. 272, 286.	Queensland
mirabilis Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1911, p. 66; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 269.	N.W.-Australien
modestus Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 216. — Lea, Trans. Roy. Soc. Austral. XXXVIII, 1914, p. 271, 273.	Somerset: Cap York;
niveus Lea, l. c. XXIX, 1905, p. 213, 218; XXXVIII, 1914, p. 273.	Queensland
morio Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 431; l. c. VII, 1, 1843, p. 12.	Galam
multimaculatus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXV, 1911, p. 64; XXXVIII, 1914, p. 271.	Queensland
mundus Voss, Wien. Ent. Zeit. XLIX, 1932, p. 288.	Hoa-Binh
naso Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 106.	Japan
nasutus Pascoe, Ent. Monthly Mag. VI, 1869, p. 103, 105. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 271.	West-Australien
necopinus Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 299, 335 ♂ ♀.	Punjab
nemorosus Hustache, Rev. Zool. Afr. XII, 1924, p. 52.	Centralafrika

niger Auriv. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris XVIII, 1912, p. 361; Voy. Rothschild en Ethiopie II, 1922, p. 739, I c 28, 3; l. c. p. 360. — S. Äthiopien

nigrimaculatus Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 169. — Japan

nigrosuturalis Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 294, 308. — Birma

nigrovarius Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 272, 289. — Queensland

nodicollis Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 300, 341 ♂ ♀. — Assam

Nodieri Hustache, Sborník ent. odd. narod. Mus. Praze X, 1932, p. 37. — Senegal

obliquefasciatus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XLI, 1917, p. 584. — W.-Australien

obliquicollis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LIV, 1929, p. 525. — Australien

obockianus Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 244. — ? Patria

obscurus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales L, 1925, p. 422. — Australien

Otsukai Kôno, Journ. Fac. Agric. Sapporo XXIV, 1930, p. 218. — Japan

paetus Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 293, 303 ♂ ♀. — Madras, C. Provinces

pallidicolor Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 331. — Belg. Kongo: Katanga

pauculus Voss, Ent. Nachrichtenbl. VIII, 1934, p. 71. — China

pauper Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 356. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 296, 322. — Indien: Belgaum, Bombay

Peneckei Voss, Kol. Rundsch. XXII, 1936, p. 37. — Ussuri

pennatus Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXXIX, 1922, p. 78. — Indien

perarmatus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales IVL, 1929, p. 527. — Australien

persimilis Hustache, Voy. Babault Afr. Or. Angl. 1921, p. 32. — Engl. Ostafrika

perversus Hustache, Ann. Soc. Linn. Lyon LXVII, 1921, p. 22. — Trop. Afrika: Chari Becken

phariseus Hustache, Ann. Soc. Linn. Lyon LXVIII, 1921—22, p. 7. — Franz.Kongo: Fort Crampel

pictus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales L, 1925, p. 425. — Australien

pilifer Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 356. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 294, 307 ♂ ♀. — Indien: Chamba

planoculis Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 294, 309, f. 95. — Madras

plebejus Hartmann, Deutsche Ent. Zeitschr. 1904, p. 387. — Ostafrika: Usambara, Kwai

pollux Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 149; XXXVIII, 1914, p. 270, 274. — Queensland

polylineatus Hustache, Ann. Soc. Linn. Lyon LXVIII, 1921—22, p. 5. — Franz. Kongo: Fort Crampel

postfasciatus Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 296, 319. — Birma

Posthi	Hust. Ann. Soc. Linn. Lyon LXVII, 1920, p. 20 *(Corigetus)*. — Peyerimh. Mém. Soc. Hist. Nat. Maroc. 2, 1931, p. 119 *(Myllocerus)*.	Tifedest
pracuae	Faust, Stett. Ent. Zeit. LII, 1891, p. 265 (? *Myllocerus*).	Sikkim
pretiosus	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 356. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 295, 314.	Indien: Belgaum, Kanara, Bombay, Madras
procerus	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 356 ♂ ♀. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 297, 323.	Indien: Belgaum Bombay
prosternalis	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 269, 277.	N.-Queensland
proteus	Hustache, Voy. Alluaud & Jeannel Afr. Or. Angl. XIX, 1929, p. 456.	Kilimandjaro
pruinosus	Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 220, t. 15, f. 20.	Borneo
pteroderes	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LIV, 1929, p. 524.	Australien
pubescens	Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXIV, 1894, p. 196. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 299, 338.	Birma: Rangoon, Tikekee, Bengal
pudicus	Pascoe, Ent. Monthly Mag. VI, 1869, p. 103, 104.	Nicol-Bay
pulchellus	Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXXIX, 1922, p. 76.	China
pumilus	Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 294, 311, f. 96.	Assam
quadricolor	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XLI, 1917, p. 583.	N.-Australien
rabdetanus	Hustache, Bull. Soc. Ent. Egypte 1934, p. 141.	Rotes Meer: Gebel Elba, Mersa Halaib
raddensis	Pic, Échange XX, 1904, p. 35. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58, 1906), p. 244.	Sibirien: Amurland, Raddefka
	var. *obscuricolor* Pic, l. c. p. 35. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58, 1906), p. 244.	
Reitteri	Kirsch, Verh. Nat. Ver. Brünn XVII, 1878 (1879), p. 26.	Kaukasus
retratiens	Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 263 *(? Myllocerus)*.	Ceylon
Rodhaini	Hustache, Rev. Zool. Afric. XII, 1924, p. 50.	Centralafrika
roscidus	Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 301, 304 ♀.	Madras
roseus	Hustache, Ann. Soc. Linn. Lyon LXVIII, 1921—22, p. 4.	Franz.Kongo: Fort Crampel
rostralis	Kôno, Journ. Fac. Agric. Sapporo XXIV, 1930, p. 214.	Formosa
ruandanus	Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 329.	Belg. Kongo: Ruanda
rubiginosus	Hustache, Ann. Soc. Linn. Lyon LXVIII, 1921—22, p. 5.	Elfenbeinküste

rufitarsis Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 63 *(Corigetus)*; Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 242 (subg. *Myllocerinus*). — Sumakow, Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 162.	Buchara
rugicollis Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 214, 218; XXXVIII, 1914, p. 271.	Queensland
rusticus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 356, 368 (non Pascoe 1869). — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 293, 306 ♂ ♀, f. 94. — Pascoe, Ent. Monthly Mag. VI, 1869, p. 103, 105. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXXIX, 1932, p. 78.	Indien: Punschab, Kashmir, Champion Bay
sabulosus Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 299, 336.	Bengal, United Provinces, Madras
Sakaguchii Kôno, Journ. Fac. Agric. Sapporo XXIV, 1930, p. 212.	Japan
saraenus Hustache, Ann. Soc. Linn. Lyon LXVII, 1921, p. 18.	Trop. Afrika: Fort Archambault (Sara)
Satunini Suvorov, Rev. Russe Ent. XV, 1915, p. 327.	Transcaspien
scapularis Roelofs, Notes Leyden Mus. II, 1880, p. 207.	Sumatra
Schimperi Hustache, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XVII, 1936, p. 441.	Abessinien: Mulu
scitulus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales L, 1925, p. 420.	Australien
sericeus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 356, 362. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 204, 309.	Indien: Dalhousie, Chamba, Punschab
setistriatus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 270, 283.	Queensland
setosus Kôno, Journ. Fac. Agric. Sapporo XXIV, 1930, p. 214.	Formosa
setulifer Desbr. Indian Mus. Notes IV, 1899, p. 111. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 295, 312.	Indien: United Provinces
Severini Mshl. l. c. p. 300, 342 ♂ ♀.	Bengal
simplex Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 356 ♂ ♀. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 295, 314.	Indien: Belgaum, Bombay, Madras
smaragdinus Mshl. l. c. p. 297, 323.	Sikkim
sordidus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXI, 1905, p. 213, 218; XXXVIII, 1914, p. 271.	W.-Australien
sparsutus Fairm. Rev. d'Ent. XI, 1892, p. 117.	Obock
speciosus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VIII, 1893 (1894), p. 268. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 270, 274.	West-Australien, Tasmanien
spectator Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 300, 340.	Assam
spurius Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 228.	Togo: Bismarckburg

squamicornis	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 272, 289.	S.-Australien
suavis	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 356 ♂ ♀. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 299, 335.	Indien: Kanara, Bombay
subapterus	Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1911, p. 64; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 272.	N.W.-Australien
subcostatus	Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 86, t. 2, f. 13. — Marseul, Abeille XI, 1873 (1874), p. 745. — Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, 1879, p. 111 *(Pachytychius)*. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1883, p. 633; Best.-Tab. 9, 1883, p. 231. — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 61.	Kaukasus
subcruciatus	Voss, Ent. Nachrichtenbl. VIII, 1934, p. 72.	China
subfasciatus	Guér. Voy. Delessert II, 1843, p. 54. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 10. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 301, 345.	Indien: Nilgherries, Ceylon, Madras, Bombay
	var. *mutabilis* Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 356. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 345.	Indien: Belgaum, Tauunghu, Bombay, Madras
	var. *spurcatus* Walker, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) III, 1859, p. 263.	Ceylon
	nubilosus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 356, 358. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 345.	Bombay, Belgaum
subglaber	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 356, 369. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 293, 305.	Indien: Madura, Taunghu, Madras, Birma
subglaucus	Mshl. l. c. p. 300, 339.	Madras
subrostralis	Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 270, 279.	N.W.-Australien
sulcicornis	Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales XL, 1915, p. 655; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 271.	Australien
superelegans	Hustache, Sbornik ent. odd. narod. Mus. Praze X, 1932, p. 35.	Welgeleger
suspiciens	Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 293, 306.	S.-Indien
suturalis	Lea, Trans. Linn. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 216, 218; Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 271.	Queensland
szetschuanus	Voss, Ent. Nachr.-Blatt VII, 1933, p. 28.	China
Tatei	Blackb. Horn's Exped. II, 1896, p. 284. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 272.	C.Australien
tavetanus	Hustache, Voy. Alluaud et Jeannel Afr. Or. XIX, 1929, p. 455.	Taveta, Kilimandjaro

Taylori Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 148; XXXVIII, 1914, p. 269, 275. — N.Queensland

tenuiclavis Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 297, 327 ♂ ♀. — Madras

var. *inferior* Mshl. l. c. p. 328. — Madras, Bengal

tessellatus Auriv. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris XVIII, 1912, p. 361; Voy. Rothschild en Éthiopie II, p. 738, I c 28, 3; l. c. p. 360. — S.Äthiopien

tibialis Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 271, 284. — Queensland

torridus Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VIII, 1893 (1894), p. 267. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 270. — Australien

tosanus Kôno, Journ. Fac. Agric. Sapporo XXIV, 1930, p. 218. — Japan

transmarinus Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1797, p. 213, t. 5, f. 1 *(Curculio)*. — Steven, Mus. Mosq. II, 1829, p. 96 *(Pachygaster)*. — Stebbing, Indian Forest Ins. 1914, p. 402. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 299, 337, f. 102. — Hustache, Res. Scient. Miss. Guy Babault Inde-Himalaya 1928, Curcul. p. 10. — Indien, Ceylon; Punschab, United Province Bengal,

musculus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 499; l. c. VII, 1, 1843, p. 11. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 337. — Bombay, Madras

molarius Faust, Stett. Ent. Zeit. LII, 1891, p. 268; l. c. LIV, 1893, p. 149. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 337. — Indien: Nagpore, Calcutta

bengalensis Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLVI, — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1891, p. 149. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 337. — Westbengal, Konbir, Tetara

trapezicollis Ballion, Bull. Soc. Ent. France (5) VIII, 1878, p. 357. — Kuldja

trepidus Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 215. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 250; XXXVIII, 1914, p. 272. — Somerset, Cap York

tricarinirostris Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales I, 1925, p. 422. — Australien

trifasciatus Voss, Wien. Ent. Zeit. XLIX, 1932, p. 288. — Hoa-Binh

trilineatus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 217, 218; XXXVIII, 1914, p. 271. — Queensland

trisinuatus Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LIV, 1929, p. 526. — Australien

tristis Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 269, 277. — Queensland

trivitticollis Lea, Proc. Linn. Soc. N. S. Wales LIV, 1929, p. 527. — Australien

tusicollis Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 298, 330. — Madras

undatus Mshl. l. c, p. 301, 350. — Ceylon

undecimpustulatus Faust, Stett. Ent. Zeit. LII, 1891, p. 266. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 301, 350. — Indien: Nagpore, Bengal, Bombay

var. *maculosus* Desbr. Indian Mus. Notes IV, 1899, p. 111 ♂ ♀. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 351. — Brehan, Bull. Agric. Research Inst. Pusa 181, 1929, p. 28. — Indien: Punyab, United Provinces, Bengal, Madras

var. *marmoratus* Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 361. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 350.

var. *pistor* Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 356. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 351. — Indien: Kanara

usitatus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXVIII, 1904, p. 86; XXXVIII, 1914, p. 272. — N.S.Wales

Vanderijsti Hustache, Rev. Zool. Afric. XII, 1924, p. 51. — Centralafrika

variabilis Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 168. — Japan

varius Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 272, 286. — W.-Australien

veterator Hustache, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XVIII, 1936, p. 439. — Abessinien: Maraca

villosipennis Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XLI, 1917, p. 585. — S.Australien

viridanus F. Syst. Ent. 1775, p. 155 *(Curculio)*; Spec. Ins. I, 1781, p. 198; Mant. Ins. I, 1787, p. 123; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 489; Syst. El. II, 1801, p. 544. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1776. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1797, p. 119, t. 79, f. 1. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 427 *(Myllocerus)*; l. c. VII, I, 1843, p. 4. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 293, 301, f. 93. — Stebbing, Indian Forest Ins. 1914, p. 398. — Madras, Ceylon

angustifrons Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 356.

viridiaureus Suvorov, Rev. Russe Ent. XV, 1915, p. 328. — Ussuri

viridimicans Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XLI, 1917, p. 583. — S.Australien

viridis Auriv. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris XVIII, 1912, p. 361; Voy. Rothschild en Éthiopie II, 1922, p. 739, I c 28, 5; p. 361. — S.Äthiopien

viridulus Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 171. — Japan

vonguensis Hustache, Sborník ent. odd. narod. Mus. Praze X, 1932, p. 34. — Belg. Kongo

Vossi nom. nov. — Yunnan

amoenus Voss, Wien. Ent. Zeit. XLIX, 1932, p. 287 (non Hartmann 1915).

yeboensis Hustache, Rev. Zool. Afr. XXV, 1934, p. 332. — Belg. Kongo: Uellé

zeylanicus Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 295, 315 ♂ ♀. Ceylon

zopherus Lea, Trans. Roy. Soc. N. S. Wales XLI, 1917, p. 586. S.Australien

302

Phaylomerinthus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 190. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 217.

Phailomerinthus Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 635 (err.).

Phaulomerinthus Gemm. et Harold, Cat. Col. VIII, 1871, p. 2302.

cinereus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 192. Kafferngebiet

1

Platyrhynchus Chevr.

Chevr. Naturaliste II, 4, 1882, p. 94 (non Thunb. 1815, non Cuvier 1826).

bicarinatus Chevr. l. c. p. 94. Andamanen

1

Ptochus Schönh.

Schönh. Disp. meth. Curc. 1826, p. 187; Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 481; l. c. VII, 1, 1843, p. 104. — Cast. Hist. Nat. Ins.Col. II, 1840, p. 326. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 155, 261. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. CXX, 732; l. c. ed. 3, I, 1847, p. CXXXII; l. c. II, 1874, p. 228. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 450, 496. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 188. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 3, 35; Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Gatt. p. 155, Arten p. 579 *(Ptochus* subg. *Ptochus)*; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 155, Arten p. 634. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 459. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 49. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 407, 603; Best.-Tab. 9, 1883, p. 7, 201. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 208, 227; l. c. LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 12; Fauna Germ. V, 1916, p. 34. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 252, 259.

Subgen. *Ptochus* Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 579; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 634. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 228.

adjunctus Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 261, 269. Birma

afflictus Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVII, 1886, p. 141 ♀. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 237 *(Ptochus* subgen. *Ptochus)*. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 261, 265. N.W.Indien: Kashgar Punschab

albanicus Apfelb. Wiss. Mitteil. Bosnien Herzeg. VIII, 1901, p. 467. Janina

antennalis Voss, Deutsche Ent. Zeitschr. 1922, p. 173. — Himalaya: Kurseong, Darjeeling

Antoniae Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 28 *(Myllocerus)*. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 234 *(Ptochus* subg. *Ptochus)*. — Transkaukasien: Araxes, Ordubad

apicatus Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 361, 368. — Sikkim

assamensis Mshl. l. c. p. 261, 269. — Assam

aurichalceus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 163 ♂ ♀. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 231 *(Ptochus* subg. *Ptochus)*. — Turkestan: Dolon, Otar, Verni

bengalensis Voss, Deutsche Ent. Zeitschr. 1922, p. 173. — Himalaya: Kurseong

brachyderoides Desbr. Ann. Soc. Ent. Belg. XXXV, 1891, Compt. rend. p. CCCLVII *(Myllocerus)*. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894 (1895), p. 359 *(Synolobus)*. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 262, 272 *(Ptochus)*. — Bengal

brevicollis Mshl. l. c. p. 261, 267. — „

carinaerostris Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 105. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 43. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 461, 467 *(carinirostris)*. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 239 *(Ptochus)*. — Mongolei

cephalotes Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXVIII, 1894, p. 142. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 229 *(Ptochus* subgen. *Ptochus)*. — Issyk-Kul

circumcinctus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 481; l. c. VII, 1, 1843, p. 104 *(Ptochus)*. — Falderm. Fn. Ent. Transcauc. II, in Nouv. Mém. Soc. Moscou IV, 1835, p. 201, t. 5, f. 3; l. c. III, l. c. VI, 1838, p. 191. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 326. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 414. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 42. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 461, 465. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1883, p. 605; Best.-Tab. 9, 1883, p. 203. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 233 ♂ *(Ptochus* subg. *Ptochus)*. — Araxes: Ordubad; Persien

concinnus Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 261, 266 ♂ ♀. — Madras

congoanus Hustache, Rev. Zool. Afric. XII, 1924, p. 44. — Belg. Kongo

cretensis Pic, Échange XX, 1904, p. 4. — Kreta

crinitus Redtenb. in Hügel, Reise Kaschmir IV/2, 1844, p. 547 *(Omias)*. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 274 *(? Ptochus)*. — Kashmir

Czikii Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 117. — Mongolei: Gobi, Kaschan

deportatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 485; l. c. VII, 1, 1843, p. 106. — Gebler, Bull. Soc. Nat. Moscou XXI, 1848, p. 359. — Kol. l. c. XXXI, 2, 1858, p. 415. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 38. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 460, 462. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XVI, 1881, p. 299; Oefv. Finska Vet.-Soc. Förh. XXXII, 1890, p. 68. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1883, p. 603; Best.-Tab. 9, 1883, p. 201. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 238 *(Ptochus* subg. *Ptochus)*.	Sibirien, Südwest-Sibirien, Krasnojarsk, Mongolei, Abak
variegatus Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XXIV, 1851, p. 65 *(Peritelus)*.	
var. *fasciolatus* Gebler in Ledebour, Reise Altai-Gebirge II, 1830, III, p. 169. — Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 106.	Songorei, Barnaul
eurynotus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 117.	Mongolei: Gobi, Alaschan
Hauseri Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVIII, 1887, p. 178. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 229 *(Ptochus* subg. *Ptochus)*.	Turkestan: Kyndyr-Tau, Alaigebirge, Tschimgan
horridulus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 354. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 260, 262, fig. 81.	Belgaum
imbellis Mshl. l. c. p. 260, 264.	Madras
imbricatus Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, 1, 1866, p. 430 *(Peritelus)*. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 275 *(? Ptochus)*.	Ceylon
impressicollis Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XVI, 1882, p. 300 ♂ ♀. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1883, p. 603; Best.-Tab. 9, 1883, p. 201. — Faust, Oefs. Finska Vet.-Soc. Förh. XXXII, 1890, p. 68. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 239 *(Ptochus)*.	Sibirien: Minussinsk, Krasnojarsk (nicht Lenkoran); Nord-Mongolei: Urga
indemnis Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 431. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 238 *(Ptochus* subg. *Ptochus)*.	China: Gan-ssu
Koltzei Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58) p. 239 (subg. *Ptochus*).	Thibet: Kuku-noor
Kozlovi Suvorov, Rev. Russe Ent. XV, 1915, p. 330.	Mongolei
lapsus Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 261, 267.	Madras
latifrons Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 1847, p. 504 *(Peritelus)*. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 44 *(? Ptochus)*. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 468 *(Ptochus)*. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1883, p. 605; Best.-Tab. 9, 1883, p. 203 *(Ptochus)*. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 239 *(Ptochus* subg. *Ptochus)*.	Ostkaukasus, Sibirien, Kirghisensteppe; Guberli

desertus Motsch. Bull. Ac. Sc. St. Pétersbourg I, 1860, p. 312. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 40. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1883, p. 604; Best.-Tab. 9, 1883, p. 202. — Sibirien

deserticola Marseul, Abeille XI, 1873, p. 460, 463. — ,,

? *fulvidipes* Marseul, l. c. p. 461, 468.

var. ? *fulvipes* Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XXIV, 1851, p. 62 *(Peritelus)*. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 44 *(Ptochus)*. — Stierl, Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1883, p. 605; Best.-Tab. 9, 1883, p. 203. — Bucharei

♂ *strigirostris* Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XXIV, 1851, p. 64 *(Peritelus)*. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 39. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XVI, 1881, p. 299—300. — Sibirien

strigirostris Marseul, Abeille XI, 1873, p. 460, 462. — Sibirien: Nertschinsk

? *subacutus* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1883, p. 604; Best.-Tab. 9, 1883, p. 202.

limbatus Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 262, 270 ♂. — Ceylon

longicollis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 482; l. c. VII, 1, 1843, p. 104. — Fald. Fn. Ent. Transcauc. II, in Nouv. Mém. Soc. Moscou V, 1837, p. 203; l. c. III, in l. c. VI, 1838, p. 191. — Kol. in Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 414. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 42 *(? Ptochus)*. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 461, 466 *(Ptochus)*. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1883, p. 605; Best.-Tab. 9, 1883, p. 203 *(Ptochus)*. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 228 *(Ptochus* subg. *Ptochus)*. — Persien

Marquardti Reitter, Ent. Blätter XII, 1916, p. 119. — Zentralasien: Chotan

Melichari Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXXIX, 1922, p. 75. — Kashmir

Mithras Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXII, 1915, p. 118. — Mandschurei: Lavian

napaeus Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 261, 270. — Madras

nigropilosus Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 230 *(Ptochus* subg. *Ptochus)*. — Turkestan: Issykkul, Katschkar, Dolon

nodulosus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 376 *(Cyphicerus)*. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 262, 273 *(Ptochus)*. — Indien: Thungu, Tharawaddy, Belgaum, Madura, Kanara, Madras, Bombay, Birma

noxius Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 353. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 236 (subg. *Ptochus*). — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 262, 271. — Himalaya: Dahlkousie, Simla, Punschab

obliquesignatus Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 232 *(Ptochus* subg. *Ptochus)*. — Tibet, Kuku-noor

obscuripes Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, I, 1866, p. 180. — Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 112. — Japan

ovulum Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 353. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 233, Note *(Ptochus* subg. *Ptochus)*. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 260, 265. — Indien: Madura Madras

percussus Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVII, 1886, p. 140 ♂ ♀. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 237 (subg. *Ptochus*). — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 262, 272. — Kashgar, Murree, Punschab

piliferus Motsch. Étud. Ent. II, 1854, p. 49. — Nord-China

pilifer Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 235, Note.

planoculis Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 262, 273. — Ceylon

porcellus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 482; l. c. VII, 1, 1843, p. 105. — Steven, Mus. Mosq. II, 1829, p. 94. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 414. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 189, Note. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 40. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 604; Best.-Tab. 9, 1883, p. 202 *(Ptochus)*. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 235 *(Ptochus* subg. *Ptochus)*. — Südrußland, Taurien, Kaukasus

lacteolus Motsch. Bull. Ac. Sc. St. Pétersbourg I, 1860, p. 313. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1883, p. 604; Best.-Tab. 9, 1883, p. 202. — Wolgagebiet

? *rufipes* Gebler in Ledebour, Reise Altai-Gebirge II, 1830, p. 169; Bull. Soc. Nat. Moscou XXI, 1848, p. 360. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 487; l. c. VII, 1, 1843, p. 106. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 416. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 42. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 461, 467. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 605; Best.-Tab. 9, 1883, p. 203. — Kaukasus, Sibirien: Barnaul

sus Marseul, Abeille XI, 1873, p. 460, 463.

var. *perdix* Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 484; l. c. VII, 1, 1843, p. 105. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 415. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 235. — Taurien, Kaukasus, Sibirien

Potanini Reitter, l. c. p. 232 *(Ptochus* subg. *Ptochus)*. Nordchina

pusio Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 261, 269. Madras

pyriformis Mshl. l. c. p. 260, 263. Ceylon

setosus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 484; l. c. VII, 1, 1843, p. 105 *(Ptochus)*. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 415. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 41. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 461, 464. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, 1883, p. 604; Best.-Tab. 9, 1883, p. 202. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Moscou XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 234 *(Ptochus* subg. *Ptochus)*. Kaukasus, Russisch Armenien, Araxes

squamosus Reitter, l. c. p. 235 *(Ptochus* subg. *Ptochus)*. Araxestal: Ordubad

strabo Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 260, 263 ♂ ♀. Madras

subcretaceus Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 156 ♂ ♀. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 230 *(Ptochus* subg. *Ptochus)*. Turkestan: Karschau Ak-ssai

Suvorovi Suvorov, Rev. Russe Ent. XV, 1915, p. 330. Alaschan

tigrinus Redtenb. in Hügel, Reise Kaschmir IV, 2, 1844, p. 546. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 189, Note. Kaschmir

vagepictus Desbr. Frelon I, 1892, p. 123. — Pic, Échange XXII, 1907, p. 111. Griechenland, Peloponnes

vittatus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XVII, 1898, p. 20; Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 236 *(Ptochus* subg. *Ptochus)*. Araxestal (Ordubad)

58

Synomus Pascoe.

Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 217. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 292.

aeruginosus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 221. Queensland

cephalotes Pascoe, Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 217. Cap York

inconspicuus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 293. Australien

ovipennis Lea, l. c. p. 293. „

setipennis Lea, Ent. Mitteil. XVI, 1927, p. 129. Queensland

5

Telenica Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XI, 1872, p. 444. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VIII, 1893 (1894), p. 259.

nebulosa Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XI, 1872, p. 445. W.-Australien

subfasciata Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VIII, 1893 (1894), p. 261. W.-Australien
sublimbata Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XI, 1872, p. 445. „
3

Tigones Broun.

Broun, Man. New Zeal. Col. IV, 1886, p. 855.

Asaphia Broun, Man. New Zeal. Col. II, 1881, p. 700; l. c. V, 1893, p. 1182, Obs.

Protophormus Sharp, Trans. Roy. Dubl. Soc. (2) III, 1886, p. 416. — Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1178; l. c. p. 1185.

albopictus Broun, Trans. New Zeal. Inst. XLV, 1913, p. 100 *(Tigones)*. Neuseeland
angustulus Broun, Man. New Zeal. Col. II, 1881, p. 701 *(Asaphia)*; l. c. V, 1893, p. 1182, Obs. „
antennalis Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1182 *(Tigones)*. „
assimilis Broun, Bull. New Zeal. Inst. I, 1910, pars 5, p. 401 *(Tigones)*. „
aulicus Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1180 *(Tigones)*. „
binodulus Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 418. — Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1179. „
caudatus Broun, Man. New Zeal. Col. IV, 1886, p. 855 *(Tigones)*. „
Cavelli Broun, Man. New Zeal. Col. VI, 1893, p. 1361 ♂ ♀ *(Tigones)*. „
certus Broun, Man. New Zeal. Col. IV, 1886, p. 856 *(Tigones)*. „
cervinus Broun, Man. New Zeal. Col. IV, 1886, p. 857 *(Tigones)*. „
citimus Broun, Bull. New Zeal. Inst. I, pars 5, 1917, p. 401 *(Tigones)*. „
crudus Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1182 ♂ ♀ *(Tigones)*. „
dispar Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XIV, 1904, p. 107 *(Tigones)*. „
diversus Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1183 *(Tigones)*. „
flectiscapus Broun, Bull. New Zeal. Inst. I, 1914, 202 *(Tigones)*. „
gracilis Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 417, t. 13, f. 9. — Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1179. „
griseus Broun, Man. New Zeal. Col. IV, 1886, p. 856 *(Tigones)*. „
humeralis Broun, Bull. New Zeal. Inst. I, 1914, p. 202 *(Tigones)*. „
longiceps Broun, Bull. New Zeal. Inst. I, pars 5, 1917, p. 405 *(Tigones)*. „
murinus Broun, l. c. p. 403 *(Tigones)*. „
nasalis Broun, l. c. p. 401 *(Tigones)*. „
obscurus Broun, Man. New Zeal. Col. VII 1893, p. 1361 ♂ *(Tigones)*. „

osculans Broun, Man. New Zeal. Col. IV, 1886, p. 856 *(Tigones)*. Neuseeland
Philpotti Broun, Bull. New Zeal. Inst. 1910, p. 57 *(Tigones)*. „
planum Broun, Man. New Zeal. Col. II, 1881, p. 700 *(Asaphia)*. „
robustus Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 418. — Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1180. „
rufulus Broun, l. c. p. 1183 *(Tigones)*. „
rugosus Broun, Trans. New Zeal. Inst. XLV, 1913, p. 99 *(Tigones)*. „
scutellaris Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1181 *(Tigones)*. „
setosus Broun, Bull. New Zeal. Inst. I, pars 5, 1917, p. 404 *(Tigones)*. „
thoracicus Broun, l. c. p. 402 *(Tigones)*. „
variatus Broun, l. c. p. 403 *(Tigones)*. „
variegatus Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1181 *(Tigones)*. „
33

10. Tribus: Holcorrhinini.

Holcorhinides Desbr. Frelon VI, 1898, p. 1—54; l. c. XIV, 1906, p. 1—4.
Curculioninae gr. *Holcorrhina* Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 4, 1904—06 (1930), p. 277.
Otiorrhynchinae trib. *Holcorrhinini* Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 9, 14; Fauna Germ. V, 1916, p. 14.
Otiorrhynchinae trib. *Cyclopterini* Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 9, 13.
Otiorrhynchinae trib. *Holcorhinini* Winkler, Cat. Col. Reg. Palaearct. pars 12, 1932, p. 1444.
Otiorrhynchinae trib. *Holcorrhinini* Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 14, 68.
Otiorrhynchinae trib. *Cyclopterini* Porta, l. c. p. 14, 67.

Altonomus Desbroch.

Desbroch. Frelon XV, 1907—08 (1907), p. 95.
Demaisoni Desbr. l. c. p. 95. Kleinasien
1

Argoptochus Weise.

Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 255. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—83 (1883), p. 49. — Seidlitz, Fauna Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 579 *(Ptochus* subg. *Argoptochus)*; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 634. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Bestimm.-Tab. 58), p. 208, 222 *(Argoptochus)*; l. c. LI, 1912 (1913) (Bestimm.-Tab. 68), p. 13; Fauna Germ. V, 1916, p. 35. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 908, 931. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1035, 1047. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 67.

Ptochus Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 155, 261 (non Schönh.). — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 450, 496.

Subgen. **Argoptochus** Reitter.

Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 222.

biloveolatus Stierl. Mitteil. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1893—97 (1897), p. 480 *(Mylacus)*; l. c. X, 1898—1903 (1899), p. 199. — Heyden, Ent. Nachr. XXV, 1899, p. 176. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Bestimm.-Tab. 58), p. 225 (subg. *Argoptochus*). — Siebenbürgen

Strobli Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 278.

bisignatus Germ. Spec. Ins. Nov. I, 1824, p. 410 *(Peritelus)*. — Steven, Mus. Mosq. II, 1829, p. 94 *(Ptochus)*. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 488; l. c. VII, 1, 1843, p. 106. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 261 *(Ptochus)*. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Curc. 1854, p. 32, t. 13, f. 62. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 733; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 228. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 416. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 496 *(Ptochus)*. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 44; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 635 *(Ptochus* subg. *Argoptochus)*. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 461, 470 *(Ptochus)*. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 606; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 204. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLII, 1905 (1906) (Bestimm.-Tab. 58), p. 223 (subg. *Argoptochus)*; Fauna Germ. V, 1916, p. 36, t. 154, f. 13 *(Argoptochus)*. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 931, f. 129, 130 B. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 11 ♂ ♀. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1047, t. 37, f. 9. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 874. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 67. — Deutschland, Österreich, Ungarn, Nord-Italien (Toskanisch. Apennin), Dalmatien, Bosnien, Herzegovina, Krim

grandicornis Steven, Mus. Mosq. II, 1829, p. 94 *(Ptochus)* (s. descr.).

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 51; l. c. XVIII, 1886, p. 290.

Championi Reitter, Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 214 *(Foucartia)*; Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Bestimm.-Tab. 58), p. 226 (subg. *Argoptochus)*. — Korfu

cretensis Pic, Échange XIX, 1904. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 223 (subg. *Argoptochus)*. — Kreta

Emgei Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1887), p. 396 *(Ptochus)*. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Bestimm.-Tab. 58), p. 224 (subg. *Argoptochus*). — Thessalien

graecus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1887), p. 395 *(Ptochus)*. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Bestimm.-Tab. 58), p. 223 (subg. *Argoptochus*). — Griechenland

innotatus Pic, Échange XXIII, 1907, p. 106. — Morea

interruptus Desbr. Frelon I, 1892, p. 122 *(Ptochus)*. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Bestimm.-Tab. 58), p. 226 (subg. *Argoptochus*). — Griechenland, Kleinasien

Leonhardi Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 10 ♂ ♀. — Mazedonien

longisetis Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LVIII, 1926, p. 109. — Albanien

megacephalus Solari, l. c. p. 107. — „

minimus Form. Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 261 ♂ ♀, f. 1 *(Ptochus)*. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Bestimm.-Tab. 58), p. 225 (subg. *Argoptochus*). — Dalmatien

quadrisignatus Bach, Stett. Ent. Zeit. XVII, 1856, p. 242 *(Ptochus)*. — Redtb. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. 733; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 228. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 45 *(Ptochus)*; Fn. Transsylv. 1886—91 (1891), Arten p. 635 *(Ptochus* subg. *Argoptochus)*. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 461, 470 *(Ptochus)*. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 606 *(Ptochus)*; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 204. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Bestimm.-Tab. 58), p. 223 (subg. *Argoptochus)*; Fauna Germ. V, 1916, p. 36 *(Argoptochus)*. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 8 ♂ ♀. — Kuhnt, Ill. Bestimm.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 931, f. 130 A. — Thüringen, Schlesien

bisignatus Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 261 *(Ptochus)* (non Germar 1824). — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 496.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 51; l. c. XVIII, 1886, p. 290.

Ravasinii Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LVIII, 1926, p. 108. — Albanien

Schatzmayri Solari, l. c. 1926, p. 108. — „

Schwarzi Reitter, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 71 *(Foucartia)*; l. c. X, 1891, p. 216; Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Bestimm.-Tab. 58), p. 224 *(Argoptochus)*. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 874. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 68. — Mittel- und Süditalien, Korfu, Türkei

albanicus Apfelb. Glasnik Muzeja Bosn. XIII, 1901, p. 435 *(Ptochus)*; Wiss. Mitteil. Bosnien VIII, 1901, p. 467.

ophthalmicus K. Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 83 ♂ ♀ *(Ptochus* subg. *Argoptochus)*. — Fiori, Riv. Col. Ital. II, 1904, p. 225 ♂ ♀. — Italien: Apulien, Varano; Mte. Conero bei Ancona

subsignatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 489; l. c. VII, 1, 1843, p. 106 *(Ptochus)*. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 416, 510. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 46 *(Ptochus)*; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 635 *(Ptochus* subg. *Argoptochus)*. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 461, 471 *(Ptochus)*. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 606 *(Ptochus)*; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 204. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Bestimm.-Tab. 58), p. 225 (subg. *Argoptochus)*. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 9 ♂ ♀. — Krim, Ungarn, Krain, Bulgarien

unicolor Penecke, Kol. Rundschau XXI, 1935, p. 106. — Mazedonien: Vardar

vindobonensis Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 223. — Wien

virens Faust, Oefv. Finska Vet.-Soc. Förh. XXXII, 1890, p. 68. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Bestimm.-Tab. 58), p. 227 (subg. *Argoptochus)*. — Südwest-Sibirien

viridilimbatus Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 284 *(Ptochus)*; Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 789. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 226 (subg. *Argoptochus*). — Krain, Ungarn, Serbien

Subgen. **Henschia** Reitter.

Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Bestimm.-Tab. 58), p. 227.

periteloides Fuss, Verh. Siebenbürg. Ver. Nat. 1861, p. 171, t. 3, f. 3 A *(Ptochus)*. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 46; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 635 *(Ptochus* subg. *Argoptochus)*. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 472 *(Ptochus)*. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 606; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 204. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 136; Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Bestimm.-Tab. 58), p. 227 (subg. *Henschia*). — Siebenbürgen, Slavonien, Serbien

Henschi Reitter, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 200 *(Foucartia)*; l. c. XXI, 1902, p. 136. — Slavonien, Ruma

serbicus Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 297 *(Foucartia)*; Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 801. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 40 ♂ ♀. — Bosnien: Ak. Palanka

Reitteri Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 137. — Kaukasus: Araxestal

Atoporhynchus Desbr.

Desbr. Frelon IV, 1894—95 (1895), p. 160; l. c. VI, 1897—98 (1898), p. 49, 54.

Apotorhynchus Sharp, Zool. Record. Ins. XXXII, 1895 (1896), Ins. p. 186 (err.).

periteloides Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 20; l. c. VI, 1897—98 (1898), p. 50, 54 ♂ ♀. — Algerien: Batna

1

Caenopsimorphus Desbr.

Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 175, Note; l. c. VI, 1897—98 (1898), p. 6, 36, 54.

Chobauti Hustache, Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc XII, 1932, p. 46. — Algerien: Ghardaia

Desbrochersi Pic, Échange XX, 1904, p. 91. — Algerien

perculus Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 175; l. c. VI, 1897—98 (1898), p. 37, 54. — Tunis

tenietensis Pic, Échange XX, 1904, p. 91. — Algerien

Vaulogeri Desbr. Frelon I, 1892, p. 119 *(Cyclomaurus)*; l. c V, 1895—96 (1896), p 175 *(Coenopsimorphus)*; l. c. VI, 1897—98 (1898), p. 54. — Tunis

5

Chiloneonasus Reitter.

Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Bestimm.-Tab. 68), p. 13.

Formaneki Reitter, l. c. p. 13, Note. — Marokko

1

Cyclobarus Faust.

Faust, Berl. Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 97. — Desbroch. Frelon VI, 1897—98 (1898), p. 6, 13, 53. — Reittter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Bestimm.-Tab. 68), p. 15.

alternevittatus Desbr. Frelon XIV, 1905—06 (1905), p. 6 ♀. — Algerien: Constantine

Antoinei Hustache, Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc XII, 1932, p. 45. — Marokko

comatus Peyerh. Abeille XXXI, 1907, p. 41. — N.-Arabien: Mazerah

costulatus Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1886, p. 64 *(Holcorhinus)*. — Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1898), p. 14, 53 *(? Cyclobarus)*. — Algerien: Oran

cyrtus Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 64 *(Holcorhinus)*. — Faust, Berl. Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 97 *(Cyclobarus)*. — Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 26; l. c. VI, 1897—98 (1898), p. 13, 14 ♂ ♀, p. 53. — Algerien

foveicollis Desbr. Frelon XII, 1903—04 (1904), p. 59 *(Cyclobarus)*. — Algerien: Bou-Berak

hipponensis Pic, Échange XVII, 1902, p. 33. — Algerien

major Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1898), p. 14, 17 ♂ ♀, p. 53 *(Cyclobarus)*. — Algerien: Tlemcen

makalicus Escalera, Trab. Mus. Madrid XI, 1914, p. 423. — Peyerimh. Bull. Soc. Ent. France 1922, p. 64. — Marokko

metallescens Lucas, Explor. Sc. Algérie II, Col. 1849, p. 434, t. 36, f. 10 *(Otiorrhynchus)*. Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1886, p. 63 *(Cyclomaurus)*. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 10. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 16, 17. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 410; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 8. — Faust, Berl. Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 97 *(Cyclobarus)*. — Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 26; l. c. VI, 1897—98 (1898), p. 14, 16 ♂ ♀, p. 53 *(Cyclobarus)*. — Algerien: Costantine, Teniet-el-Had

♂ *armipes* Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 10, 11 *(Cyclomaurus)*. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 16, 17 ♂ ♀. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 8 ♂ ♀. — Algerien: Oran

var. *longipilis* Pic, Échange XXII, 1906, p. 41. — Algerien

oribates Peyerh. Bull. Soc. Ent. France 1922, p. 64 ♂ ♀. — Marokko

persimilis Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 174; l. c. VI, 1897—98 (1898), p. 14, 15 ♂ ♀, p. 53. — Algerien: Oran, Oued Riou

puncticollis Hustache, Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc XII, 1932, p. 44 ♂ ♀. — Marokko: Tamanar

Rotroui Peyerh. Ann. Soc. Ent. France XCIV, 1925, p. 18. — Algerien: Oran (Sidi-bel-Abbès)

turgidus Peyerh. Abeille XXXI, 1907, p. 41. — Innes Bey, Bull. Soc. Ent. Égypte II, 1909, p. 25. — Sinai

15

Cyclomaurus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. France (3) VIII, 1860; Bull. p. XXXI. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 621. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 3, 9. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 5, 15. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 406, 410; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 4, 8. — Faust, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 235; l. c. XXX, 1886, p. 97. — Desbroch. Frelon VI, 1897—98 (1898), p. 6, 42, 54.

Demaisoni Desbr. Frelon XIV, 1905—06 (1905), p. 7. — Kleinasien: Adana

insidiosus Faust, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 234 *(Cyrtolepis)*. — Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1898), p. 42, 43 ♂ ♀, p. 54 *(Cyclomaurus)*. — Algerien: Daya

medianus Pic in Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1898), p. 42, 46 ♂, p. 54. — Algerien

subconicirostris Pic, Miscell. Ent. IV, 1896, p. 114. — Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1898), p. 43, 45 ♂ ♀, p. 54. Algerien: Tiaret
conicirostris Sharp, Zool. Record XXXIII, 1896 (1897), Ins. p. 158 (err.).
subfuscus Pic, Échange XX, 1904, p. 91. Algerien
syriacus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93 (1888), p. 54. Syrien: Beyruth
tessellatus Hustache, Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc XII, 1932, p. 43. Marokko
velutinus Fairm. Ann. Soc. Ent. France 1860, Bull. p. XXXI; l. c. 1866, p. 65. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 10. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 410; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 8 ♂ ♀. — Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1898), p. 43, 44 ♂ ♀, p. 54. Algerien: Oran
Fairmairei Marseul, Abeille X, 1872, p. 16.
8

Cycloptochus Reitter.

Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Bestimm.-Tab. 68), p. 14.

ptochoides Pic, Échange XXII, 1906, p. 66 *(Cyclomias)*. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Bestimm.-Tab. 68), p. 14 *(Cycloptochus)*; Fauna Germ. V, 1916, p. 35, Note *(Cyclopterus)*. Kleinasien: Adana
1

Cyrtolepus Desbr.

Desbr. Opusc. Ent. I, 1874—75, p. 11; Frelon VI, 1897—98 (1898), p. 6, 18, 53; l. c. XV, 1907, p. 93. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 407; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 7. — Faust, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 235. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 15.

Subg. Aigelius Desbr.

Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1898), p. 6, 20, 53. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Bestimm.-Tab. 68), p. 15.

boghariensis Desbr. Frelon I, 1892, p. 118 *(Cyclomaurus)*; l. c. V, 1895—96 (1896), p. 21; l. c. VI, 1897—98 (1898), p. 19, 22, 53 *(Cyrtolepus* subg. *Aigelius)*. Algerien: Boghari, Bou-Saada

Bonnairei Faust, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 233 ♂ ♀ *(Cyclomaurus)*; l. c. XXX, 1886, p. 97 *(Cyclobarus)*. — Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1898), p. 19, 24, 53 ♀ *(Cyrtolepus* subg. *Aigelius)*. Algerien: Tlemcen

Diecki Desbr. Frelon XIV, 1905—06 (1905), p. 5 ♀. Algerien: Biskra

graecus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. X, 1898—1903 (1899), p. 200 *(Cyclomaurus)*. Algerien

gibbosus Desbr. Frelon XV, 1906—08 (1907), p. 93 ♀. Griechenland
Moraguesi Desbr. Frelon I, 1892, p. 117 *(Cyclomaurus)*; l. c. VI, 1897—98, 1898, p. 19, 20 ♂ ♀, p. 53 (subg. *Aigelius*). Balearen, Algerien: Boghari, Kabylie

metallescens Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 10 *(Cyclomaurus)*. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 16, 17.
var. *kabylianus* Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 22 *(Cyclomaurus)*; l. c. VI, 1897—98 (1898), p. 53 *(Cyrtolepis)*.

oblitus Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 173 ♂ ♀; l. c. VI, 1897—98 (1898), p. 19, 21 ♂ ♀, p. 53 (subg. *Aigelius*). Algerien: Mellala
obscuricolor Pic, Échange XXII, 1906, p. 41. Algerien
Peyerimhoffi Pic, Échange XXXI, 1915, p. 26. „
subnitidus Pic, l. c. p. 25. „
villosus Desbr. Frelon XV, 1906—08 (1907), p. 94. Kleinasien

Subg. **Cyrtolepus** Desbr.

Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1898), p. 25, 53. — Bedel, Ann. Soc. Ent. France (5) VIII, 1878, Bull. p. CLXX.

angustirostris Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 24 ♂ ♀ *(Cyrtolepus)*; l. c. VI, 1897—98 (1898), p. 27 ♂ ♀, p. 53 (subg. *Cyrtolepus*). Algerien: Constantine Medjez-Amar
biskrensis Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 23 *(Cyrtolepus)*; l. c. VI, 1897—98 (1898), p. 19 ♂, p. 35 ♂, p. 53 *(Cyrtolepus)*. Algerien: Biskra
dilatipes (Desbr.) Pic, Miscell. Ent. IV, 1896, p. 43 *(Cirtolepus)*. — Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1898), p. 20, 28 ♀, p. 53 (subg. *Cyrtolepus*). Algerien: Aïn-Sefra
ericius Peyerimh. Bull. Soc. Ent. France 1920, p. 43. Alg. Sahara: El Goléa
Gaheryi Hustache, Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc XII, 1932, p. 42 *(Cyrtolepis)*. Marokko Moyen Atlas
Lethierryi Desbr. Opusc. Ent. I, 1874—75, p. 11; Frelon VI, 1897—98 (1898), p. 20, 32 ♂ ♀, p. 53 (subg. *Cyrtolepus*). — Bedel, Ann. Soc. Ent. France (5) VIII, 1878, Bull. p. CLXX. — Faust, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 235. Algerien: Algier, Bône, Costantine
maculicornis Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1898), p. 34 *(Cyclomaurus)*. Algerien: Tiaret
monilicornis Desbr. l. c. p. 19, 26 ♂ (false ♀), p. 52 ♂ ♀ (subg. *Cyrtolepus*). Algerien
parvicollis Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 7, 8 *(Holcorhinus)*. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 206. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 409; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 7. — Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1898), p. 29, 53 (subg. *Cyrtolepus*). Sizilien, Algerien

parvulicollis Marseul, Abeille X, 1872, p. 10, 13.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 47; l. c. XVIII, 1886, p. 288.

piceus Allard, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 324 *(Cyclomaurus)*. — Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 26; l. c. VI, 1897—98 (1898), p. 20, 31 ♂ ♀, p. 54 (subg. *Cyrtolepus)*. Algerien

punctatus Allard, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 325 *(Cyclomaurus)*. — Faust, Berl. Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 98. Constantine

Seidlitzi Tourn. Ann. Soc. Ent. France 1874, Bull. p. CCXI *(Holcorhinus)*. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 409; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 7 ♂ ♀. — Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1898), p. 19, 34 ♂ ♀, p. 53 (subg. *Cyrtolepus)*. Algerien: Biskra

assimilis Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 25 *(Cyrtolepus)*. Algerien: Oran

susicus Escalera, Trab. Mus. Madrid XI, 1914, p. 424 *(Cyclobarus)*. — Peyerimh. Bull. Soc. Ent. France 1922, p. 65 *(Cyrtolepus)*. Marokko

tenuitarsis Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 22; l. c. VI, 1897—98 (1898), p. 19, 21 ♂ ♀, p. 53 (subg. *Cyrtolepus)*. Algerien: Mecheria

parvicollis var. Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 8.

tibialis Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1898), p. 20, 33 ♀ *(Cyclomaurus)*, p. 53 (subg. *Cyrtolepus)*. Algerien: Oran

25

Eptacus Desbr.

Desbr. Frelon XVI, 1908, p. 65 *(Otiorrh.* subgen.). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Bestimm.-Tab. 68), p. 14 (eigene Gattung); Fauna Germ. V, 1916, p. 14, Note 16. — Emden, Ent. Blätt. XXIV, 1928, p. 120 (Revision).

arachniformis Reitter, Bull. Soc. Ent. Égypte I, 1908, p. 52 *(Otiorrh.* subgen. *Tournieria)*. — Emden, Ent. Blätter XXIV, 1928, p. 124. Ägypten: Cairo

arachnoides Stierl. Revis. Eur. Otiorrh. 1861, p. 108 *(Otiorrhynchus)*. — Reitter, Bull. Soc. Ent. Égypte I, 1908, p. 53. — Emden, Ent. Blätt. XXIV, 1928, p. 124 *(Eptacus)*. Syrien, Ägypten

ventralis Marseul, Abeille V, 1868, p. 194; l. c. X, 1872, p. 187 *(Otiorrh.)*. — Crotch, Synops. Col. Eur. 1871, p. 39. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1872, p. 355; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 552; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 150. — Reitter, Bull. Soc. Ent. Égypte I, 1908, p. 53 *(Otiorr.* subgen. *Tournieria)*; Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 44 *(Eptacus)*.

clavicrus Marseul, Nouv. et Faits (2) 1878, p. 76. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, Trapezunt

1883 (1884), p. 699 (subg. *Tournieria*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 44 (*Eptacus*).

hostilius Reitter, Bull. Soc. Ent. Égypte I, 1908, p. 53. — Emden, Ent. Blätt. XXIV, 1928, p. 124. — Kurdistan: Mardin

kurdistanus (Chevr.) Stierl. Revis. Eur. Otiorrh. 1861, p. 108; Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1873, p. 270; Abeille XI, 1873, p. 777; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 552; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 150 (subg. *Tournieria*). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 192. — Reitter, Bull. Soc. Ent. Égypte I, 1908, p. 53 (*Otiorrh.* subg. *Tournieria*); Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 44 (*Eptacus*). — Emden, Ent. Blätt. XXIV, 1928, p. 123. — Kurdistan

otiorrhynchoides Emden, l. c. pl. 121, 124. — Syrien

Wohlberedti Emden, l. c. pl. 120, 123. — Transjordanien (Petra)

7

Euplatinus Desbr.

Desbr. Frelon XV, 1906—08 (1907), p. 93; XVII, 1909—11 (1909), p. 2.

Boviei Melichar, Wien. Ent. Zeit. XXXIX, 1922, p. 108. — Marokko

otiorrhynchoides Desbr. l. c. XVII, 1909—11 (1909), p. 2. — Kleinasien

tigrellus Desbr. l. c. XV, 1906—08 (1907), p. 93 ♂ ♀. — Asiat. Türkei

3

Holcorhinus Schönh.

Schönh. Disp. meth. Curc. 1826, p. 194; Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 518; l. c. VII, 1, 1843, p. 190. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 181. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 282; Monogr. Peritelus 1866, p. 10, tab. f. 2; Otiorrhynchid. 1868, p. 3, 6; Fn. Balt. ed. 2, 1887-91 (1890), Gatt. p. 154; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 154. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 62—65. — Mars., Abeille X, 1870, p. 5, 8. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, I, 1874, p. CXXXI; l. c. II, 1874, p. 206. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1883, p. 406, 408; Best.-Tab. 9, 1883, p. 4, 6. — Faust, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 235; l. c. XXX, 1886, p. 97—98. — Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1898), p. 6, 7, 52. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 15; Fn. Germ. V, 1916, p. 14. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 68.

arabicus Pic, Miscell. Ent. IV, 1896, p. 95 ♂ ♀ (*Holcorhinus*). — Arabien: Jedded

mutator Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XXVII, 1883, Compt. rend. p. XLIV ♂ ♀ (*Holcorhinus*). — Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1898), p. 7, 11, 52. — Algerien: Tlemcen

parvus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. X, 1898—1903 (1899), p. 200 (*Holcorhinus*). — Marokko

querulus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 520; l. c. VII, 1, 1843, p. 190. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 62. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 7. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 9, 10 ♂ ♀. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 408 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 6 ♂ ♀. — Desbr. Frelon VI, 1897—98, p. 8, 9 ♂ ♀, p. 52. — Algerien

caesicollis Desbr. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. 1871, p. 349; Ann. Soc. Ent. France (5) II, 1872, p. 428 *(Holcorhinus)*.

pilosulus Chevr. Rev. Mag. Zool. 1860, p. 450 *(Holcorhinus)*. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 63. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. 1868, Beih. p. 7, 9.— Marseul, Abeille X, 1872, p. 11.

Seidlitzi Tourn. Ann. Soc. Ent. France (5) IV, 1874, Bull. p. CCXI. — Biskra

seriehispidus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 519; l. c. VII, 1, 1843, p. 190. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 63. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 7. — Faust, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 235; l. c. XXX, 1886, p. 97—98. — Desbr. Frelon VI, 1897—98, 1898, p. 7 ♂, 8 ♀, 8 ♂ ♀, p. 52. — Algerien: Constantine

♂ *albomarginatus* Lucas, Explor. sc. Algérie II, 1849, p. 435 ♂, t. 37, f. 2 *(Nastus)*; Rev. Mag. Zool. 1855, p. 292. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 9, 12 ♂ *(Holcorhinus)*. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 408 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 6 ♂ ♀.

♀ *albopunctatus* Lucas, Explor. scient. Algérie II, 1849, p. 434, t. 7, f. 1 *(Nastus)*. — Algerien

otiorrhynchoides Fairm. Rev. Zool. (3) I, 1873, p. 344. — Bedel, Ann. Soc. Ent. France (6) VII, 1887, p. 200. — Bône

siculus Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 8; Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Gatt. 154 *(Holcorhinus)*; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 154. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 10, 13 ♂ ♀ *(Cyclomaurus)*. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1883, p. 409; Best.-Tab. 9, 1883, p. 7. — Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1898), p. 51, 54. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 874. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 68. — Sizilien: Mte. Pellegrino bei Palermo

7

Nucterocephalus Desbr.

Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1897), p. 20. — Weise in Reitter, Cat. Col. Eur. ed. 2, 1906, p. 753 *(Nycterocephalus)*.

Cyclopterus Seidlitz, Abeille X, 1872, p. 6, 30 (non L. 1758). — Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1898), p. 6, 47, 54. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Bestimm.-Tab. 68), p. 13; Fauna Germ. V, 1916, p. 35.

Desbrochersi Reitter, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. VI, 1906, p. 377 *(Cyclopterus)*. — Weise in Reitter, Cat. Col. Eur. ed. 2, 1906, p. 753 *(Nycterocephalus)*. — Valencia

spinifer Seidlitz, Abeille X, 1872, p. 30 *(Cyclopterus)*. — Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1898), p. 48, 54. — Algerien

♀ *Caroli* Pic, Miscell. Ent. IV, 1896, p. 114 *(Cyrtolepis)*. — Bou-Saada Algerien

♂ *Henoni* Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1897), p. 20 ♂ *(Nucterocephalus)*.

var. *latenotata* Pic, Échange XVI, 1903, p. 129. — Tunesien: Gabés

var. *squamans* Desbr. Frelon V, 1895—96 (1895), p. 20 *(Cyclomaurus)*. — „

tuniseus Pic, Échange XVIII, 1903, p. 129 *(Cyclopterus)*. — „

3

Paracyclomaurus Desbr.

Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1898), p. 6, 1898, p. 39, 54.

conglobatus Seidlitz, Abeille X, 1872, p. 14 *(Holcorhinus)*. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 409; Best.-Tab. 9, 1883, p. 7. — Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1898), p. 41 ♂ ♀, p. 54 *(Paracyclomaurus)*. — Algerien

opacus Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 172 *(Cyrtolepus)*.

pygmaeus Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 7, 8 *(Holcorhinus)*. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 14. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 409; Best.-Tab. 9, 1883, p. 7. — Faust, Berl. Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 98. — Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1898), p. 39 ♂ ♀, p. 54 *(Paracyclomaurus)*. — Algerien: Oran

seriatellus Desbr. Frelon XIV, 1905—06 (1906), p. 7. — Algerien: Biskra

3

Periteloneus Reitter.

Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 14; Fn. Germ. V, 1916, p. 35.

Schilskyi Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 14; Fn. Germ. V, 1916, p. 35, Note. — Asiat. Türkei

tauri Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 67 ♂ *(Peritelus)*. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 14 *(Periteloneus)*; Fn. Germ. V, 1916, p. 35, Note. Kleinasien
sauri Sharp, Zool. Record XLV, 1908 (1910) Ins. p. 262 (err.).
2

Pimelorrhinus Reitter.

Reitter, Ent. Blätter XI, 1915, p. 116.

globatus Reitter, l. c. p. 117. Rhodus
1

Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 162:

C. Lona

Curculionidae: Otiorrhynchinae III.

Dr. W. Junk
Verlag für Naturwissenschaften
's-Gravenhage
1938.

11. Tribus: Mylacini.

Otiorrhynchinae trib. *Mylacini* Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 9, 15; Fn. Germ. V, 1916, p. 15, 36.
Otiorrhynchinae trib. *Mylacini* Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 14, 68.

Amicromias Reitter.

Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 17; Fauna Germ. V, 1916, p. 37.

Breiti Formán. Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 29 *(Brachysomus)*. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Bestimm.-Tab. 68), p. 17, Note *(? Amicromias)*. — Dobrudja

rumelicus Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosn. VI, 1899, p. 800 *(Brachysomus)*. — Türkei, Griechenland

Formaneki Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Bestimm.-Tab. 68), p. 17, Note (sine descr.) *(Amicromias)*.

2

Choerocephalus Chevr.

Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) XIII, 1861, p. 307. — Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 82.

Chaerorhinus Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) XII, 1860, p. 461 (non Fairm. 1857). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 621. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 497. — Desbr. Frelon III, 1893—94 (1893), p. 23, 28; l. c. VI, 1897—98 (1898), p. 56.
Felicienella Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Bestimm.-Tab. 68), p. 16; Fauna Germ. V, 1916, p. 36. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 68, 69.

alternans Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 58 ♂ *(Sciaphilus)*. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—1887 (1884), p. 84; Bestimm.-Tab. 13, 1885, p. 28 *(Sciaphilus* subgen. *Sciaphilus)*. — Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1898), p. 56, 62 *(Choerocephalus)*. — Tanger

fasciolatus Fairm. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 59 ♀ *(Sciaphilus)*. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 84; Bestimm.-Tab. 13, 1885, p. 28 *(Sciaphilus* subgen. *Sciaphilus)*. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LV, 1895, p. 359. — Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1898), p. 56, 62 *(Choerocephalus)*.

maroccanus Desbr. Frelon III, 1893—94 (1893), p. 12, 17, 19, 28 ♀; l. c. IV, 1894—95 (1895), p. 22 *(Elytrodon)*. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LV, 1895, p. 359. — Reitter,

Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Bestimm.-Tab. 68), p. 16 *(Felicienella)*.

barbarus Desbr. Frelon XIV, 1905—1906 (1905), p. 1 ♂ ♀.

araneus Flach, Deutsche Ent. Zeitschr. 1907, p. 16 *(Otiorrhynchus)*. — Winkler, Cat. Col. Reg. Pal. II, 1927—1932, p. 1449 *(Choerocephalus)*. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 874 *(Felicienella)*. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 69 *(Felicienella)*. — Calabrien: Antonimina

baborensis Pic, Échange XXX, 1914, p. 2. — Algerien: Mt. Babor

brevicollis Desbr. Frelon XVII, 1909—11 (1909), p. 1 ♀. — Algerien

carinifrons Desbr. Frelon I, 1891—92 (1892), p. 116; l. c. III, 1893—94 (1893), p. 18, 26, 28; l. c. VI, 1897—98 (1898), p. 57, 63. — Algerien: Constantine

Cloueti Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 63; l. c. VI, 1897—98 (1898), p. 57, 63. — Algerien: Saint-Charles

curtipennis Pic, Échange XXIX, 1913, p. 177. — Algerien: Philippeville

fallax Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1898), p. 57 ♂. — Algerien: Teniet-el-Haad

giganteus Fairm. Ann. Soc. Ent. France (3) VIII, 1860, Bull. p. XXXI; l. c. (4) VI, 1866, p. 58 *(Sciaphilus)*. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 49 ♂ ♀ *(Elytrodon)*. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 496 ♂ ♀. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 115; Bestimm.-Tab. 13, 1885, p. 59. — Desbr. Frelon III, 1893—94 (1893), p. 17, 20 ♂ ♀, p. 28; l. c. VI, 1897—98 (1898), p. 56, 62 *(Choerocephalus)*. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. 76 ♂ ♀ *(Chiloneus)*. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Bestimm.-Tab. 68), p. 16 *(Felicienella)*. — Algier, Oran, Marokko

var. *angustatus* Pic, Échange XXX, 1914, p. 65. — Algerien: Saint-Charles

grandis Pic, Échange XX, 1904, p. 92. — Algerien

Henoni Desbr. Frelon III, 1893—94 (1893), p. 17, 21, 28 *(Elytrodon)*; l. c. VI, 1897—98 (1898), p. 57, 63 *(Choerocephalus)*. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 16 *(Felicienella)*. — ,,

immunis Desbr. Frelon XIV, 1905, p. 4 ♂. — ,,

impressifrons Desbr. Frelon I, 1891—92 (1892), p. 115 *(Elytrodon)*; l. c. III, 1893—94 (1893), p. 17, 24 ♀, 28; l. c. VI, 1897—98 (1898), p. 57, 59 ♂ ♀, p. 63 *(Choerocephalus)*. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Bestimm.-Tab. 68), p. 16 *(Felicienella)*. — Algerien: Teniet-el-Haad

var. *depressifrons* Pic, Échange XXIX, 1913, p. 178. — Algerien: Mt. Ouarsenis

lanosimanus Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) XII, 1860, p. 452 *(Holcorhinus)*; l. c. p. 461 *(Chaerorhinus)*. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 49 *(Elytrodon)*. — Desbr. Frelon III, 1892—93 (1893), p. 23, 28; l. c. VI, 1897—98 (1898), p. 56, 57, 61, 63 *(Chaerocephalus)*. — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 36 *(Felicienella)*. Algerien

lanuginosus Chevr. in Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Bestimm.-Tab. 68), p. 16 *(Felicienella)* (err.).

longipennis Pic, Échange XXIV, 1908, p. 90. „

multifoevolatus Desbr. Opusc. Ent. I, 1874—75, p. 10; Frelon III, 1893—94 (1893), p. 18, 23, 28; l. c. VI, 1897—98 (1898), p. 57, 59, 63 *(Choerocephalus)*. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 115; Bestimm.-Tab. 13, p. 1885, p. 59 *(Elytrodon)*. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Besttimm.-Tab. 68), p. 16 *(Felicienella)*. Algier, Oran, Bône: Monte Edough

rufolimbatus Pic, Échange XXVII, 1911, p. 138. Algerien

siculus Ragusa, Natural. Sicil. XVII, 1904, p. 100, Note ♂ ♀. — Desbr. Frelon XIV, 1905, p. 3. — Porta, Riv. Col. Ital. III, 1905, p. 150; Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 69. Sizilien

tessellatus Desbr. Opusc. Ent. I, 1874—75, p. 10; Frelon III, 1893—94 (1893), p. 18, 25, 28; l. c. VI, 1897—98 (1898), p. 57, 63 *(Choerocephalus)*. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 115; Bestimm.-Tab. 13, 1885, p. 59.

tuniseus Pic, Échange XXII, 1906, p. 11. Tunis
20

Desbrochersella Reitter.

Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905, (1906) (Best.-Tab. 58), p. 208, 209; l. c. LI, 1912 (1913) (Bestimm.-Tab. 68), p. 16; Fauna Germ. V, 1916, p. 37.

baetica Schauf. Sitzungsber. Ges. Isis 1861, p. 51; Nunquam Otiosus I, 1870—71 (1870), p. 159; l. c. II, 1872, p. 316—317 *(Strophosomus)*. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. 1867, p. 185; Otiorrhynchid. 1868, p. 23. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Bestimm.-Tab. 58), p. 210. Südspanien: Andalusien

rhinolophus Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 22 *(Mylacus)*. — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 206. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 413; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 11 *(Mylacus)*.

castiliana K. Daniel, Soc. Ent. XV, 1900, p. 139 *(Omias)*. — Formánek, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904—06 (1904), p. 175, 180, f. 29 (subg. *Omias*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Bestimm.-Tab. 58), p.211 *(Desbrochersella)*. — Südspanien: Pozuelo de Calatrava; Mittel-Spanien: Fuente

pennata Faust, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 235 ♂ ♀ *(Mylacus)*. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905—1906 (Best.-Tab. 58), 1906, p. 211 *(Desbrochersella)*. — Algerien: Amusi-Moussa

pruinosa Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 39 *(Sciaphilus)*. — Oued-Riou

Reitteri Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884, p. 36. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Bestimm.-Tab. 58), p. 211 *(Desbrochersella)*. — Syrien: Haifa

Vaulogeri Pic, Miscell. Ent. IV, 1896, p. 93 *(Sciaphilus* subg. *Pleurodirus)*. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 210 *(Desbrochersella)*. — Algerien, Tunis, Sfax

5

Elytrodon Schönh.

Schönh. Disp. meth. Curc. 1826, p. 209; Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 628; l. c. VII, 1, 1843, p. 404. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 331. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 106, 121. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p .197. — Redtenb. Fauna Austr. ed. 2, 1858, p. CXX, 750; l. c. ed. 3, I, 1874, p. CXXX, l. c. II, 1874. p. 228. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 282; Otiorrhynchid. 1868, p. 4, 48; Fauna Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Gatt. p. 157; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 157, Arten p. 649; Archiv Naturg. LXV, 2, 1, 1899, p. 300. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 492. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 59, 114; Bestimm.-Tab. 13, 1885, p. 3, 58. — Desbr. Frelon III, 1893—94 (1893), p. 15, 28; l. c. IV, 1894—95 (1895), p 22; l. c. VI, 1897—98 (1898), p. 55, 63; l. c. XIV, 1905—06 (1905), p. 1, 4. — K. Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 82. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Bestimm.-Tab. 68), p. 16; Fauna Germ. V, 1916, p. 36. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 68, 69.

Elytrodes Steven, Mus. Mosq. II, 1829, p. 96.
Choerocephalus Desbr. Frelon VI, 1908, p. 55 (non Chevr.). — Seidlitz, Arch. Naturg. LXV, 2, 1, 1899, p. 300.

alepensis Pic, Échange XXX, 1914, p. 65. — Syrien: Aleppo

Baudii Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93 (1892), p. 363; Natural. Sicil. XI, 1892, p. 156. — Desbr. Frelon IV, 1894—95 (1895), p. 22; l. c. XIV, 1905, p. 2. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 874. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 69 *(Felicienella)*. — Sizilien: Mistretta, Ficuzza, Castrogiovanni

bidentatus Stev. Mus. Mosq. Ins. II, 1829, p. 96 *(Elytrodes)*. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 638; l. c. VII, 1, 1843, p. 404 *(Elytrodon)*. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 331. — Jacq. du Val, Gen. Col. Eur. Curc. 1854, t. 16, f. 74. — Redtenb. Fauna Austr. p. 750; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 227. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 457. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 49 ♂ ♀; Fauna Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 649 ♂ ♀. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 495 ♂ ♀. — Retowski, Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 69 ♂ ♀. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 114 ♂ ♀; Bestimm.-Tab. 13, 1885, p. 58 ♂ ♀. — Desbr. Frelon III, 1893—94 (1893), p. 16 ♀; p. 17 ♂, p. 18 ♂ ♀, p. 27; l. c. VI, 1897—98 (1898), p. 62. — K. Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 83. — Wagner in Calwer, Käferb. ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1047, t. 37, f. 22. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 874. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 69. — Ungarn, Krim, Theodosia, Amasia, Türkei, Griechenland, Italien: Cerchio, Foggia

Biologie: Retowski, Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 69—70 *(Metamorphose)*. — Rupertsb. Biol. Lit. Käf. Eur. 1894, p. 203.

bituberosus Desbr. Frelon III, 1893—94 (1893), p. 17, 19 ♀. — Griechenland

bispinus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 639; l. c. VII, 1, 1843, p. 404. — Germ. Fn. Ins. Germ. XX, 1838, t. 2. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 750; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 229. — A. Friv. Kiraly magy. 1866, p. 216, t. 12, f. 7. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 114; Bestimm.-Tab. 13, 1885, p. 58. — Ungarn, Dalmatien, Türkei, Herzegovina, Serbien

Chevrolati Reiche, Ann. Soc. Ent. France (3) VI, 1858, p. 5, t. 1, f. 4; Col. Syrie 1858, p. 200, t. 1, f. 4. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 49 ♂ ♀. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 114; Bestimm.-Tab. 13, 1885, p. 58. — Desbr. Frelon III, 1893—94 (1893), p. 22, 28; l. c. VI, 1897—98 (1898), p. 56, 59 ♂, p. 63 *(Choerocephalus)*. — Syrien: Naplouse

dicatus Marseul, Abeille XI, 1873, p. 494 ♂ ♀.

dilaticollis Pic, Échange XX, 1904, p. 10. — Griechenland: Ins. Cerigo (Kythera)

Desbrochersi Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Bestimm.-Tab. 68), p. 16; Fauna Germ. V, 1916, p. 36 (s. descr.). — Palästina

distincticornis Pic, Échange XXVII, 1911, p. 138. — Cypern

ferox K. Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 82 ♂ ♀ (subg. *Elytrodon*). — Kleinasien: Konia

hyperoides Ragusa, Natural. Sicil. XVII, 1904, p. 99, Note ♀. — Desbr. Frelon XIV, 1905, p. 2. — Porta, Riv. Col. Ital. VI, 1905, p. 150; Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 69 *(Felicienella)*. — Sizilien: Palermo

inermis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 404 *(Elytrodon)*. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 49. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1885), p. 114; Bestimm.-Tab. 13, 1885, p. 58. — Desbr. Frelon I, 1891—92 (1891), p. 34; l. c. III, 1893—94 (1893), p. 27, 28; l. c. IV, 1897—98 (1898), p. 57, 60 ♀, p. 63 *(Choerocephalus)*. — Kaukasus, Korfu

imbellis Marseul, Abeille XI, 1873, p. 498 *(Elytrodon)*. — Südeuropa

Luigionii Desbr. Frelon VIII, 1899—1900 (1900), p. 1 ♂ ♀. — Luigioni, Mem. Pontificia Sc. Accad. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 874. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 69. — Italien: Rom

procerus Rottb. Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 230 *(Sciaphilus)*. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 84; Bestimm.-Tab. 13, 1885, p. 28 *(Sciaphilus* subg. *Sciaphilus)*. — Weise in Heyden, Reitter, Weise, Cat. Col. Eur. ed. 2, 1906, col. 619 *(Chiloneus)*. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 21 *(Chiloneus)*. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 187 *(Elytrodon)*. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 69, 92. — Sizilien: Palermo

8

Gyratogaster K. & J. Daniel.

K. & J. Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 319. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 15; Fn. Germ. V, 1916, p. 36.

larinoides Reitter, Wien. Ent. Zeit. XV, 1896, p. 237, t. 3, f. 8 *(Otiorrhynchus* subg. *Aramichnus)*; l. c. XXVI, 1907, p. 29 *(Gyratogaster)*. — Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 15 *(Gyratogaster)*; Fn. Germ. V, 1916, p. 36 Note. — Russisch-Armenien, Araxes, Ordubad

comosus K. & J. Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 319. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXVI, 1907, p. 29.

1

Hlavena Reitter.

Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Bestimm.-Tab. 68), p. 15; Fauna Germ. V, 1916, p. 16, 36.

subconstrictus Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 40 *(Otiorrhynchus* subgen. *Arammichnus)*. — Kaukasus

1

Leianisorhynchus Pic.

Pic, Échange XXI, 1905, p. 179.

brunnescens Pic, l. c. p. 179. Adana
1

Mylacomias Reitter.

Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 16; Fn. Germ. V, 1916, p. 37.

eques Chevr. in Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 16 *(Mylacomias)*. Kaspisee-gebiet
1

Mylacus Boh.

Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 144. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 3, 11; Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Gatt. p. 155, Arten p. 569; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 155, Arten p. 614. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 5, 18. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 155, 624. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 187. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 3, I, 1874, p. CXXXII; II, 1874, p. 207. — J. H. Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 68. — J. L. Leconte, Class. Col. North Amer. ed. 2, in Smithson. Misc. Coll. XXVI, 1883, p. 448. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 406, 410; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 4, 8. — Faust, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 235; l. c. XXX, 1886, p. 97. — Casey, Ann. New York Ac. IV, 1888, p. 268. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 551. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Bestimm.-Tab. 58), p. 208, 212; l. c. LI, 1912 (1913) (Bestimm.-Tab. 68), p. 16; Fn. Germ. V, 1916, p. 37. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 907, 930. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 68, 70.

alboornatus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 305; Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Bestimm.-Tab. 58), p. 220. — Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 283; Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 789. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 875. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 71. Dalmatien: Ragusa; Süd-Herzegovina, Bilek, Trebinje, Domanovic, Caplijina

albosquamulatus Reitter, Bol. Soc. Espan. Hist. Nat. VII, 1907, p. 323. Saragossa

armatus Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 13, 20 ♂ ♀. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 412 ♂ ♀; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 10 ♂ ♀. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Bestimm.-Tab. 58), p. 212 ♂ ♀. Türkei, Bosporus

armipotens Marseul, Abeille X, 1872, p. 20, 27 ♂ ♀.

atticus Pic, Échange XVII, 1902, p. 25. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 219. Griechenland: Attika

Brancsiki Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Bestimm.-Tab. 58), p. 218 ♀. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 875. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 70. — Dalmatien: Cattaro; Italien: Gargano

crinitus (Daniel) Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Bestimm.-Tab. 58), p. 215 ♂ ♀. — Bulgarien: Slivno

cupripubens Reitter, l. c. p. 222 ♂ ♀. — Syrien: Akbés

Desbrochersi Reitter, l. c. p. 222 ♂ ♀. — Algerien: St. Charles

Formaneki Reitter, l. c. p. 218. — Korfu

globosus Gyllh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 499 *(Omias)*; l. c. VII, 1, 1843, p. 128 *(Omias)*. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 419. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 13, 18 ♂ *(Mylacus)*. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 20, 25. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 412; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 10 ♂ ♀. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Bestimm.-Tab. 58), p. 212 ♂ ♀. — Südrußland, Krim, Kaukasus, Taurien

Martini Pic, Échange XVII, 1902, p. 26; l. c. XXII, 1906, p. 65. — Kaukasus

var. *glomulus* Schönh. in Ménétriés, Cat. rais. 1832, p. 219 *(Omias)*. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 498; l. c. VII, 1, 1843, p. 127 *(Omias)*. — Falderm. Fn. Ent. Transcauc. II, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou V, 1837, p. 204; l. c. III, in l. c. VI, 1838, p. 191. — Kolen. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 419. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 13, 19 ♂ ♀ *(Mylacus)*. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 20, 26 ♂ ♀.' — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 412; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 10. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Bestimm.-Tab. 58), p. 212. — Südrußland, Krim, Kaukasus, Taurien

♀ *glomeratus* Gyllh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 498; l. c. VII, 1, 1843, p. 127 *(Omias)*. — Kolen. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 418. — Kaukasus

globulus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 153 *(Peritelus)*. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 13, 14 *(Mylacus)*. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 19, 22. — Stierl. Mitteil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 411; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 9. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Bestimm.-Tab. 58), p. 219. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 71. — Ungarn, Rußland, Italien (Lombardia)

graecus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 37. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 213 ♂. — Griechenland: Morea

haematopus	Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 261 Note *(Omias)*. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 13, 16 *(Mylacus)*. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 411; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 9. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Bestimm.-Tab. 58), p. 219. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 875. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 70.	Tirol
rubripes	Marseul, Abeille X, 1872, p. 20, 23.	
Helleri	Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Bestimm.-Tab. 58), p. 220 ♂ ♀.	Attika, Thessalien
indutus	Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 259 *(Omias)*. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 413; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 11 ♂ ♀ *(Mylacus)*. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 93. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Bestimm.-Tab. 58), p. 220, ♂ ♀.	Griechenland, Korfu, Kreta, Ägypten
inermis	Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LVIII, 1926, p. 106.	Albanien
Krüperi	Stierl. Mitttheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93 (1888), p. 9. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 221 ♂ ♀.	Griechenland
coniceps	Desbr. apud Reitter, l. c. p. 221 (Typenuntersuchung).	
Lonae	Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. LVIII, 1926, p. 106.	Albanien (Tomor)
murinus	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 145. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 425. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 13, 14. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 410; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 8. — Faust, Berl. Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 235; l. c. XXX, 1886, p. 97. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Bestimm.-Tab. 58), p. 219. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 4. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 70.	Sibirien; Ost- und Südrußland
sphaericus	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 1, 1843, p. 128 *(Omias)*. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 419. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 14 *(Mylacus)*. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 21. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 411; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 9.	Rußland, Cherson
vestitus	Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 129 *(Omias)*. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 423. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 14 *(Mylacus)*. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 21. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 410; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 8.	Kaspigebiet

soricinus Marseul, Abeille X, 1872, p. 21. — Rußland, Sibirien

nitidulus Vitale, Riv. Col. Ital. II, 1904, p. 126; Atti Accad. Palermo XX, 1905, p. 184. — Reitter. Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Bestimm.-Tab. 58), p. 214. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 875. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 70. — Sizilien: Messina

Oertzeni Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1887), p. 390 ♂ ♀. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Bestimm.-Tab. 58), p. 222 ♀. — Griechenland

pustulatus Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 13, 17 ♂ ♀. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 20, 24 ♂ ♀. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 412 ♂ ♀; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 10 ♂ ♀. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Bestimm.-Tab. 58), p. 215 ♂ ♀. — Balkan, Europ. Türkei, Bulgarien (Sofia)

Reitteri Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884, p. 36. — Syrien

rotundatus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 473; Syst. El. II, 1801, p. 53 *(Curculio)*. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 355, t. 87, f. 15. — Panz. Deutschl. Ins.-Fn. 1795, p. 330. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 173 *(Brachyrhinus)*. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 500 *(Omias)*; l. c. VII, 1, 1843, p. 128. — Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 1847, p. 501. — Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 428; l. c. ed. 2, 1858, p. 737 *(Omias)*; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 207 *(Mylacus)*. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 264 *(Omias)*. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 420 *(Omias)*. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 498 *(Omias)*. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 186, Note *(Omias)*. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 13, 15; Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 569 ♂ ♀; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 624 ♂ ♀ *(Mylacus)*. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 19, 22 *(Mylacus)*. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 411; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 9; Fn. Col. Helv. II, 1886—98 (1891), p. 232. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 571. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Bestimm.-Tab. 58), p. 216 ♂ ♀; Fn. Germ. V, 1916, p. 38, t. 154, f. 12. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 930. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 3. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 875. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 70. — Mitteleuropa, Süd-Podolien, Südrußland, Kaukasus, Dobrudscha, Bosnien, Kroatien (Gospic), Italien (Piemont)

Biologie: Redtenb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 207. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 48; l. c. XVIII, 1886,

p. 288. — Bourgeois, Mitteil. Nat. Ges. Colmar VIII, 1905—06 (1906), p. 211. — Pospelow, Zeitschr. f. Landw. und Industrie 1906 (Schädling an Zuckerrüben). — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 71.

debilis Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVIII, 1887, p. 296.

ovatus Ol. Entom. V, 1807, p. 421, t. 25, f. 352 *(Curculio)*. — Podolien

var. *puberulus* Stev. Mus. Mosq. II, 1829, p. 94. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 502; l. c. VII, 1, 1843, p. 129 *(Omias)*. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 422 *(Omias)*. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 22 *(Mylacus)*. — Südrußland, Taurien, Kaukasus

saccatus J. L. Leconte, Rep. Expl. Mississippi River IX, 1857, p. 56 *(Ptochus)*; Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 68, 437 *(Mylacus)*. — Kalifornien, Oregon

Sandneri Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Bestimm.-Tab. 58), p. 217 ♂ ♀. — Olymp

Seidlitzi Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 333. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 7. — Ägypten

indutus Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 13, 21 *(Mylacus)* (nec Kiesw. 1864). — Marseul, Abeille X, 1872, p. 20, 28 ♂ ♀.

seminulum F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 470 *(Curculio)*; Syst. El. II, 1801, p. 528. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 502. — Panz, Deutschl. Ins.-Fn. 1795, p. 328. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 170 *(Brachyrhinus)*. — Germ. Ins. Spec. Novae I, 1824, p. 409 *(Peritelus)*. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 497 *(Omias)*; l. c. VII, 1, 1843, p. 127. — Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 428 *(Omias)*; l. c. ed. 2, 1858, p. 737; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 207 *(Mylacus)*. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 264. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 498. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 13, 18 ♂ ♀; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 614 ♂ ♀ *(Mylacus)*. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 20, 24 ♂ ♀. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 412; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 10 ♂ ♀. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 212 ♂ ♀; Fauna Germ. V, 1916, p. 37. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 930. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 1 ♂ ♀. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 70. — Schweiz, Österreich, Ungarn, Siebenbürgen, Bulgarien (Sofia), Ost-Rumelien: Philippopel

Biologie: Kaufmann, Rovart. Lapok XVII, 1910, p. 68—72.

globulus Oliv. Entom. V, 1807, p. 421, 519, t. 35, f. 545 *(Curculio)*. — Ungarn

Sénaci Desbr. Opusc. Ent. I, 1874—75, p. 10. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 413; Bestimm.-Tab. 9, 1883 — Türkei: Küstendjé

p. 11. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Bestimm.-Tab. 58), p. 214.

subplumbeus Desbr. Opusc. Ent. I, 1874—75, p. 11. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Bestimm.-Tab. 58), p. 221 ♀. — Algier: Bône

syriacus Pic, Bull. Soc. Hist. Nat. Autun XI, 2, 1898, p. 124. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Bestimm.-Tab. 58), p. 216 ♀. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 2. — Syrien: Akbes

turcicus Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 13, 21. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 20, 27. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 413; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 11. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Bestimm.-Tab. 58), p. 216, Note. — Kleinasien

turkestanus Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 6. — Turkestan: Karagai-tau

verruca Steven, Mus. Mosq. II, 1829, p. 94 *(Omias)*. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 501; l. c. VII, 1, 1843, p. 129. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 421. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 13, 16 *(Mylacus)*. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 20, 23. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 411; Bestimm.-Tab. 9, 1883, p. 9. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Bestimm.-Tab. 58), p. 214 ♂ ♀. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, p. 5. — Südrußland, Kaukasus, Krim, Taurus, Russ. Armenien, Ungarn

34

Omias Schönh.

Schönh. Disp. meth. Curc. 1826, p. 109; Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 496; l. c. VII, 1. 1843, p. 127. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 326. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 106. — Redtb. Gatt. Deutsch. Käferfn. 1845, p. 40; Fn. Austr. 1849, p. 40, 427; l. c. ed. 2, 1858, p. CXX & 736; l. c. ed. 3, I, 1874, p. CXXXVIII, & II, 1874, p. 230. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XIX, 1847, p. 314—317; Brit. Ins.-Fam. Curc. 1844—52 (1852), p. 85; Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 341, 359. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 155, 264. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 186, 625. — Gautier des Cottes, Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. II, 1867, p. 161—162. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 282; Otiorrhynchid. 1868, p. 4, 50; Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Gatt. p. 156, Arten p. 587; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 156, Arten p. 647. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 7; l. c. XI, 1873, p. 557. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 43. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 2, 1884, p. 58, 96; Best.-Tab. 13, 1885, p. 2, 40; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 239, 249. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 188, 192. — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 200—202 (Revision); Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 17; Fn. Germ. V, 1916, p. 37, 38. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 551, 576. — Formánek, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 16—28 (Monographie). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 909, 941. — Pierce,

Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 423. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1002, 1060. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 68, 71.

Subg. *Omias* Formánek, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904, p. 17, 174—181 (Monographie).

albus Van Dyke, Pan-Pacific Ent. XI, 1935, p. 96. — Washington

asiaticus Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXIX, 1910, p. 242. — Kleinasien: Goek-Dagh

Brandisi Apfelbeck, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902—03 (1903), p. 336 ♂ ♀ *(Omias)*. — Formánek, l. c. II, 1904—06 (1904), p. 174, 176, fig. 26 (subg. *Omias*). — Zentral-Bosnien: Sarajevo

castilianus K. Daniel, Soc. Ent. XV, 1900, p. 139 *(Omias)*. — Formánek, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904—06 (1904), p. 175, 180, t. 9, f. 29. — M.-Spanien

concinnus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 508; l. c. VII, 1, 1843, p. 141 *(Omias)*. — Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 429; l. c. ed. 2, 1858, p. 738; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 230 *(Omias)*. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 267. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 499. — Aubé, Ann. Soc. Ent. France (4) IV, 1864, p. 314. — Gautier, l. c. (4) V, 1865, Bull. p. LX. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 53, 57; Fn. Balt. ed. 2, 1887—90 (1890), Arten p. 587; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 647. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 2, 1884, p. 97; Best.-Tab. 13, 1885, p. 41; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 249. — Formánek, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904—06 (1904), p. 175, 179, fig. 28 (subg. *Omias*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 941 *(Omias)*. — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 38 *(Omias)*. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei XIII, 1929, p. 875. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 71. — Frankreich, Illyrien, Dalmatien, Italien

Biologie: Marseul, Abeille XI, 1873, p. 565. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 50; l. c. XVIII, 1886, p. 289. — Xambeu, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XLIII, 1896, p. 150—151 (Puppe); Moeurs et Métam. Ins. V, 1896, p. 128—129.

parvulus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 509; l. c. VII, 1, 1843, p. 140 *(Omias)*. — Deutschland, Österreich, Italien

oblongus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 141 *(Omias)*. — Südwest-Frankreich

sericeus Boh. l. c. p. 139 *(Omias)*. — Triest, Illyrien

Raymondi Gautier, Ann. Soc. Ent. France (4) I, 1861, p. 98; l. c. (4) V, 1865, Bull. p. LX *(Omias)*. — Hyères

mandibularis Chevr. in Grenier, Cat. Col. France 1863, p. 106.

Marqueti Gautier, Ann. Soc. Ent. France (4) III, 1863, p. 489; l. c. (4) V, 1865, Bull. p. LX *(Omias)*. — Toulouse

crinitus Redtenb. in Hügel, Kaschm. IV, 2, 1848, p. 547. — Kaschmir

cypricus Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 53, 56. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 97; Best.-Tab. 13, 1885, p. 41. — Formánek, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904—06 (1904), p. 175, 178 (subg. *Omias*). — Cypern

elongatus Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 1847, 2, p. 503. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 425. — Armenien

Formaneki Tyl, Ent. Blätter VIII, 1912, p. 131—133, fig. 1, 2. — Österreich, Novibazar

fulgidus Formánek, Deutsche Ent. Zeitschr. 1909, p. 624 ♀ *(Omias)*. — Porta, Riv. Col. Ital. VIII, 1910, p. 150; Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 71. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 875. — Sardinien: Oristano

Ganglbaueri Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 225 ♂ *(Omias)*. — Thessalien: Larissa

haifensis Formánek, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904—06 (1904), p. 299 (subg. *Omias*). — Syrien: Haifa

Hanaki Friv. Magy. Aud. Akad. Evkonyvei XI, 4, 1866, p. 205, t. 11, f. 7 *(Omias)*. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 53; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 647. — Heyden, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 58. — Mårseul, Abeille XI, 1873, p. 561. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 96; Best.-Tab. 13, 1885, p. 40. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 409 ♂ ♀. — Formánek, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904—06 (1904), p. 174, 175 ♂ ♀, fig. 25 (subg. *Omias*). — Karpathen: Marmarosch; Siebenbürgen, Galizien, Ungarn

var. *montanus* Petri, Siebenbürg. Käfer 1912, p. 303. — Siebenbürgen

Heydeni Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 96 *(Barypeithes)*; Best.-Tab. 13, 1885, p. 40. — Formánek, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904—06 (1904), p. 17 *(Omias)*, 175, 180 (subg. *Omias*). — Naldi, Riv. Col. Ital. III, 1905, p. 89. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 875. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 71. — Genua: Nervi, Mte. Dente

interrupto-punctatus Ménétriés, Mém. Ac. St. Pétersbourg VI, 1849, p. 260. — Baschkir

Krajniki Roubal, Ent. Blätter XXVII, 1931, p. 3. — Slovakei: Berg Choc

latirostris Penecke, Col. Centralbl. III, 1928, p. 43. — Österreich

Leonhardi Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 139. — Erzerum

lepidotus Perris, Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 190. — Bône

metallescens Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 57. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. 1884, p. 97. — Formánek, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904—06 (1904), p. 175, 178. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 875. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 71. — Italien: Rom, Sizilien; Algier

maurulus Redtenb. Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 53.

micans Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 55 *(Omias)*. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 563. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 97; Best.-Tab. 13, 1885, p. 45. — Mittel-Frankreich

Moczarskii Penecke, Col. Centralbl. IV, 1929, p. 139. — Bukovina

mollinus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 504; l. c. VII, 1, 1843, p. 131 *(Omias)*. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 266. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 738; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 230 *(Omias)*. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 53, 59; Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 587; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 647. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 98; Best.-Tab. 13, 1885, p. 42. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 192; l. c. VI, 1913, p. 305. — Formánek, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904—06 (1904), p. 175, 181, fig. 30 (subg. *Omias*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 941. — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 38. — Skandinavien, Deutschland, Österreich, Ungarn, Serbien

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 50; l. c. XVIII, 1886, p. 289. — Reblaus Deutschlands 1904, p. 134. — Reh in Sorauer, Handbuch d. Pflanzenkrankheit. III, 1906—13 (1912), p. 543 (Schädling an amerikan. Reben).

Bohemani Zetterst. Ins. Lapp. I, 1838 (1840), col. 188 *(Curculio)*. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 130 *(Omias)*. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XIX, 1847, p. 315; Brit. Ins. Curc. 1844—52, p. 86; Stett. Ent. Zeit. IX, 1848, p. 345. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 499. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 143; l. c. X, 1868, p. 177 *(Omias)*. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 738. — Schweden

nitidus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 138. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 424. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 53, 55; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 647. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884) (Best.-Tab. 13, 1885), p. 41. — Formánek, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904—06 (1904), p. 175, 177 (subg. *Omias*). — Südrußland

rufipes Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 500; l. c. VII, 1, 1843, p. 129 *(Omias)*. — Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 1847, p. 501. — Kol. l. c. XXXI, 2, 1858, p. 420. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 230 *(Omias)*. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 53, 54. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—1887 (1884), p. 97; Best.-Tab. 13, 1885, p. 41. — Formánek, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904—06 (1904), p. 174, 176, fig. 27 (subg. *Omias*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Deutschl. 1912, p. 941. — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 38. — Mitteleuropa: Alpen, Deutschland, Rußland, Volhynien, Galizien, Kroatien, Kärnten

rufulipes Marseul, Abeille XI, 1873, p. 560, 562 *(Omias)*.

scabripennis Ménétriés, Mém. Ac. St. Pétersbourg VI, 1849, p. 26 *(Omias)*. — Turkmenien

tessellatus Brullé, Webb et Berth. Ins. Can. 1838, p. 72, t. 1, f. 15. — Canarien

Vaulogeri Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 176 *(Platytarsus)*. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 192 ♀ *(Omias)*. — Algerien: Oued-Rion

villosus Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXX, 1911, p. 203 *(Omias)*. — Russisch-Polen: Mutnevice

29

Rhinochrosis Desbr.

Desbr. Frelon I, 1891—92 (1892), p. 121.

subglobatus Desbr. l. c. p. 122. — Tanger
1

Rhinomias Reitter.

Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 314, 314—316; Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 17; Fn. Germ. V, 1916, p. 37, 38. — Formánek, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904—06, p. 17, 24 *(Omias* subg. *Rhinomias)*. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 69, 71.

austriacus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 315 ♂ ♀ *(Omias)*. — Penecke, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 19. — Formánek, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904—06 (1904), p. 24, 26, fig. 10 (subg. *Rhinomias)*. — Niederösterreich (Schneeberg), Nord-Mittel-Steiermark, Ungarn

cruciatus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—80 (1879), p. 431 *(Platytarsus)*; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 431, 481; Mitteil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 601 *(Peritelus* subg. *Meira)*; Best.-Tab. 9, 1883, p. 199. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXIV, 1905, p. 193, fig. 16 *(Rhinomias)*. — Kaukasus: Abchasien, Cirkassien

caucasicus Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. XXI, 1877, p. 183 *(Meira)*. — Schneider & — Kaukasus

Leder, Verh. Nat. Ver. Brünn XVII, 1878 (1879), p. 23. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 67.

Eldae Passauro, Bull. Ann. Soc. Ent. Belg. LXXIV, 1934, p. 188, fig. 3 Dalmatien

forticornis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 142 ♂ ♀ *(Omias)*. — Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 428; l. c. ed. 2, 1858, p. 737; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 230 *(Omias)*. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 264. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 498. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 53, 60 ♂ ♀; Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 587; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 647. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 560, 568. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 98; Best.-Tab. 13, 1885, p. 42; Fn. Col. Helvet II, 1886—98 (1891), p. 249 ♂ ♀ *(Omias)*. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 315 ♂ ♀ *(Rhinomias)*; Fn. Germ. V, 1916, p. 39, t. 155, f. 12. — Penecke, Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 19. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 576. — Formánek, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904—06 (1904), p. 24, 25 ♂ ♀, fig. 8 (subg. *Rhinomias*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 941 *(Omias)*. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1060 (subg. *Rhinomias*). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 875. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 72. Europa, Kaukasus, Kleinasien

Biologie: Marseul, Abeille XI, 1873, p. 568. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 50; l. c. XVIII, 1886, p. 289.

gracilipes Panz. Fn. Ins. Germ. V, 1798, Heft 87, t. 18 *(Curculio)*; Krit. Revis. I, 1805, p. 133. — Germ. Ins. Spec. Novae I, 1824, p. 349 *(Otiorrhynchus)*. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 505 *(Omias)*; l. c. VII, 1, 1843, p. 131. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 265. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 737; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 230 *(Omias)*. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 498.

rugicollis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 131 *(Omias)*.

validicornis Märkel in Germar, Zeitschr. Ent. V, 1845, p. 250 *(Omias)*. — Bach, Käferfn. 1852—54 (1854), p. 265. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 498.

illotus Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 2, 1847, p. 502 *(Omias)*. — Kol. l. c. XXXI, 2, 1858, p. 424. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 61. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 570. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent.

Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 98; Best.-Tab. 13, 1885, p. 42.

maxillosus Petri, Verh. Siebenbürg. Ver. Nat. XLI, p. 21 ♂. — Formánek, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904—06 (1904), p. 24, 27, fig. 12 (subg. *Rhinomias*). — Siebenbürgen: Schässburg, Nagy Küküllo, Hagymadfalva, Bihar

bihariсus Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 316 ♂ ♀ (*Omias*).

Peneckei Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 316 ♂ ♀ (*Rhinomias*). — Penecke, l. c. XVII, 1898, p. 253. — Formánek, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904—06 (1904), p. 24, 27, fig. 13 (subg. *Rhinomias*). — Steiermark: Graz

pygmaeus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. 1899, p. 199. — A. & F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 59. : syn. zu peneckei

Gattereri Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 98; Best.-Tab. 13, 1885, p. 42 (*Omias*). — Formánek, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904—06 (1904), p. 27 Note.

pygmaeus Stierl. Mitteil. Schweiz. Ent. Ges. 1899, p. 199 (*Peritelus*). — A. & F. Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LIV, 1922, p. 59.

pyrorhinus K. & J. Daniel, Col.-Studien II, 1898, p. 69 (*Rhinomias*). — Formánek, Münch. Ent. Zeitschr. II, 1904—06 (1904), p. 24, 26 ♂, fig. 11 (subg. *Rhinomias*); Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 143 ♀. — Siebenbürgen: Hermannstadt

Viertli Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 426 ♂ ♀ (*Omias*). — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 647. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 315 ♂ ♀. — Formánek, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904—06 (1904), p. 24, 25 ♂ ♀, fig. 9 (subg. *Rhinomias*). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 875. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 72. — Ungarn (Fünfkirchen), Steiermark, Deutschland, Kroatien, Banat, Istrien: Mte. Maggiore

8

Teripelus Heller.

Heller, Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 233.

subpilosus Heller, l. c. p. 234, fig. 1—2. — Erythraea: Asmara

1

Urometopus Formánek.

Formánek, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1, 1904—06 (1904), p. 17, 18 (*Omias* subg. *Urometopus*). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 17; Fauna Germ. V, 1916, p. 37, 38.

circassicus Reitter, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 262, 263; Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. — Kaukasus: Cirkassien

202 *(Omias)*. — Formánek, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904—06 (1904), p. 18, 20, fig. 3 (subg. *Urometopus)*.

ferrugineus Formánek, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904—06 (1904), p. 299, fig. 2 *(Omias* subg. *Urometopus)*. — Elburs

georgicus Reitter, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 263; Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 201 ♂ ♀. — Formánek, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904—06 (1904), p. 22, fig. 6 (subg. *Urometopus)*. — Centraler Kaukasus, Armenien, Daghestan, Martkopi, Talysch

talyschensis Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 201 *(Omias)*. — Talysch

imereticus Reitter, l. c. p. 202. — Formánek, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904—06 (1904), p. 18, 19, fig. 2 (subg. *Urometopus)*. — Kaukasus: Swanetien, Imeritien

inflatus Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 421. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 561, 567. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 98; Best.-Tab. 13, 1885, p. 42. — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 201. — Formánek, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904—06 (1904), p. 18, 22, fig. 7 (subg. *Urometopus)*. — Mittel-Kaukasus: Suram und Meskisches Gebirge

strigifrons Reitter, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 263 *(Omias)* (non Gyllh.). — Zentral-Kaukasus: Talysch; Krim

longicollis Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 201 ♂ ♀. — Formánek, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904—06 (1904), p. 18, 23 ♂ (subg. *Urometopus)*. — Kaukasus

longicornis Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93 (1893), p. 410 *(Barypeithes)*. — Formánek, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904—06 (1904), p. 18, 19, fig. 1 (subg. *Urometopus)*. — Kaukasus, Abchasien

♀ *Rosti* Reitter, Wien. Ent. Zeit. 1896, p. 77; Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 200.

Malyi Obenberger, Col. Rundschau III, 1914, p. 141, fig. — Buchara

mingrelicus Reitter, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 263, 264 *(Omias)*; Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 201. — Formánek, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904—06 (1904), p. 18, 21, fig. 5 (subg. *Urometopus)*. — Kaukasus: Mingrelien, Meskisches Gebirge

strigifrons Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 503; l. c. VII, 1, 1843, p. 131 *(Omias)*. — Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 1847, p. 502. — Kol. l. c. XXXI, 2, 1858, p. 423. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 53, 59. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—89 (1884), p. 98; Best.-Tab. 13, 1885, p. 42. — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 200 Note. — Formánek, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904—06 (1904), p. 24 (subg. *Urometopus)*. — Österreich, Südrußland, Kaukasus, Kaspisee-Gebiet

rugifrons Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XXIV, 1, 1851, p. 52. — Seidlitz, Otior- — Krim

rhynchid. 1868, p. 60. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 98; Best.-Tab. 13, 1885, p. 42.
rugosifrons Marseul, Abeille XI, 1873, p. 567.
swaneticus Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr 1897, p. 202 ♂ ♀ *(Omias)*. — Formánek, Münch. Kol. Zeitschr. II, 1904—06 (1904), p. 18, 21, fig. 4 (subg. *Urometopus*). Kaukasus, Swanetien
11

12. Tribus: Laparocerini.

Otiorrhynchides gr. *Laparocerides* Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 145, 196.
Otior rhynchides gr. *Laparocerides* Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 280.
Curculionidae subfam. *Laparocerides* Woll. Col. Atlant. 1865, p. 309.

Aomus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 532; l. c. VII, 1, 1843, p. 159. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 328 (*Anomus* emend.). — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 106. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 202. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 282; Otiorrhynchid. 1868, p. 3, 48; Arch. f. Nat. LXVIII, 2, 1902, p. 241. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 6; l. c. XI, 1873, p. 490. — Faust, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 232. — Pic, Échange XVII, 1901, p. 87—88. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Bestimm.-Tab. 68), p. 17; Fauna Germ. V, 1916, p. 37.

elongatus Pic, Échange XVII, 1901, p. 87. Arabien
minutissimus Pic, l. c. p. 87. „
politus Pic, l. c. p. 87. „
var. *brunnescens* Pic, l. c. p. 88.
pubescens Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curcul. II, 2, 1834, p. 533 ♀; l. c. VII, 1, 1843, p. 159. — Falderm. Fauna Ent. Transcauc. II, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou V, 1837, p. 209, t. 5, f. 1; l. c. III; l. c. IV, 1838, p. 182. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 328. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 427. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 491 ♂ ♀. Araxes, Persien
similaris Pic, Échange XVII, 1901, p. 88. Arabien
subdentatus Pic, l. c. p. 88. „
ventricosus Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) X, 1880, p. Bull. p. V *(? Aomus)*. Syrien
7

Aphyonotus Faust.

Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 239.

lepidopterus Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 244 ♂ ♀. — Gestro, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 410. Arussi Galla, Ganale Guddà

nitidus Gestro, l. c. p. 411. — Arussi Galla: Alto Ganale

pectorosus Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 242 ♂ ♀. — Gestro, l. c. p. 410. — Hustache, Res. Scient. Voyage Rothschild Éthiopie II, 1922, p. 737. — Arussi Galla, Ganale Guddà

sodalis Faust, Ann. Mus. Civ. Genova XXXV, 1895, p. 243 ♂ ♀. — Gestro, l. c. p. 410. — Arussi Galla, Cormoso

zophosioides Faust, l. c. p. 240 ♂ ♀. — Gestro, l. c. p. 410. — „

5

Asmaratrox Heller.

Heller, Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 235.

coxalis Heller, l. c. p. 236, fig. 3, 4, 6. — Erythraea: Asmara

Helleri Hartm. l. c. XXXIII, 1914, p. 198 ♂ ♀. — „

intrusus Heller, l. c. p. 237, f. 5. — „

3

Cyrtozemia Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XI, 1872, p. 443. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchophora I, 1916, p. 252—53.

Cyrtomezia Rye, Zool. Record Ins. IX, 1872 (1873), p. 287 (err.).

cognata Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchophora I, 1916, p. 255 ♂. — Bombay

dispar Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XI, 1872, p. 443. — Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchophora I, 1916, p. 253 ♂ ♀, f. 78. — „

2

Laparocerus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 530; l. c. VII, 1, 1843, p. 228. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 328. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 360; Cat. Col. Canar. 1864, p. 340. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. CXX & 742; l. c. ed. 3, II, 1874, p. CXXXII; l. c. II, 1874, p. 229. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 198. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. 1865, p. 282; Otiorrhynchid. 1868, p. 48. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 512.

Amyntas Woll. Col. Atlant. 1865, p. 55.

Subg. *Amphora* Woll. Cat. Canar. Col. 1864, p. 335 (non Ehrl.). — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 540.

Subg. *Atlantis* Woll. Ins. Mader. 1854, p. 361, t. 7, f. 3—6. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 200. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 48. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 539.

Subg. *Canopus* Marseul, Abeille XI, 1873, p. 541.

Subg. *Cyphoscelis* Woll. Ins. Mader. 1854, p. 356, t. 7, f. 2. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 200. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 48. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 537.

Subg. *Laparocerus* Marseul, l. c. p. 513.

aenescens Woll. Ins. Mader. 1854, p. 383 *(Omias)*; Cat. Col. Madeira 1857, p. 115; Col. Atlant. — Madeira

1865, p. 314 (subg. *Atlantis*). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 187, Note *(Laparocerus)*. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 556 (subg. *Atlantis*).

aethiops Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 347; Col. Atlant. 1865, p. 319. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 522 (subg. *Laparocerus*). Hierro

angustulus Woll. Cat. Col. Madeira 1857, p. 116 *(Omias)*; Col. Atlant. 1865, p. 314 (subg. *Atlantis*). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 187, Note *(Laparocerus)*. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 555 (subg. *Atlantis*). Madeira

azoricus Douet, Rev. Mag. Zool. 1859, p. 256. — Crotch, Proc. Zool. Soc. London 1867, p. 388, t. 23, f. 6. Azoren

calcatrix Woll. Ins. Mader. 1854, p. 366 *(Atlantis)*; Cat. Col. Madeira 1857, p. 113; Col. Atlant. 1865, p. 311 (subg. *Atlantis*). Madeira

calcator Marseul, Abeille XI, 1873, p. 546 (subg. *Atlantis*).

canariensis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 228. — Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 335 (subg. *Amphora*); Col. Atlant. 1865, p. 309. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 540 (subg. *Atlantis*). Teneriffa

clavatus Woll. Ins. Mader, 1854, p. 363, t. 7, f. 3 *(Atlantis)*; Cat. Col. Madeira 1857, p. 113; Col. Atlant. 1865, p. 315 *(Laparocerus)*. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 513 (subg. *Laparocerus*). Madeira

compactus Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 359; Col. Atlant. 1865, p. 325. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 536 (subg. *Laparocerus*). Grande Canaria

rassifrons Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XI, 1863, p. 220; Cat. Col. Canar. 1864, p. 346; Col. Atlant. 1865, p. 319. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 521 ♂ ♀ (subg. *Laparocerus*). Teneriffa

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 150.

crassirostris Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 345; Col. Atlant. 1865, p. 319. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 520 (subg. *Laparocerus*). Grande Canaria

debilis Woll. Col. Atlant. 1865, p. 324. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 532 (subg. *Laparocerus*). Teneriffa

dispar Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 357; Col. Atlant. 1865, p. 323. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 531 ♂ ♀ (subg. *Laparocerus*). Lanzarote

distortus Woll. Ins. Mader. 1854, p. 556, t. 7, f. 2 ♂ *(Cyphoscelis)*; Cat. Col. Madeira 1857, p. 113; Col. Atlant. 1865, p. 315. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 200 Note. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 538 ♂ ♀ (subg. *Cyphoscelis*). Madeira

doramasensis Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXII, 1929, p. 352, figs. Canarien

ellipticus Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XI, 1868, p. 220; Cat. Col. Canar. 1864, p. 351; Col. Atlant. 1865, p. 321. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 525 ♂ ♀ (subg. *Laparocerus*). Teneriffa, Gomera, Palma

excavatus Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XI, 1863, p. 219; Cat. Col. Canar. 1864, p. 343; Col. Atlant. 1865, p. 317. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 517 ♂ (subg. *Laparocerus*). — Heyne & Taschenb. Exot. Käfer 1903—08 (1908), p. 226, t. 30, f. 7. — Teneriffa, Gomera

excelsa Woll. Ins. Mader. 1854, p. 378 *(Atlantis)*; Cat. Col. Madeira 1857, p. 115; Col. Atlant. 1865, p. 313 (subg. *Atlantis*). — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 553 (subg. *Atlantis*). — Madeira

globulipennis Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 349; Col. Atlant. 1865, p. 320. — Palma

globulosipennis Marseul, Abeille XI, 1873, p. 524 (subg. *Laparocerus*).

gracilis Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 356; Col. Atlant. 1865, p. 323. — Gomera

gomeraecola Marseul, Abeille XI, 1873, p. 531 ♂ ♀ (subg. *Laparocerus*).

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 150.

Grayanus Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XI, 1863, p. 219 *(Atlantis)*; Cat. Col. Canar. 1864, p. 240; Col. Atlant. 1865, p. 310 (subg. *Canopus*). — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 544 (subg. *Atlantis*). — Grande Canaria

grossepunctatus Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 344; Col. Atlant. 1865, p. 318. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 518 ♂ ♀ (subg. *Laparocerus*). — Teneriffa

hirtus Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 348; Col. Atlant. 1865, p. 320. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 522 (subg. *Laparocerus*). — Grande Canaria

inaequalis Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) XI, 1863, p. 220; Cat. Col. Canar. 1864, p. 348; Col. Atlant. 1865, p. 320. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 523 (subg. *Laparocerus*). — Teneriffa

inconstans Woll. Ins. Mader, 1854, p. 375 *(Atlantis)*; Cat. Col. Madeira 1857, p. 115; Col. Atlant. 1865, p. 312 (subg. *Atlantis*). — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 551 (subg. *Atlantis*). — Porto Santo

indutus Woll. Col. Atlant. 1865, p. 325, App. p. 53. — Gomera

tectus Marseul, Abeille XI, 1873, p. 535 ♂ (subg. *Laparocerus*).

inflatus Woll. Col. Atlant. 1865, p. 321, App. p. 51. — „

tumens Marseul, Abeille XI, 1873, p. 526 (subg. *Laparocerus*).

instabilis Woll. Ins. Mader. 1854, p. 377 *(Atlantis)*; Cat. Col. Madeira 1857, p. 115; Col. Atlant. 1865, p. 313 (subg. *Atlantis*). — Marseul. Abeille XI, 1873, p. 552 (subg. *Atlantis*). — Punto Santo, Ilhio Chao?, Bugio?

lamellipes Woll. Ins. Mader. 1854, p. 364, t. 7, f. 5 *(Atlantis)*; Cat. Col. Madeira 1857, p. 113; Col. Atlant. 1865, p. 310 *(Atlantis)*. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 544 ♂ ♀ (subg. *Atlantis*). — Madeira

lanatus Woll. Ins. Mader. 1854, p. 372, t. 7, f. 6 *(Atlantis)*; Cat. Col. Madeira 1857, p. 114; Col. Atlant. 1865, p. 312 (subg. *Atlantis*). — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 549 ♂ ♀ (subg. *Atlantis*). — „

lepidopterus Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 352; Col. Atlant. 1865, p. 321. — Teneriffa, Palma, Hierro, Grande Canaria?

bellopterus Marseul, Abeille XI, 1873, p. 527 (subg. *Laparocerus*).

mendax Woll. Ins. Mader. 1854, p. 376 *(Atlantis)*; Cat. Col. Madeira 1857, p. 115; Col. Atlant. 1865, p. 313 (subg. *Atlantis*). — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 552 (subg. *Atlantis*). — Punto Santo

mendicus Woll. Cat. Col. Canar. 1854, p. 355; Col. Atlant. 1865, p. 323. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 530 ♂ ♀ (subg. *Laparocerus*). — Hierro

morio Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 531; l. c. VII, 1, 1843, p. 228. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 328. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 300, t. 7, f. 1; Cat. Col. Madeira 1857, p. 113; Cat. Col. Canar. 1864, p. 341; Col. Atlant. 1865, p. 316. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 740; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 229. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Curc. 1854, t. 15, f. 69. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 199 Note. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 513 ♂ ♀ (subg. *Laparocerus*). — Madeira, Teneriffa; Gomora (nicht Portugal)

navicularis Woll. Ins. Mader. 1854, p. 374 *(Atlantis)*; Cat. Col. Madeira 1857, p. 114; Col. Atlant. 1865, p. 312 (subg. *Atlantis*). — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 550 (subg. *Atlantis*). — Punto Santo

noctivagans Woll. Ins. Mader. 1854, p. 367; Cat. Col. Madeira 1857, p. 114; Col. Atlant. 1865, p. 311 (subg. *Atlantis*). — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 547 ♂ ♀ (subg. *Atlantis*). — Woll. Tr. Ent. Soc. London 1871, p. 273. — Madeira

australis Woll. Ins. Maderens. 1854, p. 370 *(Atlantis)*.

lauripotens Woll. Ins. Maderens. 1854, p. 369 *(Atlantis)*; Trans. Ent. Soc. London 1871, p. 273. — Funchal

obesulus Desbr. Frelon XII, 1904, p. 63 ♀. — Madeira

obscurus Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 355; Col. Atlant. 1865, p. 322. — Teneriffa

obscurellus Marseul, Abeille XI, 1871, p. 529 (subg. *Laparocerus*).

obsitus Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 361; Col. Atlant. 1865, p. 324. — Grande Canaria

persitus Marseul, Abeille XI, 1873, p. 534 (subg. *Laparocerus*).

obtriangularis Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 351; Col. Atlant. 1865, p. 321. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 525 ♀ (subg. *Laparocerus*). — Teneriffa

occidentalis Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 350; Col. Atlant. 1865, p. 350. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 524 (subg. *Laparocerus*). — Hierro

opacus Woll. Col. Atlant. 1865, App. p. 52. — Gomera

piceus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 531; l. c. VII, 1, 1843, p. 228. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 740; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 229. — Madeira, Portugal

puncticollis Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 362; Col. Atlant. 1865, p. 325. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 535 ♂ ♀ (subg. *Laparocerus*). Hierro

rasus Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 354; Col. Atlant. 1865, p. 322. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 527 ♂ ♀ (subg. *Laparocerus*). Lanzarote, Fuerteventura

scapularis Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 347; Col. Atlant. 1865, p. 319. Teneriffa

Wollastoni Marseul, Abeille XI, 1873, p. 521 (subg. *Laparocerus*).

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 150.

Schaumi Woll. Ins. Mader. 1854, p. 379 *(Atlantis)*; Cat. Col. Madeira 1857, p. 115; Col. Atlant. 1865, p. 313 (subg. *Atlantis*). — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 554 (subg. *Atlantis*). Madeira, Punto Santo

Florae Woll. Ins. Mader. 1854, p. 380 *(Atlantis)*.

seniculus Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 353; Col. Atlant. 1865, p. 322. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 528 (subg. *Laparocerus*). Grande Canaria

squamosus Brullé in Webb & Berthelot, Hist. Nat. Iles Canar. Col. 1838, p. 71 *(Otiorrhynchus)*. — Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 344 *(Laparocerus)*; Col. Atlant. 1865, p. 318. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 519 ♂ ♀ (subg. *Laparocerus*). Teneriffa

sculptus Brullé in Webb et Berthelot, Hist. Nat. Iles Canar. Col. 1838, p. 71 *(Otiorrhynchus)*. — Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 341 *(Laparocerus)*; Col. Atlant. 1865, p. 317. — Lacord. Gen. Col. VI, 1866, p. 201, Note. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 516 (subg. *Laparocerus*). Palma

subnebulosus Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 337 *(Atlantis)*; Col. Atlant. 1865, p. 309 (subg. *Canopus*). — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 541 ♀ (subg. *Atlantis*). Grande Canaria

subopacus Woll. Col. Atlant. 1865, p. 322; App. p. 52. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 528 (subg. *Laparocerus*). Gomera

sulcirostris Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 359; Col. Atlant. 1865, p. 326. Grande Canaria

canalirostris Marseul, Abeille XI, 1873, p. 537 (subg. *Laparocerus*).

tenellus Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 362; Col. Atlant. 1865, p. 325. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 534 ♂ (subg. *Laparocerus*). Teneriffa

tessellatus Brullé in Webb & Berthelot, Hist. Nat. Iles Canar. Col. 1838, p. 72, t. 1, f. 15 *(Omias)*. — Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 360; Col. Atlant. 1865, p. 324. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 533 (subg. *Laparocerus*). Teneriffa, Palma, Hierro

tetricus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 542 *(Eremnus)*; l. c. VII, 1, 1843, p. 228 *(Laparocerus)*. — Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 338; Col. Atlant. 1865, p. 310 (subg. *Canopus*). — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 543 ♂ ♀ (subg. *Atlantis*). Teneriffa

simplex Brullé in Webb & Berthelot, Hist. Nat. Iles Canar. Col. 1838, p. 71 *(Omias)*.

tibialis Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 338 *(Atlantis)*; Col. Atlant. 1865, p. 309 App. p. 55 (subg. *Canopus*). — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 542 ♂ ♀ (subg. *Atlantis*). — Teneriffa, Palma, Hierro

incomptus Woll. Col. Atlant. 1865, App. p. 55 *(Lichenophagus)*.

undatus Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 342; Col. Atlant. 1865, p. 317. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 517 (subg. *Laparocerus*). — Teneriffa

undulatus Woll. Ann. Mag. Nat. Hist. (3) X, 1862, p. 332; Col. Atlant. 1865, p. 315, App. p. 51. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 514 *Laparocerus*). — Madeira

ventrosus Woll. Ins. Mader. 1854, p. 382 *(Omias)*; Cat. Col. Madeira 1857, p. 115; Col. Atlant. 1865, p. 314 *(Atlantis)*. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 555 (subg. *Atlantis*). — ,,

vespertinus Woll. Ins. Mader. 1854, p. 371, t. 7, f. 4 *(Atlantis)*; Cat. Col. Madeira 1857, p. 114; Col. Atlant. 1865, p. 311 *(Atlantis)*. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 548 ♂ ♀ (subg. *Atlantis*). — ,,

vestitus Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 358; Col. Atlant. 1865, p. 324. — Teneriffa

velatus Marseul, Abeille XI, 1873, p. 548 ♂ ♀ (subg. *Laparocerus*).

var. *affinis* Marseul, l. c. p. 533.

Waterhousei Woll. Ins. Mader. 1854, p. 384, t. 7, f. 8 *(Omias)*; Cat. Col. Madeira 1857, p. 116; Col. Atlant. 1865, p. 315 (subg. *Atlantis*). — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 557 (subg. *Atlantis*). — Madeira

61

Lichenophagus Woll.

Woll. Ins. Mader. 1854, p. 389. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 188. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 282; Otiorrhynchid. 1868, p. 4, 48. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 505.

acuminatus Woll. Ins. Mader. 1854, p. 391, t. 8, f. 3; Cat. Col. Madeira 1857, p. 117; Col. Atlant. 1865, p. 329. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 507. — Madeira

auctus Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 363; Col. Atlant. 1865, p. 329. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 507. — Gomera, Hierro

var. *amplificata* Woll. Col. Atlant. 1865, p. 330, Note; App. p. 54, Note. — Gomera

buccatrix Woll. Col. Atlant. 1865, p. 332, App. p. 54.

buccator Marseul, Abeille XI, 1873, p. 512.

fritillus Woll. Ins. Mader. 1854, p. 390, t. 8, f. 1; Cat. Col. Madeira 1857, p. 117; Col. Atlant. 1865, p. 329. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 506. — Punto Santo

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 52.

impressicollis Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 68; Col. Atlant. 1865, p. 332. — Teneriffa

fossicollis Marseul, Abeille XI, 1873, p. 511.

persimilis Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 365; Col. Atlant. 1865, p. 331. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 509. — Teneriffa, Palma

sculptipennis Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 367; Col. Atlant. 1865, p. 331. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 510. — Palma, Hierro

subnodosus Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 366; Col. Atlant. 1865, p. 331. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 509.

tesserula Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 364; Col. Atlant. 1865, p. 330. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 538. — Teneriffa

9

Merimnetes Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 253. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 204. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1865, p. 2.

aequalifrons Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VIII, 1893 (1894), p. 259. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 18. — N.S.Wales

var. *compactus* Lea, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XV, 1915, p. 395.

Biologie: Froggatt, Agric. Gaz. N. S. Wales IX, 1898, p. 6; Bull. Deptm. Agric. N. S. Wales 1911, Nr. 2.

australis Boisd. Voy. Astrolabe II, 1835, p. 348 *(Lagostomus)*. — Schönh. Gen. Spec. Curc. V, 2, 1840, p. 898 *(Dermatodes)*. — Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1911, p. 69 *(Merimnetes)*. — Australien

celmisiae Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 15. — N.S.Wales, Victoria

decipiens Lea, l. c. p. 16. — Tasmanien

fagi Lea, l. c. p. 13. — ,,

montanus Lea, l. c. p. 14. — ,,

simplicipennis Lea, l. c. p. 14. — ,,

uniformis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 254. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 17. — Australien

viridis Lea, l. c. p. 15. — N.S.Wales

9

Neomerimnetes Blackb.

Blackb. Proc. Roy. Soc. Victoria XII, 1900, p. 226. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 16.

destructor Blackb. Proc. Roy. Soc. Victoria XII, 1900, p. 227. — Südaustralien

inflatus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIV, 1910, p. 16. — Queensland

rivularis Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1911, p. 71. N.W.-Australien

sobrinus Lea, l. c. p. 70. Queensland
4

Straticus Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. London XIX, 1886, p. 326.

funestus Pascoe, l. c. p. 327. Mamboia
1

13. Tribus: Nastini.

Otiorrhynchinae trib. *Nastini* Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 9, 17; Fn. Germ. V, 1916, p. 15.

Nastus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 405. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. CXX & 751; l. c. ed. 3, I, 1874, p. CXXXII, II, 1874, p. 207. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 405. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 282; Otiorrhynchid. 1868, p. 3, 23; Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Gatt. p. 158; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 158. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 472. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 407, 606; Best.-Tab. 9, 1883, p. 7, 204. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 259. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 177—214 (Revision). — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 17.

Albinae Form. Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 181, 191 ♀. Cirkassien

albolineatus (Reitter) Form. l. c. p. 184, 205 ♂ ♀. Turkestan: Alexander-Gebirge

amoebaeus Suvorov, Rev. Russe Ent. XII, 1912, p. 479. Turkestan: Alexander-Gebirge

beatus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 102 ♂ ♀. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 184, 202 ♂ ♀. Mongolei: Tarbagatai

circassicus Reitter, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 260, 261. — Formánek, l. c. XXVIII, 1909, p. 181, 189. W.-Kaukasus

concinnus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 104 ♀. — Formánek, l. c. XXVIII, 1909, p. 183, 201. N.-Persien

costatus Formánek, l. c. p. 186, 211 ♂. Turkestan

devians Faust, Stett. Ent. Zeit. XLV, 1884, p. 449 ♂ ♀. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 261. — Formánek, l. c. XXVIII, 1909, p. 180, 187 ♀. Armenien

Fausti Reitter, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 259, 261. — Formánek, l. c. XXVIII, 1909, p. 180, 188 ♂ ♀. Cirkassien: Fischt, Abager

Goryi Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 406 *(Otiorrhynchus)*. — Jacq du Val, Gen. Col. d'Eur. Curc. 1854, t. 21, f. 98. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 751; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 207. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 458. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 23. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 473. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 606; Best.-Tab. 9, 1883, p. 204. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 260. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 183, 200. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16, (1913), p. 1047, t. 37, f. 8. — Krim, Kaukasus, Kirghisensteppe

Helleri Form. Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 186, 213 ♂ ♀. — Sarafschan, Buchara

Heydeni Form. l. c. p. 182, 193 ♀. — Turkestan

humatus Germ. Ins. Spec. Novae I, 1824, p. 354 *(Otiorrhynchus)*. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1834, p. 620 *(Otiorhynchus)*; l. c. VII, 1, 1843, p. 407 *(Nastus)*. — Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 1847, p. 529. — Kol. l. c. XXXI, 2, 1858, p. 458. — Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 23. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 474. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1883, p. 607; Best.-Tab. 9, 1883, p. 205. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 261 ♂ ♀. — Formánek, l. c. XXVIII, 1909, p. 180, 186 ♂ ♀. — Südrußland, Kaukasus

Kraatzi Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXV, 1891, p. 390 ♂ ♀. — Form. Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 185, 207 ♂ ♀. — Alai, Turkestan: Alexander-Gebirge, Taluss-Tal

Kuschakewitschi Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 105 ♂ ♀. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 185, 210. — Buchara, Issykul, Wjernoe

latifrons Form. l. c. p. 185, 209 ♀. — Turkestan: Alexander-Gebirge

Lederi Reitter, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 260, 261. — Formánek, l. c. XXVIII, 1909, p. 181, 189 ♂ ♀. — Cirkassien

lineatus Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVIII, 1887, p. 179 ♂. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 183, 196 ♂ ♀. — Turkestan: Kyndyr-Tau

Lokayi Form. l. c. p. 184, 203 ♂. — Buchara

longicornis Form. l. c. p. 183, 199 ♀. — Taschkent

luteosquamosus Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 295. — Form. Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 184, 204. — Turkestan: Namangan, Alexander-Gebirge

margelanicus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 54. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 182, 195 ♂ ♀. — Margelan, Turkestan

var. *fraternus* Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1883, p. 107 ♂. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 195. — Samarkand

var. *speculator* Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 107. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 195. — „

var. *tigrinus* Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 106 ♂. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 195. — „

var. *turbatus* Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 55. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 195.

mucoreus Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 185, 210 ♀. — Semirjetschensk

Oschanini Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 55. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 183, 198. — Turkestan, Wernoje

prolixus Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVIII, 1887, p. 179 ♀. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 186, 212 ♀. — „

sareptanus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 102 Note ♂. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1883, p. 607; Best.-Tab. 9, 1883, p. 183. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 260. — Formánek, l. c. XXVIII, 1909, p. 183, 200. — Südrußland: Sarepta, Kaukasus, Ural

Seidlitzi Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 105 ♀. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 182, 196 ♂ ♀. — Mongolei: Tarbagatai

Stierlini Faust, l. c. p. 104, Note. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 260. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1883, p. 607; Best.-Tab. 9, 1883, p. 205. — Formánek, Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1909, p. 181, 190. — Kaukasus

sulcifrons Form. l. c. p. 185, 206 ♀. — Turkestan: Alexander-Gebirge

tessellatus Suvorov, Rev. Russe Ent. XII, 1912, p. 481. — Semirdtschje-Gebiet: Dzarkend

trapezicollis Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 103, Note ♀. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1883, p. 607; Best.-Tab. 9, 1883, p. 205. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 260. — Formánek, l. c. XXVIII, 1909, p. 182, 192. — Kaukasus, Lenkoran, Derbent, Ala-Verdi, Mongolei: Tarbagatai

14. Tribus: Eustylini.

Otiorrhynchides gr. *Eustylides* Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 145, 205.

Otiorrhynchides gr. *Eustylides* Seidlitz, Otiorrhynchid. 1868, p. 1.

Brachyrhininae-trib. *Eustylini* Pierce, Proc. U. S. Nat. Museum XLV, 1913, p. 425.

Achrastenus G. H. Horn.

G. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 97. — J. L. Leconte & G. H. Horn, Class. Col. North Amer. ed. 2, in Smithson. Misc. Coll. XXVI, 1883, p. 447. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Museum XLV, 1913, p. 425.

griseus G. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 97. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 426. Texas
Biologie: Mitchell & Pierce, Proc. Ent. Soc. Washington XIII, 1911, p. 50 (Futterpflanze).
1

Aptolemus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 1. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 206.

rufipes Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 2. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 206, t. 65, f. 1. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 282. Brasilien
1

Brachystylus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 433. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 207. — G. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 90. — J. L. Leconte, Smithson. Misc. Coll. XXVI, 1883, p. 453. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 297. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 425. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. North East. Amer. 1916, p. 121, 122.

acutus Say, Journ. Ac. Nat. Sc. Philadelphia III, 1824, p. 310 *(Curculio)*; ed. Leconte II, 1859, p. 173; Descr. North Amer. Curc. 1831, p. 7 *(Chlorophanus)*; ed. Leconte I, 1859, p. 266 *(Brachystylus)*. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 434 *(Brachystylus)*. — G. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 91. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 425. — Blatchl. & Leng, Rhynchoph. North East. Amer. 1916, p. 122. Indiana, Alabama, Pennsylvania, Georgia, Kentucky
Biologie: Beutenmüller, Journ. New York Ent. Soc. I, 1893, p. 38.

cavifrons Hustache, Ann. Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 169. Argentinien

microphthalmus Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 298, t. 14, f. 2 ♂. Mexiko

tamaulipanus Champion, l. c. p. 298 ♂ ♀, t. 14, f. 1 ♀. „
4

Eustylus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 40. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 207. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 225.

aequus Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XVIII, 1916, p. 464. — Brasilien
Bodkini Mshl. l. c. p. 456. — Guiana
bolivianus Mshl. l. c. p. 463. — Brasilien
chiriquensis Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 291, 294, t. 13, f. 27 ♂. — Panama
cinericius Champion, l. c. p. 291, 296 ♂ ♀. — Guatemala
ephippiatus Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XVIII, 1916, p. 458. — Kolumbien
funicularis Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 390. — Peru
grypsatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 27 *(Phyllobius)*. — Champion, l. c. p. 291, 293 ♂ ♀, t. 13, f. 25 ♂. — Mexiko
humilis Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 129. — Peru
inclusus Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XVIII, 1916, p. 461. — Brasilien
magdalensis Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XVIII, 1926, p. 536. — Kolumbien
obliquefasciatus Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XVIII, 1916, p. 445. — Venezuela
placidus Er. Arch. f. Naturg. XIII, 1847, I, p. 129. — Peru
puber Oliv. Entom. V, Nr. 83, 1807, p. 367, t. 4, f. 39 a, b *(Curculio)*. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 41 *(Eustylus)*. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 290, 291. — Kolumbien
quadrigibbus Champion, l. c. p. 291, 292 ♂ ♀, t. 13, f. 23 ♂. — Mexico
ruptus Champion, l. c. p. 291, 293 ♂, t. 15, f. 24 ♂. — Panama
scapularis Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XVIII, 1916, p. 464. — Brasilien
setipennis Champion, l. c. p. 290, 292 ♂, t. 13, f. 21 ♂. — Guatemala
sexguttatus Champion, l. c. p. 290, 291 ♂, ♀, t. 13, f. 20 ♂. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XVIII, 1926, p. 537. — Panama
simplex Mshl. l. c. p. 460. — Kolumbien
simulatus Mshl. l. c. p. 459. — „
sordidus Mshl. l. c. p. 460. — „
striatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 42 *(Eustylus)*. — Champion, l. c. p. 291, 292 ♂ ♀, t. 13, f. 22 ♂. — Mexico
subapterus Champion, l. c. p. 291, 295 ♂ ♀, t. 13, f. 28 ♂. — Mexiko, Guatemala
subfasciatus Voss, Rev. Ent. S. Paulo II, 1932, p. 40. — Paraguay
subguttatus Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XVIII, 1916, p. 462. — Brasilien
subvittatus Mshl. l. c. p. 457. — Venezuela
veraepacis Champion, l. c. p. 291, 294 ♂ ♀, t. 13, f. 26 ♀. — Guatemala

Platyomida White.

White, Voy. Erebus and Terror 1846, p. 14. — Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 415.

Empaeotes Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVIII, 1876, p. 59. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 441. — Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 415.
Eurynotia Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 440. — Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 415.

aculeata Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 442 *(Empaeotes)*. — Neuseeland

aequa Broun, Bull. New Zeal. Instit. Sc. II, 1885, p. 386 *(Empaeotes)*; Man. New Zeal. Col. IV, 1886, p. 932. — Queenstown, Otago

amota Broun, Man. New Zeal. Col. III, 1886, p. 793. — Neuseeland

apicalis Broun, Man. New Zeal. Col. II, 1881, p. 701 *(Empaeotes)*. — „

binodis White, Voy. Erebus and Terror 1846, p. 14 *(Platyomida)*. — „

brevicornis Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XIV, 1904, p. 107. — „

caudata Broun, Bull. New Zeal. Instit. I, 1910, p. 54. — „

censoria Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVIII, 1876, p. 60. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 442 *(Empaeotes)*. — Neuseeland (Otago)

coronata Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 420, t. 13, f. 12. — Neuseeland

crispata Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVIII, 1876, p. 60. — Broun, Man. New Zealand Col. I, 1880, p. 442 *(Empaeotes)*. — Neuseeland (Tairua)

cuprealis Broun, Bull. New Zeal. Instit. I, 1917, p. 407. — Neuseeland

depressa Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1185. — „

dorsalis Broun, Bull. New Zeal. Instit. I, 1917, p. 407. — „

Enysi Broun, Man. New Zeal. Col. IV, 1886, p. 852 *(Empaeotes)*. — „

fuscella Broun, Man. New Zeal. Instit. I, 1917, p. 09. — „

Hamiltoni Broun, Trans. New Zeal. Instit. XLV, 1913, p. 100. — „

Hochstetteri Redtenb. Reise Novara II, 1868, p. 147 *(Ancistropterus)*. — „

pulcherrima Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 440 *(Eurynotia)*. — Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 415 *(Platyomida)*.

humeralis Broun, Bull. New Zeal. Instit. I, 1910, p. 55. — „

hystricula Broun, Bull. New Zeal. Instit. I, 1917, p. 410. — „

latipennis Broun, l. c. p. 411. — „

morosa Broun, Trans. New Zeal. Insit. XLV, 1913, p. 101. — „

niger Broun, Trans. New Zeal. Inst. IX, 1876, p. 373. — „

perniciosa Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 442. Neuseeland
rectirostris Broun, Bull. New Zeal. Instit. I, 1917, p. 409. „
simulatrix Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 421. „
sulcicollis Broun, Bull. New Zeal. Instit. I, 1917, p. 410. „
tibialis Broun, Bull. New Zeal. Instit. I, 1910, p. 56. „
versicolor Broun, Trans. New Zeal. Instit. XLIII, 1911, p. 103. Insel Pitt
verrucosa Broun, Bull. New Zeal. Instit. I, 1914, p. 120. Neuseeland
29

Pseudeustylus Champ.

Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1889—1911 (1911), p. 296.

cupreotinctus Champion, l. c. p. 297 ♂ ♀, t. 13, f. 29 ♀. Panama
cupreoviridis Champion, l. c. p. 297, t. 13, f. 30 ♀. Guatemala
planicollis Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XIV, 1934, p. 626. Cuba
3

Temnoscapus Chevr.

Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) VIII, 1878, Bull. p. LV. — Champion, Biol. Centr.-Amer. IV, 3, 1911, p. 282.

fissirostris Chevr. l. c. p. LV. Bogotá
1

15. Tribus: Phyllobiini.

Brachyrhynchi div. *Phyllobides* Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1, 1833, p. 15; l. c. II, 2, 1834, p. 424; l. c. VII, 1, 1843, p. 1.
Brachyrhynchi div. *Phyllobides* Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 150, 155.
Curculionidae subfam. *Curculionides* trib. *Phyllobiina* C. G. Thomson, Skand. Col. I, 1859, p. 131; l. c. X, 1868, p. 162, 165.
Otiorhynchides Gr. *Phyllobiides* Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 145, 208.
Otiorhynchides Gr. *Phyllobiides* Seidlitz, Otiorhynchidae 1868, p. 1.
Phyllobiides Desbr. Abeille XI, 1873, p. 659—748.
Otiorhynchidae trib. *Phyllobiinii* J. L. Leconte, Amer. Natural. VIII, 1874, p. 454; Proc. Amer. Philos. Soc. XV, Nr. 96, 1876, p. 81, 103; Smithson. Misc. Coll. XXVI, Nr. 507, 1883, p. 451, 456.
Brachyrhinidae trib. *Phyllobiini* Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1883—88 (1883), p. 32, 49; (1886), p. 240.
Brachyrhinae trib. *Phyllobiina* Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 172, 196.
Phyllobiens Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 525, 526.

Brachyrhinae trib. *Phyllobiini* Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 547, 552, 580.

Otiorrhynchinae trib. *Phyllobiini* Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 9, 17; Fn. Germ. V, 1916, p. 15, 39.

Otiorrhynchinae trib. *Phyllobiini* Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 98 (Curcul. Gallo-Rhénan. p. 216).

Otiorrhynchinae trib. *Phyllobiini* Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 14, 72.

Phyllobius Germ.

Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 447. — Latr. Dict. Class. Hist. Nat. XIV, 1822, p. 596; Fam. Nat. Règne Anim. 1825, p. 391; in Cuvier, Règne Anim. ed. 2, V, 1829, p. 80. — Schönherr, Disp. meth. Curc. 1826, p. 180; Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 434; l. c. VII, I, 1843, p. 12. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 147; Man. Brit. Col. 1839, p. 214. — Walton, Ent. Mag. V, 1838; Ann. Mag. Nat. Hist. XVII, 1846, p. 12; Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 307. — Zetterst. Ins. Lapp. I, 1838 (1840), col. 116. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 105. — Redtb. Gatt. Deutsch. Käferfn. 1845, p. 39; Fn. Austr. 1849, p. 39; l. c. ed. 2, 1858, p. CXX, 710; l. c. ed. 3, I, 1874, p. CXXXI & II, 1874, p. 234. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 155, 256. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 132; l. c. VII, 1865, p. 110; l. c. X, 1868, p. 166. — Gutfleisch-Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 450, 493. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 210, 625. — Desbr. Abeille XI, 1873, p. 662, 748 (Monographie). — Tourn. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1—2, 1877, p. 1—9. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 49, 53; (1886), p. 245; (1888), p. 423. — J. L. Leconte, Smiths. Misc. Coll. XXVI, Nr. 507, 1883, p. 456. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 8—9, 1883, p. 407, 607; Best.-Tab. 9, 1883, p. 7, 205; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 208, 233. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Gatt. p. 155, Arten p. 579; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 155, Arten p. 635. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891. — Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 97. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1880, p. 527, 528. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XX, 1902, p. 214—217; Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 17; Fn. Germ. V, 1916, p. 39, 41. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 552, 585. — Vitale, Riv. Ital. Sc. Nat. XXIV, 1904, p. 13 (Schutzfärbung). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, p. 1—66; l. c. XLVII, 1911, p. A, B, G; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 718 (Fabricius-Typen). — Hubenthal, Ent. Blätter V, 1909, p. 22, 174. — Künnemann, Ent. Blätt. V, 1909, p. 112. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 908, 931. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1035, 1048. — Smirnov, Horae Soc. Ent. Ross. XL, 1913, p. 1—150 (Morphologie, Phylogenie, russisch). — Hansen, Flora og Fauna 1915, p. 89—95. — Blatchley & Leng, Rynchoph. North East Amer. 1916, p. 128. — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 394 (Balkanhalbinsel). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 98 (Curc. gallo-rhén. p. 216). — Penecke, Col. Centralbl. II, 1928, p. 269. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 72.

Biologie: Ritsema, Instit. Phytopathologie 1907, p. 41. — Reh in Sorauer, Handb. d. Pflanzenkrankh. III, 1906—13 (1912), p. 544 (Schädling an Obst- und Waldbäumen). —

Cornelius, Jahresber. Ver. Elberf. 1878, p. 48 (Copula *Phyll. ruficornis* Redtb. ♂ mit *Polydrosus micans* F. ♀). — Urban, Ent. Blätt. X, 1914, p. 27, 32.

Subg. **Onychophyllobius** Schilsky.

Schilsky in Küster, Käf. Eur. XLV, 1908, Nr. 1 a.

molitor Schilsky in Küster, Käf. Eur. XLV, 1908, Nr. 1 ♀. — Arabien

Subg. **Pseudomyllocerus** Desbr.

Desbr. Abeille XI, 1873, p. 662, 739. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1883), p. 53; (1886), p. 246. — Stierl. Fauna Col. Helv. II, 1886—98 (1891), p. 233, 238. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), Arten p. 579; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 635. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1048. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. A & E. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 100 (Curc. gallo-rhén. p. 218).

albidus L. Miller, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXXIII, 1883, p. 265, 286 ♀. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908 ♂ ♀ (subg. *Pseudomyllocerus*). — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 402. — Porta, Fn. Col. Ital. V, 1932, p. 77. — Griechenland: Parnass, Karpenisi, Chelmos, Morea; Dalmatien

fallax Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, p. 13. — Griechenland: Veluchi

caucasicus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 616 (subg. *Phyllobius*); Best.-Tab. 9, 1883, p. 214. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. E (subg. *Pseudomyllocerus*). — Kaukasus

cinerascens F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 467 (*Curculio*). — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 214, t. 2, f. 75; p. 497. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 54, Note. — Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 289; Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 794. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 587. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908 ♂ ♀ (subg. *Pseudomyllocerus*); l. c. XLVII, 1911, p. E. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 934. — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 46, t. 154, f. 22 (subg. *Pseudomyllocerus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 102, 123 (Curc. Gallo.-rhén. p. 220, 241). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 879. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 77. — Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich (Rhône-Becken), Norditalien

Biologie: Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 73.

mus F. Syst. El. II, 1801, p. 524 (*Curculio*). — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804,

p. 166 *(Brachyrhinus)*. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 451; l. c. VII, I, 1843, p. 29. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 432; l. c. ed. 2, 1858, p. 711; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 235. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 259. — Gutfleisch & Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 494. — Desbr. Abeille XI, 1873, p. 739, Nr. 3, p. 742. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 630 (subg. *Pseudomyllocerus)*; Best.-Tab. 9, 1883, p. 228; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 238. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten, p. 582 ♂ ♀ (subg. *Pseudomyllocerus)*; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 639 ♂ ♀. — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 402.

Biologie: Mathieu, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 201. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1868, p. 32. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 235. — Pirazzoli & Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 151; l. c. XVIII, 1886, p. 291.

canescens Germ. Ins. spec. novae I, 1824, p. 451 *(Phyllobius)*. — Stev. Mus. Mosq. II, 1829, p. 94 *(Ptochus)*.

ophthalmicus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93, Nr. 1 (1888), p. 12. — Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 266; Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 774; l. c. XIII, 1916, p. 402. — Kroatien: Ludbreg

dorsalis Mannerh. in Hummel, Essais Ent. IV, 1825, p. 34 *(Polydrusus)*; in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 451; l. c. VII, I, 1843, p. 28 *(Phyllobius)*. — Gebler in Ledebour, Reise Altai-Gebirge II, 1830, Nr. III, p. 168. — Kol. Bull. Soc. Natur. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 405. — Desbr. Abeille XI, 1873, p. 739, 740. — Stierl. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 630; Best.-Tab. 9, 1883, p. 228 (subg. *Pseudomyllocerus)*. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. F (subg. *Pseudomyllocerus*).

Paganettii Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. F ♂ ♀ (subg. *Pseudomyllocerus)*. — Holdhaus, Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 349—350. — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 402. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 879. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 77. — Italien: Emilia, Toscana, Abruzzi, Lazio, Puglie, Sicilia (Madonie)

Schneideri Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. F ♂ ♀ (subg. *Pseudomyllocerus)*. — Kaukasus: Cirkassien, Utsch Dere, Tiflis, Meskisches Gebirge

sinuatus F. Syst. El. II, 1801, p. 528 *(Curculio)*. — Ill. Mag. Ins.-Kunde VI, 1807, p. 314. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 452 *(Phyllobius)*; l. c. VII, I, 1843, p. 29. — Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 1847, p. 196. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 432; ed. 2, 1858, p. 711; ed. 3, II, 1874, p. 235. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 259. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 405. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 495. — Desbr. Abeille XI, 1873, Nr. 2, p. 740, 741. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 55; (1886), p. 246 (subg. *Pseudomyllocerus*). — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 631; Best.-Tab. 9, 1883, p. 229; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 238. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten, p. 582 ♂ ♀; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten, p. 639 ♂ ♀ (subg. *Pseudomyllocerus*). — Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 289; Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 795. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 528, 529. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 587. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 10 ♂ ♀; l. c. XLVII, 1911, p. F (subg. *Pseudomyllocerus*). — Pic, Bull. Soc. Ent. France 1910, p. 154. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 934. — Holdhaus, Wien. Ent. Zeit. XXXIV, 1915, p. 349. — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 46, t. 154, f. 23. — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 402. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 102, 122 (Curc. Gallo-rhén. p. 220, 240) *(Pseudomyllocerus)*. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 879. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 77.

Belgien, Frankreich, Deutschland, Österreich, Bosnien, Herzegovina, Montenegro, Serbien, Italien (Sicilia)

Biologie: Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1868, p. 32. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 153; l. c. XVIII, 1886, p. 292. — Bourgeois, Mitteil. Nat. Ges. Colmar (n. s.) VIII, 1905—06 (1906), p. 212. — Kleine, Ent. Blätter VI, 1936, p. 72.

neapolitanus Pic, Échange XVIII, 1902, p. 26 *(Ptochus)*; l. c. XXII, 1906, p. 66 *(Phyllobius)*. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn XLIV, 1905 (1906) (Best.-Tab. 58), p. 240 ♂ ♀ *(Phyllobius)*. — Weise in Heyden, Reitter, Weise, Cat. Col. Eur. ed. 2, 1906, col. 614 (subg. *Parascythropus*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 10. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 122 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 240) (subg. *Pseudomyllocerus*).

Italien (Neapel)

Subgen. **Parnemoicus** Schilsky.

Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. B. J. — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 406. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 100 (Curcul. Gallo-rhén. p. 218) *(Parnemoecus)*.

Parnemoicus Reitter, Fauna Germ. V, 1916, p. 41.

armeniacus Kirsch in Schneider & Leder, Beitr. Kenntn. Kaukas. Käferfn. in Verh. Nat. Ver. Brünn XVII, 1878 (1879), p. 25 ♂ ♀. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 627; Best.-Tab. 9, 1883, p. 226 (subg. *Phyllobius)*. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 17 ♂ ♀ (subg. *Phyllobius)*; l. c. XLVII, 1911, p. K (subg. *Paranemoicus)*. — Kaukasus: Meskisches Gebirge; Borshom, Armenien

var. *rufulus* Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 17.

Sahlbergi Faust, Oef. Finska Vet.-Soc. Förh. XXXII, 1890, p. 67 ♂ ♀; Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 202. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 15 ♀ (subg. *Phyllobius)*; l. c. XLVII, 1911, p. k (subg. *Parnemoicus)*. — Reitter, Fauna Germ. V, 1916, p. 41 (subg. *Paranemoicus)*. — West-Sibirien: Verchne Sujetuk, Minuzinsk

viridicollis F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 469 *(Curculio)*; Syst. El. II, 1801, p. 528. — Panz. Fn. Ins. Germ. II, 1794, Heft 19, t. 13; Deutschl. Ins.-Fn. 1795, p. 328. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 222, t. 75, f. 12. — Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 309. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 170 *(Brachyrhinus)*. — Oliv. Entom. V, 1807, Nr. 83, p. 379, t. 20, f. 268 *(Curculio)*. — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 273 *(Curculio)*; in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 461 *(Phyllobius)*; l. c. VII, I, 1843, p. 36 *(Phyllobius)*. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 151; Man. Brit. Col. 1839, p. 250. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1835), p. 116 *(Curculio)*. — Walton, Ent. Mag. V, 1838, p. 8; Ann. Mag. Nat. Hist. XVII, 1846, p. 16; Brit. Ins. Curc. 1844—52, p. 61; Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 311. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 433; ed. 2, 1858, p. 712; ed. 3, II, 1874, p. 236. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 261. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 496. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 110 ♂ ♀ (subg. *Nemoicus)*; l. c. X, 1868, p. 170. — Desbr. Abeille XL, 1873, p. 671, 732 ♂ ♀. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 54, Note. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 627 (subg. *Phyllobius)*; Best.-Tab. 9, 1883, p. 225; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 237. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 — Nord- und Mitteleuropa, Nord- und Mittelitalien, Bosnien, Herzegovina

(1890), Arten p. 581; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 638 (subg. *Phyllobius*). — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 204—206 ♂ ♀; l. c. VI, 1913, p. 306. — Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 288; Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 793; l. c. XIII, 1916, p. 406. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 587. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 14 ♂ ♀ (subg. *Phyllobius*); l. c. XLVII, 1911, p. J (subg. *Paranemoicus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 933. — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 41, 45, t. 154, f. 20 (subg. *Parnemoicus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 100, 118 (Curc. Gallo-rhén. p. 218, 236). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 878. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 76.

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 153; (excl. cit. plur.); l. c. XVIII, 1886, p. 292. — Rupertsberger, Biol. Lit. Käfer Eur. 1894, p. 203, Note. — Bourgeois, Mitteil. Nat. Ges. Colmar (n. F.) VIII, 1905—06 (1906), p. 212. — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 73. — Reh in Sorauer, Handb. d. Pflanzenkrankh. III, 1906—13 (1912), p. 544 (Schädling der Obstbäume, Eichen- und Kieferkulturen).

Subgen. **Neripletenus** Reitter.

Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 41.

singularis Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 41, Note ♀ (subg. *Neripletenus*). — Kuldscha

Subgen. **Udanellus** Reitter.

Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 40.

Platycnemidius Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 403.

brevis Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 461; Boh. l. c. VII, 1, 1843, p. 35. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 409. — Desbr. Abeille XI, 1873, p. 672, p. 735 ♂ ♀. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 237. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 628; Best.-Tab. 9, 1883, p. 226 (subg. *Phyllobius*). — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 639 (subg. *Phyllobius*). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 239. — Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 289; Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 794. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 20 ♂ ♀ (subg. *Phyllobius*); l. c. XLVII, 1911, p. M (subg. *Subphyllobius*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. — Österreich (Wien), Ungarn, Kroatien, Dalmatien, Herzegovina, Bosnien, Dobrudscha, Südrußland, Armenien (Erivan), Südwest-Sibirien, Zentralasien (Thian-Schan)

Käfer Deutschl. 1912, p. 934. — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 41, 45 (subg. *Udanellus*).

irroratus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 37 ♂. — Gebler, Bull. Soc. Nat. Moscou XXI, 1848, p. 357. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 412. — Marseul, Abeille VI, 1869, p. 154, Note. — Sibirien

planirostris Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 462; l. c. VII, I, 1843, p. 38. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 412.

seriehispidus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1834, p. 464; l. c. VII, I, 1843, p. 38 ♂. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 413. — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 403. — Südrußland, Dalmatien

sulcirostris Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 462; l. c. VII, I, 1843, p. 37. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 412. — Desbr. Abeille XI, 1873, p. 672 ♂ ♀. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 627; Best.-Tab. 9, 1883, p. 225 (subg. *Phyllobius*). — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 582; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 638 (subg. *Phyllobius*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 19 ♂ ♀ (subg. *Phyllobius*); l. c. XLVII, 1911, p. L (subg. *Subphyllobius*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 934. — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 45. — Wolhynien

suratus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 463; l. c. VII, I, 1843, p. 38. — Gebler, Bull. Soc. Nat. Moscou XXI, 1848, p. 359. — Kol. l. c. XXXI, 2, 1858, p. 413. — Kaukasus

dispar Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 433; l. c. ed. 2, 1858, p. 712; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 236. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 476. — Österreich

var. *cinereus* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 455; l. c. VII, I, 1843, p. 30. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 260. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 713; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 237. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 407. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 495. — Desbr. Abeille XI, 1873, p. 671, 734. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 627; Best.-Tab. 9, 1883, p. 225. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 19; l. c. XVII, 1911, p. L. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 934. — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 45. — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 404. — Südwest-Sibirien, ? Kaukasus

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 151; l. c. XVIII, 1886, p. 291 *(cinereus)*.

♂ **Emgei** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1887), p. 393 ♂. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XI, 1892, p. 239. — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 404. — Griechenland: Parnass, Veluchi, Kephalonia

pseudonothus Apfelbeck, l. c. p. 404. — Kroatien (Küsten), Südbosnien, Herzegovina, Dalmatien, Montenegro, Westalbanien

var. *hypsibatus* Apfelbeck, l. c. p. 404. — Bosnien: Bjelasnica

var. *merditanus* Apfelbeck, l. c. p. 404. — Hochgeb. Albaniens

subsp. *bratislavensis* Roubal, Ent. Blätt. XXXI, 1935, p. 246. — Böhmen (Bratislava)

Subgen. **Subphyllobius** Schilsky.

Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1918, p. C, K. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 100 (Curc. gallo-rhén. p. 218). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 76.

auliensis Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 215. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 27 (subg. *Phyllobius*); l. c. XLVII, 1911, p. A (subg. *Subphyllobius*). — Mittelasien: Aulie-Ata

Bang-Haasi Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 29 ♂ ♀ (subg. *Phyllobius*); l. c. XLVII, 1911, p. Q (subg. *Subphyllobius*). — Buchara

confusus Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 12 ♂ (subg. *Subphyllobius*). — Kaukasus

Hochhuthi Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 628; Best.-Tab. 13, 1883, p. 226 (subg. *Phyllobius*) (non Faust). — Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 266, 289; Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 774, 793. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 12. — „

exaequatus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 162 ♂ ♀. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 22 ♂ ♀. (subg. *Phyllobius)*; l. c. XLVII, 1911, p. N (subg. *Subphyllobius*). — Turkestan: Kur-Kura

femoralis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 36. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 411. — Desbr. Abeille XI, 1873, p. 671, 715. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 202. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 16 ♂ ♀ (subg. *Phyllobius*). — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 40, Note (subg. *Subphyllobius*). — Sibirien: Irkutsk, Kiachta

gracilipes Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. P (subg. *Subphyllobius*). — Amur

Hochhuthi Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 108 (non Stierl.). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 30 ♀ (subg. *Phyllobius*); l. c. XLVII, 1911, p. P (subg. *Subphyllobius*); l. c. XLVIII, 1912, Nr. 12. — ,,

kirgisicus Csiki, Allatt. Közlem. XXI, 1922, p. 34. — W.-Sibirien

mundus Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 104 *(Diallobius)*. — Japan

japonicus (Schilsky) Kôno, Journ. Fac. Agric. Sapporo XXIV, 1930, p. 207.

Schilskyi Kôno, Journ. Fac. Agric. Sapporo XXIV, 1930, p. 207 (nom. nov. für *japonicus* Schilsky nec Faust).

obscuripes (Reitter) Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. O ♂ ♀ (subg. *Subphyllobius*). — Turkestan, Juldus

parvulus Oliv. Entom. V, 1807, p. 381, t. 20, f. 271 *(Curculio)*. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 25 ♂ ♀ (subg. *Phyllobius*); l. c. XLVII, 1911, p. L (subg. *Subphyllobius*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 933. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1051. — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 45 (subg. *Subphyllobius*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 103, 122 (Curc. gallo-rhén. p. 221, 240). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 878. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 76. — Deutschland: Thüringen, Arnstadt, Weimar, Westfalen, Muggendorf, Schwarzwald; Schweiz, Italien: Rovereto, Vallombrosa; Algier, Sibirien

uniformis Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 149 *(Phyllobius)* (non Marsh. 1802); Man. Brit. Col. 1839, p. 250. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 458 *(Phyllobius)*; l. c. VII, I, 1843, p. 35. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1835), p. 115 *(Curculio)*. — Walton, Ent. Mag. V, 1837—38 (1838), p. 7; Ann. Mag. Nat. Hist. XVII, 1846, p. 15; Brit. Ins. Curc. 1844—52, p. 61; Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 310. — Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 1847, p. 498. — Gebler, l. c. XXI, 1848, p. 359. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 433; l. c. ed. 2, 1858, p. 712; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 236. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 260. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 410. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 475. — England

roboretanus Gredler, Zeitschr. Ferdinandeum Innsbruck (3) XXVI, 1882, p. 231. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 630; Best.-Tab. 9, 1883, p. 228 (subg. *Phyllobius*). — Desbr. Frelon I, 1891—92, Nr. 4 (1891), p. 34. — Norditalien: Rovereto

var. *cinereus* (Tourn.) Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, p. 25; l. c. XLVII, 1911, p. L. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 933. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1057. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 878. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 122 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 240). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 76.

russicus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 41; Best.-Tab. 13, 1883, p. 93. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXXI, 1902, p. 216. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 26 ♂ ♀ (subg. *Phyllobius*); l. c. XLVII, 1911, p. M (subg. *Subphyllobius*). — Talysch: Lenkoran; Persien: Astrabad

similis Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. P. & Nr. 14 (subg. *Subphyllobius*). — Baikalsee

Solskyi Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 163 ♂ ♀. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 215. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 28 ♂ ♀ (subg. *Phyllobius*); l. c. XVII, 1911, p. Q (subg. *Subphyllobius*). — Turkestan: Taschkent, Margelan, Kulab, Buchara, Kaschgar

subdentatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 30. — Desbr. Abeille XI, 1873, p. 747. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. L & Nr. 10 ♂ ♀ (subg. *Subphyllobius*). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 878. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 76. — Sizilien: Madonie

tersus Desbr. Abeille XI, 1873, p. 667, 720, 747. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 619; Best.-Tab. 9, 1883, p. 217 (subg. *Phyllobius*). — Sizilien

Logesi Ragusa, Natural. Sicil. II, 1883, p. 303 ♂. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9 (1883), p. 627; Best.-Tab. 9, 1883, p. 225 (subg. *Phyllobius*). — Desbr. Frelon XVI, 1908, p. 87. — Sizilien: Castelbuono

siculus Baudi, Natural. Sicil. XI, 1892, p. 156. — Stierl. Mitteil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 9, 1892, p. 360. — Sizilien

vespertilio Faust, Stett. Ent. Zeit. XLV, 1884, p. 449 ♀. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 24 ♀ (subg. *Phyllobius*); l. c. XLVII, 1911, p. O (subg. *Subphyllonius*). — Armenien: Manglis

virideaeris Laichart. Verz. Tyroler Ins. I, 1781, p. 211 (*Curculio*). — Desbr. Abeille XI, 1873, p. 672, p. 731 ♂ ♀ (*Phyllobius*). — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 55 ♀ (subg. *Phyllobius*); (1886), p. 246. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 629 ♂ ♀ (subg. *Phyllobius*); Best.-Tab. 9, 1883, p. 227 ♂ ♀; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 238 ♂ ♀ (subg. *Phyllobius*). — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 204, 206 ♂ ♀. — Lameere, — Europa, Algier, Sibirien, Nord-Mongolei

Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 528, 529. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 216. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 587. — Varenius, Ent. Tidskr. XXVI, 1905, p. 247. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 23 ♂ ♀ (subg. *Phyllobius*); l. c. XLVII, 1911, p. O (subg. *Subphyllobius*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 933. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1051. — Apfelbeck, Wiss. Mittheil. XIII, 1916, p. 406. — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 45, t. 154, f. 21. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 103, 120 (Curc. gallo-rhén. p. 221, 238 (subg. *Phyllobius*). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 878. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 76.

Biologie: Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 147, 153, 239, 527, 647. — Kittel, Korrespondenzbl. Nat. Ver. Regensburg XXXV, 1881, p. 72. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, p. 153; l. c. XVIII, 1886, p. 292. — Bourgeois, Mitteil. Nat. Ges. Colmar (n. s.) VIII, 1905—06 (1906), p. 21. — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 212.

fulvipes Payk. Monogr. Curc. Suec. 1792, p. 114; Fn. Suec. III, 1800, p. 310 (*Curculio*).

uniformis Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 311 (*Curculio*). — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 458 (*Phyllobius*); l. c. VII, I, 1843, p. 35. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1835), p. 115 (*Curculio*). — Walton, Ent. Mag. V, 1837—38 (1838), p. 7; Brit. Ins. Fam. Curc. 1844—52 (1852), p. 61. —? Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 1847, p. 498. — ? Gebler, Bull. Soc. Nat. Moscou XXI, 1848, p. 359. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 410. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 475. — Desbr. Abeille XI, 1874, p. 309. — Kaukasus, West-Sibirien

pomonae Oliv. Entom. V, Nr. 83, 1807, p. 380, t. 35, f. 548 (*Curculio*). — Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 450 (*Phyllobius*). — Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 459, l. c. VII, I, 1843, p. 35 (*Phyllobius*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 149; Man. Brit. Col. 1839, p. 250. — Walton, Ent. Mag. V, 1837—38 (1838), p. 7; Ann. Mag. Nat. Hist. XVII, 1846, p. 15; Brit. Ins. Curc. 1844—52, p. 60; Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 310. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 260. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 476. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 112 ♂ ♀; l. c. X, 1868, p. 170. — Desbr. Abeille XI, 1873, p. 672, 730. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 236. — Europa, Algier, Kaukasus, Turkestan, Ostsibirien

— Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 55 ♂ ♀; (1886), p. 246 (subg. *Phyllobius*). — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 629; Best.-Tab. 9, 1883, p. 227; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 237 (subg. *Phyllobius*). — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 204, 206 ♂ ♀; l. c. VI, 1913, p. 306. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 581 ♂ ♀; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 638 (subg. *Phyllobius*) ♂ ♀. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 528, 529. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 216. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 587.

Biologie: Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1868, p. 32. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 152; l. c. XVIII, 1886, p. 292. — Vitale, Riv. Ital. Sc. Nat. XXIV, 1904, p. 14 (Schutzfärbung). — Bourgeois, Mitteil. Nat. Ges. Colmar VI, 1905—06 (1906), p. 212. — Kleine, Ent. Blätter XI, 1906, p. 73. — Reh in Sorauer, Handb. d. Pflanzenkrankh. III, 1906—13 (1912), p. 544 (Schädling an Obstbäumen).

parvulus Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 272; l. c. I, 4, 1827, p. 610 *(Curculio)* (non Oliv.). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 150; Man. Brit. Col. 1839, p. 250. — Walton, Ent. Mag. V, 1838, p. 7.

albidus Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 150; Man. Brit. Col. 1839, p. 250. — Walton, Ent. Mag. V, 1838, p. 7. — Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 39.

minutus Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 150; Man. Brit. Col. 1839, p. 250. — Walton, Ent. Mag. V, 1838, p. 8. — Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 39.

impressirostris Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, I, 1843, p. 35. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 411. — West-Sibirien

pseudopomonae Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 216. — Nord-Mongolei, Irkutsk

narynensis Reitter, l. c. p. 216. — Thian-Schan, Naryn Kol, Tekestal

var. *cinereipennis* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 459; l. c. VII, I, 1843, p. 35. — Bach, Käferfn. II, 1852 — 54 (1854), p. 261. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 713; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 235. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 411. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 476. — Fowler, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 306. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 216; Fn. Germ. V, 1916, p. 45. — Schilsky in Küster, — Taurien

Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 23; l. c. XLVII, 1911, p. O. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 933. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1051. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 878.

ulmi Becker, Bull. Soc. Nat. Moscou XXXVII, 1, 1864, p. 482 (= *cinereipennis* Gyll.). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XLIII, 1924, p. 121 (Curc. Gallo-rhén. p. 239). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 76. — Sarepta

var. *chlorizans* Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 33 ♀. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 408. — Desbr. Abeille XI, 1873, p. 672, 729. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 23; l. c. XLVII, 1911, p. O. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 121 (Curcul. Gallo-Rhén. p. 239). — Ost-Sibirien

var. *pedestris* Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLII, 1911, p. DD ♂ ♀ (subg. *Phyllobius*). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 878. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 75. — Sicilien: Castelbuono

aspromontis Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 406. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 76.

var. *chlorizans* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 216 (non Boh.). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 23; l. c. XLVII, 1911, p. O. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 121 (Curc. Gallo-Rhén. p. 239). — Ost-Sibirien, Nördl. Mongolei

var. *pseudochlorizans* Reitter, Fauna Germ. V, 1916, p. 45. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 121 (Curc. Gallo-rhén. p. 239). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 76.

Subgen. **Nemoicus** Steph.

Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 5, 146; Man. Brit. Col. 1839, p. 214 *(Nemoicus)*. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 132; l. c. VII, 1865, p. 111; l. c. X, 1868, p. 170. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 210. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 53; (1886), p. 245 *(Nemoecus)*. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. B. & H. *(Nemoicus)*. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 99 (Curc. Gallo-Rhén. p. 217) *(Nemoecus)*.

Doii Kôno, Ins. Matsum. II, 1927, p. 59, fig. — Japan

Jakovlevi Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 201 ♀. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 13 ♂ ♀ (subg. *Phyllobius*); l. c. XLVII, 1911, p. K (subg. *Parnemoicus*). — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 40 (subg. *Nemoicus*). — Ost-Sibirien: Irkutsk; Mongolei: Urga, Changai

oblongus L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 384; l. c. ed. 12, I, 2, 1767, p. 615; Fn. Suec. ed. 2, 1761, p. 182 *(Curculio)*. — F. Syst. Ent. — Europa

1775, p. 156; Spec. Ins. I, 1781, p. 199; Mant. Ins. I, 1787, p. 123; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 489; Syst. El. II, 1801, p. 544. — Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 118; Naturforsch. XXIV, 1789, p. 76; Fn. Boica I, 1798, p. 496. — Bonsd. Hist. Nat. Curc. Suec. II, 1785, p. 25. — Herbst, Natursyst. Ins. Col. VII, 1786, p. 168, t. 45, f. 9. — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 203. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1775. — Oliv. Encycl. méthod. V, 1790, p. 559; Entom. V, 1807, p. 415, t. 5, f. 80. — Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 133; ed. Hellw. I, 1795, p. 142. — Payk. Monogr. Curc. Suec. 1792, p. 90; Fn. Suec. III, 1800, p. 284. — Panz. Fn. Ins. Germ. II, 1794, Heft 9, t. 15; Deutschl. Ins.-Fn. 1795, p. 334. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 316. — Walck. Fn. Paris. I, 1802, p. 249. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 184. — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 334 *(Curculio)*; in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 448; l. c. VII, I, 1843, p. 27 *(Phyllobius)*. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 146 *(Nemoicus)*; Man. Brit. Col. 1839, p. 249. — Walton, Ent. Mag. V, 1838, p. 6; Ann. Mag. Nat. Hist. XVII, 1846, p. 14; Brit. Ins. Curc. 1844—52, p. 60; Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 310. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 324. — Gebler, Bull. Soc. Nat. Moscou 1848, p. 358. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 431; ed. 2, 1858, p. 710; ed. 3, II, 1874, p. 234. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 257. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. Curc. 1854, t. 13, f. 61. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 404. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 495. — C. G. Thoms. Skand. Kol. VII, 1865, p. 111 ♂ ♀; l. c. X, 1868, p. 170 (subg. *Nemoicus*). — Desbr. Abeille XI, 1873, p. 671, 713 (subg. *Plagius*). — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 54 ♂ ♀; (1886), p. 245 (subg. *Nemoecus*). — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 10, 1883 (1884), p. 699. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 581; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 637 (subg. *Phyllobius*). — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 203, 204 ♂ ♀ (subg. *Nemoicus*). — Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 288; Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 793. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 529, 530. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 585 (subg. *Nemoecus*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 12 ♂ ♀ (subg. *Phyllobius*); l. c. XLVII, 1911, p. J (subg. *Nemoicus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 931. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1050, t. 37, f. 11. — Apfel-

beck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 405. — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 44, t. 154, f. 19. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XLIII, 1924, p. 99, 119 (Curc. Gallorhén. 217, 237) (subg. *Nemoecus*). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 878. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 77.

Biologie: Schmidberger in Kollar, Nat. Schädl. Ins. 1837, p. 295. — Ratzeburg, Forstins. 1839, p. 31. — Waga, Bull. Soc. Ent. France 1839, p. VIII. — Nördlinger, Stett. Ent. Zeit. VII, 1848, p. 232. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. I, 1854, p. XVI; l. c. IV, 1868, p. 82. — Künstler, Schädl. Ins. Kulturg. 1871, p. 79; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXI, 1871, p. 79. — Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 179, 543. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXIII, 1876, p. 223; Larves Col. 1877, p. 383. — Rupertsberger, Biol. Käfer Eur. 1880, p. 199; Biol. Lit. Käfer Eur. 1894, p. 203. — Kittel, Korrespbl. Nat. Ver. Regensburg XXXV, 1881, p. 71. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 151; l. c. XVIII, 1886, p. 291. — Decaux, Feuille Jeun. Natural. XXII, 1891—92, p. 188. — Zirngiebel, Prakt. Blätter f. Pflanzenschutz IV, 1901, p. 3—4. — Ritsema Bos, Tijdschr. v. Plantenziekt. VIII, 1902, p. 44—46. — Bourgeois, Mitteil. Nat. Ges. Colmar (n. F.) VI, 1905—06 (1906), p. 212. — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 74. — Reh in Sorauer, Handb. f. Pflanzenkrankh. III, 1906—13 (1912), p. 544 (Schädling an Obstbäumen). — Quaintance, Proc. Ent. Soc. Washington XV, 1913, p. 79. — Urban, Ent. Blätter X, 1914, p. 27, fig. — Chatanay, Bull. Soc. Ent. France 1914, p. 357. — Fryer, Ann. Appl. Biol. Cambridge VI, 1919, p. 208.

pruni Scop. Ent. Carn. 1763, p. 31 *(Curculio)*. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1777.

mali F. Mant. Ins. I, 1787, p. 122; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 487; Syst. El. II, 1801, p. 542 *(Curculio)*. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1775. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 334. — Ill. Mag. Ins.-Kunde IV, 1805, p. 161. — Oliv. Entom. V, 1807, p. 559. — Gyll. Fn. Suec. I, 3, 1813, p. 330, var. c. — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 718 (subg. *Phyllobius*).

fuscus Laichart. Verz. Tyrol. Ins. I, 1781, p. 211 *(Curculio)*.

querneus Geoffr. in Fourcroy, Ent. Paris. I, 1875, p. 128 *(Curculio)*.

var. *rufescens* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 316 *(Curculio)*. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 12; l. c. XLVII, 1911, p. J *(Phyllobius)*. — Wagner in Cal-

wer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1050. — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 44. Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 120 (Curc. Gallo-rhén. p. 238). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 878. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 77.

var. *floricola* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 449. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 12; l. c. XLVII, p. J. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 931. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1050. — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 44. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 878. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 77. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 99, 120 (Curc. Gallo-rhén. p. 217, 238).

var. *mandibularis* (Gerh.) Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 931. — Schlesien

Solarii Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. J ♀ *(Parnemoicus)*. — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 40, Note *(Nemoicus)*. — Nord-Mongolei

Subgen. **Osmichanes** Reitter.

Reitter, Fauna Germ. V, 1916, p. 40.

serripes Desbr. Abeille XI, 1873, p. 671, 708. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 8—9, 1883, p. 627; Best.-Tab. 9, 1883, p. 225 (subg. *Phyllobius*). — Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 288; Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 793; l. c. XIII, 1916, p. 406 *(Subphyllobius)*. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 21 ♂ ♀ (subg. *Phyllobius)*; l. c. XLVII, 1911, p. L (subg. *Subphyllobius)*. — Reitter, Fauna Germ. V, 1916, p. 40 (subg. *Osmichanes)*. — Dalmatien, Herzegovina, Albanien (Oroshi), Mazedonien (Uesküb), Griechenland (Attika, Taygetos, Naxos), Syrien (Akbés)

eibesensis Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 195 ♂. — Syrien: Eibes, Akbés

var. *Tieffenbachi* Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 21; l. c. XLVII, 1911, p. L. — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 406. — Griechenland

Kiesenwetteri Desbr. Abeille XI, 1873, p. 747.

Subgen. **Phyllerastes**, Stev.

Steven, Mus. Mosq. II, 1829, p. 95. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. B G. — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 403.

pictus Stev. Mus. Mosq. II, 1829, p. 95 *(Phyllerastes)*. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. — Südöstl. Europa:

II, 2, 1834, p. 456 *(Phyllobius)*. — Boh. l. c. VII, I, 1843, p. 31. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 407. — Desbr. Abeille XI, 1873, p. 671, 709 ♂ ♀. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9, 1883, p. 626 (subg. *Phyllobius)*; Best.-Tab. 9, 1883, p. 224. — Seidlitz, Fn Transsylv. 1888—91 (1891), Arten, p. 638 (subg. *Phyllobius)*. — Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 288; Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 793; l. c. XIII, 1916, p. 403. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 5 ♂ ♀; l. c. XLVII, 1911, p. G (subg. *Phyllerastes)*. — Südrußland (Krim), Türkei (Konstantinopel), Bulgarien, Serbien, Dobrudscha, Griechenland (Parnass); Ungarn, Kleinasien: Biledjik, Sultan Dagh, etc.

varius Brullé, Expéd. sc. Morée 1832, p. 238. — Griechenland, Türkei

var. *pallipes* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 450; l. c. VII, 1, 1843, p. 31. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9, 1883, p. 626; Best.-Tab. 9, 1883, p. 224. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 5; l. c. XLVII, 1911, p. G. — Steiermark, Siebenbürgen, Chalcis

var. *rhodesicus* Faust, Wien. Ent. Zeit. XVIII, 1899, p. 174. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 5; l. c. XLVII, 1911, p. G. — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 403. — Rhodus, Athen (Pentelikon)

Subgen. **Oedecnemidius** Daniel.

K. Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 252. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. B—H. — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 403.

curvipes Pic, Échange XXXV, 1919, p. 1. — Cypern

var. *lividianus* Pic, Échange XXXV, 1919, p. 2.

monstruosus Tourn. Ann. Soc. Ent. Belg. XXII, 1879, Compt. rend. p. III ♂ ♀. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 630 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 228 (subg. *Phyllobius)*. — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 403. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 878. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 77. — Griechenland, Cypern, Kleinasien, Kalabrien

gloriosus K. Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 252. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. F, 47 H, Bl. 47 B. H. — Kleinasien, Biledyik

♀ *pictus* Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. G ♀.

saltuarius Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 46 ♂ ♀. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 7 ♂ ♀ (subg. *Oedecnemidius)*; l. c. XLVII, 1911, p. H. — Amasia

Subgen. **Phyllobius** s.str.

Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), Arten p. 597; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 635. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. C & Q. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1048. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 100 (Curc. Gallo-rhén. p. 218). — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 406 (I. Abteilung) p. 419 (II. Abteilung).

Plagius Desbr. Abeille XI, 1873, p. 712.
Metaphyllobius Smirnow, Horae Soc. Ent. Ross. XL, 1913, p. 95. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 103.
Dieletus Reitter, Fauna Germ. V, 1916, p. 40, 44. — Hustache, l. c. p. 99.
Nanoschetus Reitter, Fauna Germ. V, 1916, p. 40.
Ustavenus Reitter, l. c. p. 40. — Hustache, l. c p. 100.

Achardi Desbr. Abeille XI, 1873, p. 665, 675 ♂ ♀. — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 409, 418. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 35 ♂ ♀ (subg. *Phyllobius*); l. c. XLVII, 1911, p. DD. — Rumelien, Konstantinopel, Kleinasien

Bonvouloiri Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 620; Best.-Tab. 9, 1883, p. 218. — Desbr. Abeille XI, 1873, p. 747. — Kleinasien

aetolicus Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien VIII, 1901, p. 467 ♂ ♀; Glasnik Muzeja Bosni XIII, 1901, p. 435 ♂ ♀; Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 411, 418. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. FF (subg. *Phyllobius*). — Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. LXIII, 1931, p. 89. — Griechenland: Karpenisi, Oxyá, Morea, Euboea, Aetolien; Mazedonien: Goleznica-planina; Albanien

albanicus Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 411, 418 (subg. *Phyllobius*). — Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIII, 1931, p. 89. — West-Albanien: Bulshari

alpinus Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 269 ♂; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 620 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 218 ♂ ♀; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 235 (subg. *Phyllobius*). — Desbr. Abeille XI, 1873, p. 667, 727 ♂ ♀. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 638 (subg. *Phyllobius*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 37 ♂ ♀ (subg. *Phyllobius*); l. c. XLVII, 1911, p. Y. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 932. — Reitter, Fauna Germ. V, 1916, p. 43. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 101, 110, fig. 68 (Curc. Gallo-rhén. 219, 228) (subg. *Phyllobius*). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. — Deutschland: Schlesien; Siebenbürgen; Tirol; Schweiz: M. Rosa, Tessin; Frankreich; Italien: Venezia Tridentina

876. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 74.

Biologie: Vitale, Riv. Ital. Sc. Nat. XXIV, 1904, p. 14 (Schatzfärbung). — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 74.

scutellaris Kiesw. Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 287 (p. p.).

xanthocnemis Desbr. Abeille XI, 1873, p. 666, 725 ♂ ♀ (non Kiesw. 1851).

var. *sudeticus* Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 43.

acuminatus Desbr. Abeille XI, 1873, p. 690 ♂ ♀ (non Boh.). — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9, 1883, p. 622; Best.-Tab. 9, 1883, p. 220; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 236. — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 42. — Schweiz

arborator Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VII, 1797, p. 51, t. 98, f. 8 *(Curculio)*. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 53 ♂ ♀ (subg. *Phyllobius)*; l. c. XLVII, 1911, p. X. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 932. — Reitter, Fauna Germ. V, 1916, p. 42 (subg. *Phyllobius)*. — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 418. — Nord- und Mitteleuropa (fehlt in der Balkanhalbinsel)

psittacinus Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 448; in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 15 ♂; l. c. VII, I, 1843, p. 8 ♂ ♀. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 257. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 710; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 235. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 398. — Desbr. Abeille XI, 1873, p. 689 ♂ ♀. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9, 1883, p. 622; Best.-Tab. 9, 1883, p. 230; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 236 (subg. *Phyllobius)*. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 580; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 637. — Leisewitz, Chitin. Fortbewegungsapp. Ins. 1906, p. 113 (Morphologie).

Biologie: Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 152; l. c. XVIII, 1886, p. 292. — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 72. — Reh in Sorauer, Handb. d. Pflanzenkrankh. III, 1906—12 (1913), p. 544 (Schädling an Obstbäumen, Buchen und Birken).

acuminatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 24, 26. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 258. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 712; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 237. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 494. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 107 (Curc. Gallo-rhén. p. 225). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 876.

Apfelbecki Stierl. Mitteil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93 (1888), p. 13 ♂ ♀. — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 774 (p. p.). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 53 (p. p.). — Reitter, Fauna Germ. V, 1916, p. 42. Ungarn: Tatra

argentatus L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 384; l. c. ed. 12, I, 2, 1767, p. 615; Fn. Suec. ed. 2, 1761, p. 182 *(Curculio)*. — Müller, Linné's Nat. Syst. V, I, 1774, p. 236. — F. Syst. Ent. 1775, p. 155; Spec. Ins. I, 1781, p. 198; Mant. Ins. I, 1787, p. 123; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 489; Syst. El. II, 1801, p. 543. — Müller, Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 87. — Laichart. Verz. Tyrol. Ins. I, 1781, p. 209, var. B. — Herbst in Borowsky, Naturg. VI, 1784, p. 113. — Bonsd. Hist. Nat. Curc. Suec. I, 1785, p. 27, fig. 12. — Schmiedl, Einl. Ins.-Lehre 1786, p. 220. — Petagna, Spec. Ins. Calabr. 1787, p. 12. — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 204 (excl. fig.). — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1776, 1779. — Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 134; ed. Hellwig I, 1795, p. 143. — Payk. Monogr. Curc. 1792, p. 89; Fn. Suec. III, 1800, p. 283. — Donov. Brit. Ins. III, 1794, p. 107. — Sturm, Deutschl. Ins. IV, 1792, p. 17. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 260, t. 79, f. 4. — Panz. Deutschl. Ins.-Fn. 1795, p. 334. — Cederhj. Fn. Ingr. Prodr. 1798, p. 106. — Schrank, Fn. Boica I, 1798, p. 497. — Göze ed. Dondorff, Fn. Eur. VIII, 1799, p. 505. — Walck. Fn. Paris. I, 1802, p. 249. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 318 *(Curculio)*. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 183 *(Brachyrhinus)*. — Bechst. & Scharfenb. Forstins. I, 1805, p. 170. — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 324 *(Curculio)*; in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 446 ♂ ♀; l. c. VII, I, 1843, p. 20 ♂ ♀ *(Phyllobius)*. — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 331; Ins. Lapp. I, 1838 (1840), p. 186 *(Curculio)*. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 148; Man. Brit. Col. 1839, p. 250. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1836), p. 132 *(Curculio)*. — Walton, Ent. Mag. V, 1838, p. 7; Ann. Mag. Nat. Hist. XVII, 1846, p. 14; Brit. Ins. Fam. Curc. 1844—52, p. 59; Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 309. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 324. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 120. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 431; l. c. ed. 2, 1858, p. 711; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 235. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 258. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 494. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1859, p. 402. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 115 ♂ ♀, l. c. X, 1868, p. 170, 171. — Desbr. Abeille XI, 1873, p. Europa

668, 703. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 55; (1886), p. 246 (subg. *Phyllobius*). — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 621 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 219 ♂ ♀; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 236 ♂ ♀ (subg. *Phyllobius*). — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 581; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 637 (subg. *Phyllobius*). — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 204, 205 ♂ ♀. — Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 285, 287; Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 790, 791, 792; l. c. XIII, 1916, p. 412, 418. — Lameere, Man. Belg. Fn. II, 1900, p. 528, 529. — Everts, Fn. Neerl. II, 1903, p. 586. — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 718; in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 51 ♂ ♀; l. c. XLVII, 1911, p. EE (subg. *Phyllobius*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 932. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1049, t. 59, f. 4. — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 40, 44 (subg. *Dieletus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 100, 116 (Curc. Gallo-rhén. p. 218, 234) (subg. *Dieletus*). — Penecke, Col. Centralbl. II, 1928, p. 270. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 877. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 75.

sericeus Piller et Mitterpacher, Iter per Poseganam 1783, t. 8, f. 1. — Scriba, Journ. Ent. I, 1790, p. 81. — Donovan, Brit. Ins. III, 1794, t. 97.

croaticus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 42; Best.-Tab. 13, 1884, p. 93; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93 (1888), p. 42 ♂ ♀. — Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 266; Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 774. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 51 a.

tenuior Rey, Échange X, 1894, p. 139. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 116 (Curc. Gallo-rhén. p. 234).

Biologie: Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 134, 344. — Ratzeburg, Forstins. I, 1838, p. 115, t. 4, f. 10. — Goureau, Ins. nuis. arbres fruit. 1862; Ins. nuis. arbres Forêts 1867, p. 49. — Allgem. Forst- und Jagdzeit. XXXVIII, 1862, p. 192, 193. — Studer, Mittheil. Nat. Ges. Bern 1873—1874, Sitzungsber. p. 42, 43 (Metamorphose). — Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 180, 590, 620. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXIII, 1876 (1877), p. 213; Larves Col. 1877, p. 373. — Kittel, Korrespbl. Nat. Ver. Regensburg XXXV, 1884, p. 71. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 150;

l. c. XVIII, 1886, p. 291 (Standpflanzen). — Kempers, Tijdschr. v. Ent. XLV, 1902, p. 62 (Flügel). — W. E. Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1907, Proc. p. XVI—XVII (Zwergbildung). — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 72 (Standpflanzen). — Reh in Sorauer, Handb. d. Pflanzenkrankh. III, 1906—13 (1912), p. 544 (Schädling an Obstbäumen, Buchen, Hainbuchen, Fichten).

var. *mediatus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 238 ♂ ♀. — Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 266; Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 774. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908; l. c. XVLII, 1911, p. EE. — Zentraler Kaukasus: Cirkassien

var. *tephreus* Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 51; l. c. XLVII, 1911, p. EE. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1050. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 117 (Curc. Gallo-rhén. p. 235).

var. *tereticollis* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 457; l. c. VII, 1, 1843, p. 34. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 409. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9, 1883, p. 621 ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 219 — Volhynien

var. *viridans* Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 22. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 621 ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 219 ♀; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 236 ♀ (subg. *Phyllobius*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 51; l. c. XVII, 1911, p. EE. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 932. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1050. — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 44. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 117 (Curc. Gallo-rhén. p. 235).

pineti Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 432; l. c. ed. 2, 1858, p. 711 ♂ ♀; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 235. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 494. — Desbr. Abeille XI, 1873, p. 737, 748 ♂ ♀. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1884), p. 699. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—1891 (1891), Arten p. 636 (subg. *Phyllobius*). — Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 266; Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 774.

Biologie: Redtenbacher, Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 235. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 737. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 152; l. c. XVIII, 1886, p. 292.

betulae F. Syst. El. II, 1801, p. 543 *(Curculio)*. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 183 *(Brachyrhynus)*. — Oliv. Entom. V, — Europa

1807, p. 414, t. 26, f. 387 *(Curculio)*. — Germ. Ins. Spec. Novae I, 1824, p. 449. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 457 ♂ ♀; l. c. VII, 1, 1843, p. 32 ♂ ♀ *(Phyllobius)*. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 324. — Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 432; ed. 2, 1858, p. 711; ed. 3, II, 1874, p. 236. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 260. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 495. — Desbr. Abeille XI, 1873, p. 670, 697 ♂ ♀. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 55; (1886), p. 246 (subg. *Phyllobius*). — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 626; Best.-Tab. 9, 1883, p. 224 (subg. *Phyllobius*); Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 237 (subg. *Phyllobius*). — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 581; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 637 (subg. *Phyllobius*). — Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 286, 287; Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 791, 792. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 528, 529. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 586. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLIV, 1908, Nr. 45 ♂ ♀; Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 718; l. c. XLVII, 1911, p. H (subg. *Phyllobius*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 932. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1050. — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 416, 418. — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 44, t. 154 (subg. *Ustavenus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 101, 112 (Curc. Gallo-rhén. 219, 230) (subg. *Ustavenus*). — Penecke, Col. Centralbl. II, 1928, p. 271. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2), XIII, 1929, p. 876. — Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIII, 1931, p. 85, 88. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 75.

Biologie: Goureau, Ins. nuis. arbr. fruit. 1862, p. 49. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 151; l. c. XVIII, 1886, p. 291. — Pissot, Ann. Soc. Ent. France (6) VIII, 1888, Bull. p. CXX (Metamorphose). — Rupertsberger, Biol. Lit. Käfer Eur. 1894, p. 203. — Bourgeois, Mitteil. Nat. Ges. Colmar (n. F.) VIII, 1905—06 (1906), p. 212. — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 72.

betulinus Bechst. & Scharfenb. Forst-Ins. III, 1805, p. 886.

trivialis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 32. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 408. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 626; Best.-Tab. 9, 1883, p. 224. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907 Kaukasus

—16 (1913), p. 1050. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 112.

aurifer Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 29. — Desbr. Abeille XI, 1873, p. 698. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1880—83 (1883), p. 625; Best.-Tab. 9, 1883, p. 223, 224. — Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 286; Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 774, 792. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 45; l. c. XLVII, 1911, p. 77. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1050. — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 44. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 114 (Curc. Gallo-rhén. p. 232). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 876. — Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIII, 1931, p. 86. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 76. — Hungaria

var. *brachycornis* Desbr. Abeille XI, 1873, p. 670, 700 ♂ ♀. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 626; Best.-Tab. 9, 1883, p. 224 (subg. *Phyllobius*). — Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni XI, 1898, p. 287; Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 792; l. c. XIII, 1916, p. 416 Note. — Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIII, 1931, p. 87. — Österreich

brevicornis Desbr. Abeille XI, 1873, p. 747.

var. *etruscus* Desbr. l. c. p. 670, 696 ♂ ♀. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9, 1883, p. 624; Best.-Tab. 9, 1883, p. 222 (subg. *Phyllobius*); Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 237 ♂ ♀ (subg. *Phyllobius*). — Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 266, 286; Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 774, 791; l. c. XIII, 1916, p. 416. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 45; l. c. XLVII, 1911, p. HH. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1050. — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 44. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 114 (Curc. Gallo-rhén. p. 232). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 876. — Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIII, 1931, p. 86. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 76. — Horion, Nachtrag zu Fn. Germ. 1935, p. 310. — Italien

fulvipilis Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 792; l. c. XIII, 1916, p. 417.

Biologie: Desbrochers, Abeille X, 1872, p. 696. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 151; l. c. XVIII, 1886, p. 291.

var. *nudus* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9, 1883, p. 624 — Toscana, Umbria

♂; Best.-Tab. 9, 1883, p. 222 ♂ (non Westh.). — Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 287; Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 792. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 45; l. c. XLVII, 1911, p. JJ. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 932. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1050. — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 44. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 114 (Curc. Gallo-rhén. p. 232). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 876. — Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. V, 1932, p. 76.

Stierlini Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 110.

var. *hellenicus* Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 416. — Griechenland: Parnass, Chelmos, Taygetos

var. *kiorensis* Apfelbeck, l. c. p. 417. — Südalbanien: **Kiora**

ab. *nigrinus* Apfelbeck, l. c. p. 416. — Herzegovina, Albanien

var. *pseudoetruscus* Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LXVIII, 1931, p. 86.

fulvipilis Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 792.

etruscus Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 416.

Brenskei Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. KK ♂ ♀ (subg. *Phyllobius*). — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 418. — Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIII, 1931, p. 89. — Griechenland: Morea

bulgaricus Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 410, 418 (subg. *Phyllobius*). — Bulgarien: Samakov, Tschamkorija; Südungarn

var. *rumelicus* Apfelbeck, l. c. p. 410.

calcaratus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 485 (*Curculio*); Syst. El. II, 1801, p. 539. — Panz. Deutschl. Ins.-Fn. 1795, p. 332. — Clairv. Ent. Helvet. I, 1798, p. 90, t. 8, f. 3, 4. — Latr. Hist. Nat. Crust. & Ins. XI, 1804, p. 179 (*Brachyrhinus*). — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 435 ♂ (*Phyllobius*); l. c. VII, I, 1843, p. 13. — Steph. Man. Brit. Col. 1839, p. 249. — Suffr. Stett. Ent. Zeit. I, 1840, p. 46. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XVII, 1846, p. 12; Brit. Ins. Fam. Curc. 1844—52 (1852), p. 57; Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 307. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 431; l. c. ed. 2, 1858, p. 710; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 234. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 257. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 395. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer — Europa, Caucasus, Canada (eingeführt)

Deutschl. 1859, p. 494. — Desbr. Abeille XI, 1873, p. 664, 677 ♂ ♀. — G. H. Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 105. — Tourn. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1, 2, 1877, p. 3. — Flach, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 225—226 ♂ ♀. — Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 226. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 55; (1886), p. 245 (subg. *Phyllobius*). — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 608; Best.-Tab. 9, 1883, p. 206; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 233 (subg. *Phyllobius*). — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 94; l. c. 1890, p. 193; l. c. 1908, p. 718; in Küster, Käfer Eur. XLV, 1809, Nr. 64 ♂ ♀; l. c. XLVII, 1911, p. V (subg. *Phyllobius*). — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 580; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 636 (subg. *Phyllobius*). — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 203, 204 ♂ ♀; l. c. VI, 1913, p. 306. — Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 284; Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 789. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 529, 530. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 586 (subg. *Phyllobius*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 933. — Smirnov, Horae Soc. Ent. Ross. XL, 1913, p. 70 (*glaucus* Scop.). — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1048, t. 57, f. 1. — Blatchley & Leng, Rhynch. North East. Amer. 1916, p. 42, t. 154, f. 14. — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 422. — Edwards, Ent. Month. Mag. LIV, 1918, p. 105. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 102, 103 (Curc. Gallo-rhén. p. 220, 221) (subg. *Phyllobius*). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 876. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 73. — Kempers, Tijdschr. Ent. LXXV, 1932, Suppl. p. 68, fig.

Biologie: Suffrian, Stett. Ent. Zeit. I, 1840, p. 46. — Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 153, 213, 527, 590. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 151; l. c. XVIII, 1886, p. 291. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXIII, 1876 (1877), p. 213. — Reh, Jahrb. Hamburg. Wiss. Anstalt. XIX, 1901, 3. Beitr. p. 151, 152; in Sorauer, Handb. d. Pflanzenkrankh. III, 1906—13 (1912), p. 544 (Schädling an Obstbäumen, Erlen, Weinbeeren, schwarzen Johannisbeeren und Erdbeeren). — Bourgeois, Mitteil. Nat. Ges. Colmar (n. F.) VI, 1905—06 (1906), p. 211. — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 72. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 105 (Curc. Gallo.-rhén. p. 223).

coelestinus Scop. Ent. Carn. 1763, p. 39 *(Curculio)*. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1777. — Oliv. Encycl. méthod. V, 1790, p. 574. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 876.

carniolicus Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1777. — Oliv. Encycl. méthod. V, 1790, p. 575 *(Curculio)*. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 876.

Biologie: Suffrian, Stett. Ent. Zeit. I, 1840, p. 46. — Fairm. Ann. Soc. Ent. France (2) X, 1852, p. 685. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 151; l. c. XVIII, 1886, p. 291.

caesius Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 318 *(Curculio)*. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 103 (Curc. Gallo-rhén. p. 221).

cnides Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 318 *(Curculio)*.

pyri Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 147; Man. Brit. Col. 1839, p. 250.

fessus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 14. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 397. — Sibirien: Irkutsk

alneti C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 132; l. c. VII, 1865, p. 113 ♂ ♀; l. c. X, 1868, p. 170, 171 (non F.). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 103. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 876.

nudus Westh. Käfer Westfal. II, 1882, p. 198. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 110. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 580; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 636. — Westdeutschland

Schilskyi Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 110 ♂ ♀. — Isergebirge, Berchtesgaden

ab. *pyri* F. Syst. Ent. 1775, p. 155; Spec. Ins. I, 1781, p. 198; Mant. Ins. I, 1787, p. 122; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 487; Syst. El. II, 1801, p. 541 *(Curculio)* (non L. 1758). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 933 *(Phyllobius)*. — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 423. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 105 (Curc. Gallo-rhén. p. 223). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 73. — Europa, Kaukasus

atrovirens Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 436; l. c. VII, 1, 1843, p. 13 ♂. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 608; Best.-Tab. 9, 1883, p. 206; Fn. Col. Helvet. II, 1880—98 (1891), p. 233 (subg. *Phyllobius*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 64; l. c. XLVII, 1911, p. V ♂. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. — Gallia orient.

1912, p. 933. — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 42. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 105 (Curc. Gallo-rhén. p. 223). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 877. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 73.

glaucus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 607; Best.-Tab. 9, 1883, p. 206 (subg. *Phyllobius)*; Fn. Col. Helvet II, 1886—98 (1891), p. 233 ♂ ♀ (subg. *Phyllobius)* (nec Scop.). — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 243. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1048. — Europa, Kaukasus

var. *densatus* Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 95; in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 64; l. c. XLVII, 1911, p. V. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 933. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1049. — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 423. — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 42. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 104 (Curc. Gallo-rhén. p. 222). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 877. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 73. — Deutschland, Frankreich, Nord-Italien

var. *nigrofemoratus* Gabriel, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 71. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 64; l. c. XLVII, 1911, p. V. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 933. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1048. — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 423. — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 41. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 877. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 73. — Ungarn, Nord-Italien (Venezia Tridentina)

nigripes Gerhardt, Zeitschr. Ent. (Breslau) 1900, p. 7. — Tatra

var. *fuscofumosus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 243; Fn. Germ. V, 1916, p. 41. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 64; l. c. XLVII, 1911, p. V. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 933. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1049. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 104 (Curc. Gallo-rhén p. 222). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 877. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 73. — Rumänien, Italien (Piemont), Sibirien (Ural, Tomsk)

var. *pseudodensatus* Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 42. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 104 (Curc. Gallo-rhén. p. 222). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, — Deutschland, Piemont

p. 877. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1922, p. 73.

ab. *tibialis* Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 64; l. c. XLVII, 1911, p. V. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 933. — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 41. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 105 (Curc. Gallo-rhén. p. 223). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 877. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 73. — Ungarn, Italien (Piemont, Venezia Tridentina), Krain, Kroatien, Griechenland

canus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 439; l. c. VII, 1, 1843, p. 14. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 397. — Desbr. Abeille XI, 1873, p. 668, 687 ♂ ♀. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 237. — Tourn. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—80 (1877), p. 4. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 612; Best.-Tab. 9, 1883, p. 210 (subg. *Phyllobius*). — Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 109. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 637 (subg. *Phyllobius*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 62 ♂ ♀; l. c. XLVII, 1911, p. GG (subg. *Phyllobius*). — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 408. — Südöstl. Europa: Südrußland, Kaukasus, Krim, Rumelien, Türkei, Griechenland, Kleinasien

pilifer Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 443; l. c. VII, 1, 1843, p. 17. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 399. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 109. — Kaukasus

ab. *faeculentus* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 440; l. c. VII, 1, 1843, p. 14. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 398. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 109. — Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 285; Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 790; l. c. XIII, 1916, p. 408. — Weise, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 49. — Südrußland, Adrianopel, Serbien, Kleinasien

contemptus Stev. Mus. Mosq. 1829, p. 95; in Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 219. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 447 ♀. — Boh. l. c. VII, 1, 1843, p. 26. — Falderm. Fn. Ent. Transcasp. II, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou V, 1837. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 258. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 712; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 237. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 403. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 494. — Desbr. Abeille XI, 1873, p. 668, 701. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 614; Best.-Tab. 9, 1883, p. 212 (subg. *Phyllobius*). — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 637 (subg. *Phyllobius*). — Schilsky in Küster, — Ost- und Südrußland (Ural, Perm, Sarepta, Krim); Buchara, Persien, ?Serbien (Belgrad)

Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 63 ♂ ♀; l. c. XLVIII, 1911, p. HH (subg. *Phyllobius*). — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 408.

♂ *valgus* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 442; l. c. VII, 1, 1843, p. 17 ♂. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 712; ed. 3, II, 1874, p. 237. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 399. — Kaukasus, Taurien

crassipes Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXII, 1859, 2, p. 495. — Desbr. Abeille XI, 1873, p. 665, 674. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 36 ♂ ♀; l. c. XLVII, 1911, p. Y (subg. *Phyllobius*). — Südrußland, Samara, Orenburg, Sibirien, Altaigebirge, Amurgebiet

cupreoaureus Stierl. Wien. Ent. Monatschr. V, 1861, p. 222; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 613; Best.-Tab. 9, 1883, p. 211 (subg. *Phyllobius*); Abeille IV, 1864, p. XVIII. — Desbr. Abeille XI, 1873, p. 668, 688 ♂ ♀. — Tourn. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—83 (1877), p. 4. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. H H & Nr. 32 ♂ ♀ (subg. *Phyllobius*). — Apfelbeck, Glasnik Zem. Muz. XXVII, 1915; Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 408. — Albanien: Janina

var. *Holtzi* Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. X ♂ ♀ (subg. *Phyllobius*). — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 409. — Griechenland: Veliá Vuna (Morea)

cylindricollis Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 1834, p. 458; l. c. VII, 1, 1843, p. 34. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 409. — Desbr. Abeille XI, 1873, p. 665, 673 ♂ ♀. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 616 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 215 ♂ ♀ (*subg. Phyllobius*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 42 ♂ ♀; l. c. XLVII, 1911, p. W (subg. *Phyllobius*). — Reitter Fn. Germ. V, 1916, p. 40 (subg. *Nanoschetus*). — Südrußland, Kaukasus

♂ *hebes* Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 26. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 404. — Kaukasus

crassicollis (Motsch.) Stierl. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXVI, 1863, p. 496; Abeille IV, 1867, p. 190 ♂ ♀. — Sarepta

Delagrangei Desbr. Frelon II, 1892—93, Nr. 1, 1892, p. 3 ♀. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. F F & Nr. 30 ♂ ♀ (subg. *Phyllobius*). — Syrien: Akbes, Mardin

Derjugini Smirnow, Horae Soc. Ent. Ross. XL, 1913, p. 95 (subg. *Metaphyllobius*). — Batum

Deyrollei Tourn. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—80, Nr. 1—2, 1877, p. 3, 4 ♀. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9, 1883, p. 609; Best.-Tab. 9, 1883, p. 207 (subg. *Phyllobius*). — Schilsky in — Kaukasus: Persath, Ratscha, Swanetien, Meskisches

Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 65 ♂ ♀; l. c. XLVII, 1911, p. U (subg. *Phyllobius*). — Smirnov, Horae Soc. Ent. Ross. XL, 1913, p. 81 (subg. *Metaphyllobius*). — Gebirge, Batum

pallidipes Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 154 ♂. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 65 ♂. — Smirnov, Horae Soc. Ent. Ross. XL, 1913, p. 88 (subg. *Metaphyllobius*). — Zentraler Kaukasus

var. *circassicus* Reitter, Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 237 ♂. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 65. — Smirnov, Horae Soc. Ent. Ross. XL, 1913, p. 78 (subg. *Metaphyllobius*). — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 42, Note (subg. *Phyllobius*). — Kaukasus, Cirkassien

Emeryi Desbr. Abeille XI, 1873, p. 703. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 622 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 220 ♂ ♀. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 49 (*Emryi* err.); l. c. XLVII, 1911, p. YY. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 876. — Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIII, 1931, p. 84, 89. — Italien: Napoli, Camaldoli, Carditello, Lioni

fulvipilis Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 876.

euchromus Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 392. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 44 ♂ ♀; l. c. XLVII, 1911, p. K K (subg. *Phyllobius*). — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 414, 418. — Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIII, 1931, p. 89. — Griechenland: Taygetos

var. *Leonisi* Pic, Échange XVII, 1902, p. 65. — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 414. — „

Leonii Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, p. 44; l. c. LXVII, 1911, p. K K (err.).

Flecki Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 243. — Rumänien

Klecki Sharp, Zool. Record 1906 (1908), Ins. p. 252 (err.).

fumigatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 18. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 401. — Desbr. Abeille XI, 1873, p. 664, 680 ♂ ♀. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 31 ♂ ♀; l. c. XLVII, 1911, p. U (subg. *Phyllobius*). — Ost-Sibirien, Daurien, Amurgebiet: Pochrofka

lugubris Motsch. Schrencks Reisen Amurland II, 1860, p. 162, t. 10, f. 12. — Daurien

Haberhaueri Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 412, 418 ♀ (subg. *Phyllobius*). — Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIII, 1916, p. 89. — Ostrumelien: Slivno

incanus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 455; l. c. VII, 1, 1843, p. 31. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 432; l. c. ed. 2, 1858, p. 711; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 236. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 260. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. — Österreich, Mostar, Bilek, Montenegro, Korfu, Griechen-

1859, p. 495. — Desbr. Abeille XI, 1873, p. 664, 712 ♂ ♀ (subg. *Plagius*). — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 615; Best.-Tab. 9, 1883, p. 213 (subg. *Phyllobius*); Fn. Col. Helvet. II, 1880—98 (1891), p. 234 (subg. *Phyllobius*). — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 638 (subg. *Phyllobius*). — Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 285; Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 790; l. c. XIII, 1916, p. 420. — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 42 (subg. *Phyllobius*). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 876 (*pallidus* = *incanus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 74 (*pallidus*). land, Türkei

Biologie: Redtenb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 236. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 151; l. c. XVIII, 1886, p. 291. — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 72.

pallidus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 455; Syst. El. II, 1801, p. 542 (*Curculio*). — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 718 (*Phyllobius*); in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 33 ♂ ♀; l. c. XLVII, 1911, p. A A. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 932. — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 420 Note.

ruficornis Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 432; ed. 2, 1858, p. 711; ed. 3, II, 1874, p. 236. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 495. — Cornelius, Jahresber. Nat. Ver. Elberf. 1878, p. 48. Ungarn, Türkei

maculifer Desbr. Abeille XI, 1873, p. 665, 710 (subg. *Plagius*); Frelon I, 1891—92, Nr. 4, 1891, p. 34. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 615 (subg. *Phyllobius*); Best.-Tab. 9, 1883, p. 213. — Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 285; Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 790; l. c. XIII, 1916, p. 420 Note. Osterreich

maculosus Desbr. Abeille XI, 1873, p. 747.

var. *insulanus* Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. Z, Nr. 22 ♂ ♀ (subg. *Phyllobius*). — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 420. Kephallenia, Megalo Vuno

vagus Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. A A, Nr. 23 ♂ ♀ (subg. *Phyllobius*). Korfu, Zante, Samos

Jacobsoni Smirnov, Horae Soc. Ent. Ross. XL, 1913, p. 85 (subg. *Metaphyllobius*). Sarepta

Krüperi Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93 (1888), p. 12. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 39; l. c. XLVII, 1911, p. B B. — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 422 (subg. *Phyllobius*). Griechenland: Taygetos, Kaláwryta, Hagios Wlassis

Seidlitzi Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. B B ♂ ♀ (subg. *Phyllobius*). Griechenland

? var. *graecus* Schilsky, l. c. p. B. B. — Griechenland
var. *euboicus* Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 422. — Euboea

lateralis Reiche, Ann. Soc. Ent. France (3) V, 1857, p. 682 ♀. — Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 262. — Desbr. Abeille XI, 1873, p. 670, 699. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 625; Best.-Tab. 9, 1883, p. 223 (subg. *Phyllobius*). — Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 287; Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 792. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 45. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1050. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 114. — Solari, Bull. Soc. Ital. LXIII, 1931, p. 89. — Serbien (Uesküb, Negotin), Bulgarien (Vitosa Planina), Griechenland: Euboea, Parnass, Veluchi Geb., Peloponnes
smaragdifer Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 262. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 45; l. c. XLVII, 1911, p. J J. — Griechenland: Aetolien
var. *Stierlinensis* Desbr. Abeille XI, 1873, p. 671, 714, 747 (subg. *Plagius*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. H & Nr. 8 ♀ (subg. *Nemoicus*). — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 416. — Banat: Herkulesbad
Stierlini Desbr. Abeille XI, 1873, p. 747. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 10, 1883 (1884), p. 699. — Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 266; Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 774.

Lederi Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. E E ♂ ♀ (subg. *Phyllobius*). — Kaukasus

lenkoranus Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. E E ♂ ♀ (subg. *Phyllobius*). — Lenkoran

Leonhardi Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 56 ♂ ♀ (subg. *Phyllobius*). — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 406. — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 43, Note. — Penecke, Col. Centralblatt II, 1928, p. 271. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 74. — Horion, Nachtrag zu Fauna German. 1935, p. 310 (gute Art). — Herzegovina: Velez Planina, Maklenpaß, Konjica
Bonhardi Sharp, Zool. Record XLV, 1908 (1910), Ins. p. 262 (err.).

litoralis Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 165 ♀. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. T ♀ (subg. *Phyllobius*). — Smirnov, Horae Soc. Ent. Ross. XL, 1913, p. 76 (subg. *Metaphyllobius*). — Amurgebiet: Vladiwostok

longicornis Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 166. — Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 98. — Smirnov, Horae Soc. Ent. Ross. XL, 1913, p. 68 (subg. *Metaphyllobius*). — Japan

longipilis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 15. — Desbr. Abeille XI, 1873, p. 704 ♀ ♂. — Stierlin, Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 624; Best.-Tab. 9, 1883, p. 222 (subg. *Phyllobius*). — Fiori, Riv. Col. Ital. V, 1907, p. 296. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 50 ♂ ♀ (subg. *Phyllobius*). — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 414 (pars). — Penecke, Col. Centralbl. II, 1928, p. 271. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 876. — Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIII, 1931, p. 82, 89. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 76. — Sicilia; Mittel- u. Süd-Italien, Ins. Elba

fulvipilis Desbr. Abeille XI, 1873, p. 669, 702 ♀. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 622 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 220 ♂ ♀ (subg. *Phyllobius*). — Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIII, 1931, p. 82. — Italien

grisellus Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, p. 49; l. c. XLVII, 1911, p. 77. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 876. — Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIII, 1931, p. 85. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 76. — Campania

maculatus Tourn. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—80 (1877), p. 3, 5 ♀. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 610; Best.-Tab. 9, 1883, p. 208 (subg. *Phyllobius*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. V; l. c. XLVIII, 1912, Nr. 13 ♂ ♀. — Smirnov, Horae Soc. Ent. Ross. XL, 1913, p. 97 (subg. *Metaphyllobius*). — Nord-Rußland, Kaukasus, Südwest-Sibirien

var. *rufipes* Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1912, Nr. 13.

var. *tibiellus* Schilsky, l. c. Nr. 13.

maculicornis Germ. Ins. Spec. novae I, 1824, p. 449; Fn. Ins. Eur. IX, 1824, t. 12 (*Phyllobius*). — Gyll. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 617 (*Curculio*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 148, t. 9, f. 12 (*Phyllobius*); Man. Brit. Col. 1839, p. 250. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 447 ♂ ♀; l. c. VII, 1, 1843, p. 20 ♂ ♀. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1836), p. 132. — Walton, Ent. Mag. V, 1838, p. 7; Ann. Mag. Nat. Hist. XVII, 1846, p. 14; Brit. Ins. Fam. Curc. 1844—52; p. 59; Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 310. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 432; ed. 2, 1858, p. 711; ed. 3, II, 1874, p. 235. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 258. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 794. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 116 ♂ ♀; l. c. X, 1868, p. 170, 171. — Desbr. Abeille XI, 1873, p. 665, 676 ♂ ♀. — Stierl. Mittheil. — Europa, Südwest-Sibirien

Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 621; Best.-Tab. 9, 1883, p. 219 ♂ ♀; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 236 ♂ ♀ (subg. *Phyllobius*). — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 54, Note; (1888), p. 423 (subg. *Phyllobius*). — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 580; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 636 (subg. *Phyllobius*). — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 204, 205 ♂ ♀; l. c. VI, 1913, p. 306. — Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 287; Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 792. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 587. — Schurawski, Arbeit. Nat. Ges. St. Petersburg XXXV, 2, 1905, p. 65 (Tundra). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 43 ♂ ♀ (subg. *Phyllobius*); l. c. XLVII, 1911, p. FF. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 932. — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 411, 418. — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 43, t. 154, f. 17 (subg. *Phyllobius*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 102, 109 (Curc. Gallo-rhén. p. 220, 227) (subg. *Phyllobius*). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 876 (subg. *Phyllobius*). — Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIII, 1931, p. 89. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 75. — Jacobs, Ent. Zeitschr. (Frankfurt) XL, 1926, p. 309.

Biologie: Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 590, 624. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 151; l. c. XVIII, 1886, p. 291. — Lampa, Ent. Tidskr. XXIV, 1902, p. 59. — Kleine, Ent. Blätter XI, 1910, p. 72. — Reh in Sorauer, Handb. d. Pflanzenkrankh. III, 1906—13 (1912), p. 544 (Schädling an Obstbäumen und Buchen). — Quaintance, Proc. Ent. Soc. Washington XV, 1913, p. 79. — Anderson, Trans. Perthshire Soc. Nat. Sc. V, 1914, p. 16.

var. *Heydeni* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 42; Best.-Tab. 13, p. 93. — Desbr. Frelon I, 1891—92, Nr. 4, 1891, p. 34. — Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 666; Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 774. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 43; l. c. XLVII, 1911, p. FF. — Hubenthal, Ent. Blätter V, 1909, p. 24. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 933. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 876. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 75. — Kroatien, Istrien (M. Maggiore)

var. *lucanus* A. & F. Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXV, 1903, p. 174 ♂ ♀. — Porta, Riv. Col. Ital. II, 1904, p. 156 ♂ ♀. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2). XIII, 1929, p. 876. — Salerno. Mte. Scuro (Vallo Lucano)

var. *pygmaeolus* Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 43, Note. — Caucasus, Swanetien

var. *griseolus* Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 43; l. c. XLVII, 1911, p. FF. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 933. — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 43. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 110 (Curc. Gallo-rhén. p. 228). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 876. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 75.

maroccanus Peyerh. Bull. Soc. Ent. France 1921, p. 26 ♂ ♀ (*Phyllobius* s. str.). — Marokko: Atias

montanus L. Miller, Wien. Ent. Monatschr. VI, 1862, p. 351. — Desbr. Abeille XI, 1873, p. 665, 711 ♂ ♀ (subg. *Plagius*). — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 615 (subg. *Phyllobius*); Best.-Tab. 9, 1883, p. 213. — Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 285; Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 790. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 39 ♂ ♀; l. c. XLVII, 1911, p. BB. — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 421. — Griechenland: Kephallenia, Parnass, Parnes, Euboea, Taygetos

nudiamplus Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 44, Note ♀ (subg. *Ustavenus*). — Kleinasien: Mardin

obliquus Desbr. Opusc. Ent. I, 1874—75, p. 7; Petit. Nouv. Ent. VII, 1875, p. 478. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 615; Best.-Tab. 9, 1883, p. 213 (subg. *Phyllobius*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 6 ♂ ♀; l. c. XLVII, 1911, p. G Z (subg. *Phyllcrastes*). — Syrien: Akbés

pallidipennis Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 1847, p. 496. — Kol. l. c. XXXI, 2, 1858, p. 406. — Desbr. Abeille XI, 1873, p. 738. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 611; Best.-Tab. 9, 1883, p. 209 (subg. *Phyllobius*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. DD & Nr. 25 ♂ ♀ (subg. *Phyllobius*). — Rußland, Kaukasus, Persien: Astrabad

rufipennis Kirsch in Schneider & Leder, Beitr. Kaukas. Käferfn. 1878, p. 280; in Verh. Nat. Ver. Brünn XVII, 1878 (1879), p. 24. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9, 1883, p. 613; Best.-Tab. 9, 1883, p. 211 (subg. *Phyllobius*). — Baku

var. *caspius* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9, 1883, p. 618 ♂ ♀ (subg. *Phyllobius*); Best.-Tab. 9, 1883, p. 216 ♂ ♀. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. DD & Nr. 25 ♂. — Kaspiseegebiet, Astrabad

var. *frontalis* Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 58 ♀; l. c. XLVII, 1911, p. DD & Nr. 25 (subg. *Phyllobius*). — Kaspiseegebiet: Lenkoran

parviceps Desbr. Abeille XI, 1873, p. 668, 707 ♂ ♀. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 613 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, — Türkei, Kleinasien, Kaukasus

1883, p. 211 ♂ ♀ (subg. *Phyllobius*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. G G & Nr. 31 ♂ ♀ (subg. *Phyllobius*). — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 407.

pellitus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 16 ♂ ♀. — Desbr. Abeille XI, 1873, p. 669, 691. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 622; Best.-Tab. 9, 1883, p. 220 (subg. *Phyllobius*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 38 ♂ ♀; l. c. XLVII, 1911, p. X (subg. *Phyllobius*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1929, p. 102, 108 (Curc. Gallo-rhén. p. 220, 226) (subg. *Phyllobius*). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 877. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 73. — Corsica, Sardinien

Peneckei Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIII, 1931, p. 89 (subg. *Phyllobius*). — Dalmatien, Albanien

longipilis Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 414.

fulvipilis Penecke, Col. Centralbl. II, 1928, p. 271.

pilipes Desbr. Abeille XI, 1873, p. 669, 692 ♀. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9, 1883, p. 622 (subg. *Phyllobius*); Best.-Tab. 9, 1883, p. 220. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 877. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 78. — Sardinien: Monte Gennargentu

piri L. Syst. Nat. ed. 10, 1758, p. 384 (*Curculio*); l. c. ed. 12 I, 2, 1767, p. 615; Fn. Suec. ed. 2, 1761, p. 182. — Müller, Linné's Natursyst. V, 1, 1774, p. 235. — Gleditsch, Einl. Forstwiss. II, 1775, p. 87. — Müller, Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 87. — Brahms, Ins.-Kal. I, 1790, p. 98. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1775. — ? Rossi, Fn. Etr. I, 1790, p. 133; ed. Hellwig I, 1790, p. 141. — Bechstein, Naturg. Ins. I, 2, 1793, p. I, 852. — Hoppe, Enum. Ins. Erlang. 1795, p. 66. — Panz. Deutschl. Ins.-Fn. 1795, p. 333; Fn. Ins. Germ. IX, 1809, Heft 107, f. 4. — Cederhj. Prodr. Fn. Ingr. 1798, p. 113. — Schrank, Fn. Boica I, 1798, p. 495. — Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 280. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 317. — Walck. Fn. Paris. I, 1802, p. 248. — Bechst. & Scharfenb. Forstins. I, 1805, p. 169. — ? Oliv. Entom. V, 1807, p. 412, t. 3, f. 30 c. — ? Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 323 (*Curculio*); in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 437 ♂ ♀; l. c. VII, 1, 1843, p. 13 ♂ ♀ (subg. *Phyllobius*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 147; Man. Brit. Col. 1839, p. 250. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1836), p. 131 (*Curculio*). — Walton, Ent. Mag. V, 1837—38 (1838), p. 6; Ann. Mag. Nat. — Europa

Hist. XVII, 1846, p. 13; Brit. Ins. Curc. 1844—52, p. 58; Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 308 *(Phyllobius)*. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 324. — Gebler, Bull. Soc. Nat. Moscou XXI, 1848, p. 358. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 259. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 711; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 235; p. 431. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 396. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 495. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 112 ♂ ♀; l. c. X, 1868, p. 170. — Desbr. Abeille XI, 1873, p. 664, 721. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 55 ♂ ♀; (1886), p. 245 (subg. *Phyllobius*). — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 612; Best.-Tab. 9, 1883, p. 210 ♂ ♀ (subg. *Phyllobius*). — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 581; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 638; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 234 (subg. *Phyllobius*). — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 204, 205 ♂ ♀. — Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 285; Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 790. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 528, 529, fig. 527. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 586. — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 718; in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 57 ♂ ♀; l. c. XLVII, 1911, p. CC. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 932. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1019, t. 37, f. 10. — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 406 *(Phyllobius* s. str.). — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 40, 43, t. 154, f. 16 (subg. *Ustavenus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 101, 114 (Curc. Gallo-rhén. p. 219, 232) *(Ustavenus)*. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, 1929, p. 877. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 74.

Biologie: L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1775. — Hegetschweiler, Denkschr. All. Schweiz. Ges. Nat. I, 1833, p. 73. — Dubois, Ent. hortic. 1865, p. 49. — Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 180, 182, 242, 527, 611. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXIII, 1876 (1877), p. 213. — Rupertsberger, Biologie Käfer Eur. 1880, p. 199; Biol. Lit. Käfer Eur. 1894, p. 203. — Kittel, Korresp.-Bl. Nat. Ver. Regensburg XXXV, 1881, p. 72. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 152; l. c. XVIII, 1886, p. 292. — Decaux, Feuille Jeun. Natural. XXII, 1891—92 (1892), p. 188. — Lampa, Ent. Tidskr. XXIV, 1902, p. 59. — Bourgeois, Mitteil. Nat. Ges. Colmar (n. F.) VI, 1905

—06 (1906), p. 211. — Cameron, Ent. Month. Mag. XLV, 1909, p. 277 (Kopula). — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 73. — Reh in Sorauer, Handb. d. Pflanzenkrankh. III, 1906—13 (1912), p. 544 (Schädling an Obstbäumen, Birken, Eichen). — Quaintance, Proc. Ent. Soc. Washington XV, 1913, p. 79.

fulvipes F. Mant. Ins. I, 1787, p. 116 *(Curculio)*; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 467; Syst. El. II, 1801, p. 525. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 185 *(Brachyrhinus)*.

aeruginosus Bonsdorff, Hist. Nat. Curc. Suec. 1785, p. 23, fig. 8 *(Curculio)*. — Payk. Monogr. Curc. Suec. 1790, p. 88. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 1790, p. 1776. — Oliv. Encycl. Méthod. V, 1790, p. 560. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 185 *(Brachyrhinus)*.

padi Bonsdorff, Hist. Nat. Curc. Suec. II, 1785, p. 26, fig. 11 *(Curculio)*. — Oliv. Encycl. méthod. V, 1790, p. 560.

rufipes Bonsdorff, Hist. Nat. Curc. Suec. II, 1785, p. 25, t. 10 *(Curculio)*.

erythropus Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1776 *(Curculio)*. — Oliv. Encycl. méthod. V, 1790, p. 560. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 185 *(Brachyrhinus)*.

vespertinus F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 487 *(Curculio)* (p. p.); Syst. El. II, 1801, p. 542. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 519 (p. p.). — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 334 (p. p.). — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 182 *(Brachyrhinus)* (p. p.). — Ill. Mag. Ins.-Kunde III, 1804, p. 424 *(Curculio)* (p. p.). — Müller, Mag. Ent. III, 1818, p. 424 ♂ *(Curculio)*. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 453 (subg. *Phyllobius)*; l. c. VII, 1, 1843, p. 29. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1836), p. 133 *(Curculio)*. — Falderm. Fn. Ent. Transcauc. II, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou V, 1837, p. 190. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 406. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 432. — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 718; in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 57; l. c. XLVII, 1911, p. CC. — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 43. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 115 (Curc. Gallo-rhén. p. 233). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 877. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 74.

? *lar* Panz. Ent. Germ. 1795, p. 335.

amaurus Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 318. ?1 ♀

irroratus Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. 1867, p. 187 ♂ ♀ (non Boh. 1843). — Andalusien

Marseul, Abeille VI, 1869, p. 154, Note. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 612; Best.-Tab. 9, 1883, p. 210. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 57. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1049.

irrorellus Gemm. Col. Hefte VII, 1871, p. 122 (= *irroratus* Seidl. nec Boh.). — Spanien

var. *mali* Payk. Monogr. Curc. Suec. 1792, p. 86; Fn. Suec. III, 1800, p. 281 *(Curculio)*. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 261, t. 79, f. 5. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 317, t. 19, f. 21, 22. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 185 *(Brachyrhinus)*. — Oliv. Entom. V, 1807, p. 413, t. 26, f. 384 *(Curculio)*. — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 330. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 149 *(Phyllobius)*; Man. Brit. Col. 1839, p. 250. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 57; l. c. XLVII, 1911, p. CC. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 932. — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 43. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 116 (Curc. Gallo-rhén. p. 234). — Penecke, Col. Centralbl. II, 1928, p. 272. — Horion, Nachtrag zu Reitter, Fauna Germ. 1935, p. 309.

artemisiae Desbr. Abeille XI, 1873, p. 664, 722 ♂ ♀. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 612 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 210 ♂ ♀; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 234 ♂ ♀ (subg. *Phyllobius)*. — Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni 1898, p. 266; Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 774; l. c. XIII, 1916, p. 406. — Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIII, 1931, p. 272. — Hendersohn, Ent. Month. Mag. LXVIII, 1932, p. 150—153, figs.

var. *mutus* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 454; l. c. VII, 1, 1843, p. 29. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 259. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 713; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 237. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 407. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 495. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 586. — Gusman, Ent. Blätter XXIII, 1927, p. 132. — Horion, Nachtrag zu Reitter, Fauna Germ. 1935, p. 310. — Wolhynien, Holland

subsp. *italicus* A. & F. Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXV, 1903, p. 173. — Porta, Riv. Col. Ital. II, 1904, p. 156. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 55 ♂ ♀; l. c. XLVII, 1911, p. GG (subg. *Phyllobius)*. — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 407. — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 43 (subg. *Ustavenus)*. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi — Kalabrien; Salerno (Monti di Rofrano)

	Lincei (2) XIII, 1929, p. 877. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 75.	
quercicola	Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 421 (subg. *Phyllobius*). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 876. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 74.	Herzegovina: Mostar, Bilek, Domanovic; Dalmatien: Zara, Split; Montenegro: Rijeka, Sutormann-Paß; Albanien: Cukaligeb., Oroshi, Valona, Janina; Insel Veglia
montanus	Mill. et auct. post. (ex parte).	
Raverae	A. & F. Solari, Bull. Soc. Ent. Ital. XXXV, 1903, p. 175 ♂ ♀. — Porta, Riv. Col. Ital. II, 1904, p. 157 ♂ ♀; Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 78. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 877.	Italien: Salerno (Montetaurino, Montescuro)
Reicheidius	Desbr. Abeille XI, 1873, p. 694. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 877. — Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIII, 1931, p. 90, Note. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 78.	Sizilien
claroscutellatus	Vitale, Riv. Col. Ital. III, 1905, p. 205; Atti Acc. Sc. Pelor. XX, 1905, p. 185. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 55; l. c. XLVII, 1911, p. GG.-Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIII, 1931, p. 90, Note.	
italicus	Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. 47 GG (non Solari).	
var. *depilis*	(Fiori) Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 877. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 78.	Basilicata: Vulture
Reichei	Desbr. Abeille XI, 1873, p. 747.	Sizilien
rhodopensis	Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 288; Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 793; l. c. XIII, 1916, p. 419. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. Y & Nr. 20 ♂ (subg. *Phyllobius*).	West-Rhodope: Isker Tal, Demirkapu Paß, Salokova Tal
romanus	Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 330 ♂ ♀. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 52 ♂ ♀; l. c. XLVII, 1911, p. FF (subg. *Phyllobius*). — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 411, Note. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 876. — Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIII, 1931, p. 89. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 75.	Italien: Toscana, Abruzzo, Umbria, Lazio, Campania, Mte. Gargano

rotundicollis Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 167. — Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 100. — Smirnov, Horae Soc. Ent. Ross. XL, 1913, p. 67 (subg. *Metaphyllobius).* — Japan

rufitarsis Pic, Échange XXVII, 1911, p. 98. — Kleinasien: Brussa

scutellaris Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 432; l. c. ed. 2, 1858, p. 712; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 236. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 495. — Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 287 (p. p.). — Desbr. Abeille XI, 1873, p. 664, 666, 725. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 615 (subg. *Phyllobius);* Best.-Tab. 9, 1883, p. 213. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 581 (subg. *Phyllobius);* Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 638. — Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 285; Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 790. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 34 ♂ ♀ (subg. *Phyllobius);* l. c. XLVII, 1911, p. Y. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 932. — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 419. — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 43 (subg. *Phyllobius).* — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 876. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 73. — Österreich, Ungarn, Serbien, Türkei

var. *mutabilis* Desbr. Abeille XI, 1873, p. 666, 724 ♂ ♀. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83, Nr. 8—9, 1883, p. 616 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 215 ♂ ♀ (subg. *Phyllobius).* — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 34; l. c. XLVII, 1911, p. Y. — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 43. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 73.

Wankae Reitter, Fn. Germ. V, 1906, p. 42. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 73.

seladonius Brullé, Expéd. scient. Morée III, 1832, p. 238; Atlas, 3e Serie, Zool. 1831—1835, t. 42, f. 3. — Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr. X, 1864, p. 261. — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 413, 418 (subg. *Phyllobius).* — Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIII, 1931, p. 89. — Südost-Europa: Niederösterreich, Ungarn (Thurn-Severin, Herkulesbad), Siebenbürgen, Nord-Bosnien, Dalmatien (Split), Korfu, Griechenland, Türkei

breviatus Desbr. Abeille XI, 1873, p. 670, 705 ♂ ♀. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 625; Best.-Tab. 9, 1883, p. 223 (subg. *Phyllobius*). — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 637 (subg. *Phyllobius*). — Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 287; Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 792; l. c. XIII, 1916, p. 413. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 47 ♂ ♀; l. c. XLVII, 1911, p. KK (subg. *Phyllobius*). — Penecke, Col. Centralbl. II, 1928, p. 271.

breviusculus Desbr. Abeille XI, 1873, p. 747.

var. *nigrofemoratus* Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 414. — Attika

squamosus Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. France (4) VI, 1866, p. 409. — Desbr. Abeille XI, 1873, p. 747. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 48 ♂ ♀; l. c. XLVII, 1911, p. HH (subg. *Phyllobius*). — Spanien: Jaën, Sierra de la Segura, Cuenca

hirtus Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 187. — Andalusien

squarrosus Desbr. Abeille XI, 1873, p. 669, 693, 747 ♂ ♀. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 623 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 221 ♂ ♀ (subg. *Phyllobius*). — „

ab. *subsquamosus* Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 48; l. c. XLVII, 1911, p. HH.

var. *Korbi* Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 48.

sutorinensis Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 286; Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 792; l. c. XIII, 1916, p. 413, 418. — Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIII, 1931, p. 89. — Penecke, Col. Centralbl. II, 1928, p. 270. — Herzegovina: Sutorina, Dalmatien

sutomorensis Weise in Heyden, Reitter, Weise, Cat. Col. Eur. ed. 2, 1906, col. 613 (err.). — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 413, Note.

thalassinus Gebler, Bull. Soc. Nat. Moscou XXI, 1848, p. 359. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 445; l. c. VII, 1, 1843, p. 18 (*Phyllobius*). — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 401. — Desbr. Abeille XI, 1873, p. 666. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 617 ♂ ♀; Best.-Tab. 9, 1883, p. 215 ♂ ♀ (subg. *Phyllobius*). — Sibirien, Rußland

impressifrons Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 19. — Gebler, Bull. Soc. Nat. Moscou XXI, 1848, p. 357. — Kol. l. c. XXXI, 2, 1858, p. 402. — West-Sibirien

Tournieri Smirnov, Horae Soc. Ent. Ross. XL, 1913, p. 93 (subg. *Metaphyllobius*). — Amur

illibatus Tourn. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—80 (1877), p. 3, 6 (part.).

transsylvanicus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1893—97 (1894), p. 115. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 54 ♂ ♀; l. c. XLVII, 1911, p. U (subg. *Phyllobius*). — Smirnov, Horae Soc. Ent. Ross. XL, 1913, p. 79. — Siebenbürgen

tuberculifer Chevr. Rev. Mag. Zool. 1865, p. 26. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 186. — Desbr. Abeille XI, 1873, p. 669, 695. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 623 ♂ ♀ (subg. *Phyllobius*); Best.-Tab. 9, 1883, p. 221 ♂ ♀. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 46 ♂ ♀ (subg. *Phyllobius*); l. c. XLVII, 1911, p. X. — Spanien: Escurial, Madrid, Sierra Guadarrama, Reynosa, Avila, Bejar, Lagranja, Alberca

urticae Degeer, Mém. Hist. Ins. V, 1775, p. 219 (*Curculio*). — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1883), p. 55; (1886), p. 245 (subg. *Phyllobius*). — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1890), Arten p. 580 (subg. *Phyllobius*); Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 636. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 204, 205 ♂ ♀. — Grill, Ent. Tidskr. XIV, 1893, p. 251—252 (Note über Type). — Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 285; Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 790. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 529—530. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 586. — Reitter, Wien. Ent. Zeit. XXV, 1906, p. 243. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 66 ♂ ♀ (subg. *Phyllobius*); l. c. XLVII, 1911, p. W. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 933. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1049. — Smirnov, Horae Soc. Ent. Ross. XL, 1913, p. 87 (subg. *Metaphyllobius*). — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 423. — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 42, t. 154 (subg. *Phyllobius*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 102, 105 (Curc. Gallo-rhen. p. 220, 223) (subg. *Phyllobius*). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 877. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 73. — Nord- und Mitteleuropa, Norditalien, Balkanhalbinsel, Südwest-Sibirien

Biologie: Eckstein, Zeitschr. f. Forst- u. Jagdwesen XX, 1888, p. 627—628. — Rupertsberger, Biol. Lit. Käfer Eur. 1894, p. 203. — Bourgeois, Mitteil. Nat. Ges. Colmar (n. s.) XIII, 1905—06 (1906), p. 212. — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 72. — Fryer, Ann. Appl. Biol. VI, 1919, p. 207, 209. — Urban, Ent. Blätt. XV, 1919, p. 247. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 106 (Curc. Gallo-rhén. p. 224). — Rymer, Ann. Appl. Biol. XIII, 1926, p. 193, 214.

prasinus Oliv. Encycl. méthod. V, 1790, p. 559; Entom. V, 1807, p. 413, t. 26, f. 385.

alneti F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 487; Syst. El. II, 1801, p. 542 *(Curculio)*. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 260, t. 79, f. 3. — Panz. Deutschl. Ins.-Fn. 1795, p. 333. — Schrank, Fn. Boica I, 1798, p. 496. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 148; Man. Brit. Col. 1839, p. 250. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. XVII, 1846, p. 13; Brit. Ins. Curc. 1846, p. 58; Stett. Ent. Zeit. VII, 1846, p. 308. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 257. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 710; l. c. ed. 3, 1874, II, p. 234. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 494. — Flach, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIV, 1880, p. 225 ♂ ♀. — Heyden, l. c. XXIV, 1880, p. 226. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 608; Best.-Tab. 9, 1883, p. 206; Fn. Col. Helvet. 1886—98 (1891), p. 233 (subg. *Phyllobius*). — Schilsky, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 94; l. c. 1908, p. 718, Nr. 2.

Biologie: Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1868, p. 32. — Kaltenbach, Pflanzenfeinde 1874, p. 527, 611. — Kittel, Korresspbl. Nat. Ver. Regensburg XXXV, 1881, p. 48. — Reh in Sorauer, Handb. d. Pflanzenkrankh. III, 1906—13 (1912), p. 544 (Schädling an Obstbäumen u. Erlen).

prasinus Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 184 *(Brachyrhinus)*.

piri Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 438 ♀; l. c. VII, 1, 1843, p. 13. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 257. — Gutfleisch ed. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 494. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 237. — Schweden

verecundus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 17. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 400. — Südrußland

brevitalus C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 114 ♂ ♀; l. c. X, 1868, p. 170, 171. — Schweden

pyri var. Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 438.

calcaratus Desbr. Abeille XI, 1873, p. 664, 677 ♂ ♀ (ex parte). — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 608; Best.-Tab. 9, 1883, p. 206; Fn. Col. Helvet II, 1886—98 (1891), p. 233 (subg. *Phyllobius*) (p. p.).

anomastus Tourn. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—80 (1877), p. 3, 8 ♂ ♀. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 609; Best.-Tab. 9, 1883, p. 207 (subg. *Phyllobius*). — Nord-Rußland

Gyllenhali Tourn. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—80 (1877), p. 3, 7. — Stierl. — Ungarn

Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 609; Best.-Tab. 9, 1883, p. 207 (subg. *Phyllobius*).

ab. *caesius* Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 147 *(Phyllobius)*; Man. Brit. Col. 1839, p. 250. — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 42. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 106 (Curc. Gallorhén. p. 224). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 877. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 73.

piri Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 259, t. 79, f. 2 b ♀ *(Curculio)*. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 66. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 933.

ab. *Lindemanni* Lindemann, Bull. Soc. Nat. Moscou XLIV, 1, 1871, p. 171. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 110; Oefv. Finska Nat. Soc. Förh. XXXII, 1890, p. 66. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. W. — Rußland: Moskau; Westsibirien: Baschkirensteppe

ab. *Fussi* Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 66. — Everts, Tijdschr. Ent. L, 1910, Versl. p. XXXIX—XL (Holland). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1912, p. 933. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1049. — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 423. — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 42. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 106 (Curc. Gallorhén. p. 224). — Holland, Deutschland

var. ♀ *serbicus* Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 423. — Serbien: Pozarevac

valonensis Apfelbeck, l. c. p. 409. — Albanien: Kioregebirge

versipellis Apfelbeck, l. c. p. 407. — Griechenland: Euboea und Attika

ab. *brachylepis* Apfelbeck, l. c. p. 408. — Euboea, Peloponnes (Hagion, Wlassis, Tripolitea)

ab. *pubipennis* Apfelbeck, l. c. p. 408. — Athen, Peloponnes (Hagion Wlassis)

xanthocnemus Kiesenw. Ann. Soc. Ent. France (2) IX, 1851, p. 634. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 619 ♂ ♀ (subg. *Phyllobius*); Best.-Tab. 9, 1883, p. 217 ♂ ♀; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 235. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. Y & Nr. 21 ♂ ♀ (subg. *Phyllobius*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 101, 111, fig. — Spanien: Asturien; Pyrenäen

69 (Curc. Gallo-rhén. p. 219, 229) (subg. *Ustavenus*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 74.

meridionalis Desbr. Abeille XI, 1873, p. 309. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, Nr. 21.

var. *Ragusae* Stierl. Natural. Sicil. II, 1883, p. 303; Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 619; Best.-Tab. 9, 1883, p. 217. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, Nr. 21. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France XCIII, 1924, p. 112 (Curc. Gallo-rhén. p. 230). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 74. — Sizilien: Ficuzza

Subgen. **Hoplopyllobius** Apfelb.

Apfelb. Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 423.

Ganglbaueri Apfelb. Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 424, 425. — Südserbien: ScharDagh bei Uesküb; Golesnica planina bei Köprülü

Noesskei Apfelb. l. c. p. 424, 425. — Südost-Bosnien: Viségrad, Zvjezda Planina bei Vareš

pilicornis Desbr. Abeille XI, 1873, p. 668, 686 ♂ ♀. — Tourn. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—80 (1877). — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 610; Best.-Tab. 9, 1883, p. 208 (subg. *Phyllobius*). — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 637 (subg. *Phyllobius*). — Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 285; Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 790. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 59 ♂ ♀; l. c. XLVII, 1911, p. T (subg. *Phyllobius*). — Smirnov, Horae Soc. Ent. Ross. XL, 1913, p. 74 (subg. *Metaphyllobius*). — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 424 (subg. *Hoplophyllobius*). — Bosnien: Semec; Herzegovina: Jablanica; Serbien, Bulgarien, Türkei, Griechenland: Parnes; Banat: Herkulesbad

hungaricus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1886), p. 284; Soc. Ent. III, 1888, p. 97 ♂ ♀. — Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 285; Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 740. — Ungarn: Visegrad; Bosnien

ab. *ater* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 610; Best.-Tab. 9, 1883, p. 208. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, p. 59; l. c. XLVII, 1911, p. T. — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 425. — Griechenland

ab. *parnasius* Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 59 ♂ ♀; l. c. XLVII, 1911, p. T. — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 425. — Parnes bei Athen, Südbosnien, Hercegovina

ab. *aureolus* Apfelbeck, l. c. p. 425. — Orhanié; Griechenland: Veluchigeb.

Subgen. **Ectomogaster** Apfelb.

Apfelb. Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 426.

fulvago Stev. Mus. Mosq. II, 1829, p. 95 *(Polydrusus)*. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 442 ♂ *(Phyllobius)*; l. c. VII, 1, 1843, p. 16 ♂. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 398. — Desbr. Abeille XI, 1873, p. 664, 679 ♂ ♀. — Tourn. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—80 (1877), p. 4. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 610; Best.-Tab. 9, 1883, p. 208 (subg. *Phyllobius*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, p. 60 ♂ ♀; l. c. XLVII, 1911, p. 8 (subg. *Phyllobius*). — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 426 (subg. *Ectomogaster*). — Balkanhalbinsel (Mostar, Dobrudscha), Südrußland, Kaukasus, Kleinasien, Syrien (Libanon, Akbes), Palästina

akbesianus Desbr. Frelon IV, 1894—95 (1895), p. 96. — Syrien: Akbes

Davidowi Suvorov, Rev. Russe Ent. XV, 1915, p. 332.

var. ♀ *fulvipes* Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 441; l. c. VII, 1, 1843, p. 16. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 398. — Desbr. Abeille XI, 1873, p. 747. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 60; l. c. XLVII, 1911, p. S. — Südrußland, Kaukasus

var. *Brisouti* Desbr. Abeille XI, 1873, p. 664, 681. — Tourn. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877, p. 4. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI (1883), p. 614; Best.-Tab. 9, 1883, p. 212 (subg. *Phyllobius*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 60 (subg. *Phyllobius*); l. c. XLVII, 1911, p. S. — Palästina: Jerusalem

var. *pilidorsum* Desbr. Frelon IV, 1894—95, Nr. 6, 1895, p. 95. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 60; l. c. XLVII, 1911, p. S. — Syrien: Libanon

var. *Staudingeri* Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 60; l. c. XLVII, 1911, p. S.

fulvagoides Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 387 ♂ ♀. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, p. 61 ♂ ♀; l. c. XLVII, 1911, p. T (subg. *Phyllobius*). — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 426 (subg. *Ectomogaster*). — Creta: Elos Assistaes

ab. *marginalis* Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 69. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, p. 61; l. c. XLVII, 1911, p. T. — Kaukasus: Lasithi-Gebirge

profanus Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XVI, 1882, p. 302 ♂ ♀. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 40 ♀ (subg. *Phyllobius*); l. c. XLVII, 1911, p. S & Nr. 16 ♂ (subg. *Phyllobius*). — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 426 (subg. *Ectomogaster*). — Sibirien: Minussinsk

prolongatus Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, 1, 1866, p. 180. — Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 98. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 32 ♂ ♀; l. c. XLVII, 1911, p. R (subg. *Phyllobius*). — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 426 (subg. *Ectomogaster*). — Japan: Yokohama

sanctus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 260 ♀. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVIII, 1911, p. T & Nr. 17 ♀ (subg. *Phyllobius*). — Amurgebiet: Ussuri

undatus Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. R & Nr. 15 ♂ ♀. — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 426 (subg. *Ectomogaster*). — Libanon

var. *subfasciatus* Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. R & Nr. 15.

Subgen. **Aprepes** Schönh.

Schönh. Mant. sec. Curc. 1847, p. 57. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 202. — Seidlitz, Berl. Ent. Zeitschr. IX, 1865, p. 282; Otiorrhynchid. 1868, p. 3. — Marseul, Abeille XI, 1873, p. 489. — Faust, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 233.

Paraphyllobius Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. B-F.

crassus Motsch. Schrenck's Reisen Amurland II, 1860, p. 163. — Faust, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 234 (subg. *Aprepes*). — Nord-Sibirien Kirensk

corpulentus Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. G & Nr. 7 ♂ ♀ (subg. *Paraphyllobius*). — Nord-Sibirien

gyratus Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 444; l. c. VII, 1, 1843, p. 17. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 400. — Desbr. Abeille XI, 1873, p. 667, 717 ♀. — Faust, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 234 (subg. *Aprepes*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, p. 41 ♂ ♀ (subg. *Phyllobius*); l. c. XLVII, 1911, p. G (subg. *Paraphyllobius*). — Ost-Sibirien, Altai

Motschoulskyi Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXIX, 1895, p. 97 ♂ ♀ (*Aprepes*). — Irkutsk: Maltinskoje

obovatus Gebler, Bull. Soc. Nat. Moscou VI, 1833, p. 299; in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 445; l. c. VII, 1, 1843, p. 18; Bull. Soc. Nat. Moscou XXI, 1848, p. 358. — Kol. — West-Sibirien

Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 400. — Desbr. Abeille XI, 1873, p. 667, 716.

splendens Marseul, Abeille XI, 1873, p. 489 ♂ ♀. — Sibirien: Kolyvan

micans Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 203. — Schönh. Mant. sec. Curc. 1847, p. 58 (s. descr.).

crassior Desbr. Abeille XI, 1873, p. 718. — Faust, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 234 (subg. *Aprepes*). — Ost-Sibirien

Subgen. **Parascythropus** Desbr.

Desbr. Opusc. Ent. I, 1874—75, p. 6; Petit. Nouv. Ent. VII, 1875, p. 469. — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 96 (Europa). — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), Arten p. 579; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Arten p. 635. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. A & C. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1913), p. 1048.

Abeillei Guilleb. Échange XIV, 1897, p. 23. — Syrien: Akbés

Apollinis Miller, Wien. Ent. Monatschr. VI, 1862, p. 350. — Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 260. — Desbr. Abeille XI, 1873, p. 667, 684 ♂ ♀; Opusc. Ent. I, 1874—75, p. 7 (subg. *Parascythropus*); Petit. Nouv. Ent. VII, 1875, p. 469. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 631 ♂ ♀ (subg. *Parascythropus*); Best.-Tab. 9, 1883, p. 229 ♂ ♀. — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 96 (subg. *Parascythropus*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 4 ♂ ♀ (subg. *Parascythropus*); l. c. XVII, 1911, p. D. — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1961, p. 401. — Kephalonia, Korfu, Parnes bei Athen, Pentelikon, Peloponnes (Chelmos, Taygetos), Euboea

var. *taygetanus* Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 96. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 4; l. c. XLVII, 1911, p. D. — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 402. — Taygetos

lateobscurus Pic, Échange XVII, 1902, p. 65. — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 402.

var. *Kiesenwetteri* Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 4; l. c. XLVII, 1911, p. D. — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 402.

ab. *squamosus* Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 4; l. c. XLVII, 1911, p. D. — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 402.

Baudii Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VIII, 1888—93 (1892), p. 361 (subg. *Parascythropus*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. C & Nr. 2 ♀ (subg. *Parascythropus*). — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, — Kalabrien: Catanzaro

p. 876. — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 77.

claviger Faust, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 234, Note (subg. *Parascythropus*). — Ussuri

creticus Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 92 ♂ ♀ (subg. *Parascythropus*). — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. C & Nr. 1 ♂ ♀ (subg. *Parascythropus*). — Kreta

Festae Solari in Dodero, Boll. Mus. Zool. Anat. Comp. Torino (n. s.) XXXIX, Nr. 23, 1925, p. 28 (subg. *Parascythropus*). — Cyrenaica

gemmifer Guilleb. Bull. Soc. Ent. France 1897, p. 165. — Syrien: Akbès

mirandus Desbr. Opusc. Ent. I, 1874—75, p. 6; Petit. Nouvell. Ent. VII, 1875, p. 478 (subg. *Parascythropus*). — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 631 (subg. *Parascythropus*); Best.-Tab. 9, 1883, p. 229. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 2 ♂ ♀; l. c. XLVII, 1911, p. D (subg. *Parascythropus*). — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 402. — Syrien: Libanon, Akbès; Kleinasien: Kilikischer Taurus

ab. *deflloratus* Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 2; l. c. XVII, 1911, p. D.

pinicola Kiesenw. Berl. Ent. Zeitschr. VIII, 1864, p. 260. — Desbr. Abeille XI, 1873, p. 667, 683 ♂ ♀ (subg. *Parascythropus*); Opusc. Ent. I, 1874—75, p. 7. — Reitter, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1884, p. 96 (subg. *Parascythropus*). — Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 289 (*Parascythropus*); Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 784; l. c. XIII, 1916, p. 401. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 3 ♂ ♀ (subg. *Parascythropus*); l. c. XLVII, 1911, p. E. — Südbosnien, Montenegro, Serbien, Bulgarien, Mazedonien, Albanien, Griechenland

ab. *Desbrochersi* Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 625; Best.-Tab. 13, p. 223 (subg. *Phyllobius*). — Apfelbeck, Glasnik Muzeja Bosni X, 1898, p. 266, 287; Wiss. Mitteil. Bosnien VI, 1899, p. 774, 792; l. c. XIII, 1916, p. 401. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 3; l. c. XLVII, 1911, p. E. — Süd-Bosnien, Albanien, Griechenland (Attika, Parnes)

ab. *Holtzi* Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 3; l. c. XVII, 1911, p. E. — Apfelbeck, Wiss. Mitteil. Bosnien XIII, 1916, p. 401. — Griechenland: Taygetos

Phyllobius incertae sedis.

altaicus Gebler, Bull. Soc. Nat. Moscou VI, 1833, p. 299. — Altai

annectens Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 99. — Japan

daisetsuzanus Kôno, Ins. Matsum. II, 1928, p. 164.

armatus Roelofs, Compt. Rend. Soc. Ent. Belg. XVII, p. CXXVIII ♂ ♀. — Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 99. — „

atlasicus Hustache, Bull. Soc. Sc. Nat. Maroc XIII, 1933, p. 142. — Atlas (Marokko)

Ballioni Stark, Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 54. — West-Kaukasus

brevicollis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 34. — Nordchina

brevitarsis Kôno, Journ. Fac. Agric. Sapporo XXIV, 1930, p. 205. — Japan

carinicollis Motsch. Bull. Acad. St. Petersbourg XVII, 1859, p. 572. — Irkutsk

cervinus Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 1847, p. 498. — Kol. l. c. XXXI, 2, 1858, p. 410. — Desbr. Abeille XI, 1873, p. 738. — ? Süd-Rußland, Kaukasus

chloris Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 21 ♂. — Desbr. Abeille XI, 1873, p. 667, 728 ♂. — Kamtschatka

crassior Desbr. Frelon VIII, 1899—1900 (1900), p. 3 (non Desbr. 1873) (non praeocc.). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 78. — Malta

Galloisi Hustache, Bull. Soc. Ent. France 1920, p. 115. — Japan

incomptus Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 103. — „

inornatus Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 104 *(Diallobius)*.

japonicus Faust, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 221. Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 101. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, p. N & Nr. 11 ♀ (subg. *Subphyllobius)*. — „

kuldzhanus Suvorov, Rev. Russe Ent. XV, 1915, p. 332. — Tianshan

latithorax Desbr. Abeille XI, 1873, p. 672, 730 ♂. — Sibirien

Leechi Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 103. — Japan

Lewisi Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 104 *(Diallobius)*. — „

maculosus Motsch. Schrenck's Reisen Amurland II, 1860, p. 162, t. 10, f. 13. — Amurgebiet

Mariae Faust, Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 430. — Samara

mixtus Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 1847, p. 494. — Kol. l. c. XXXI, 2, 1858, p. 403. — Desbr. Abeille XI, 1873, p. 737. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 624 (subg. *Phyllobius)*; Best.-Tab. 9, 1883, p. 222; Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 237. — Kaukasus, Schweizer Alpen?

nigritus Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 100. — Japan

omioides Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XXIV, 1851, I, p. 50. — Desbr. Abeille XI, 1873, p. 736. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 629; Best.-Tab. 9, 1883, p. 227 (subg. *Phyllobius)*. — Sibirien

pacificus Motsch. Schrenck's Reisen Amurland II, 1860, p. 163, t. 10, f. 13. — Amurgebiet

picipes Motsch. Étud. Ent. IX, 1860, p. 20; Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, 1866, I, p. 180. — Desbr. Abeille XI, 1874, p. 660, Note. — Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 101. — Japan

polydrusoides Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 102. — „

Reitteri Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VII, 1884—87 (1884), p. 41; l. c. Nr. 3, 1884, p. 149; Best.-Tab. 13, 1883, p. 93 *(Phyllobius)*. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLV, 1908, Nr. 68 ♂ *(Peritelus)*. Kaukasus

sibiricus Gebler, Bull. Soc. Nat. Moscou VI, 1833, p. 299. Sibirien

subnudus Kôno, Ins. Matsum. II, 1928, p. 165. Honshu

Suvorovi Smirnov, Rev. Russe Ent. XVI, 1916, p. 16.
Jacobsoni Suvorov, Rev. Russe Ent. XV, 1915, p. 331. Sibirien

tonnaiensis Kôno, Ins. Matsum. II, 1928, p. 165. Sakhalin

tridentinus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1893—97 (1894), p. 116. — Luigioni, Mem. Pontificia Accad. Sc. Nuovi Lincei (2) XIII, 1929, p. 876 (subg. *Phyllobius*). — Porta, Fauna Col. Ital. V, 1932, p. 78. Trient

159

Alsus Motsch.

Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XVIII, 1845, p. 104; Schrenck's Reisen Amurland II, 1860, p. 160. — Stierlin, Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 407, 634; Bestimm.-Tab. IX, 1883, p. 7, 232.

collaris Motsch. Schrenck's Reisen Amurland II, 2, 1860, p. 162. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 634; Bestimm.-Tab. IX, 1883, p. 232. Dniepergebiet, Kaukasus

farinosus Motsch. Schrenck's Reisen Amurland II, 1860, p. 161. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 634; Bestimm.-Tab. IX, 1883, p. 232. Kirgisensteppe

flavipes Motsch. Schrenck's Reisen Amurland II, 1860, p. 161, t. 10, f. XI. Amurland

inderiensis Motsch. Schrenck's Reisen Amurland II, 1860, p. 162. — Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880—83 (1883), p. 634; Bestimm.-Tab. IX, 1883, p. 232. Krim, Sibirien

macrocerus Motsch. Schrenck's Reisen Amurland II, 1860, p. 162. Ost-Sibirien

5

Rhinoscythropus Desbr.

Desbr. Frelon IV, 1894—95, 1895, p. 97.

asiaticus Desbr. Frelon l. c. p. 97. — Schilsky in Küster, Käfer Eur. XLVII, 1911, Nr. 55. Kleinasien

1

Phyllobioides Form.

Formánek, Wien. Ent. Zeit. XL, 1923, p. 109.

crassicornis Formánek, l. c. p. 109. Crimea

1

Opitomorphus Motsch.

Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XVIII, 1845, I, p. 104.

brevirostris Motsch. l. c. p. 104, t. 1, f. 13. Kaspiseegebiet

1

Oarius Desbr.

Desbr. Frelon XIV, 1905—06, 1905, p. 20.

grisescens Desbr. l. c. p. 20. Kleinasien: Gülek

1

Lepidosoma Gemm.-Har.

Gemm. & Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2299 (emend.).
Lepesoma Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XVIII, 1845, p. 105. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVI, 1882, p. 264. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 426.

californicus Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XVIII, 1845, p. 105. — J. L. Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 429. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 426. Kalifornien

variegatum Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XIX, 1846, p. 379, t. 7, f. 6. Kamtschatka, Amurgebiet

2

Brachymerinthus Faust.

Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 338.

Helferi Faust, l. c. p. 339. Mesopotamien

1

Genera exotica.

Amphorygma Mshl.

Mshl. Fauna British Ind. Rhynchoph. I, 1916, p. 278, 281.

africana Hust. Bull. Mus. Hist. Nat. Paris 1923, p. 152. Angola

ceylonensis Mshl. Fauna Brit. Ind. Rhynch. I, 1916, p. 282. Ceylon

nilgirensis Mshl. l. c. p. 291, fig. 88. Madras

3

Aphrastus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 1, 1833, p. 16; l. c. VII, 1, 1843, p. 39. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 209. — G. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, Nr. 96, 1876, p. 98. — Champion, Biol. Centr.-Amer.

Col. IV, 1889—1911 (1911), p. 299. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 424. — Blatchley & Leng, Rhynch. of East U. S. America 1916, p. 121—126.

angularis Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889—1911 (1911), p. 299 ♂ ♀, t. 14, f. 3 ♂. — Mexico

griseus Blatchl. & Leng, Rhynch. of East U. S. America 1916, p. 127. — Indiana (Marion, Hamilton, Poscy), Georgia

submarginatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1889—1911 (1911), p. 299 ♂ ♀, t. 14, f. 4 ♂. — Mexico

taeniatus Say, Descr. North Amer. Curc. 1831, p. 9 *(Curculio)*; ed. Leconte I, 1859, p. 269 *(Aphrastus)*. — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 460 *(Phyllobius)*; l. c. VII, 1, 1843, p. 40 *(Aphrastus)*. — G. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, Nr. 96, 1876, p. 99. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 425. — Blatchley & Leng, Rhynch. of East U. S. America 1916, p. 127. — U.S.America: Mittel- und Südstaaten

Biologie: Beutenmüller, Journ. New York Ent. Soc. I, 1893, p. 38. — Blatchley & Leng, Rhynch. of East U. S. America 1916, p. 127.

unicolor G. H. Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, Nr. 96, 1876, p. 99 (*Aphrastus*). — Texas

uniformis G. H. Horn, l. c. p. 99 (*Aphrastus*). — ,,

6

Brachycaulus Mshl.

Mshl. Fn. Brit. India, Rhynchophora I, 1916, p. 287.

personatus Mshl. l. c. p. 289 ♀. — Burma

posticalis Mshl. l. c. p. 288 ♀, fig. 91. — ,,

2

Catorygma Mshl.

Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchophora I, 1916, p. 278—279.

curvipes Mshl. l. c. p. 280 ♀, f. 87. — Madras

1

Drepanoderes G. R. Waterh.

G. R. Waterh. Trans. Ent. Soc. London (2) II, 1853, p. 186. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 215. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 278, 285.

leucofasciatus Voss, Wien. Ent. Zeit. XLIX, 1932, p. 58, fig. — Yunnan

viridifasciatus G. R. Waterh. Trans. Ent. Soc. London (2) II, 1853, p. 186. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 215, t. 65, f. 2. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 285, f. 90. — Bengal

fuscus G. R. Waterh. Trans. Ent. Soc. London (2) II, 1853, p. 186 (*Drepanoderes*).

2

Epherina Pascoe.

Pascoe, Ent. Monthly Mag. II, 1869, p. 102.
longicornis Pascoe, l. c. p. 102, f. 2. Champion Bay
1

Epicalus Motsch.

Motsch. Étud. Ent. VII, 1858, p. 90. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 21. — Mshl. Fauna Brit. India, Rhynchoph. I, 1916, p. 278, 282.
virgatus Motsch. Étud. Ent. VII, 1858, p. 90. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 263. — Mshl. Fauna Brit. India Rhynchoph. I, 1916, p. 283, fig. 89. Ceylon, Burma
sandakanus Mshl. Philipp. Journ. Sci. XXX, 1926, p. 349. Borneo
2

Episomoides Kôno.

Kôno, Journ. Fac. Agric. Sapporo XXIV, 1930, p. 220.
albinus Matsumura, Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1911, p. 141 (*Episomus*). — Kôno, l. c. p. 220. Formosa
1

Hormotrophus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 43. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 211.
aureomixtus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 44. Haiti
1

Idaspora Pascoe.

Pascoe, Ent. Monthly Mag. II, 1869, p. 101. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 117.
terrea Pascoe, Ent. Monthly Mag. II, 1869, p. 101, fig. 3. Gawler
1

Nonnotus Sharp.

Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, Nr. XI, 1886, p. 418. — Broun, Man. New Zealand Col. V—VII, 1893, p. 1177.
eclectus Broun, Man. New Zealand Col. V—VII, 1893, p. 1177. Neuseeland
griseolus Sharp, Trans. Roy. Dublin Soc. (2) III, Nr. XI, 1886, p. 419, t. 13, f. 8. — Broun, Man. New Zealand Col. V—VII, 1893, p. 1177. „
pallescens Broun, l. c. p. 1178. „
3

Phlyda Pascoe.

Pascoe, Ent. Monthly Mag. VI, 1869, p. 100.
periteloides Pascoe, l. c. p. 100, fig. 1. Adelaide
1

Proxyrodes Blackb.

Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XVI, 1892—96 (1892), p. 48.
maculatus Blackb. l. c. p. 48. Australien
viridipictus Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXXIII, 1909, p. 150. Queensland
2

Proxyrus Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. London X, 1870, p. 437.
abstersus Pascoe, l. c. p. 437, t. 17, f. 18. W.-Australien
gibbicollis Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VIII, 1893 (1894), p. 261. „
lecideosus Pascoe, Journ. Linn. Soc. London X, 1870, p. 438. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXVIII, 1904, p. 86. „
3

Rhynchuchus Boh.

Boh. Eugenies Resa, Col. 1859, p. 125. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 212.
acuminatus Boh. Eugenies Resa, Col. 1859, p. 125, t. 2, f. 3. Puna Ins.
1

Simophorus Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 19.
pustulosus Faust, l. c. p. 19. Venezuela: San Esteban
1

Titinia Pascoe.

Pascoe, Ent. Monthly Mag. VI, 1869, p. 101. — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892. p. 116.
bicolor Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 120, 122. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 209, 219. S.-Australien
brevicollis Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 118, 121. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXVIII, 1904, p. 86. „
eremita Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 119, 122. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 219. „
ignaria Pascoe, Ent. Monthly Mag. VI, 1869, p. 101, fig. 4 ♀. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 209, 219. — Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXX, 1906, p. 323. Neu-Süd-Wales, Melbourne
marmorata Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XX, 1872, p. 132 ♂. — Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 219.
incisicollis Lea in Michaelsen & Hartmeyer, Fn. Südwest-Austral. II, 17, 1909, p. 215. S.-Australien
laeta Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 119, 121; l. c. XXX, 1906, p. 323. Australien

— Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXIX, 1905, p. 219.

microps Lea, Mém. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1911, p. 66. — Queensland

parva Lea. Trans. Roy. Soc. S. Austral. XXIX, 1905, p. 220. — Neu-Süd-Wales

tenuis Germ. Linnaea Ent. III, 1848, p. 220 (*Merimnetes*). — Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 121 (*Titinia*). — Adelaide

terrea Blackb. Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) VII, 1892, p. 122. — Queensland

10

Genera incertae sedis.

Agasphaerops Horn.

Horn, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 24. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Museum XLV, 1913, p. 409. — Emden, Stett. Ent. Zeit XCVIII, 1936, p. 75, Note 2.

nigra Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 25. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 409. — Kalifornien

1

Agatholobus Broun.

Broun, Trans. New Zealand Instit. XLV, 1913, p. 109.

Waterhousei Broun, l. c. p. 109. — New Zealand

1

Anaptoplus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 221. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 468 (Bestimm.-Tab.); Bull. Acad. Malgache (n. s.) VII, 1924, p. 31; Suppl. p. 16; Mém. Acad. Malgache XIV, 1933, p. 16. — Olsoufieff, Mém. Acad. Malgache XIV, 1933; Addendum p. VII.

brevicornis Hustache, Mém. Acad. Malgache XIV, 1933, p. 17. — Madagascar

brunneus Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 471; Bull. Acad. Malgache (n. s.) VII, 1924, p. 33. — „

convexifrons Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 222. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 470. — „

Cottae Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 221. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 470, 471. — „

grisescens Fairm. Rev. d'Ent. XXII, 1903, p. 34. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 470. — „

histrix Hustache, Mém. Acad. Malgache XIV, 1933, p. 16. — „

setosulus Hustache, l. c. p. 16. — „

vagefasciatus Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXI, 1902, p. 359. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 470. — „

8

Anchitelus Van Dyke.

Van Dyke, Pan-Pacific Ent. XII, 1936, p. 19.
alboviridis Van Dyke, l. c. p. 19. Californien
1

Anillobius Fauvel.

Fauvel, Rev. d'Ent. XXVI, 1908, p. 71.
solifuga Fauv. Rev. d'Ent. XXVI, 1908, p. 72. Madeira
1

Anomalodermus Perroud.

Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon XI, 1864, p. 147.
alienus Heller, Nova Caledonia A, Zool. II, 3, 1916, p. 313. Neu-Kaledonien,
cicur Heller, l. c. p. 314. „
flexuosocostatus Perroud, l. c. p. 149. „
ignambius Heller, l. c. p. 314 ♀. „
4

Anomophthalmus Fairm.

Siehe Pars 131: Curc. Tanymecinae, p. 60. Gehört hierher!

Aporolobus Sharp.

Sharp, Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 421. — Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1186.
irritus Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIX, 1877, p. 141 *(Trachyphloeus)*. — Sharp, Trans. R. Dublin Soc. (2) III, 1886, p. 421, t. 13, h. 10 *(Aporolobus)*. Neuseeland
pallidus Broun, Man. New Zealand Col. VI, 1893, p. 1365. „
2

Arrhaptogaster Roelofs.

Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 163. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 229.
pilosus Roel. l. c. p. 164, t. 2, f. 3. Japan
1

Asphalmus Sharp.

Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 94.
japonicus Sharp, l. c. p. 95. Japan
1

Auklandius Gemm.-Har.

Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2242 (emend.).
Oclandius Blanch. Voy. Pôle Sud IV, 1853, p. 202. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 622. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 72, 88, Note 4; l. c. p. 225, Note 1.
cinereus Blanch. l. c. p. 203, t. 13, f. 17 (*Oclandius*). Aukland
1

Brachyomus Lacord.

Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 130. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 89, Note 5.

bicostatus Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 14, 16. — Venezuela

histrio Faust, l. c. p. 14, 16. — „

metallescens Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 427. — Sarayacu

octotuberculatus F. Mant. Ins. I, 1787, p. 112; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 453; Syst. Eleuth. II, 1801, p. 511 (*Curculio*). — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, IV, 1790, p. 1791. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 482. — Oliv. Enc. méth. V, 1807, p. 482. — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 296 (*Geonemus*). — Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 216. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 130, Note 3 (*Brachyomus*). — Cayenna

quadrinodosus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 217 (*Geonemus*). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 130, Note 3 (*Brachyomus*). — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 14, 16. — Kolumbien, Venezuela

quadrituberculatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 216 (*Geonemus*). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 130, Note 3 (*Brachyomus*). — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 14, 16. — Heyne & Taschenb. Exot. Käfer 1908, p. 225, t. 29, f. 47. — „

Sallei Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 15, 16. — Venezuela

sulcicollis Kirsch, Abh. Mus. Dresden 1885—89, p. 24, t. 2, f. 47. — Ecuador

tuberculatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 2, 1842, p. 218 (*Geonemus*). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 130 Note 3 (*Brachyomus*). — Ins. S. Vincent

5

Cacochromus Sharp.

Sharp, Biol. Centr. Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 140.

Carteri Chevr. Bull. Soc. Ent. France 1880, p. LXXII (*Epicaerus*). — Sharp, Biol. Centr.-Amer. IV, 3, 1911, p. 140, t. 6, f. 6 (*Cacochromus*). — Guatemala

1

Catamonus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 422. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 117. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 214, Note 2.

cribrarius Oliv. Ent. V, 1807, 83, 348, t. 24, f. 344 (*Curculio*). — Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1842, p. 214 (*Geonemus*). — Woll. Canar. Col. 1864, p. 369 (*Catamonus*); Col. Atlant. 1865, p. 332 Note. — Südafrika, ?Teneriffa

melancholicus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII, 2, 1845, p. 423. — Labr. & Imh. Gen. Curc. II, 19, Nr. 70. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 118. — Kap

suffusus Pascoe, Journ. Linn. Soc. XIX, 1886, p. 324. — Old Calabar

tristis Mshl. Proc. Zool. Soc. London 1906, p. 921. — Süd-Afrika
3

Cladeyterus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 157. — Lacord. Gen. Col. 1863, p. 216.

lepidopterus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 158. — Kaffernland
1

Compsus Schönh.

Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 109 (*Cyphus* subgen. *Compsus*); Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 640 (*Platyomus* grex *Compsus*); l. c. VI, 1, 1840, p. 175 (*Platyomus* grex *Compsus*). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 116. — Champion, Biol. Centr.-Am. Col. IV, 3, 1911, p. 287. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 406. — Blatchley & Leng, Rhynchophora of North East Amer. 1916, p. 122. — Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 193. — Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XII, p. 88. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 67.

Platyomus (Sahlb.) Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 109, pars (*Cyphus* subg. *Platyomus*). — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 632, pars *niveus* F. (*Platyomus*); l. c. VI, 1, 1840, p. 155; grex I. pars: *niveus, sordidus* (*Platyomus*).

Oxyderces Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 110 (*Cyphus* subgen. C); Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 646 (*Oxyderces*); l. c. VI, 1, 1840, p. 203 (*Oxyderces*). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 113. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 306.

acrolithus Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 435 (*Cyphus*). — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 641; l. c. VI, 1, 1840, p. 194 (*Platyomus*). — Heyne & Taschenb. Exot. Käfer 1908, p. 225, t. 29, f. 35 (*Compsus*). — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 406 (*Compsus*). — Brasilien

adamantinus Kirsch, Abh. Zool. Mus. Dresden 1888—89, p. 19, t. 2, f. 40. — Kolumbien

adonis Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 197, t. 4, f. 11 ♀. — „

aeruginosus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 177 (*Platyomus*). — „

albarius Boh. l. c. p. 192 (*Platyomus*). — Brasilien

alternans Kirsch, Abh. Zool. Mus. Dresden 1888—89, p. 20. — N.W.-Südamerika

apiarius Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 184 (*Platyomus*). — Kolumbien

argentinicus Heller, An. Soc. Cient. Argent. XCI, 1921, p. 29, fig. — Argentinien

argyreus L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 384; l. c. ed. XIII (Gmel.) I, 4, 1790, p. 1781 (*Curculio*). — F. Spec. Ins. I, 1781, p. 184; Mant. Ins. I, 2, — Cayenna

1787, p. 110; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 145; Syst. El. II, 1801, p. 448 (*Curculio*). — Oliv. Enc. Méth. V, 83, 1790, p. 525 (*Curculio*). — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 479 (*Curculio*). — Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 201 (*Platyomus*).
elegans Oliv. Enc. Méth. V, 83, 1790, p. 328, t. 1, f. 10 (*Curculio*). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1883, p. 641 (*Platyomus*).

armatissimus Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 193, t. 3, f. 4 ♂ ♀. — Brasilien

ater Kirsch, Abh. Zool. Mus. Dresden 1888—89, p. 20, t. 2, f. 42. — N.W.-Südamerika

atrosignatus Luc. Cast. Voy. Amér. Sud 1859, p. 155, t. 10, f. 3 a—c. — Brasilien

auricephalus Say, Journ. Ac. Phil. III, 1823, p. 310 (*Curculio*). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 645 (*Platyomus*). — Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 88 (*Compsus*). — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, t. 13, f. 17, 18. — Blatchley & Leng, Rhynchophora North East. Amer. 1916, p. 122. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XXXVII, 1910, p. 360 (*Compsus*). — Mitchell and Pierce, Proc. Ent. Soc. Washington XIII, 1911, p. 48. — Mississippi, von Georgien bis Mexico, Texas
auriceps Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 183. — Labr. et Imhoff, Gen. Curc. II, 1851, Nr. 52.
Biologie: Blatch. & Leng, l. c.

bicarinatus Kirsch, Abh. Zool. Mus. Dresden 1888—89, p. 22. — N.W.-Südamerika

bicoloratus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 196 (*Platyomus*). — Südamerika

bimpressus Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 9. — Venezuela

bimaculatus Hustache, Ann. Soc. Cient. Argent. XCVI, 1923, p. 290. — Argentinien

bisignatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 190 (*Platyomus*). — Cayenna

bituberculatus Kirsch, Abh. Zool. Mus. Dresden 1888—89, p. 19, t. 2, f. 41. — N.W.-Südamerika

bituberosus Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 237. — Kolumbien: Bogotà

Bourcieri Guér. Verh. zool.-bot. Ver. Wien V, 1855, p. 591 (*Platyomus*). — Amazonien

caeruleipes Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 288, t. 13, f. 15. — Venezuela

canescens Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 181 ♂ ♀ (*Platyomus*). — Guér. Verh. zool.-bot. Ver. Wien V, 1855, p. 592 (*Platyomus*). — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 237 (*Compsus*). — Columbien, Amazonien

chlorostictus Er. Schomb. Reise III, 1848, p. 568. — Guyana

cinerascens Blanch. in Gay Hist. Chile V, p. 318, t. 23, f. 8, a—d. — Chili

clarus F. Syst. El. II, 1801, p. 541 (*Curculio*). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 646 (*Platyomus*). — Demerary

coelestinus Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 203 (*Oxyderces*). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 113 (*Oxyderces*). — Cayenna

cometes Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 425 (*Eustales*). — Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 193 (*Compsus*). — Macas

confluens Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 194 ♂ (*Compsus*). — Brasilien: S. Paulo

coruscus Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) V, 1880, p. 425 (*Eustales*). — Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 193 (*Compsus*). — Macas

costaricensis Voss, Rev. Ent. St. Paulo II, 1932, p. 39. — Costarica

Dalmani Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 175 (*Platyomus*). — Brasilien

dives Guér. Icon. Règne Anim. t. 37, f. 4 (*Curculia*). — Schönh. l. c. I, 2, 1833, p. 456 (*Entimus*). — Heyne & Taschenb. Exot. Käfer 1908, p. 225, t. 29, f. 34 (*Compsus*).

deplanatus Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 237. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 10. — Columbien (Bogotà), Venezuela

dives Oliv. Ent. V, 83, 1790, p. 296, t. 18, f. 233. — Südamerika

dubius Voss, Rev. Ent. S. Paulo II, 1932, p. 140. — Paraguay

ermineus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 191 (*Platyomus*). — Brasilien

exanguis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 641 (*Platyomus*). — Südamerika

fractilineatus Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 200, t. 3, f. 6 ♂ ♀. — Venezuela

fossicollis Kirsch, Abh. Zool. Mus. Dresden 1888—89, p. 19. — N.W.-Südamerika

fulgidipes Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 326. — Brasilien

furcatus Guér. Verh. zool.-bot. Ver. Wien V, 1855, p. 592 (*Platyomus*). — Amazonien

gemmeus Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 13. — Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 198. — Venezuela

glaucus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 178 (*Platyomus*). — Columbien

hybridus Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 200 (*Platyomus*). — Guadeloupe

iris Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 198, t. 4, f. 11 ♂ (*Compsus*). — Columbien: Medellin

isabellinus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 644 (*Platyomus*). — Brasilien

lacteus F. Spec. Ins. I, 1781, p. 185; Mant. Ins. I, 1787, p. 111; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 451; Syst. El. II, 1801, p. 510 (*Curculio*). — Oliv. Enc. Méth. V, 1790, p. 527; Ent. V, 83, 1807, p. 304, t. 14, f. 172 (*Curculio*). — Herbst, Natursyst. Käfer VI, 1795, p. 177, t. 72, f. 5 (*Curculio*). — Gmel. in Syst. Nat. I, 4, 1790, p. 1791 (*Curculio*). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 642; l. c. VI, 1, 1840, p. 185 (*Platyomus*). — Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 424 (*Compsus*). — Cayenna

var. *canus* Boh. l. c. I, 1833, p. 643: l. c. VI, 1, 1840, p. 185. — Brasilien
var. *Dejeani* (Chevr.) Boh. l. c. VI, 1, 1840, p. 185. — Cayenna
var. *religiosus* Oliv. Ent. V, 83, 1790, p. 302, t. 2, f. 20 (*Curculio*). — „

Lebasi Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 182 (*Platyomus*). — Columbien: Carthagena

lepidus Boh. l. c. p. 193 (*Platyomus*). — Cayenna

maricao Wolcott, Journ. Departm. Agric. Portorico VII, 1924, p. 125. — Portorico

molitor Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 189 (*Platyomus*). — Brasilien

monachus Fauvel, Bull. Soc. Linn. Normand. V, p. 313. — Cayenna

nigropunctatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 289 t. 13, f. 19. — Centr.-Amerika

niveus F. Mant. I, 1787, p. 111; Ent. Syst. I, II, 1792, p. 451; Syst. El. II, 1801, p. 510 (*Curculio*). — Oliv. Enc. méth. V, 1790, p. 527; Ent. V, 83, 1807, p. 304, t. 14, f. 173 (*Curculio*). — Herbst, Natursyst. Käfer VI, 1795, p. 176, t. 72, f. 4 (*Curculio*). — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1791 (*Curculio*). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, p. 639 (*Platyomus*); l. c. VI, 1, 1840, p. 173 (*Platyomus*). — Pascoe, Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1886, p. CLII. — Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 195 (*Compsus*).

obliquecostatus Perroud, Ann. Soc. Linn. Lyon (2) I, 1853, p. 464. — Brasilien

ochroleucus Er. Schomb. Reise III, 1848, p. 568. — Guyana

opalinus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 562 (*Eustales*); l. c. VI, 1, 1840, p. 193 (*Platyomus*). — Brasilien

opulentus Kirsch, Abh. Zool. Mus. Dresden 1888—89, p. 18, t. 2, f. 39. — N.W.-Südamerika

ostracion Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 420 (*Platyomus*). — Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 194 (*Compsus*). — Brasilien

placidus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 180 ♂ ♀ (*Platyomus*). — Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 237 (*Compsus*). — Neu-Grenada

popayanus Kirsch, Abh. Zool. Mus. Dresden 1888—89, p. 21. — N.W.-Südamerika

pugionatus Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 196, t. 3, f. 7. — Zentralamerika

quadrilineatus Kirsch, Abh. Zool. Mus. Dresden 1888—89, p. 18. — N.W.-Südamerika

quadrisignatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 188 (*Platyomus*). — Columbien

rufipes Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 199 (*Platyomus*). — Pascoe, Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1886, p. CLII. — Brasilien: Minas Geraes

saucius Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 198 (*Platyomus*). — Brasilien

sejunctus Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 426 (*Eustales*). — Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 193 (*Compsus*). — „

serietuberculatus Voss, Rev. Ent. S. Paulo II, 1932, p. 38. — Brasilien

Simoni Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 10. — Venezuela
octodecim signatus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1911, p. 288, t. 13, f. 16; Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XV, 1925, p. 429.

sordidus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 174 (*Platyomus*). — Brasilien

spectabilis Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 12. — Venezuela

variegatus Kirsch, Abh. Zool. Mus. Dresden 1888—89, p. 21, t. 2, f. 43. — N.W.-Südamerika

vespertinus Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 424. — Sarayacu, Chamicuros

vestalis Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 423. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 10. — Macas

virginalis Faust, l. c. p. 9. — Venezuela

virgineus Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 423. — Trinidad (Perú)

viridimaculatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 185 (*Platyomus*). — Cayenna

viridis Voss, Rev. Ent. S. Paulo II, 1932, p. 38. — Costarica

viridivittatus Guér. Verh. zool.-bot. Ver. Wien V, 1855, p. 592 (*Platyomus*). — Amazonien, Columbien

Westermanni Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 197 (*Platyomus*). — Brasilien

zebra Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 199, t. 3, f. 13 ♀. — Columbien, Ecuador

81

Cyphoides Linell.

Linell, Proc. U. S. Nat. Mus. XVII, 1895 (1896), p. 701.

impressifrons Linell, l. c. p. 701. — Ostafrika: Tana Fluß

foveicollis Linell, l. c. p. 702. — „

2

Cyrtolepidopus Van Dyke.

Van Dyke, Pan-Pacific Entom. XII, 1936, p. 191.
Lepidopus Van Dyke, l. c. p. 76.

nevadicus Van Dyke, l. c. p. 77 (Gattungstype). — U. S. Amer.

parvulus Van Dyke, l. c. p. 78. — „ „ „

2

Curiades Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 8, 1880, p. 420. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 75, Note, 1, p. 79,

Boisduvali Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 163 (*Platyomus*). — Labr. et Imh. Gen. Curc. II, Nr. 50. — Heyne & Taschenb. Exot. Käfer 1908, p. 225, t. 29, f. 33. — Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 421. — Brasilien

1

Diaprepes Schönh.

Siehe Pars 131: Curc. Tanymecinae, p. 107. Gehört hierher!
Siehe p. 518 sub *Exophthalm.* subg. *Diaprepes.*

Dicorrhinus Rye.

Rye, Zool. Record Ins. 1878 (1879) p. 101 (emend.).
Dichtorrhinus Waterh. Cist. Ent. II, 1878, p. 293.
Dichthadiorrhinus Rye, Zool. Record, Ins. 1878 (1879), p. 101.

bicornis Waterh. Cist. Ent. II, 1878, p. 294. — Madagascar

1

Dinosius Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 238. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 465: Bull. Acad. Malgache (n. s.) VII, 1924, p. 18; Suppl. p. 12; Mém. Acad. Malgache XIV, 1933, p. 14. — Olsoufieff, Mém. Acad. Malgache XIV, 1933, Addendum p. VII. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 217, Note 2; l. c. p. 218, Note 6.

bidentulus Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLV, 1901, p. 224 (*Eremnus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. France I, XXXVII, 1918, p. 466; Mém. Acad. Malgache XIV, 1933, p. 14. — Madagascar
asperipennis Fairm. Ann. Soc. Ent. Belg. XLVIII, 1904, p. 238. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 466.

humeralis Hustache, Mém. Acad. Malgache XIV, 1933, p. 15 ♂ ♀. — „

Mocquerysi Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 467; Mém. Acad. Malgache XIV, 1933, p. 14. — „

rugosicollis Hustache, Mém. Acad. Malgache XIV, 1933, p. 15. — „

subglobosus Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 468; Mém. Acad. Malgache XIV, 1933, p. 14. — „

5

Dysommatus Mshl.

Mshl. Rev. Zool.-Bot. Afr. XXIV, 1933, p. 71.

costicollis Mshl. l. c. p. 72. — Ruwenzori

rufulus Mshl. l. c. p. 71. — „

2

Epilaris Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) X, 1882, p. 444.

blanda Faust, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 140. — Borneo: Kina Balu

concinna Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) X, 1882, p. 444, t. 18, f. 1; Ann. Mus. Civ. Genova (2) II, 1885, p. 215. — Borneo: Labuan

Severini Faust, Stett. Ent. Zeit. LV, 1894, p. 142. — Malacca

3

Episomellus Kirsch.

Kirsch, Mitth. Mus. Dresden II, 1877, p. 151.

papuanus Kirsch, l. c. p. 151. Neu-Guinea
1

Epitosus Sharp.

Sharp, Biol. Centr.-Amer. IV, 3, 1911, p. 150. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 90, Note 6.

boops Sharp, l. c. p. 150, t. 6, f. 15. Guatemala
1

Eustales Schönh.

Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 113; Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 649; VI, I, 1840, p. 362. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 118. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 306. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 272. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 87, Note 2.

Eustalis Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 443.

Phaops Sahlb. Peric. Ent. I, 1823, p. 25 (sine descriptio).

adamantinus Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 444, t. 2, f. 4 (*Eustalis*). — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1883, p. 649 (*Eustales*). — Rosensch. in Schönh. l. c. VI, I, 1840, p. 363 (*Eustales*). — Heyne & Taschenb. Exot. Käfer 1908, p. 225, t. 29, f. 38. Brasilien

aegrotus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, I, 1840, p. 371. „

albomarginatus Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, I, 1840, p. 373. „

ambitiosus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, I, 1840, p. 373. — Pascoe, Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1886, p. CLII. „

angustifrons Lucas, Cast. Voy. Amér. Sud, Ent. 1859, p. 159. „

cerussatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 651; l. c. VI, I, 1840, p. 379. „

circumductus Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 454 (*Polydrosus*). — Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, I, 1840, p. 376 (*Eustales*). „

auronitens Mannerh. in Schönh. l. c. I, 2, 1833, p. 650 (*Eustales*).

nitidulus F. Syst. Ent. 1775, p. 146; Spec. Ins. V, 1781, p. 185; Mant. I, 1787, p. 111; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 451 (*Curculio*). — Oliv. Enc. Méth. V, 1790, p. 527; Ent. V, 83, 1807, p. 328, t. 4, f. 38. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1791. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 255, t. 78, f. 10. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 306 (*Eustales*).

curvimanus Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 272, t. 12, f. 20. Guatemala

depressicollis Gyllh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 22 (*Prepodes*). — Schönh. l. c. VI, 1840, p. 368 (*Eustales*). Haiti

duricornis Gyllh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 367. — Brasilien
fallax Gyllh. l. c. p. 368. — „
harmonicus Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 445 (*Eustalis*). — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 653 (*Eustales*). — Rosensch. in l. c. VI, 1, 1840, p. 364. — „
impositus Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 427 (*Eustales*). — Chontales
interruptus Pascoe, l. c. p. 426 (*Eustales*). — Macas
laetus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 374. — Brasilien: Minas-Geraes
lepidotus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 366. — Süd-Amerika
leucogaeus Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 445 (*Eustalis*). — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 653; l. c. VI, 1, 1840, p. 380 (*Eustales*). — Brasilien
albugo Sahlb. Spec. Ins. I, 1824, p. 27, t. 2, f. 8 (*Phaops*).
Maugei Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 369. — Antillen
micans Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 389. — Peru
naevius Pascoe, Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1886, p. CLIII. — Rio de Janeiro
scintillans Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 364. — Brasilien
thalassinus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 378. — Pascoe, Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1886, p. CLII. — Brasilien: Minas-Geraes
Thunbergi Dalman, Anal. Ent. I, 1823, p. 84 (*Curculio*). — Sahlberg, Peric. Ent. I, 1823, p. 25, t. 2, f. 7. — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 649 (*Eustales*). — Boh. in Schönh. l. c. VI, 1, 1840, p. 372 (*Eustales*). — Brasilien
pentachordius Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 446 (*Eustalis*).
var. β Sahlb. in Schönh. l. c. I, 2, 1833, p. 650.
Thumbergi Boh. in Schönh. l. c. VI, 1, 1840, p. 372 (*Eustales*). — Sahlb. Spec. Ins. I, 1824, p. 25, t. 2, f. 7 (*Phaops*).
virgatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 375. — „
virginalis Oliv. Ent. V, 83, 1790, p. 341, t. 20, f. 270 (*Curculio*). — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 646 (*Platyomus* grex *Compsus*); l. c. VI, 1, 1840, p. 370 (*Eustales*). — „
viridans Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 379. — S. Thomas
viridisquamosus Boh. l. c. p. 376. — Brasilien: Minas Geraes

28

Eustylomorphus Pierce.

Pierce, Rep. Nr. 102 U. S. Departm. Agric. Ent. 1915, t. 2, f. 1.
squamipunctatus Pierce, l. c. t. 2, f. 1. — Peru

1

Evadodes Blackb.

Blackb. Rep. Horn Exped. II, 1896, p. 282.

decorum Blackb. l. c. p. 283. Zentral-Australien

lineatus Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, p. 179 (*Evas*). Queensland

rugiceps Lea, Trans. Roy. Soc. S. Austr. XXVIII, 1904, p. 79. Neusüdwales

3

Evadomorpha Blackb.

Blackb. Rep. Horn Exped. II, 1896, p. 284.

everardensis Blackb. Trans. Roy. Soc. S. Austr. XVI, 1892—96 (1892), p. 47 (*Evas*); Rep. Horn Exped. II, 1896, p. 284 (*Evadomorpha*). Australien

1

Evas Pascoe.

Pascoe, Trans. Ent. Soc. London 1870, p. 182.

acuminata Pascoe, Trans. Ent. Soc. London 1870, p. 183. King Georg S.

argenteiventris Pascoe, l. c. p. 183. Queensland

crassirostris Pascoe, l. c. p. 183. Süd-Australien

elliptica Lea, Trans. Soc. South Austr. XXVIII, 1904, p. 77. West-Australien

latipennis Lea, l. c. p. 78. „

5

Evotus Leconte.

Leconte, Amer. Natural. VIII, 1874, p. 458. — Champion, Biol. Centr.-Amer. IV, 3, 1911, p. 247. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Museum XLV, 1913, p. 408.

naso J. L. Leconte, Rep. Explor. Mississippi River IX, 1857, p. 56 (*Otiorrhynchus*); Amer. Natural. VIII, 1874, p. 459 (*Evotus*). — Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 103. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Museum XLV, 1913, p. 408. Oregon, Colorado

1

Exophthalmida Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 187.

glauca Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 188. Admiralty- und Salomon-Ins.

laticollis Heller, Deutsche Ent. Zeitschr. 1915, p. 513. Neu-Guinea

planirostris Heller, Wien. Ent. Zeit. XXIX, 1910, p. 180 ♂ ♀; Verh. Naturf. Ges. Basel XLV 1934, p. 33. Salomon-Ins.

3

Exophthalmodes Pierce.

Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. LI, 1917, p. 465. — Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 189. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 67, 87, Note 2.

Exophthalmus Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 115 (nec Latreille 1825); Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 4; VI, I, 1840, p. 337. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 120. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 307. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 249 (part.) — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 67, 87, Note 1.

Prepodes Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 117 (*Diaprepes* subg. *Prepodes*); Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 16 (*Prepodes*); l. c. VI, 1, 1840, p. 348 (*Praepodes*). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 120. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col II, 1840, p. 307. — Cockerell, Journ. Inst. Jamaica I, 1893, p. 374. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 67, 87, Note 2.

Callizonus Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 123; Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 16 (*Prepodes*). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 120.

Diaprepes Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 116 (part.); Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 7 (part.); l. c. VI, 1, 1840, p. 342 (part.). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 120. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 307. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 67, 76, Note 1.

agrestis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc., II, 1, 1834, p. 291 ♀; l. c. VI, 1, 1840, p. 212 (*Geonemus*). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 131, Note. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1911, p. 258, t. 11, f. 17—20 (*Exophthalmus*). — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. LI, 1917, p. 465 (*Exophthalmodes*). — Mexico

canus Gyllh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 306 ♂ (*Liophloeus*); Schönh. l. c. VI, 1840, p. 357 ♂ (*Praepodes*).

canescens Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 357 ♂ (*Praepodes*).

farinolentus Boh. in Schönh. Gen.. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 358 ♀ (*Praepodes*).

albidus Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 255, t. 11, f. 10. „

albolineatus Champion, l. c. p. 262, t. 11, f. 29. „

albosquamosus Sallé, Ann. Soc. Ent. France (3) III, 1855, p. 268, t. 14, f. 3 (*Praepodes*). S. Domingo, Haiti

albovittatus Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 263, t. 11, f. 30. Guatemala

amabilis Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1878, p. 309 (*Prepodes*). Jamaica

annulonotatus C. O. Waterh. Cist. Ent. II, 1879, p. 423, t. 9, f. 3 (*Prepodes*). Columbien

barbadensis Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. XVIII, 1916, p. 451 (*Diaprepes famelicus* sbsp.). Dominica

bilineatus Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 265, t. 12, f. 5. Zentral-Amerika

caeruleovittatus Champion, l. c. p. 264, t. 12, f. 4. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. LI, 1917, p. 465 (*Exophthalmodes*). Guatemala

capsicalis Mshl. Bull. Ent. Research XIII, 1922, p. 59 (*Diaprepes*). Portorico

carinirostris Boh. in Schönh. Gen.. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 187 *(Platyomus, Compsus)*. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 254, t. 11, f. 8. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. LI, 1917, p. 464 *(Exophthalmodes)*. Mexico

carneipes Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 257, t. 11, f. 16. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. LI, 1917, p. 465 *(Exophthalmodes)*. Costarica, Panama

cervinus Gyllh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 381. Patria?

chrysopus Chevr. Naturaliste II, 1880, p. 165. Haiti

cinerascens F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 452; Syst. El. II, 1801, p. 511 *(Curculio)*. — Oliv. Ent. V, 83, 1807, p. 326, t. 9, f. 105 a, b *(Curculio)*. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 481 *(Curculio)*. — Gyllh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1834, p. 27 *(Prepodes)*; l. c. VI, 1, 1840, p. 359 *(Praepodes)*. Cayenna, S. Domingo

clathratus Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 264, t. 12, f. 2. Mexico

consobrinus Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 190, t. 3, f. 10, f. 2 b *(Exophthalmodes)*. Columbien

costatus Gyllh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 18 *(Prepodes)*. — Schönh. l. c. VI, 1, 1840, p. 352 *(Praepodes)*. S. Domingo, Haiti

crassicornis Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XI, 1867, p. 238 *(Exophthalmus)*. — Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 191, t. 3, f. 11, f. 2 c *(Exophthalmodes)*. Columbien: Bogotá

cupreipes Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 257, t. 11, f. 15 *(Exophthalmus)*. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. LI, 1911, p. 464 *(Exophthalmodes)*. Mexico

distigma Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 259, t. 11, f. 21. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. LI, 1917, p. 465 *(Exophthalmodes)*. Guatemala

cuprirostris Champ. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XV, 1925, p. 427 *(Exophthalmus)*. Costarica

duplicatus Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 263, t. 12, f. 1. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. LI, 1917, p. 465 (*Exophthalmodes*). Mexico

elegans Guér. Rev. Zool. 1847, p. 10 *(Diaprepes)*. — Jacq. du Val, Hist. Cuba 1857, p. 182, t. 8, f. 25. Cuba

fasciatus Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 252, t. 11, f. 4. Mexico

foveicollis Chevr. Le Naturaliste II, 1880, p. 175; Bull. Soc. Ent. France (5) X, 1880, p. XXXVIII (*Diaprepes*). Guadeloupe

frenatus Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XIV, 1934, p. 624 ♂ ♀ *(Prepodes)*. Haiti

Gundlachi Chevr. Naturaliste II, 1880, p. 165. Cuba

haitiensis Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 68. Haiti

hemipterus Chevr. Le Naturaliste II, 1880, p. 197 (*Diaprepes*). — Martinique

hieroglyphicus Chevr. Bull. Soc. Ent. France (5) IX, 1879, p. XCVII ♂ ♀. — S. Domingo

humeridens Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XIV, 1934, p. 623 ♂ ♀ *(Prepodes)*. — Cuba

hybridus Chevr. Rev. Zool. 1858, p. 210 (*Prepodes*). — „

impositus Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 427 *(Eustales)*. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 261, t. 12, f. 26. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. LI, 1917, p. 465 *(Exophthalmodes)*. — Nicaragua, Costarica

impressus F. Spec. Ins. I, 1781, p. 192; Mant. Ins. I, 1787, p. 118; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 477; Syst. El. II, 1801, p. 533 *(Curculio)*. — Oliv. Enc. Méth. V, 83, 1790, p. 544 *(Curculio)*. — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 116, t. 67, f. 11 *(Curculio)*. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1781 *(Curculio)*. — Gyllh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 17 *(Prepodes)*; l. c. VI, 1, 1840, p. 348 *(Praepodes)*. — Heyne & Taschenb. Exot. Käfer 1908, p. 225, t. 29, f. 42 *(Exophthalmus)*. — Jamaica

inaequalis Gyllh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 23 *(Prepodes)*; l. c. VI, 1, 1840, p. 355 *(Praepodes)*. — S. Domingo, Haiti

interpositus Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 253, t. 11, f. 6. — Mexico

interruptus Chevr. Le Naturaliste II, 1880, p. 165, Bull. Soc. Ent. France (5) X, 1880, p. XXXVIII (*Diaprepes*). — Guadeloupe.

jamaicensis Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 69. — Jamaica

Jekelianus White, Ann. Mag. Nat. Hist. (3) II, 1858, p. 357 *(Prepodes)*. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 267, t. 12, f. 10. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. LI, 1917, p. 465 *(Exophthalmodes)*. — Columbien

stellaris Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 425 *(Eustales)*.

laetus Oliv. Ent. V, 1807, p. 326, t. 9, f. 100 a, b *(Curculio)*. — Gyllenh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 45 *(Exophthalmus)*. — Schönh. l. c. VI, 1, 1840, p. 341 *(Exophthalmus)*. — S. Domingo

lepidopterus Gyllh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 14 *(Diaprepes)*. — Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 346 *(Diaprepes)*. — Chevr. Naturaliste II, 1880, p. 197. — Guadeloupe

lepidus Chevr. Rev. Zool. 1858, p. 210 *(Prepodes)*. — Cuba

leucographus Gyllh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 19 *(Prepodes)*; l. c. VI, 1, 1840, p. 350 *(Praepodes)*. — S. Domingo, Haiti

luctuosus Gyllh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 26 *(Prepodes)*; l. c. VI, 1, 1840, p. 360 *(Praepodes)*. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 122, Note 1. — Labr. et Imh. Gen. Curc. II, Heft 19, Nr. 68. — Cuba

lunaris Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 266, t. 12, f. 7, 8, 8 a. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. LI, 1917, p. 465 *(Exophthalmodes)*. — Brit. Honduras, Guatemala

maculosus Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) IX, 1879, Bull. p. CXXVI ♂. — Cuba

Mannerheimi Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 338 *(Exophthalmus)*. — S. Domingo, Haiti

margaritaceus Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 255, t. 11, f. 9. — Nicaragua

marginicollis Chevr. Le Naturaliste II, 1880, p. 175; Bull. Soc. Ent. France (5) X, 1880, p. XXXVIII (*Diaprepes*). — Guadeloupe

marmoreus Gyllh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 352 *(Praepodes)*. — Guadeloupe

martinicensis Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) IX, 1879, Bull. p. XCVIII. — Martinique

mixtus Chevr. Naturaliste II, 1880, p. 165. — Cuba

murinus Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 354 *(Praepodes)*. — Surinam

nicaraguaensis Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 327. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 1911, p. 252, t. 11, f. 3. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. LI, 1917, p. 464. — Nicaragua

novemdecimpunctaus F. Spec. Ins. I, 1781, p. 185; Mant. Ins. I, 1787, p. 111; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 450; Syst. El. II, 1801, p. 509. — Oliv. Enc. méth. V, 1790, p. 526; Ent. V, 83, 1807, p. 299, t. 3, f. 25 *(Curculio)*. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 111, t. 67, f. 3 *(Curculio)*. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1782 *(Curculio)*. — Schönh. Disp. Meth. 1826, p. 124 *(Callizonus)*. — Gyllh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 21 *(Prepodes)*; l. c. VI, 1, 1840, p. 354 *(Praepodes)*. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 308 *(Prepodes)*. — S. Domingo

nubilus Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 355 *(Praepodes)*. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 260, t. 11, f. 23, 24 *(Exophthalmus)*. — Mexico

obsoletus Oliv. Ent. V, 83, 1807, p. 325, t. 8, f. 86 a, b *(Curculio)*. — Gyllh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 20 *(Prepodes)*; l. c. VI, 1, 1840, p. 354 *(Praepodes)*. — S. Domingo, Haiti

sejugatus Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 118 *(Diaprepes* subg. *Prepodes)*.

Olivieri Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) VII, 1877, p. 171, t. 4, f. 4 *(Exophthalmus)*. — S. Domingo, Haiti

opulentus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 365 *(Eustales)*. — Champion, Biol. Centr.-Amer. IV, 3, 1911, p. 256, t. 11, f. 11 *(Exophthalmus)*. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. LI, 1917, p. 465 (Genotypus *Exophthalmodes*). — Mexico

ornatus Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 253, t. 11, f. 5. — Guatemala

parentheticus Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 191, t. 3, f. 12, f. 2a, f. 3 ♂ ♀ *(Exophthalmodes)*. — Ecuador: S. Javier, Paramba

pictus Guér. Rev. Zool. 1847, p. 9 *(Diaprepes)*. — Jacq. du Val, Hist. Cuba 1857, p. 181, t. 8, f. 24. — Cuba

subsp. *fulvovirgatus* Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XIV, 1934, p. 625 *(Prepodes)*. — ,,

plicatus Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 268, t. 12, f. 11. — Panama

pugnax Oliv. Ent. V, 83, 1807, p. 349, t. 20, f. 262 *(Curculio)*. — Haiti

Forsstroemi Gyllh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 6; l. c. VI, 1, 1840, p. 341 *(Exophthalmus)*.

pulchellus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 5 *(Exophthalmus)*; l. c. VI, 1, 1840, p. 341. — Südamerika

pulcher Brown, Illustr. 1776, p. 126, t. 49, f. 6 *(Curculio)*. — F. Spec. Ins. I, 1781, p. 192; Mant. Ins. I, 1787, p. 118; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 476; Syst. El. II, 1801, p. 533 *(Curculio)*. — Oliv. Enc. Méth. V, 1790, p. 543; Ent. V, 83, 1807, p. 307, t. 12, f. 150 *(Curculio)*. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 316, t. 85, f. 1 *(Curculio)*. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1780 *(Curculio)*. — Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 18 *(Prepodes)*. — Gyllh. in Schönh. l. c. VI, 1, 1840, p. 348 *(Praepodes)*. — Jamaica

Purvesi Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, Compt. rend. p. XXVI *(Diaprepes)*. — Antigua

quadritaenia Chevr., Le Naturaliste II, 1880, p. 190; Bull. Soc. Ent. France 5 (X) 1880, p. XXXVIII (*Diaprepes*). — Guadeloupe

quadrivittatus Oliv. Ent. V, 83, 1807, p. 325, t. 9, f. 107 *(Curculio)*. — Gyllh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 5 *(Exophthalmus)*. — Boh. in Schönh. l. c. VI, 1, 1840, p. 337 *(Exophthalmus)*. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. LI, 1917, p. 464 *(Exophthalmodes)*. — S. Domingo, S. Thomas

var. *bivittatus* F. Mant. I, 1787, p. 118; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 475; Syst. El. II, 1801, p. 532 *(Curculio)*. — Oliv. Enc. Méth. V, 1790, p. 543; Ent. V, 83, 1807, p. 313, t. 3, f. 23; *(Curculio)*. — Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VII, 1797, p. 138, t. 79, f. 8 *(Curculio)*. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 178 *(Curculio)*. — Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 4 *(Exophthalmus)*. — Boh. in Schönh. l. c. VI, 1, 1840, p. 337 *(Exophthalmus)*. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 307 *(Exophthalmus)*.

regalis F. Syst. Ent. 1775, p. 145; Spec. Ins. I, 1781, p. 185; Mant. I, 1787, p. 111; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 449; Syst. El. II, 1801, p. 508 (*Curculio*). — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. — Peru, S. Domingo, Haiti

13, I, 4, 1790, p. 1782 (*Curculio*). — Oliv. Enc. méth. V, 1790, p. 525; Ent. V, 83, 1807, p. 297, t. 1, f. 8 a, b (*Curculio*). — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 110, t. 67, f. 2 (*Curculio*). — Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 124 (*Callizonus*). — Gyllh. in Schönh. l. c. II, 1, 1834, p. 21 (*Prepodes*). — Schönh. l. c. VI, 1, 1840, p. 354 (*Prepodes*).

reticulatus Chevr. Le Naturaliste II, 1880, p. 165; Bull. Soc. Ent. France (5) X, 1880, pl. XXXVIII (*Diaprepes*). — Martinique

roralis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 356 (*Praepodes*). — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 269, t. 12, f. 16 (*Exophthalmus*). — Mexico

rufescens Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 346 (*Diaprepes*). — Guadeloupe

scalaris Boh. l. c. p. 349 (*Praepodes*). — Labr. et Imh. Gen. Curc. II, Heft 19, Nr. 66. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 260, f. 25 (*Exophthalmus*). — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. LI, 1917, p. 464 (*Exophthalmodes*). — Cuba

hieroglyphicus Sturm, Cat. 1826, p. 115 (*Chlorima*).

scalptus Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 259, t. 11, f. 22. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. LI, 1917, p. 465 (*Exophthalmodes*). — Costarica

similis Drury, Ill. II, 1773, Index p. 62, t. 33, f. 5 (*Curculio*). — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, t. 67, f. 10 (*Curculio*). — Jamaica

cameleon F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 474; Syst. El. II, 1801, p. 532 (*Curculio*). — Oliv. Enc. méth. V, 1790, p. 543; Ent. V, 83, 1807, p. 308, t. 13, f. 166 (*Curculio*). — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 115, t. 67, f. 8 (*Curculio*). — Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 18 (*? Prepodes*).

sphacellatus Oliv. Ent. V, 83, 1807, p. 319, t. 5, f. 58, t. 20, f. 253 (*Curculio*). — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, t. 67, f. 12 (*Curculio*). — Gyllh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 20 (*Prepodes*). — Schönh. l. c. VI, 1, 1840, p. 349 (*Praepodes*). — S. Domingo, Haiti

squamipennis Gemm.-Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2234 (*Exophthalmus*). — S. Domingo

lepidopterus Gyllh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 353 (*Praepodes*) [non Gyllh. l. c. 1834].

sulcicrus Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 268, t. 11, f. 12—15. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. LI, 1917, p. 465 (*Exophthalmodes*). — Guatemala, Nicaragua, Costarica, Panama, Columbia

sulcipennis Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 265, t. 12, f. 6. — Guatemala

sulphuratus Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) IX, 1879, Bull. p. XCVII ♂; Naturaliste II, 1880, p. 165. — Cuba

tredecimmaculatus Guér. Rev. Zool. 1847, p. 10 *(Diaprepes)*. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XIV, 1934, p. 624 *(Exophthalmodes)*. — „

tessellatus Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 262, t. 11, f. 28. — Costarica

triangulifer Champion, l. c. p. 261, t. 11, f. 27. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. LI, 1917, p. 465 *(Exophthalmodes)*. — Costarica, Panama

verecundus Chevr. Col. Mex. 1833, Nr. 16 *(Diaprepes)*. — Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 347 *(Diaprepes)*. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 254, t. 11, f. 7 *(Exophthalmus)*. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. LI, 1917, p. 464 *(Exophthalmodes)*. — Mexico

modestus Gyllh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 345 *(Diaprepes)*.

viridilineatus Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 266, t. 12, f. 9. — Panama

vermiculatus Champion, l. c. p. 264, t. 12, f. 3. — Mexico

Vitraci Fleutiaux & Sallé, Ann. Soc. Ent. France (6) IX, 1889, p. 437 (*Diaprepes*). — Guadeloupe

vittatus L. Syst. Nat. ed. 12, I, II, 1767, p. 610. — F. Syst. Ent. 1775, p. 150; Spec. Ins. I, 1781, p. 191; Mant. I, 1787, p. 118; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 474; Syst. El. II, 1801, p. 532 *(Curculio)*. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1780 (*Curculio*). — Oliv. Enc. méth. V, 1790, p. 542; Ent. V, 83, 1807, p. 309, t. 15, f. 192 *(Curculio)*. — Villers, Ent. Linn. I, 1789, p. 182 (*Curculio*). — Brown, Nat. Hist. of Jamaica, p. 429, t. 43, f. 9 *(Curculio)*. — Sloane, Nat. Hist. of Jamaica I, p. 210, t. 237, f. 35 *(Curculio)*. — Gyllh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 1, 1834, p. 17 *(Prepodes)*; l. c. VI, 1, 1840, p. 348 *(Praepodes)*. — Waterh. Trans. Ent. Soc. London 1878, p. 309 *(Prepodes)*. — Heyne & Taschenb. Exot. Käfer 1908, p. 225, t. 29, f. 41 *(Exophthalmus)*. — Jamaica

vitticollis Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 256, t. 11, f. 12—14. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. LI, 1917, p. 464 *(Exophthalmodes)*. — Brit. Honduras, Guatemala

92

Exorides Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VII, 1881, p. 43. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LVIII, 1897, p. 229, Note. — Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 203 (Best.-Tab., figs.). — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 67.

abruptecostatus Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 204, 210, t. 4, f. 7 ♂ ♀. — Ecuador: Macas

bifurcatus Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XVIII, 1926, p. 537. — Kolumbien

caudatus Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 216, 217, t. 4, f. 1 ♂ ♀. Kolumbien: Bogotá

corrugatus Mshl. l. c. p. 218, t. 3, f. 8 ♂ ♀. Venezuela: Escorial

cylindricus Mshl. l. c. p. 205, 213, t. 4, f. 8 ♂. Kolumbien

equatorius Mshl. l. c. p. 206, 219, t. 4, f. 10 ♀. Ecuador: Quito

equicaudatus Mshl. l. c. p. 204, 207, f. 4 ♂. „

espletiae Kirsch, Abh. Zool. Mus. Dresden 1889, p. 23, t. 2, f. 45 *(Compsus)*. — Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 205 *(Exorides)*. Kolumbien

inflatus Mshl. l. c. p. 205, 214, t. 4, f. 6. Venezuela, Kolumbien

labyrinthicus Kirsch, Abhandl. Zool. Mus. Dresden 1889, p. 22 *(Compsus)*. — Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 203 *(Exorides)*. Kolumbien

Lajoyei Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 68 *(Compsus)*. — Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 206 *(Exorides)*. Venezuela

Lindigi Kirsch, Abh. Zool. Mus. Dresden 1889, p. 24, t. 2, f. 46 *(Compsus)*. — Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 205, 213, t. 4, f. 2 *(Exorides)*. „

Marshalli Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. LII, 1908, p. 44 *(Compsus)*. — Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 205, t. 4, f. 9 *(Exorides)*. „

Masoni Mshl. l. c. p. 205, 215, t. 4, f. 4 ♀. „

obesus Mshl. l. c. p. 209, t. 4, f. 12 ♀. „

pedunculatus Mshl. l. c. p. 206, 216, t. 4, f. 5 ♀. Ecuador

praeteritus Mshl. l. c. p. 204, 206 ♂. „

carinatus Olliff in Whymper, Travels Great Andes, Suppl. App. 1891, p. 65, fig. (nec Pascoe).

pyriformis Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 205, 211, t. 3, f. 2 ♀. Kolumbien

quadrivittatus Kirsch, Abh. Zool. Mus. Dresden 1889, p. 23, t. 2, f. 44 *(Compsus)*. — Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 206 *(Exorides)*. „

rugosus Taschenb. Zeitschr. ges. Naturw. I, 1870, p. 188 *(Compsus)*. — Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 204 *(Exorides)*. Kolumbien: Bogotá

septemcostatus Mshl. l. c. p. 204, 212, t. 4, f. 3 ♀. Kolumbien

Wagneri Harold, Ann. Soc. Ent. France (4) III, 1863, p. 176 *(Compsus)*. — Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 203, 204, f. 2, d. Ecuador

carinatus Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) VII, 1881, p. 43 *(Exorides)*. — Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 202.

Whymperi Olliff in Whymper, Travels Great Andes, Suppl. Append. 1891, p. 63, fig. *(Compsus)*. — Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 203 *(Exorides)*. „

23

Hormorus Horn.

Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 23. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 409. — Blatchl. & Leng, Rhynchoph. North East. Amer. 1916, p. 135. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 75, Note 2.

undulatus Uhler, Proc. Acad. Phil. VII, 1855, p. 416 (*Chlorophanus*). — Horn, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 23. — Pierce, Proc. U. S. Nat. Mus. XLV, 1913, p. 409. Baltimore
1

Ischnobrotus Hustache.

Hustache, Ann. Mag. Nat. Hist. (10) XVIII, 1936, p. 362.
bicallosus Hustache, l. c. p. 367. Kenya
convexus Hustache, l. c. p. 366. Abessinien
hystricosus Hustache, l. c. p. 367. „
setulosus Hustache, l. c. p. 366. Kenya
typicus Hustache, l. c. p. 366 (Gattungstype). „
5

Isopterus Faust.

Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 4. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 70.
acanthomerus Heller, Philipp. Journ. Sci. D VII, 1912, p. 388, t. 1, f. 11. Luzon
brevior Heller, Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924, p. 170. Philippinen
irroratus Faust, Stett. Ent. Zeit. LVI, 1895, p. 6. Luzon
signatus Faust, l. c. p. 5. „
tessellatus Heller, Wien. Ent. Zeit. XLI, 1924, p. 170. Philippinen
5

Kurilonus Sharp.

Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 113.
insolitus Sharp, l. c. p. 114. Kurilen
1

Lupinocolus Van Dyke.

Van Dyke, Pan-Pacif. Entom. XII, 1936, p. 81.
Blaisdelli Van Dyke, l. c. p. 82. Kalifornien
1

Miloderoides Van Dyke.

Van Dyke, Pan-Pacif. Entom. XII, 1936, p. 74.
maculatus Van Dyke, l. c. p. 76. Idaho
1

Myosides Roel.

Roel. Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 164.
pyrus Sharp, Trans. Ent. Soc. London 1896, p. 93. Japan
seriehispidus Roel. Ann. Soc. Ent. Belg. XVI, 1873, p. 165, t. 2, f. 4. „
2

Neosphrigodes Hustache.

Hustache, Rev. Zool. Afr. XI, 1923, p. 179.
unicolor Hustache, l. c. p. 179. Belg. Kongo
1

Nicaeana Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIX, 1877, p. 141. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 427.

catoptoides Broun, Bull. New Zeal. Instit. I, 2—3, 1914, p. 200. — Neuseeland

cervina Broun, Man. New Zeal. Col. VI, 1893, p. 1360. — Neuseeland: Moeraki

cinerea Broun, New Zeal. Journ. of Sc. II, 1885, p. 386; Man. New Zeal. Col. IV, 1886, p. 93. — Neuseeland

concinna Broun, Man. New Zeal. Col. IV, 1886, p. 847. — „

cordipennis Broun, Bull. New Zeal. Instit. I, 1921, p. 619. — „

crassifrons Broun, Bull. New Zeal. Instit. I, 5, 1917, p. 398. — „

gracilicornis Broun, Bull. New Zeal. Instit. I, 2—3, 1914, p. 201. — „

infuscata Broun, Ann. Mag. Nat. Hist. (8) IV, 1909, p. 52. — Neuseeland: Canterbury

modesta Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIX, 1877, p. 142. — Broun, Man. New Zeal. Col. I, 1880, p. 428. — Neuseeland: Otago, Waitaki

nesophila Broun, Trans. New Zeal. Instit. XLV, 1913, p. 97. — Neuseeland

placida Broun, Bull. New Zeal. Instit. I, 2—3, 1914, p. 201. — „

tarsalis Broun, Man. New Zeal. Col. VII, 1893, p. 1460. — Neuseeland: Ashburton

12

Ochrometa Pascoe.

Pascoe, Journ. Linn. Soc. London X, 1870, p. 449.

amoena l. c. p. 450, t. 17, f. 6, a—c. — W.-Australien: Champion Bay

1

Parexophthalmus Heller.

Heller, Abh. und Ber. Mus. Dresden XII, 1908, p. 9, f. 14. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 87, Note 1.

semiotus Heller, l. c. p. 9; Verh. Naturf. Ges. Basel XLV, 1934, p. 31. — Bismarck-Archipel

1

Periderces Mshl.

Mshl. Ann. Natal Gouvt. Mus. V, 1926, p. 249.

variegatus Fåhrs. Oefv. Vet.-Akad. Förh. XXVII, 1871, p. 20 *(Sciaphilus)*. — Mshl. l. c. p. 249 *(Periderces)*. — Kafferngebiet

1

Platyomus Schönh.

Schönh. Curc. Disp. Meth. 1826, p. 109 (*Cyphus* subgen. A ,pars); Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 632, pars (*Platyomus*, stirps I); Gen. Spec. Curc. VI, 1840, p. 155, pars (*Platyomus* grex I, stirps I). — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 115. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 7, Note 1; p. 79, Note 1.

agonista Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 433 (*Cyphus*). — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 640 (*Platyomus*); Boh. in Schönh. l. c. VI, 1, 1840, p. 160 (*Platyomus*). — Brasilien

Besckei Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 436 (*Cyphus*). — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 640 (*Platyomus*). — Rosensch. in Schönh. l. c. VI, 1, 1840, p. 164 (*Platyomus*). — Heyne & Taschenb. Exot. Käfer 1908, p. 225, t. 29, f. 31. — Brasilien: Minas Geraes

Bruchi Hustache, Ann. Mus. Nac. Hist. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 166. — Argentinien

cavirostris Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 167 (*Platyomus*). — Brasilien

crassicornis Luc. Cast. Voy. Amér. Sud, Ent. 1859, p. 156. — „

cultricollis Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 432 (*Cyphus*). — Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 155 (*Platyomus*). — Labr. et Imh. Gen. Curc. 1851, II, Nr. 49. — Waterh. Aid I, 1881, pl. 20. — Pascoe, Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1886, p. CLII. — Heyne & Taschenb. Exot. Käfer 1908, p. 225, t. 29, f. 29. — „

nodipennis Sahlb. Peric. Ent. I, 1823, p. 29, t. 2, f. 6 (*Platyomus*). — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 632 (*Platyomus*).

Dianae Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 169 ♂ ♀ (*Platyomus*). — Brasilien

Duponti Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 633; l. c. VI, 1, 1840, p. 158 (*Platyomus*). — „

elegantulus Hustache, Ann. Soc. cient. Argent. XCVI, 1923, p. 290. — Argentinien

Faldermanni Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 157 (*Platyomus*). — Brasilien

fasciatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 166 (*Platyomus*). — „

Gyllenhali Boh. l. c. p. 158 (*Platyomus*). — Südamerika

hystricosus Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1924, p. 434 (*Cyphus*). — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 640; Boh. in Schönh. l. c. VI, 1, 1840, p. 161 (*Platyomus*). — Brasilien

latacungae Kirsch, Abh. Zool. Mus. Dresden 1888—89, p. 17. — Ecuador

leucozonus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 169 (*Platyomus*). — Brasilien

mollis Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 175. — Paraguay

mutabilis Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 171 ♂ ♀ (*Platyomus*). — Pascoe, Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1886, p. CLII. — Brasilien

septempunctatus Boh. l. c. I, 2, 1833, p. 637 ♂ ♀ *(Platyomus)*.
var. *septemmaculatus* Boh. l. c. p. 638; l. c. VI, 1, 1840, p. 171 ♀ *(Platyomus)*.
var. *novemmaculatus* Boh. l. c. I, 2, 1833, p. 638; l. c. VI, 1, 1840, p. 171 ♂ ♀ *(Platyomus)*.

perlepidus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 636; l. c. VI, 1, 1840, p. 168 ♂ ♀ — Brasilien

piscatorius Germ. Ins. Spec. Nov. I, 1824, p. 434 (*Cyphus*). — Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 635 *(Platyomus)*. — Boh. in Schönh. l. c. VI, 1, 1840, p. 161 (*Platyomus*). — Pascoe, Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1886, p. CLII. — „
var. β Schönh. l. c. I, 2, 1833, p. 635; l. c. VI, 1, 1840, p. 162.

planicollis Hustache, Ann. Mus. Nac. Hist. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 165, t. 1, f. 4. — Argentinien: Catamarca

prasinus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 634; l. c. VI, 1, 1840, p. 158 *(Platyomus)*. — Heyne & Taschenb. Exot. Käfer 1908, p. 225, t. 29, f. 30. — „
var. β Schönh. l. c. VI, 1, 1840, p. 158.

signatus Rosensch. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 172 *(Platyomus)*. — Brasilien: Rio de Janeiro

Silbermanni Rosensch. l. c. p. 162. — Heyne & Taschenberg, Exot. Käfer 1908, p. 225, t. 29, f. 32. — Brasilien

subvittatus Voss, Rev. Ent. S. Paulo II, 1932, p. 41. — „

transversesignatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 165 *(Platyomus)*. — „

tripunctatus Kirsch, Berl. Ent. Zeitschr. XVIII, 1874, p. 389. — Peru

undulatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. I, 2, 1833, p. 635; l. c. VI, 1, 1840, p. 167 *(Platyomus)*. — Brasilien

Wahlenbergi Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 1, 1840, p. 159 *(Platyomus)*. — Guyana

28

Platypterocis Lea.

Lea, Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 38. — Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (10) VI, 1930, p. 573.

paradoxus Lea, Proc. Roy. Soc. S. Austral. XXXVIII, 1914, p. 38. — Australien

1

Plococompsus Mshl.

Siehe Pars 131: Curc. Tanymecinae, p. 114. Gehört hierher!

Protolobus Sharp.

Sharp, Trans. Roy. Dubl. Soc. (2) III, 1886, p. 422. — Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1188.

obscurus Sharp, l. c. p. 422. — Broun, Man. New Zeal. Col. V, 1893, p. 1188. — Neuseeland

1

Pseudocyphus Schaeffer.

Schaeff. Bull. Brooklyn Inst. I, 7, 1905, p. 179. — Champion, Biol. Centr.-Amer. IV, 3, 1911, p. 221, 282, 283. — Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 185. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 75, p. 79 Note 1.

auromaculatus Voss, Rev. Ent. Sao Paulo II, 1932, p. 37. — Costarica

atrosignatus Lucas, Casteln. Voy. 1859, p. 155, t. 10, f. 3, a—c (*Platyomus*). — Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 187 (*Pseudocyphus*). — Brasilien

sigillatus Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 421 (*Cyphus*). — Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 187. — Para

chrysopus Champ. Biol. Centr.-Amer. IV, 3, 1911, p. 286, t. 13, f. 13. — Zentral-Amerika

effusus Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) V, 1880, p. 421 (*Cyphus*).. — Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 187. — Para

eximius Voss, Rev. Ent. Sao Paulo II, 1932, p. 36. — Costarica

flexicaulis Schaeff. Bull. Brooklyn Inst. I, 7, 1905, p. 179. — Champion, Biol. Centr.-Amer. IV, 3, 1911, p. 283. — Zentral-Amerika

geminus Champ. Biol. Centr.-Amer. IV, 3, 1911, p. 284, t. 13, f. 8. — „

macroscapus Champ. Biol. Centr.-Amer. IV, 3, 1911, p. 285, t. 13, f. 11. — Zentral-Amerika

marmoratus Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 185, t. 3, f. 5 ♂ ♀. — Brasilien: Obydos; Brit. Guyana

nigroguttatus Champ. Biol. Centr.-Amer. IV, 3, 1911, p. 284, t. 13, f. 9—10. — Amerika

sellatus Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 187, t. 3, f. 9, f. 2e ♂ ♀. — Brasilien: Bahia

squaminasus Champion, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) XIV, 1925, p. 429. — Costarica

viridis Voss, Sborník ent. odd. nár. Mus. Praha XII, 1934, p. 67. — Brasilien

zebra Champ. Biol. Centr.-Amer. IV, 3, 1911, p. 286, t. 13, f. 12. — Zentral-Amerika

14

Rhinospathe Chevr.

Chevr. Ann. Soc. Ent. France (5) VIII, 1878, Bull. p. XIX. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 248. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 87, Note 2.

albomarginata Chevr. l. c. p. XX ♂♀. — Pascoe, Compt. rend. Soc. Ent. Belg. 1886, p. CLII. — Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 248, t. 11, f. 1. — Costarica

albomarginatus Motsch. Étud. Ent. V, 1856, p. 22 (*Hypsonotus;* s. descr.).

V-album Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 3, 1911, p. 249, t. 11, f. 2. — Guatemala

2

Styliscus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 45. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 216 (incertae sedis).

armatus Thunbg. Nova Acta Upsala VII, 1815, p. 119 *(Curculio)*. — Boh. in Schönh. l. c. p. 46 *(Styliscus)*. Kap

1

Styreus Pascoe.

Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (5) XII, 1883, p. 413.

geonomoides Pascoe, l. c. p. 413. N. Australien

1

Synthlibonotus Schönh.

Schönh. Mant. sec. Curcul. 1847, p. 41. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 134. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 17, Note 2. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 72.

carinatus Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VI, 2, 1840, p. 285 *(Epicaerus)*. — Chevr. Ann. Soc. Ent. France 1880, Bull. p. XLII ♂ ♀. Kolumbien

mucronatus Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 18. Venezuela

rufipes Faust, l. c. p. 17. „

? *rufipes* (Schönh.) Lacord.. Gen. Col. VII, 1863, p. 134; Atlas t. 63, f. 5. Kolumbien

scapha Faust, Stett. Ent. Zeit. LIII, 1892, p. 18. Venezuela

viator Chevr. Ann. Soc. Ent. France 1880, Bull. p. XLII ♂ ♀. Guatemala, Mexico

5

Sysciophthalmus Heller.

Siehe Pars 131: Curc. Tanymecinae, p. 60. Gehört hierher!

Taphrorrhinus Fairm.

Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXII, 1903, p. 220. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 512. — Olsoufieff, Mém. Acad. Malgache XIV, 1933, Addendum p. X.

brevicornis Fairm. Ann. Soc. Ent. France LXXII, 1903, p. 220. — Hustache, Ann. Soc. Ent. France LXXXVII, 1918, p. 512. Madagascar

1

Trachyphloeophana Heller.

Heller, Treubia, Suppl. VII, 1929, p. 108.

buruana Heller, l. c. p. 108. Buru

1

Xestogaster Mshl.

Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 221. — Emden, Stett. Ent. Zeit. XCVII, 1936, p. 67.

porosa Mshl. Trans. Ent. Soc. London 1922, p. 221, t. 3, f. 3 ♂ ♀. — Kolumbien

squalida Mshl. l. c. p. 222, t. 3, f. 1 ♀. — „

viridilimbata Bovie, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 67 *(Compsus)*. — Mshl. l. c. p. 221. — Brasilien

3

Species incertae sedis.

alaianus Stierl. Deutsche Ent. Zeitschr. XXX, 1886, p. 191 *(Otiorr.* subg. *Tournieria)*. — Turkestan

antarcticus Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. XI, 1903—09 (1903), p. 57 *(Otiorr.* subg. *Tournieria)*; Ann. Soc. Ent. Belg. XLIX, 1905, p. 140; Exped. Antarct. Belge, Zool. Curc. 1906, p. 45, t. 1, f. 8. — Patagonien

attenuatus Stierl. Mittheil.. Schweiz. Ent. Ges. V, 1877—80 (1879), p. 43 *(Otiorrhynchus)*. — Syrien

brachyderoides Fairm. Naturaliste II, 4, 1882, p. 192; Ann. Soc. Ent. France (6) III, 1883, p. 106 *(Otiorrhynchus)*. — Abyssinien

comatus Petri, Siebenbürg. Käfer 1912, p. 290 *(Otiorrhynchus)*. — Siebenbürgen

cuneiformis Waterh. Ann. Mag. Nat. Hist. XVI, 1845, p. 38 *(Otiorrhynchus)*. — Galapagos-Ins.

dauricus Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. VI, 1862, p. 365; l. c. XVII, 1873, p. 280; Abeille XI, 1873, p. 787 *(Otiorrhynchus)*. — Daurien

delatus Faust, Abh. Zool. Mus. Dresden (Festschrift) VIII, 1899, p. 4 *(Otiorrhynchus)*. — Madagascar: Antananarivo

delicatulus Fåhrs. Oefv. Vet.-Ak. Förh. XXVIII, 1871, p. 37 *(Phyllobius)*. — Auriv. Voy. Rothschild en Éthiopie II, 1922, p. 740 *(Myllocerus)*. — Kafferngebiet

deustus Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 381 *(Otiorrhynchus)*. — Chile

glabratus Krynicki, Bull. Soc. Nat. Moscou VII, 1834, p. 168. — Harold, Col. Hefte X, 1872, p. 220. — Krim

hirtellus Reiche, Voy. Abyssinie Ferret et Gallinier III, 1850, p. 385, t. 24, f. 2 *(Phyllobius)*. — Abessinien

lima Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 298 *(Otiorrhynchus)*. — England

Manderstjernae Ballion, Bull. Soc. Nat. Moscou LIII, 1, 1878, p. 354 *(Otiorrhynchus)*. — Kuldscha

melanothrix Kirby, Fauna Bor.-Amer. IV, 1837, p. 270 (*Trachyphloeus*). — Kirby & Spence, Introd. Class, Ins. ed. IV, 1838, p. 275. — Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 119. — Seidl. Otiorrhynchid. 1868, p. 98, Note (nec G. H. Horn).

Naudini Lucas, Rev. Zool. 1855, p. 292 *(Otiorrhynchus)*. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 163. — Bedel, Ann. Soc. Ent. France (5) VII, 1877, Bull. p.. XX. — Algier

nebulosus Motsch. Etud. Ent. IX, 1860, p. 20 *(Tyloderes)*. — Japan

phaeostictus Fairm. Naturaliste II, 4, 1882, p. 192; Ann. Soc. Ent. France (6) 1883, p. 106 *(Otiorrhynchus)*. — Abessinien

pimeloides Oliv. Entom. V, 83, 1807, p. 371, t. 18, f. 230 *(Curculio)*. — Schönh. Gen. Spec. Curc. II, 2, 1834, p. 634; l. c. XIV, 1, 1843, p. 387 *(Otiorrhynchus)*. — Frankreich

Raffrayi Fairm. Naturaliste II, 4, 1882, p. 192; Ann. Soc. Ent. France (6) III, 1883, p. 106 *(Otiorrhynchus)*. — Abessinien

roseus Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 374 *(Phyllobius)*. — Chili

rufiventris Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. X, 1898—1903 (1902), p. 427 *(Otiorr. subg. Tournieria)*. — Fiori, Riv. Col. Ital. I, 1903, p. 229; l. c. II, 1904, p. 228. — Schweiz: Arosa

Sayi Boh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 323 *(Otiorrhynchus)*. — J. L. Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 96, 1876, p. 61. — Nordamerika

setulosus Boh. Eugenies Resa, Col. 1859, p. 127 *(Otiorrhynchus)*. — Montevideo

subglobosus Blanch. in Gay, Hist. Chile V, 1851, p. 381, t. 24, f. 7 *(Otiorrhynchus)*. — Chili

tumidicollis Stierl. Revis. Eur. Otiorr. 1861, p. 329; Berl. Ent. Zeitschr. XVI, 1872, p. 348; l. c. XVII, 1873, p. 291; Abeille XI, 1873, p. 800. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 437. — Kleinasien: Tokat

validicornis Falderm. Fn. Ent. Transcauc. III, p. 194; in Mém. Soc. Nat. Moscou VI, 1838, p. 24 *(Otiorrhynchus)*. — Gyllh. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 1, 1843, p. 354. — Kolen. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXI, 2, 1858, p. 448. — Stierl. Berl. Ent. Zeitschr. XVII, 1872, p. 272; Abeille XI, 1873, p. 779. — Marseul, Abeille X, 1872, p. 211. — West-Persien

venalis Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXII, 1888, p. 153 *(Otiorr.. subg. Arammichnus)*. — Daurien

28
4090

Addenda et Corrigenda.

p. 5. **Otiorrhynchus** zufügen: Penecke, Kol. Rundsch. XXI, 1935, Nr. 3—4, p. 93, 95, 96. — J. Müller, Boll. Istit. Ent. Univ. Bologna X, 1937, p. 2.

Dodecastichus zufügen: Penecke, l. c. p. 93, 95, 96.

p. 14. *rumicis* Apfelb. zufügen: Smreczynski, Jahresber. Physiograf. Kommiss. Poln. Akad. Wiss. LXX, 1935, p. 93.

p. 18. **alemdaghensis** Reitter zufügen: Zumpt, Acta Inst. Mus. Zool. Univ. Atheniensis I, 1936, Fasc. 4/5, p. 112—120.

alutaceus Germ. zufügen: J. Müller, Boll. Istit. Ent. Univ. Bologna X, 1937, p. 2.

p. 19. **amissus** Reitter zufügen: Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. XVI, 1937, p. 13.

p. 20. **arcticus** O. Fabr. Székessy, Ent. Tidskr. LVII, 1936, p. 107—114.

p. 22. **ardelaicus** Penecke zufügen: Penecke, Kol. Rundsch. XXI, Nr. 3—4, p. 96.

armadillo Rossi zufügen: Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIX, 1937, p. 143.

p. 25. *rufipes* Boh. zufügen: Tempère, Bull. Soc. Ent. France CIV, 1935, p. 267.

p. 28. *subauriculus* Reitter zufügen: Smreczynski, Jahresber. Physiogr. Kommiss. Poln. Akad. Wiss. LXX, 1935, p. 93.

Blanchardi Apfelb. zufügen: Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIX, 1937, p. 131.

brevipilis Apfelb. zufügen: Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1929, Nr. 17/20, p. 199.

p. 29. **cancasanus** Reitter kommt auch in Franz. Pyrenäen und in Sierra Nevada (Hoffmann, Rev. Franc. Ent. III, 1936, p. 147) vor.

Carceli Gyll. zufügen: Zumpt, Inst. Mus. Zool. Univ. Atheniensis I, 1936, Fasc. 4/5, p. 112—120.

Desbrochersi Stierl. ist. als Art zu setzen; zufügen: Zumpt, Acta Inst. Mus. Zool. Univ. Atheniensis I, 1936, Fasc. 4/5, p. 112—120. — Patria zufügen: Griechenland.

graniger Reiche et Saucly ist als Art zu setzen; zufügen: Zumpt, Acta Inst. Mus. Zool. Univ. Atheniensis I, 1936, Fasc. 4/5, p. 112—120. — Patria zufügen: Griechenland.

Statt *carcelioides* lies **carceloides**.

carceloides Stierl. als subsp. zufügen: *bosdaghensis* Lona Boll. Soc. Ent. Ital. LXIX, 1937, p. 145; Patria: Bos-Dagh. (Mazedonien).

p. 30. **cardiniger** Host zufügen: J. Müller, Boll. Ist. Ent. Univ. Bologna X, 1937, p. 1—4.

p. 31. **carpathicus** Daniel zufügen: Penecke, Kol. Rundsch. XXI, Nr. 3—4, 1935, p. 96.

p. 34. **clavalis** Apfelb. zufügen: Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIX, 1937, p. 144. — Als Synonym zufügen: *pilosulus* Penecke.

p. 40. **corsicus** Fairm. als var. zufügen: *Balchowskyi*, Hoffmann, Rev. Franç. Ent. I, 1934, p. 88. — Patria: Corsica; *corvulus* Reitter = **denigrator** Boh. auf p. 112.

p. 42. Nach **dentipes** Gräells einfügen: **Desbrochersi** Stierl. (siehe p. 29).

p. 43. **dinaricus** Apfelb. zufügen: Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. XVI, 1937, p. 13.

p. 45. *Frescati* Boh. nach Zumpt, Ent. Blätt. XXXIII, 1937, Hft. 5, p. 328—333, ist subsp. von **Ot. ligneus** Ol.

p. 46. **glabratus** Stierl. zufügen: Székessy, Ent. Tidskr. LXII, 1936, Hft. 2—3, p. 107—114.

Nach **Ghilianii** Fairm. einfügen: **glabratus** Kryn. (Nach Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. XVI, 1937, p. 7).

glabratus Stierl. nach Solari, l. c. p. 7 = **Winkleri** nom. nov.

p. 47. Nach **grandicollis** Boh. als Art einfügen: **graniger** Reiche et Saulcy.

p. 48. *Halbherri* Stierl. streichen, steht richtig nach **armadillo** Rossi als ihre subsp.

p. 49. **hungaricus:** Patriaangabe: West-Deutschland, Hamburg, Frankfurt streichen.

hypsibatus Ganglb. zufügen: Smreczynski, Jahresber. Physiograf. Kommiss. Poln. Akad. Wiss. LXX, 1935, p. 96. — Patria zufügen: Tomnatek (Carnahora).

p. 51. **Johannis** Stierl. zufügen: Tempère, Bull. Soc. Ent. France CIV, 1935, p. 267. — Patria zufügen: Basses-Pyrenées (Col. de Larrau).

p. 53. **ligneus** Ol. zufügen: Zumpt, Ent. Blätt. XXXIII, 1937, Hft. 5, p. 328—333.

p. 54. *frisius* O. Schneider nach Zumpt, l. c. p. 328—333, als subsp. nach **ligneus** zufügen.

Nach **ligneus** Ol. zufügen: var. (?) *vitellus* Gyll. und subsp. *Frescati* Boh.

p. 55. Nach **macedonicus** zufügen: var. *conrhynchus* Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. XVI, 1937, p. 16. — Schar-Dagh.

planidorsis Fairm. zufügen: Hustache, Ann. France 1923, p. 75. — Zumpt, Bol. Soc. Espan. Hist. Nat. XXXIV, 1934, p. 284, 295. — Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. XVI, 1937, p. 13.

praelongus Fairm. zufügen: Zumpt, Bol. Soc. Espäñ. Hist. Nat. XXXIV, 1934, p. 284, 295.

p. 56. **megareus** Reitter zufügen: Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1929, Nr. 17/20, p. 199.

meridionalis Gyll. zufügen: Hoffmann, Rev. Franç. Ent. II, 1936, p. 148.

p. 57. Nach **mesatlanticus** Peyerimh. einfügen: **Mesnili** Hoffmann, Rev. Franç. Ent. II, 1936, p. 147. — Sierra Nevada, Pic de Mulhaun, Llaguna Caldera (Spanien).

morio F. zufügen: Smreczynski, Jahresber. Physiogr. Kommiss. Poln. Akad. Wiss. LXX, 1935, p. 94.

Nach **morio** F. zufügen: var. *Uyttenboogaarti* Zumpt, Tijdschr. Ent. LXXIX, 1936, p. 92. — Azores.

p. 60. *diversesculptus* Pic zufügen: Tempère, Bull. Soc. Ent. France 1935, p. 267 (Biologie).

p. 61. Nach **nevadensis** Stierl. zufügen: var. *mulhacensis* Hoffmann, Rev. Franç. Ent. III, 1936, p. 147. — Sierra Nevada: Llaguna Caldera (3 200 m).

p. 62. **niger** F. zufügen: Smreczynski, Jahresber. Physiogr. Kommis. Poln. Akad. Wiss. LXX, 1935, p. 93.

p. 65. **nodosus** zufügen: Székessy, Ent. Tidskr. LVII, 1936, Hft. 2—3, p. 107—114.

p. 68. **pedinorrhynchus** Petri zufügen: Penecke, Kol. Rundschau XXI, Nr. 3—4, 1935, p. 103.

perdix Ol. zufügen: Smreczynski, Jahresber. Physiogr. Kommiss. Poln. Akad. Wiss. LXX, 1935, p. 93.

p. 69. **peristericus** Apfelb. zufügen: Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. XVI, 1936, p. 14. — Patria zufügen: Kataphigi.

p. 70. *pilosulus* Penecke streichen (= **clavalis** Apfelb.).

politus Gyll. zufügen: Székessy, Ent. Tidskr. LVII, 1936, Hft. 2—3, p. 107—114.

p. 72. Nach **praecellens** Stierl. zufügen: subsp. *julicus* Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIX, 1937, p. 131.

leliensis Reitter zufügen: Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIX, 1937, p. 144.

Lonae J. Müller zufügen: Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIX, p. 131

Nach **proximus** zufügen: var. *depilis* Smreczynski, Jahresber. Physiogr. Kommiss. Poln. Akad. Wiss. LXX, 1935, p. 94.

p. 73. **pyrenaeus** Gyll. zufügen: Tempère, Bull. Soc. Ent. France CIV, 1935, p. 266.

p. 75. Nach **raucus** F. einfügen: **regliae** Reitter (nach Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. XVI, 1937, p. 10 gute Art).

relictus Apfelb. zufügen: Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, Nr. 17/20, 1929, p. 194.

repletus Boh. zufügen: Smreczynski, Jahresber. Physiogr. Kommiss. Poln. Akad. Wiss. LXX, 1935, p. 93.

p. 77. **rugosostriatus** Apfelb. zufügen: Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, Nr. 17/20, 1929, p. 199.

p. 78. Nach **sabulosus** Gyll. zufügen: subsp. *complanatus* J. Müller, Boll. Istit. Ent. Univ. Bologna X, 1937, p. 4. — Zentraldalmatien: Biocovo.

p. 79. **salicicola** Heyden zufügen: Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIX, 1937, p. 144.

Nach **scaber** L. zufügen: var. *oblongus* Smreczynski, Jahresber. Physiogr. Kommiss. Poln. Akad. Wiss. LXX, 1935, p. 94.

p. 82. Nach **seriehispidus** Stierl. einfügen: **setosellus** Zumpt, Acta Inst. Mus. Zool. Univ. Atheniensis 1936, Tom. I, Fasc. 4/5, p. 114—120. — Griechenland: Attica, Taygetos (*Carceli*-Gruppe).

p. 83. **sphaerosoma** Apfelb. zufügen: Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1929, Nr. 17/20, p. 199.

p. 84. Nach **Stierlini** Gemm. einfügen: **Stöckleini** Zumpt, Acta Inst. Mus. Zool. Univ. Atheniensis 1936, Tom. I, p. 113, 115, 116. — Bulgarien: Perimgeb. (Bansko).

p. 86. *martinensis* Cl. Müller zufügen: Uyttenboogaart, Tijdschr. Ent. LXXVI, 1933, p. 255—258. — Patria zufügen: Steyerische Alpen.

insubricus (Reitze nec Reitter) Patria zufügen: Simplon.

p. 87. **subspinosus** Stierl. zufügen: Zumpt, Acta Inst. Mus. Zool. Univ. Atheniensis Tom. I, 1936, Fasc. 4/5, p. 112—120.

p. 88: *frigidus* Stierl. zufügen: Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. XVI, 1937, p. 13.

p. 90. *kiorensis* Apfelb. zufügen: Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1929, Nr. 17/20, p. 201.

p. 91. **valonensis** Apfelb. zufügen: Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1929, Nr. 17/20, p. 199.

p. 92. **vitellus** Gyll. streichen (nach Zumpt, Ent. Blätter XXXIII, 1937, Hft. 5, p. 328—333, var. von **ligneus** Ol.).
Nach **vodenensis** Formanek zufügen: **Weiratherianus** Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. XVI, 1937, p. 144. — Nordalbanien: Maja e Jeserce (prope *praecellens* Stierl.).
Weisei Reitter zufügen: Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1929, Nr. 17/20, p. 199.
Nach **Weisei** Reitter einfügen: **Winkleri** Solari (nom. nov.), Mem. Soc. Ent. Ital. XVI, 1937, p. 7.

p. 94. Nach **chrysotrichus** Apfelb. zufügen: var. *plascensis* Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1928, p. 43, 54. — N. Herzeg.: Plase. — Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. XVI, 1937, p. 13.
mughus Apfelb. zufügen: J. Müller, Boll. Ist. Ent. Univ. Bologna X, 1937, p. 5. Patria zufügen: Troglav, Sator, Malovan.

p. 95. Nach **crinipes** L. Müller einfügen: **culmacensis** Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIX, 1937, p. 146. — Südalbanien: Tomor (Kulmak).
Nach **Kelecsenyi** Friv. zufügen: ab. *fallax* Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1928, p. 49. — Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. XVI, 1937, p. 13.
plicirostris zufügen: Lona, l. c. p. 147. — J. Müller, Boll. Ist. Ent. Univ. Bologna X, 1937, p. 5.

p. 96. **Dorymerus** Seidlitz zufügen: Penecke, Kol. Rundschau XXI, 1935, Nr. 3/4, p. 93—96.

p. 100. **alpicola** Boh. zufügen: Penecke, Kol. Rundschau XXI, Nr. 3—4, 1935, p. 104.

p. 102. **Apfelbecki** Stierl. zufügen: Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIX, 1937, p. 147.
Nach **Apfelbecki** zufügen: ab (?) *Kotulae* Smulikowski, Polskie Pismo I, 1922, p. 16. — Polen: Janow. — Smreczynski, Jahresber. Physiogr. Kommiss. Poln. Akad. Wiss. LXX 1935, p. 97.

p. 103. **armipes** Apfelb. zufügen: Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1929, Nr. 17—20, p. 197. — Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. XVI, 1937, p. 10; Boll. Soc. Ent. Ital. LXIX, 1937, p. 131.

p. 104. **asplenii** L. Miller zufügen: Smreczynski, Jahresber. Physiogr. Kommiss. Poln. Akad. Wiss. LXX, 1935, p. 100.

p. 107. Nach **axatensis** Hoffmann einfügen: **Beieri** Penecke, Kol. Rundschau XXI, Nr. 3—4, p. 97. — Patria: Achaia (Griechenland). — Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. XVI, 1937, p. 14.
Nach **Beieri** Penecke einfügen: **Bischoffianus** Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIX, 1937, p. 148. — Veluchi (*Schläfli*-Gruppe).

p. 109. **cirrhocnemis** Apfelb. zufügen: Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1929, Nr. 17/20, p. 197.
coptocnemis Apfelb. zufügen: Apfelb. Neue Betir. syst. Insektenk. IV, 1929, Nr. 17/20, p. 204.

p. 110. **corvus** Boh. zufügen: Smreczynski, Jahresber. Physiogr. Kommiss. Poln. Akad. Wiss. LXX, 1935, p. 99.
cribrirostris Leoni zufügen: Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIX, 1937, p. 150.

p. 111. **Danieli** Apfelb. zufügen: Solari, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIX, 1937, p. 131.

p. 112. **denigrator** Boh. zufügen: Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, Nr. 17/20, 1929, p. 197. — Smreczynski, Jahresb. Physiogr. Kommission Poln. Akad. Wiss. LXX, 135, p.

94. — Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. XVI, 1937, p. 5; Boll. Soc. Ent. Ital. LXIX, 1937, p. 131.
Nach **denigrator** Boh. zufügen: *corvulus* Reitter.
hypsicola Apfelb. zufügen: Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. XVI, 1937, p. 12; Boll. Soc. Ent. Ital. LXIX, 1937, p. 131.
Deubeli Ganglb. zufügen: Smreczynski, Jahresb. Physiogr. Kommiss. Poln. Akad. Wiss. LXX, 1935, p. 94.
p. 113. **dives** Germ. zufügen: Smreczynski Jahresb. Physiogr. Kommiss. Poln. Akad. Wiss. LXX, 1935, p. 97.
p. 115. **equestris** Richter zufügen: Smreczynski, Jahresber. Physiogr. Kommiss. Poln. Akad. Wiss. 1935, LXX, p. 96.
p. 116. **etropolensis** Apfelb. zufügen: Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1929, Nr. 17/20, p. 202.
longirostris Strl. zufügen: Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIX, 1937, p. 147.
fraxini Germ. Lona, l. c. p. 148.
p. 117. **fusciventris** Fuss zufügen: Penecke, Kol. Rundschau XXI, Nr. 3—4, 1935, p. 103.
p. 122. *chionophilus* Apfelb. zufügen: Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1929, Nr. 17/20, p. 198, 202.
p. 123. **Joakimoffi** Apfelb. zufügen: Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. XVI, 1937, p. 10; Boll. Soc. Ent. Ital. LXIX, 1937, p. 131.
Kollari Gyll. zufügen: R. Scholz, Ent. Blätter XXXI, 1936, p. 36. — Smreczynski Jahresber. Physiogr. Kommiss. Poln. Akad. Wiss. LXX, 1935, p. 96.
p. 124. **kopaonicensis** Apfelb. zufügen: Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1929, Nr. 17/20, p. 204.
koritnicensis Apfelb. zufügen: Apfelb. l. c. p. 201.
Kratteri Boh. zufügen: Smreczynski, Jahresber. Physiogr. Kommiss. Poln. Akad. Wiss. LXX, 1935, p. 98.
egregius L. Miller zufügen: Smreczynski, l. c. p. 99.
curvipes Stierl. zufügen: Smreczynski, l. c. p. 99.
Nach **Kratteri** Boh. zufügen: var. *densesquamosa* Smreczynski, l. c. p. 99.
p. 125. **latitarsis** Apfelb. zufügen: Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1929, Nr. 17/20, p. 204.
p. 126. **longipennis** Stierl. zufügen: Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. XVI, 1937, p. 15.
p. 127. **lumensis** Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1929, p. 194, 197.
Nach **Maderi** Formánek, zufügen: subsp. *dajtitensis* Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIX, 1937. — Mali Dajtit (Albanien).
malissorum Apfelb. zufügen: Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. 1929, Nr. 17/20, p. 202.
pierinus Reitter zufügen: Apfelb. l. c. p. 203.
p. 128. **Mehelyi** Stierl. zufügen: Smreczynski, Jahresber. Physiogr. Kommiss. Poln. Akad. Wiss. LXX, 1935, p. 98.
Meschniggi Petri zufügen: Penecke, Kol. Rundschau XXI, Nr. 3—4, 1935, p. 103.
Millerianus Reitter zufügen: Smreczynski, l. c. p. 97.
p. 129. **munelensis** Apfelb. zufügen: Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1929, Nr. 17/20, p. 194.
p. 131. **obsidianus** Boh. zufügen: Smreczynski, Jahresber. Physiogr. Kommiss. Poln. Akad. Wiss. LXX, 1935, p. 100.
p. 132. **oligolepis** Apfelb. zufügen: Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1929, Nr. 17/20, p. 202.
nitidipennis Apfelb. zufügen: Apfelb. l. c. p. 203.

opulentus Germ. zufügen: Smreczynski, Jahresber. Physiogr. Kommiss. Poln. Akad. Wiss. 1935, LXX, p. 98.
parnassius Apfelb. zufügen: Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. XVI, 1937, p. 14.
pedemontanus Stierl. zufügen: Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1929, Nr. 17/20, p. 194.
pelionis Penecke zufügen: Solari, l. c. p. 203.
p. 133. **pinastri** Herbst zufügen: Smreczynski, Jahresber. Physiogr. Kommiss. Poln. Akad. Wiss. LXX, 1935, p. 100.
p. 135. **prisrensis** Apfelb. zufügen: Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. XVI, 1937, p. 15.
p. 136. **Rambouseki** Apfelb. zufügen: Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1929, Nr. 17/20, p. 206.
p. 139. **rugosus** Hummel zufügen: Smreczynski, Jahresber. Physiogr. Kommiss. Poln. Akad. Wiss. LXX, 1935, p. 98.
p. 140. *squamosus* Miller zufügen: Székessy, Ent. Tidskr. LVII, 1936, p. 107—114.
p. 141. **Schaumi** Stierl. zufügen: Smreczynski, Jahresber. Physiogr. Kommiss. Poln. Akad. Wiss. LXX, 1935, p. 96.
Schlaeflini Stierl. zufügen: Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIX, 1937, p. 148.
p. 142. **shardaghensis** Apfelb. zufügen: Apfelb. Neue Beitr. syst Insektenk. IV, 1929, Nr. 17/20, p. 196. — Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. 1937, p. 12; Boll. Soc. Ent. Ital. LXIX, 1937, p. 131.
p. 146. **solitarius** Apfelb. zufügen: Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1929, Nr. 17/20, p. 205.
spinidens Apfelb. zufügen: Apfelb. l. c. p. 203.
p. 154. **veterator** Uyttenboogaart zufügen: Tempère, Boll. Soc. Ent. France CIV, 1937, p. 267.
Arammichnus Gozis zufügen: Penecke, Kol. Rundschau XXI, Nr. 3—4, 1935, p. 93—96. — J. Müller, Boll. Istit. Ent. Univ. Bologna X, 1937, p. 3, 4.
p. 165. **cribricollis** Gyll. zufügen: Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIX, 1937, p. 150.
p. 167. Nach **diotus** Reitter einfügen: **dorymeroides** Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. XVI, 1937, p. 9. — Kataphigi: Cumerka.
edentatus zufügen: Penecke, Kol. Rundschau XXI, 1935, Nr. 3—4, p. 102.
p. 171. Nach **histrioides** Reitter einfügen: **Hormuzachii** Penecke, Kol. Rundschau XXI, Nr. 3—4, 1935, p. 100. — Bukowina: im Karpathenvorlande; Moldau: Jassy (*ligustici*-Gruppe).
Nach **Hormuzachii** Penecke einfügen: **hospitus** Reitter nach Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. XVI, 1937, p. 5—9.
Nach **hospitus** Reitter zufügen: var. *corvinus* Solari, l. c. p. 7. — Bulgarien: Rila-planina (Muss-Alla).
imitator Apfelb. zufügen: Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, Nr. 17/20, p. 205, 207.
p. 172. **innocuus** Boh. zufügen: Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. XVI, 1937, p. 15.
p. 173. Nach **juvencus** zufügen: subsp. *pelagosanus* J. Müller, Boll. Istit. Ent. Univ. Bologna X, 1937, p. 6. — Pelagosa.
p. 174. **Krüperi** Stierl. zufügen: Peyerimhoff, Ann. France 1930, p. 258. — Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. XVI, 1937, p. 10; Boll. Soc. Ent. Ital. LXIX, p. 131.
hospitus Reitter streichen (nach Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. XVI, 1937, p. 5).

regliae Reitter streichen (nach Solari, l. c. p. 10).
tomoricensis Lona zufügen: Solari, l. c. p. 8.
angulipes Apfelb. = **Krüperi** Stierl. Nach Solari, l. c. p. 7
ligustici zufügen: Penecke, Kol. Rundschau XXI, Nr. 3—4, 1935, p. 101.

p. 179. **mendax** Apfelb. zufügen: Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1929, Nr. 17/20, p. 206.

p. 184. **plagiator** Apfelb. zufügen: Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1929, Nr. 17/20, p. 207.

p. 189. **tristis** Scop. zufügen: Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. XVI, 1937, p. 15.

p. 194. Nach **pachyscelis** Stierl. einfügen: **Rucconii** Lona, Boll. Soc. Ent. Ital. LXIX, 1937, p. 149. — Grecia.

p. 195. **subsulcatus** Apfelb. zufügen: Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1929, Nr. 17/20, p. 208.
Tournieria Stierl. zufügen: Penecke, Kol. Rundschau XXI, Nr. 3—4, 1935, p. 93—95.

p. 199. **callicnemis** Apfelb. zufügen: Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1929, Nr. 17/20, p. 209.
coarctatus Stierl. zufügen: Smreczynski Jahresber. Physiogr. Kommiss. Poln. Akad. Wiss. LXX, 1935, p. 100.

p. 200. **cukalensis** Apfelb. zufügen: Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1929, Nr. 17/20, p. 209.

p. 201. **desertus** Rosenh. zufügen: W. Hellén, Notul. Ent. 1921, p. 37. — Jansson, Ent. Tidskr. 1928, p. 133; Ent. Blätt. XXXII, 1936, p. 219. — Munster, Norsk Ent. Tidskr. 1928, p. 272. — Patria zufügen: Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark.
Nach **desertus** Rosenh. als Synonym zufügen: *pellucidus* J. Sahlberg, Acta Soc. Fenn. Nr. 3, 1900, p. 18—20.

p. 202. **europaeus** Stierl. zufügen: Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1929, Nr. 17/20, p. 209.

p. 205. **globipes** Apfelb. zufügen: Apfelb. l. c. p. 210.

p. 209. **nudiformis** Reitter zufügen: Penecke, Kol. Rundschau XXI, Nr. 3—4, 1935, p. 104.

p. 213. **pilosellus** Apfelb. zufügen: l. c. p. 209.
porcellus zufügen: Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. XVI, 1937, p. 15. — Patria zufügen: Abruzzo (M. Marsicano), Lazio (M. Filettino), Lucania (M. Pollino).

p. 215. **rotundatus** zufügen: Smreczynski, Jahresber. Physiogr. Kommiss. Poln. Akad. Wiss. LXX, 1935, p. 100.

p. 217. **Steindachneri** Apfelb. zufügen: Apfelb. Neue Beitr. syst. Insektenk. IV, 1929, p. 209.

p. 218. **veluchianus** Apfelb. zufügen: Apfelb. l. c. p. 209.

p. 222. *Kotulae* Smulikowski streichen.
Nach **lagenaria** Muls. einfügen: **Marshalli** nom. nov. Solari, Mem. Soc. Ent. Ital. XVI, 1937, p. 15.
Nach **Marshalli** Solari als Synonym zufügen: *peregrinus* Mshl. Fn. Ind. 16 (Nach Solari, l. c. p. 15).

p. 279. **nitidipennis** Auriv. zufügen: var. *Aurivillii* Bryk, Soc. Ent. XLII, 1927, p. 39. — Elgon.

p. 290. **brevirostris** Auriv. und **lobellae** Auriv. zufügen: Bryk, Soc. Ent. XVII, 1927, p. 39.

p. 349. **Calidiopsis** Heller streichen, steht richtig p. 292.

p. 510. **atrosignatus** Cast. streichen, steht richtig p. 530.

p. 516. **impositus** Pasc. streichen, steht richtig auf p. 520.

16
4106

Index.

Tribus, Genera, Subgenera, Sectiones.

Acalorrnynchus Reitter 97
Achrastenus Horn 445
Acoptorhynchus Heller 290
Acunotus Reitter 97
Adorhabdotus Faust 347
Advenardus Reitter 97
Agasphaerops Horn 506
Agatholobus Broun 506
Agraphus Schönh. 291
Agraphi J. L. Lec. 4
Agronus G. H. Horn 238
Aigelius Desbr. 406
Aleutinops Reitter 97
Alsus Motsch. 501
Altonomus Desbr. 400
Amicromias Reitter 415
Amosilnus Reitter 97
Amphionotus Faust 291
Amphitmetus Kolbe 347
Amphora Woll. 435
Amphorygma Mshl. 502
Amyntas Woll. 435
Anaplesius Mshl. 348
Anaptoplus Fairm. 506
Anchitelus Van Dyke 507
Anchorrhynchus Reitter 97
Anemophilus Woll. 344
Anillobius Fauv. 507
Anomalodermus Perroud 507
Anomophthalmus Fairm. 507
Anosimus Roel. 374
Antyspyris Mshl. 273
Aomus Schönh. 434
Aphrastus Schönh. 502
Aphyonotus Faust 434
Apirocalus Pascoe 291
Aporolobus Sharp 507
Apotmetus Mshl. 273
Apotomorhamphus Faust 291
Apotorhynchus Sharp 404
Aprepes Schönh. 497
Aptolemus Schönh. 445
Aragnomus Horn 273
Arammichnasus Reitter 154
Arammichnus Gozis 154, 539
Arammichnus Reitter 154
Aranihus Reitter 16
Argoptochus Reitter 401
Argoptochus Weise 400
Arrhaptogaster Roel. 507
Arrhines Schönh. 374
Asaphia Broun 399
Asceparnus Schönh. 274
Asmaratrox Heller 435
Asphaerorrhynchus Reitter 16
Asphalmus Sharp 507
Atactoglymma Heller 292
Atactophysis Heller 292
Atactus Faust 292
Atlantis Woll. 435
Atoporhynchus Desbr. 404
Auklandius Gemm.-Har. 507

Babaultia Hust. 349
Barianus Fairm. 348
Behrensiellus Berg 292
Besobarvus Reitter 154
Bonthaina Heller 292
Brachycaulus Mshl. 503
Brachycyrtus Fairm. 349
Brachymerinthus Faust 502
Brachyomus Lacord. 508
Brachyrhinae Everts 4
Brachyrhinae Fowler 4
Brachyrhinidae Lesne 3
Brachyrhinus Latr. 5
Brachyrrhini Everts 4
Brachyrrhininae Bedel 4
Brachystylus Schönh. 445
Bryochaeta Pascoe 362
Bytosmesus Reitter 97

Cacochromus Sharp 508
Cadoderus Mshl. 349
Caenopsis Bach 248
Caenopsimorphus Desbr. 404
Calidiopsis Heller 292, 349
Calyptops Schönh. 239
Callizonus Schönh. 518
Canopus Mars. 435
Catalalus Schönh. 350
Catamonus Schönh. 508
Cataphorticus Jacq. 248
Cataphractus Behrens 292
Caterectus Schönh. 274
Catergus Schönh. 239
Caterictus Gemm.-Har. 274
Cathormiocerini Reitter 315

Cathormiocerinus Escal. 335
Cathormiocerus Escal. 335
Cathormiocerus Schönh. 334
Catodryobius Broun 239
Catorygma Mshl. 503
Celeuthetes Schönh. 293
Celeuthetiden Heller 290
Celeuthetides Faust 290
Celeuthetides Lacord. 290
Celeuthetides Seidl. 290
Celeuthetini 290
Celeuthetini Pierce 290
Centricnemus Stev. 254
Ceratocrates Har. 364
Cercopeus Schönh. 344
Cercopius Gemm. 344
Cerdelcus Reitter 16
Cerpoceus Lacord. 344
Chaerorhinus Chevr. 415
Chaetechus G. H. Horn 345
Chalepoderus Mshl. 351
Chaunoderus Gerst. 364
Chiloneonasus Reitter 404
Choerocephalus Chevr. 415
Choerocephalus Desbr. 417
Choerorhamphus Faust 294
Choilisanus Reitter 16
Cirorrhynchus Apfelb. 92
Cissodicasticus Hust. 351
Cladeyterus Schönh. 509
Cnemidothrix Fairm. 294
Colposternum Heller 294
Compsus Schönh. 509
Coptorhynchus Guér. 294
Corigetini Faust 374
Cosmorhinus Schönh. 351
Cryphiphorus Stierl. 155
Ctenochirus Seidl. 255
Curiades Pascoe 513
Cycliscus Schönh. 351
Cyclobarus Faust 404
Cyclomaurus Fairm. 405
Cyclopterini Porta 400
Cyclopterini Reitter 400
Cyclopterus Seidl. 410
Cycloptochus Reitter 406
Cyphoides Linell 513
Cyphoscelis Woll. 435
Cyrtolepus Desbr. 406,
Cyrtolepus Desbr. 407
Cyrtolepidopus Van Dyke 513
Cyrtomezia Rye 435
Cyrtozemia Pascoe 435

Delhandus Reitter 16
Demenica Pascoe 364
Desbrochersella Reitter 417
Diaecoderus Fairm. 239
Diallobius Sharp 500
Dialonedus Reitter 97
Diaprepes Schönh. 514, 518
Diatmetus Gerst. 351
Dibredus Reitter 16
Dicasticus Pascoe 352
Dichthadiorrhinus Rye 514
Dichtorrhinus Waterh. 514
Dicorrhinus Rye 514
Dieletus Reitter 466
Diethicus Pascoe 353
Dinosius Fairm. 514
Dodecastichus Stierl. 5, 534
Dorymerus Reitter 96, 537
Dorymerus Seidl. 96
Dostacasbus Reitter 97
Drepanoderes G. R. Waterh. 503
Duphanastus Reitter 97
Dysommatus Mshl. 514
Dysticheus G. H. Horn 274

Ecestomus Reitter 97
Ectemnomerus Faust 300
Ectmetaspidus Form. 375
Ectomogaster Apfelb. 496
Edelengus Reitter 155
Egydelenus Reitter 16
Elechranus Reitter 16
Ellimenistes Schönh. 353
Ellimorrhinus Kolbe 354
Elvandrinus Reitter 155
Elytrocheilus Faust 301
Elytrodes Stev. 418
Elytrodon Schönh. 418
Elytrogonus Guér. 302
Elytrurus Schönh. 302
Embrithes Schönh. 354
Empaeotes Pascoe 447
Emperorrhinus Mshl. 375
Enaptomias Faust 304
Entypotrachelus Kolbe 355
Epherina Pascoe 504
Ephradus Megerle 316
Ephraenus Reitter 196
Epicalus Motsch. 504
Epilaris Pascoe 514
Epipedosoma Chevr. 356
Epiramphus Champ. 348
Episomellus Kirsch 515
Episomides Lacord. 364
Episomides Mshl. 364
Episomides Seidl. 364
Episomini 364
Episomoides Kôno 504
Episomus Faust 365
Episomus Schönh. 365
Episomus Schönh. 373
Epitimetes Pascoe 239
Epitosus Sharp 515
Epizorus Pascoe 304
Eptacus Desbr. 408
Ergiferanus Reitter 97

Eucyllus G. H. Horn 274
Eucyrtus Faust 304
Eumyllocerus Sharp 375
Eunihus Reitter 16
Euperitelus Champ. 359
Eupiona Pascoe 356
Euplatinus Desbr. 409
Eupyrgops Berg 304
Eurhynchomys Hust. 356
Eurychirus Stierl. 154
Eurynotia Broun 447
Eustales Schönh. 515
Eustalis Germ. 515
Eustylides Lacord. 444
Eustylides Seidl. 444
Eustylini 444
Eustylini Pierce 444
Eustylomorphus Pierce 516
Eustylus Schönh. 446
Evadodes Blackb. 517
Evadomorpha Blackb. 517
Evas Pascoe 517
Evotus Lec. 517
Exonastus Broun 240
Exophthalmida Faust 517
Exophthalmodes Pierce 518
Exophthalmus Schönh. 518
Exorides Pascoe 524

Felicienella Reitter 415
Fondajenus Reitter 16

Geoderces G. H. Horn 274
Geodercodes Casey 275
Getopsephus Broun 240
Glyptosomus Schönh. 275
Gymnomorphus Seidl. 254
Gynaria Pascoe 304
Gyratogaster K. & J. Daniel 420

Hadrorrhinus Schönh. 357
Hanibotus Reitter 155
Harpinorrhynchus Reitter 16
Helicorhynchus Olliff 240
Henschia Reitter 403
Heterexis Broun 240
Heteroglymma Faust 305
Hlavena Reitter 420
Holcorhinides Desbr. 400
Holcorhinini Winkler 400
Holcorrhina Champ. 400
Holcorrhinini 400
Holcorrhinini Porta 400
Holcorrhinini Reitter 400
Holcorhinus Schönh. 409
Holomrasus Reitter 155
Holorrhynchus Mshl. 375
Homodus Broun 240
Homorhythmus Bedel 250
Hoplophyllobius Apfelb. 495
Hoplotrigonops Heller 305
Hormorus Horn 525
Hormotrophus Schönh. 504
Hygrochus Broun 240
Hyperstylus Roel. 375
Hyphanthus Germ. 241

Idaspora Pascoe 504
Idiopsis Faust 305
Idorhynchus Faust 306
Ischnobrotus Hustache 526
Isomerinthus Schönh. 294
Isomerinthus Schönh. 307
Isomerinthus Schönh. 312
Isopterus Faust 526
Isaniris J. Thoms 241

Jelenantus Reitter 17

Kietana Heller 306
Kreinidinus Reitter 98
Kurilonus Sharp 526

Lachnotarsus Mshl. 372
Lacocnesus Reitter 155
Lacordairius Ch. Bris. 316
Lalagetes Schönh. 357
Laparocerides Lacord. 434
Laparocerides Seidl. 434
Laparocerides Woll. 434
Laparocerini 434
Laparocerus Mars. 435
Laparocerus Schönh. 435
Leianisorhynchus Pic 421
Lepesoma Motsch. 502
Lepidosoma Gemm.-Har. 502
Leptosphaerotus Seidl. 269
Leptospyris Auriv. 275
Lepydnus Champ. 242
Lichenophagus Woll. 440
Limatogaster Apfelb. 193
Lixorrhynchus Reitter 98
Lolatismus Reitter 17
Lupinocolus Van Dyke 526
Lyosystates Hust. 280

Machaerostylus Heller 306
Macrocorynus Schönh. 378
Majetnecus Reitter 98
Mazuranella Form. 273
Mecomerinthus Faust 358
Mecostylus Kolbe 358
Meira Jacq. 265
Meiranella Reitter 237
Melasemnus Reitter 196
Merimnetes Schönh. 441
Meriplodus Reitter 155
Merulia Auriv. 276
Mesoniomus Reitter 98

Mesostylini 290
Mesostylini Reitter 290
Mesostylus Faust 290
Metaphyllobius Smirnov 466
Metopiorrhynchus Reitter 98
Microgonus Van Dyke 306
Microphalantus Reitter 17
Mierginus Reitter 98
Miloderoides Van Dyke 526
Misenatus Reitter 98
Misonermus Dallas 316
Mitadileus Reitter 98
Mitarodes Reitter 98
Mitomermus Jacq. 335
Mitomiris Reitter 155
Mitophorus Gerst. 242
Motilacanus Reitter 17
Mylacini 415
Mylacini Porta 415
Mylacini Reitter 415
Mylacomias Reitter 421
Mylacorhina Reitter 376
Mylacorrhynchina Reitter 374
Mylacus Boh. 421
Myllocerops Reitter 376
Myllocerus Schönh. 378
Myosides Roel. 526

Namertanus Reitter 196
Nanoschetus Reitter 466
Nastini 442
Nastini Reitter 442
Nastus Schönh. 442
Necotaleus Reitter 98
Nehrodistus Reitter 98
Nematocerus Reiche 289
Nemocestes Van Dyke 274
Nemoicus Steph. 461
Neobryochaeta Hust. 358
Neobudemus Reitter 17
Neomerimnetes Blackb. 441
Neomias Hust. 276
Neoptochus G. H. Horn 377
Neopyrgops Heller 307
Neosphrigodes Hust. 527
Neosystates Hust. 279
Neoteripelus Hust. 279
Neotournieria Apfelb. 218
Neripleionus Reitter 454
Nicaeana Pascoe 527
Nihus Reitter 17
Nilepolenis Reitter 17
Nonnotus Sharp 504
Normotionus Reitter 98
Nothognathides Mshl. 374
Nothognathini 374
Nothognathus Mshl. 374
Notiopatae Broun 345
Nubidanus Reitter 155
Nucterocephalus Desbr. 410

Oarius Desbr. 502
Obrasilus Reitter 98
Obvoderus Reitter 98
Ochrometa Pascoe 527
Oclandius Blanch. 507
Ocynoma Pascoe 307
Odelengus Reitter 155
Odopadus Reitter 196
Oedecnemidius Daniel 465
Omias Form. 427
Omias Schönh. 426
Omoiotus Sharp 234
Onychophyllobius Schilsky 450
Oosomides Lacord. 347
Oosomides Seidlitz. 347
Oosominae Kolbe 347
Oosomini 347
Oosomus Schönh. 358
Opitomorphus Motsch. 502
Opseotrophus Faust 359
Oreorrhinus Mshl. 277
Oreosystates Mshl. 277
Orthoptochus Casey 278
Osmichanes Reitter 464
Osmobodes Reitter 155
Otiolehus Reitter 98
Otiomimus Reitter 17
Otiorhynchi J. L. Lec. 3
Otiorhynchidae Faust 3
Otiorhynchidae J. L. Lec. 3
Otiorhynchidae Seidl. 3
Otiorhynchidae Sharp 3
Otiorhynchiden Apfelb. 3
Otiorhynchides Bach 3
Otiorhynchides Lacord. 3, 4
Otiorhynchides Mars. 3
Otiorhynchides Schönh. 3
Otiorhynchides s. str. Seidl. 36
Otiorhynchides Seidl. 3
Otiorhynchina Fowler 4
Otiorhynchina C. G. Thoms. 3
Otiorhynchinae Blatch. & Leng 4
Otiorhynchinae Pascoe 3
Otiorhynchinae Redt. 3
Otiorhynchini Blatchley & Leng 247, 315
Otiorhynchini J. L. Lec. 3
Otiorhynchini Sharp 3
Otiorhynchini Seidl. 4
Otiorhynchini Stierl. 4
Otiorrhynchides Seidl. 247, 315
Otiorrhynchiens Lameere 3
Otiorrhynchinae Kuhnt 4
Otiorrhynchinae Reitter 4
Otiorrhynchines Lameere 3
Otiorrhynchini 4
Otiorrhynchini Reitter 4
Otiorhynchini Wagner & Schaufuss 4

Otiorrhynchus Germ. 4, 16, 534
Otiorrhynchus Reitter 17
Otismotilus Reitter 17
Oxyderces Schönh. 508

Pachyrhynchidius Faust 307
Padilehus Reitter 95
Paelocharis Broun 345
Panormus Casey 345
Panorosemus Reitter 196
Paracyclomaurus Desbr. 411
Paragraphus Bl. et Leng 243
Parameira Seidl. 237
Paranemoicus Schilsky 453
Paraphyllobius Schilsky 497
Parapionus Mshl. 372
Paraplesius Hartm. 359
Paraptochus Seidl. 278
Parascythropus Desbr. 498
Parasphenogaster Heller 307
Parasystates Auriv. 276
Paratactus Heller 307
Paratmetus Auriv. 360
Paratrachyphloeus Desbr. 316
Parexophthalmus Heller 527
Parnemoicus Reitter 453
Pedanus Schönh. 254
Pendagron Reitter 196
Peribrotus Gerst. 359
Periderces Mshl. 528
Periteli J. L. Lec. 247
Peritelides Lacord. 247
Peritelinae Casey 247
Peritelini 247
Peritelini Hust. 247
Peritelini Porta 247
Peritelini Reitter 247
Peritelinus Casey 278
Peritelodes Casey 278
Peritelomus Faust 360
Periteloneus Reitter 411
Peritelopsis G. H. Horn 278
Peritelus Germ. 253
Peritelus Seidl. 256
Peritmetus Kolbe 360
Petalorrhynchus Reitter 17
Phaeocharis Broun 243
Phalantorrhynchus Reitt. 17
Phaops Sahlb. 515
Phailomerinthus Lacord. 393
Phaulomerinthus Gemm. 393
Phaylomerinthus Schönh. 393
Phlyctinus Schönh. 243
Phlyda Pascoe 504
Phraotes Pascoe 307
Phyllerastes Stev. 464
Phyllobides Bach 448
Phyllobides Schönh. 448
Phyllobiens Lameere 448
Phyllobiides Desbr. 448
Phyllobiides Lacord. 448
Phyllobiides Seidl. 448
Phyllobiina Fowler 448
Phyllobiina C. G. Thoms. 448
Phyllobiini Bedel 448
Phyllobiini Everts 449
Phyllobiini Hust. 449
Phyllobiini Porta 449
Phyllobiini Reitter 449
Phyllobiinii J. L. Lec. 448
Phyllobiini 448
Phyllobioides Form. 501
Phyllobius Germ. 449
Phyllobius Seidl. 466
Phyllolytus Fairm. 377
Piezoderes Schönh. 361
Piezonotus Schönh. 307
Pimelorrhinus Reitter 412
Pinduchus Reitter 196
Piopisidus Reitter 99
Pirostovedus Reitter 99
Plagius Desbr. 466
Platyacus Faust 308
Platycnemidius Apfelb. 454
Platyomicus Thoms. 373
Platyomida White 447
Platyomus Schönh. 528
Platyomus Schönh. 509
Platypterocis Lea 529
Platyrhynchus Chevr. 393
Platyspartus Faust 308
Pliadonus Reitter 196
Plococompsus Mshl. 529
Pocodalemus Reitter 196
Podomincus Reitter 196
Podomebistus Reitter 196
Podoropelmus Reitter 196
Polycatus Heller 309
Polyrhabdotus Faust 361
Porpacus Schönh. 361
Postaremus Reitter 17
Postupatus Reitter 99
Prepodes Schönh. 518
Prilisvanus Reitter 99
Prodeminus Reitter 197
Proictidius Fairm. 350
Propacus (Schönh.) Heyne & Taschenb. 361
Proremus Reitter 197
Protolobus Sharp 530
Protophormus Sharp 399
Provadilus Reitter 99
Proxyrodes Blackb. 505
Proxyrus Pascoe 505
Pseudeustylus Champ. 448
Pseudocratopus Hust. 244
Pseudocyphus Schäffer 530
Pseudolacordairius Escal. 316
Pseudomeira Stierl. 262
Pseudomyllocerus Desbr. 450

Pseudosphaeropterus Heller 309
Pseudottistira Heller 309
Psomeles Guér. 309
Ptochella Reitter 377
Ptochina Reitter 374
Ptochini 374
Ptochini Reitter 374
Ptochus Bach 400
Ptochus Schönh. 393
Ptochus Seidl. 393
Pyctoderes Schönh. 361
Pyrgops Schönh. 309

Rhadinoscapus Kolbe 362
Rhinochrosis Desbr. 430
Rhinodontus Faust 334
Rhinomias Reitter 430
Rhinoscythropus Desbr. 501
Rhinospathe Chevr. 530
Rhyncholobus Gahan 312
Rhynchomys Fairm. 356
Rhynchuchus Boh. 505
Rhyncogonus Sharp 310
Rhyopodes J. H. Horn 279
Rhypodillus Cock 279
Rimenostolus Reitter 197
Rosvalestus Reitter 99
Rusnepranus Reitter 17

Satnalistus Reitter 99
Schaumius Ch. Bris. 335
Sciobius Schönh. 244
Sciopithes Horn 247
Scoliacerus Weise 335
Scoliacerus Woll. 335
Seneciobius Auriv. 279
Simoini Pierce 247
Simallus Pascoe 365
Simophorus Faust 505
Siteytes Lacord. 306
Siteytes Schönh. 244
Solariella Flach 234
Solariola Flach 233
Sphaeromus Schönh. 293
Sphaeropterus Guér. 312
Sphaerorhinus Guér. 313
Sphenogaster Faust 313
Sphrigodes Gerst. 362
Spodocellinus Reitter 99
Stelorrhinus Mshl. 377
Stenoptochus Casey 280
Stierlinellus Reitter 17
Stierlinia Desbr. 344
Stomodes Schönh. 235
Stomodesops Reitter 237
Straticus Pascoe 442
Stupamacus Reitter 155
Styliscus Schönh. 531
Styreus Pascoe 531
Subleptospyris Mshl. 280
Subphyllobius Schilsky 456
Synomus Pascoe 398
Syntaphocerus Thoms. 362
Synthlibonotus Schönh. 531
Sysciophthalmus Heller 531
Systates Gerst. 280

Tanycerus Lacord. 289
Taphrorrhinus Fairm. 531
Tecutinus Reitter 155
Telenica Pascoe 398
Temnoscapus Chevr. 448
Teripelus Heller 432
Thalycrynchus Reitter 17
Thamiras Champ. 345
Thinoxenus G. H. Horn 289
Thricolepis G. H. Horn 289
Tigones Broun 399
Timalphus Des Gozis 155
Timareta Pascoe 346
Tithonus Reitter 155
Titinia Pascoe 505
Tournieria Stierlin 195, 540
Tournieria Reitter 197
Trachyodes Mshl. 347
Trachyphilus Faust 334
Trachyphloeoides Form. 334
Trachyphloeides Lacord. 315
Trachyphloeides Mshl. 315
Trachyphloeini 315
Trachyphloeini Hust. 315
Trachyphloeini Pierce 315
Trachyphloeini Reitter 315
Trachyphloeomimus Champ. 347
Trachyphloeops Roelofs 334
Trachyphloeophana Heller 531
Trachyphloesoma Woll. 334
Trachyphloeus Germ. 316
Trepimetus Hust. 363
Trigonops Guér. 313
Trigonospartus Faust 315
Troglorrynchus Schmidt 229
Tyloderes Stierl. 218

Udanellus Reitter 454
Udonedus Reitter 99
Udosellus Reitter 99
Ulozenus Reitter 99
Urometopus Form. 432
Urorrhynchus Reitter 17
Usipoconus Reitter 99
Ustavenus Reitter 466

Vedopranus Reitter 99
Vicoranius Reitter 99
Viroprius Reitter 197

Xestogaster Mshl. 531
Xestorhinus Auriv. 290

Zadrehus Reitter 155
Zariedus Reitter 197
Zavodesus Reitter 197
Zelotomelus Reitter 197
Zenagraphus Broun 247
Zustalestus Reitter 17
Zyrcosa Pascoe 374

Species, Subspecies, Varietates.

abagoensis Reitter 197
abchasicus Rost 100
Abeillei Guilleb. 498
aberdarensis Mshl. 277
aberrans Lea (Mylloc.) 378
aberrans Fairm. (Sphaerorh.) 313
aberrans Stierl. (Otiorrh.) 156
abietinus Apfelb. 202
abnormalis Sharp 378
abnormicollis Reitter 156
abruptecostatus Mshl. 524
abruzzensis Stierl. 77
abstersus Pascoe 505
abundans Lea 379
abyssinicus Fairm. (Syst.) 280
abyssinicus Hust. (Peritm.) 360
abyssinicus Hust. (Mylloc.) 378
abyssinicus Hust. (Parasyst.) 276
acaciae Stebbing 378
acanthoides Heller 362
acanthomerus Heller 526
acatium Gyllh. 220
acerbus Faust 242
aceri Kôno 378
Achardi Desbr. 466
aciculatifrons Boh. 244
acrolithus Germ. 509
aculeata Broun 447
acuminata Pascoe 517
acuminatus Boh. (Rhynchuchus) 505
acuminatus Boh. (Phyllobius) 467
acuminatus Broun (Getopseph.) 240
acuminatus Desbr. (Phyllobius) 467
acuminatus Hustache (Systates) 280
acuminatus Mshl. (Mecostylus) 358
acuminatus Stierl. (Otiorrh.) 209
acuminatus Woll. (Lichenoph.) 440
acuticauda Fairm. 302
acuticollis Faust 241
acutidens Lea 378
acutus Say 445
adamantinus Germ. (Eust.) 515
adamantinus Kirsch (Comps.) 509
Adamsoni Van Dyke 310
Adelaidae Reitter 217
adjunctus Mshl. 393
Adonis Apfelb. (Otiorrh.) 17
adonis Mshl. (Compsus) 509
adscitus Germ. 66
adspersus Boh. (Otiorrh.) 220
adspersus Boh. (Neoptochus) 377
adumbratus Faust (Epis.) 366
adumbratus Stierl. (Otiorrh.) 14
adusticornis Kiesenw. 256
aegrotus Boh. 515
aemulus Faust (Episomus) 365
aemulus Mshl. (Otiorrh.) 51
aeneipennis Gerst. 242
aeneolus Har. 280
aeneopunctatus Gyllh. 190
aenescens Hust. (Syst.) 283
aenescens Woll. (Laparoc.) 435
aeneus Auriv. (Syst.) 284
aeneus Van Dyke (Rhyncog.) 310
aequa Broun 447
aequalifrons Blackb. 441
aequatorialis Hust. 272
aequus Mshl. 446
aerifer Germ. 115
aeruginosus Boh. (Compsus) 509
aeruginosus Bonsd. (Phyll.) 487
aeruginosus Faust (Coptorh.) 294
aeruginosus Lea (Mylloc.) 378
aeruginosus Lea (Synomus) 398
aethiops Apfelb. (Otiorrh.) 12
aethiops Behrens (Behrens.) 292
aethiops Woll. (Laparoc.) 436
aetolicus Apfelb. 466
affaber Boh. 18
affinis Hartm. (Diatm.) 351
affinis Hochh. (Otiorrh.) 50
affinis Hust. (Syst.) 280
affinis Mars. (Laparoc.) 440
affinis Redtb. (Otiorrh.) 105
affinis Schultze (Calidiopsis) 292
affinis Stierl. (Otiorrh.) 48
afflictus Faust 393
africana Hust. 502
agglutinans Hust. 269
agnatus Boh. (Embrithes) 354
agnatus Gyllh. (Otiorr.) 176
agonista Germ. 528
agrestis Boh. (Exoph.) 518
agrestis Boh. (Phlyctinus) 243
aidebus Hust. 378
akbesianus Desbr. 496
Akinini Stierl. 156

alagoesus Reitter 202
alajanus Stierl. 532
alata Heller 305
alatus Saund. 302
albanicus Apfelb. (Argopt.) 402
albanicus Apfelb. (Otiorr.) 100
albanicus Apfelb. (Phyllobius) 466
albanicus Apfelb. (Ptochus) 393
albarius Boh. (Compsus) 509
albarius Faust (Episomus) 365
albensis Petri 18
albicans Heller 305
albiceratus Boh. 244
albicinctus Boh. 244
albidoplagiatus Fairm. 308
albidovittatus Fairm. 280
albidus Ballion (Perit.) 272
albidus Champ. (Exophth.) 518
albidus Fåhr. (Ellim.) 353
albidus L. Miller (Phyllob.) 450
albidus Steph. (Phyllob.) 460
albidus Stierl. (Otiorr.) 197
Albinae Formán. (Nastus) 442
Albinae Formán. (Otiorr.) 100
albinus Matsum. 504
albivarius Lea 294
albocoronatus Stierl. 254
albohirtus Faust (Otiorrh.) 197
albohirtus Faust (Systates) 280
albolineatus Champ. (Exoph.) 518
albolineatus Formán. (Nastus) 442
albolineatus Guér. (Sphaer.) 312
albomaculatus Gortani 32
albomarginata Chevr. (Rhinosp.) 530
albomarginatus Lucas (Holcor.) 410
albomarginatus Motsch. (Rhinosp.) 530
albomarginatus Rosensch. (Eust.) 515
albomixtus Boh. 361
albonotatus Mshl. 352
alboornatus Reitter 421
albopictus Broun 399
albopunctatus Lucas 410
alboscutellatus Hust. 378
albosetosus Auriv. (Systates) 285
albosetosus Gestro (Systates) 280
albosetosus Redtb. (Atactus) 292
albosignatus Heller 308
albosquamosus Sallé 518
albosquamulatus Reitter 421
albostigma Faust 366
albovaria Heller 307
albovarius Champ. 359
alboviridis Van Dyke 507
albovittatus Auriv. (Parasyst.) 276
albovittatus Champ. (Exoph.) 518
albovittatus Heller (Elytroch.) 301
albugo Sahlb. 516
albulus Boh. 354
albus Van Dyke 427
algerinus Seidl. 316
algesiranus Escalera 317
alemdaghensis Reitter 38, 534
alepensis Pic 418
alicantinus Escalera 328
alienus Heller 507
Allardi Stierl. 156
Alluaudi Peyerimh. 18
alneti F. (Phyllobius) 493
alneti C. G. Thoms. (Phyllobius) 475
alpestris Stierl. 44
alpicola Boh. 100, 537
alpigradus Müller 102
alpinus Hust. (Entypotr.) 355
alpinus Hust. (Neomias) 526
alpinus Hust. (Parasyt.) 276
alpinus Hust. (Peritmet.) 360
alpinus Richter (Otiorr.) 20
alpinus Stierl. (Phyllobius) 466
alsaticus Silberm. 36
altaicus Gebler (Phyllobius) 499
altaicus Stierl. (Otiorr.) 220
alternans Desbr. (Cathor.) 339
alternans Fairm. (Chaer.) 415
alternans Gyllh. (Trachyph.) 317
alternans Hust. (Parasys.) 276
alternans Kirsch (Compsus) 509
alternans Voß (Myllocerus) 378
alternatum Mshl. 334
alternatus Auriv. (Syst.) 280
alternatus Van Dyke (Rhyncog.) 310
alternevittatus Desbr. 404
alticola Auriv. (Systates) 280
alticola Escal. (Cathorm.) 335
alticola Hust. (Amphitm.) 348
alticola Sol. (Otiorrh.) 7
alticollis Mshl. (Systates) 280
altirostris Faust (Coptorh.) 295
alutaceus Germ. 18, 534
alveolatus Desbr. 335
amanus Reitter 173
amaurus Marsh. 487
amabilis Faust (Syst.) 280
amabilis Heller (Coptorh.) 295
amabilis Stierl. (Otiorr.) 20
amabilis Waterh. (Exopht.) 518
ambiguus Faust 295
ambigener Penecke 19
ambiguus Schönh. 138

ambitiosus Boh. 515
amblyrhinus Lea 378
Ambrosii Bertol. 11
amissus Reitter 19, 534
amoebaeus Suvorov 442
amoena Pascoe 527
amoenulus Gerst. 281
amoenus Faust (Otiorr.) 220
amoenus Hartm. (Cadoderus) 349
amoenus Hartm. (Mylloc.) 378
amoenus Hust. (Mylloc.) 384
amoenus Voß (Mylloc.) 392
Amorei Sol. (Meira) 265
Amorei Desbr. (Stom.) 237
amota Broun 447
amphora Woll. 210
ampliatus Pascoe 357
amplicollis Desbr. (Leptosph.) 270
amplicollis Gerst. (Systates) 281
amplicollis Stierl. (Otiorr.) 156
amplificata Woll. 440
amplipennis Fairm. 19
amplithorax Form. 317
amplus Broun (Exonastus) 240
amplus Heller (Coptorh.) 295
amplus Petri (Otiorrh.) 220
amputatus Chevr. 32
analis Sol. 20
anamalainus Mshl. 378
anatolicus Boh. 197
ancora Faust 364
andarensis Reitter 20
Andreae Desbr. 256
Andreinii Sol. 229
Andrewesi Mshl. (Mylloc.) 378
Andrewesi Mshl. (Episom.) 365
Andrewsi Gahan (Rhyncol.) 312
angolanus Hust. (Platyomicus) 373
angolanus Hust. (Myllocerus) 378
angularis Champ. 503
angulata Motsch. 313
angulatipes Mshl. 378
angulatus Waterh. 303
angulicollis Desbr. 262
angulipennis G. Quedf. 281
angulipes Apfelb. 144, 540
angulithorax Fairm. 281
angustatus Pic (Choeroc.) 416
angustatus Stierl. (Otiorr.) 64
angustatus Stierl. (Stom.) 235
angustibasis Lea 378
angusticollis Boh. (Otiorr.) 220
angusticollis Taschenb. (Syst.) 281
angustifrons Faust (Mylloc.) 192
angustifrons Lucas (Eust.) 515
angustifrons Stierl. (Otiorr.) 156
angustior Pic (Caenopsis) 249
angustior J. Müller (Otiorrh.) 19
angustior Rosenh. (Otiorrh.) 105
angustipennis Lea (Mylloc.) 379
angustipennis Stierl. (Otiorr.) 117
angustirostris Auriv. (Syst.) 281
angustirostris Desbr. (Cyrtolep.) 407
angustisetulus Hansen 320
angustulus Broun (Tigones) 399
angustulus Casey (Sciopithes) 247
angustulus Pic (Cathormioc.) 335
angustulus Woll. (Laparocerus) 436
angustus Mshl. 244
annectens Sharp 499
annibali Stierl. 184
annulatus Mshl. 281
annulicornis Hust. 373
annulipes Chevr. (Episomus) 367
annulipes Apfelb. (Otiorrh.) 102
annulonotatus Waterh. 518
anomastus Tourn. 493
anoplus Lea (Mylloc.) 379
anoplus Forster (Trachyph.) 325
anophthalmoides Reitt. 229
anophthalmus F. Schmidt 229
antarcticus Stierl. 532
antennalis Broun (Tigones) 399
antennalis Voß (Ptochus) 394
antennarius Apfelb. 195
antennata Pascoe 307
antennatus Stierl. (Otiorr.) 20
antennatus Hust. (Chaunoderus) 364
Anthonyi Faust 81
anthracinus Scop. 156
antistes Peyerimh. 102
Antoinei Escal. (Trachyph.) 317
Antoinei Hust. (Cyclobarus) 404
Antoinei Hust. (Otiorr.) 157
Antoniae Reitter 394
apenninus Stierl. 79
Apfelbecki Stierl. (Otiorr.) 102, 537
Apfelbecki Stierl. (Phyllob.) 468
aphthosus Pascoe 379
apiarius Rosensch. 509
apicalis Broun (Platyomida) 447
apicalis Chevr. (Episomus) 365
apicalis Hartm. (Chaunod.) 364
apicalis Heller (Syntaphoc.) 362
apicicornis Fairm. 349
apicatus Mshl. 394
apicipennis Fairm. 281
Apollinis L. Miller 498

appendiculatus Auriv. (Systates) 281
appendiculatus Faust (Episom.) 365
apschuanus Reitter 198
apuanus A. & F. Sol. 317
apulus A. & F. Sol. 157
aquilus Chevr. 269
arabicus Boh. (Mylloc.) 379
arabicus Pic (Holcorh.) 409
arachniformis Reitter (Eptacus) 408
arachniformis Reitter (Otiorrh.) 198
arachnoides Stierl. (Eptacus) 408
arachnoides Stierl. (Otiorrh.) 220
araneus Flach 416
aratus Daniel 20
arborator Herbst 467
archaeus Stierl. 101
arcticus O. Fabr. 20, 534
arctos Reitter 102
arcuatus Casey (Sciopithes) 247
arcuatus Mshl. (Episom.) 365
ardelaicus Penecke 22, 534
arenarius Herbst 74
arduus Mshl. 365
arenosus Stierl. (Otiorrh.) 22
arenosus Stierl. (Otiorrh.) 159
areolatoides Reitter 43
areolatus Stierl. 42
argentatus L. (Phyllobius) 468
argentatus Pic (Trachyphl.) 318
argentatus Reitter (Mesostyl.) 290
argentatus Stierl. (Otiorr.) 93
argenteiventris Pascoe 517
argenteosparsus Stierl. 111
argenteus Stierl. (Otiorrh.) 92
argentifer Stierl. 193
argentinicus Heller 509
argentinensis Hustache 241
argillosus Hochh. 220
argus Reitter 230
argutus Boh. 94
argyreus L. 509
Ariasi Stierl. 85, 122
aridus Pascoe 373
aristatus Boh. (Mylloc.) 379
aristatus Gyllh. (Trachyph.) 318
armadillo Rossi 22, 534
armatissimus Mshl. 510
armatus Auriv. (Syst.) 281
armatus Boh. (Otiorrh.) 102
armatus Roel. (Phyllobius) 499
armatus Seidl. (Mylacus) 421
armatus Thunbg. (Styliscus) 531
armeniacus Hochh. (Otiorrh.) 157
armeniacus Kirsch (Phyllobius) 453
armicrus Fairm. 103
armiger Kolbe 281
armipectus Lea 379
armipes Apfelb. (Otiorrh.) 103, 537
armipes Lea (Mylloc.) 379
armipes Seidl. (Cyclobarus) 405
armipotens Mars. 421
armoricus Escal. 341
arragonicus Escal. 339
arrogans Boh. (Episomus) 365
arrogans Friv. (Otiorrh.) 93
arrogans Reitter (Otiorrh.) 94
Arrowi Mshl. 244
artemisiae Desbr. (Phyll.) 488
artemisiae Pierce (Cercopeus) 345
artensis Montr. (Sphaerop.) 312
articulatus Daniel 24
arvenicus Desbr. 80
ascendens Apfelb. (Otiorrh.) 89
ascendens Peyerh. (Trachyphl.) 318
Ashi Lea 379
asiaticus Desbr. (Rhinoscyth.) 501
asiaticus Formán. (Omias) 427
asiaticus Stierl. (Otiorrh.) 198
asper Sol. (Otiorrh.) 158
asper Hesse (Sciobius) 244
asper Pascoe (Coptorhyn.) 295
asperatus Boh. 318
asperipennis Fairm. 514
asphaltinus Germ. (Otiorrh.) 103
asphaltinus Gyll. (Trachyph.) 318
asplenii L. Miller 104, 537
aspromontis Apfelb. 461
assamensis Mshl. 394
assimilis Auriv. (Syst.) 281
assimilis Broun (Tigones) 399
assimilis Desbr. (Cyrtolepus) 408
assimilis Gemm. (Otiorrh.) 48
astragali Stierl. 250
asturiensis Chevr. 42
astutus Faust 158
ater Herbst (Otiorrh.) 62
ater Kirsch (Compsus) 510
ater Mshl. (Isaniris) 241
ater Stierl. (Phyllobius) 495
ater Steph. (Otiorrh.) 35
aterrimus Boh. 101
athasiensis Reitter 24
atjehensis Ritsema 379
atlanticus Escal. 335
atlasicus Escal. (Otiorrh.) 158
atlasicus Hust. (Phyllob.) 500
atricolor Reitter 158
atripes Apfelb. 6
atrictirostris Rey 323
atroapterus Degeer 158

atronitens Formán. 104
atrosignatus Luc. 530
atrovirens Gyll. 475
attalica Pascoe 356
attaphilus Bris. 335
attenuatus Stierl. 532
atticus Pic (Mylacus) 421
atticus Stierl. (Otiorr.) 178
atticus Stierl. (Otiorr.) 198
auctus Woll. 440
audax Faust 359
aulicus Broun 399
auliensis Reitter 456
aurasiacus Peyerimh. 335
aureocruciatus Desbr. 319
aureolus Apfelb. (Phylloh.) 496
aureolus Gyll. (Otiorrh.) 142
aureolus Hust. (Leptosph.) 270
aureomixtus Boh. 504
auricapillus Germ. 104
auriceps Schönh. (Compsus) 510
auriceps Fåhr. (Myllocerus) 379
auricephalus Say 510
aurichalceus Faust 394
auricomus Germ. 105
aurifer Boh. (Otiorrh.) 24
aurifer Boh. (Phyllob.) 472
aurifex Pascoe (Mylloc.) 379
auriculatus Faust 371
auripes Stierl. 198
Aurivillii Bryk 540
Aurivilliusi Faust 368
aurocincta Heller 310
aurocinctus Lacord. 309
aurofasciatus Heller 309
auroguttatus Stierl. 48
auromaculatus Form. (Otiorr.) 159
auromaculatus Voß (Pseudocyphus) 530
auronitens Mannerh. 515
auropunctatus Gyll. 25
auropupillatus Stierl. 26
aurosparsus Germ. 159
aurosquamulatus Retowski 106
aurosignatus Apfelb. 6
aurosus Rey 67
aurotomentosus Csiki 9
australis Boisd. (Celeuthet.) 293
australis Boisd. (Merimnetes) 441
australis Boisd. (Myllocerus) 379
australis Gyll. (Celeuthetes) 293
australis Mshl. (Isaniris) 241
australis Woll. (Laparocerus) 438
austriacus F. (Otiorr.) 106
austriacus Reitter (Rhinomias) 430
avarus F. (Episomus) 369
avarus F. (Episomus) 370
avenionensis Hust. 336
avuncularis Mshl. 366
axatensis Hoffm. 107
azaleae Penecke 26
azoricus Douet 436

Babaulti Hust. 362
babensis Apfelb. 93
baborensis Pic 416
bacaresensis Escal. 336
baccifer Germ. 241
Bachi (Först.) 248
baeodontomerus Lea 379
baetica Schauf. 417
Bagnolii Stierl. 168
Balassogloi Stierl. 160
balcanicus Stierl. 26
baldensis Czwal. 230
balearicus Desbr. (Peritelus) 256
balearicus Desbr. (Cathormiocerus 336
Ballioni Stark 500
banahaonis Heller 304
banaticus Stierl. 33
Bang-Haasi Schilsky 456
Bangi Reitter 290
Banksi Heller 307
barbadensis Champ. 518
barbarus Desbr. 416
barbipes Saund. et Jekel 294
bardus Boh. 160
Barkeri Mshl. 244
Barrosi Pic 336
basale Heller 305
basicollis Lea 379
basirostris Lea 357
batjanensis Faust 295
Baudii Stierl. (Otiorr.) 151
Baudii Stierl. (Elytrodon) 418
Baudii Stierl. (Meira) 266
Baudii Stierl. (Phyllobius) 498
bavaricus Reitter 36
Bayeri Hust. (Myllocerus) 379
Bayeri Hust. (Systates) 281
beatus Faust (Otiorrh.) 160
beatus Faust (Nastus) 442
Beauprei Pic (Trachyphloeus) 321
Beauprei A. & F. Sol. (Otiorr.) 26
Beccarii Pascoe 295
beiranus Mshl. 281
Beckeri Stierl. 208
Bedeli Peyerimh. 183
Beieri Penecke 537
bellicomus Reitter 93
bellicus Say 291
bellopterus Mars. 438
bellus Faust 349
bengalensis Desbr. (Myllocerus) 391

bengalensis Voß (Ptochus) 394
Benhami Broun 230
benignus Faust 379
Bequaerti Hust. 281
bergamascus Stierl. 22
Bertarinii Stierl. 27
Besckei Germ. 528
beterensis Escal. 338
Bettinii Fiori 75
betulae F. 470
betulinus Bechst. 471
beryllinus Heller 295
bicallosus Hust. 526
bicarinatus Kirsch (Compsus) 510
bicarinatus Chevr. (Platyrhynchus) 393
bicolor Mshl. (Elytrog.) 302
bicolor Broun (Epitimetes) 239
bicolor Blackb. (Titinia) 505
bicoloratus Boh. 510
bicornis Waterh. 514
bicostatus Boh. (Otiorrh.) 160,
bicostatus Faust (Brachyomus) 508
bicristatus Montr. (Celeuth.) 293
bicristatus Faust (Ectemnom.) 300
bicruciatus Faust 360
bicuspis Mshl. 366
bidentatus Boh. (Ellimenistes) 353
bidentatus Pic (Myllocerus) 379
bidentatus Stev. (Elytrodon) 419
bidentatus Stierl. (Otiorrh.) 198
bidentulus Fairm. (Dinosius) 514
bidentulus Faust (Isaniris) 241
Bielzi Küster 123
bifasciata Heller 305
bifasciatipennis Lea 379
biformis Perkins 310
bifoveolatus Beck (Trachyphl.) 319
bifoveolatus Stierl. (Argoptochus) 401
bifoveolatus Stierl. (Otiorr.) 217
bifurcatus Mshl. 524
biharicus Reitter 432
biimpressus Faust (Compsus) 510
biimpressus Hust. (Peritelus) 256
bilekensis Apfelb. (Trachyph.) 317
bilekensis Apfelb. (Otiorr.) 6
bilineater Lea 380
bilineatus Chevr. (Episomus) 366
bilineatus Champ. (Exoph.) 518
bilineellus Auriv. (Adorhab.) 347
bilineellus Chevr. (Adorhab.) 347
bilunulata Motsch. 314
bimaculatus Hust. 510
binodis White 447
binodosus Chevr. 366
binodulus Sharp 399
binominatus Fauvel 101
biocovensis J. Müller 83
bipustulata Faust 313
biramosa Motsch. 305
Bischoffi Stierl. 130
Bischoffianus Lea 537
biserintus Escal. 336
bisignatus Bach (Argoptochus) 402
bisignatus Boh. (Compsus) 510
bisignatus Germ. (Argoptochus) 401
biskrensis Desbr. (Cyrtolepus) 407
biskrensis Pic (Trachyphloeus) 320
bisphaericus Reiche (Otiorrh.) 161
bisphaericus Stierl. (Otiorrh.) 200
bispina Motsch. 314
bispinosa Heller 305
bispinosus Hust. 281
bispinus Boh. 419
bistrigicollis Boh. 244
bisulcatoides Reitter 28
bisulcatus F. 27
bisulcus Steph. 32
bituberculata Faust 314
bituberculatus Kirsch (Compsus) 510
bituberculatus Kirsch (Sphaeropterus) 312
bituberosus Auriv. (Sys.) 281
bituberosus Desbr. (Elytr.) 419
bituberosus Kirsch (Compsus) 510
bivittatus Mshl. (Elytrog.) 302
bivittatus F. (Exophth.) 522
Blackburni Lea (Myllocerus) 380
Blackburni Sharp (Rhyncogonus) 310
Blaisdelli Van Dyke 526
Blanchardi Apfelb. (Otiorrh.) 28, 534
Blanchardi Faust (Coptorhyn.) 295
Blanchardi Heller (Coptorhyn.) 297
blanda Faust 514
blandus Faust (Myllocerus) 380
blandus Gyllh. (Otiorrh.) 21
Bleusei Faust 198

Bodemeyeri K. & J. Daniel 198
Bodkini Mshl. 446
boghariensis Desbr. 406
Bohemani Faust (Episomus) 369
Bohemani Stierl. (Otiorrh.) 28
Bohemani Zetterst. (Omias) 429
Boisduvali Boh. (Curiades) 513
Boisduvali Faust (Celeuthetes) 293
Bolivari Uhagon 336
bolivianus Mshl. 446
bombicollis MacLeay 295
bombylius Guér. 295
bonensis Formán. 320
Bonhardi Sharp 481
Bonnairei Faust 406
Bonvouloiri Stierl. (Otiorr.) 151
Bonvouloiri Stierl. (Phyllobius) 466
boranus Gestro 380
boops Sharp 515
borealis Stierl. 70
Borshii Lona 107
bosnarum Csiki 71
bosnicus Apfelb. (Trachyph.) 321
bosnicus Stierl. (Otiorrh.) 107
bosphoranus auct. (Otiorrh.) 44
bosphoranus Stierl. (Otiorrh.) 68
Bourcieri Guér. 510
Boviei Mshl. (Mylloc.) 380
Boviei Heller (Elytrocheilus) 301
Boviei Melichar (Euplatinus) 409
Bovilli Blackb. 380
Bozasi Hust. 380
brachialis Boh. 198
brachycollis Faust 380
brachycornis Desbr. 472
brachyderoides Desbr. (Ptochus) 394
brachyderoides Stierl. (inc. sedis) 532
brachylepis Apfelb. 494
brachypterus Sol. 177
brachyscelis Apfelb. 89
Brancsiki Reitter (Mylacus) 422
Brancsiki Stierl. (Otiorrh.) 101
Brancsiki Stierl. (Otiorrh.) 72
Brandisi Apfelb. (Omias) 427
Brandisi Apfelb. (Otiorrh.) 107
bratislavensis Roubal 456
brattiensis J. Müller 30
Brauneri Smirnow 107
Breiti Formán. 415
Brenskei Reitter (Otiorrh.) 200
Brenskei Schilsky (Phyllob.) 473
breviatus Desbr. 491
breviclavatus Stierl. 107
brevicollis Blackb. (Titinia) 505
brevicollis Boh. (Phyllobius) 500
brevicollis Desbr. (Chaeroceph.) 416
brevicollis Fåhrs. (Sciobius) 244
brevicollis Faust (Chaunoderus) 364
brevicollis Faust (Systates) 281
brevicollis Faust (Eupiona) 356
brevicollis Heller (Coptorhynchus) 295
brevicollis Heller (Elytroch.) 301
brevicollis G. H. Horn (Rhypodillus) 279
brevicollis Hust. (Peribrotus) 359
brevicollis Mshl. (Ptochus) 394
brevicollis Seidl. (Pseudomeira) 263
brevicollis Sol. (Otiorrh.) 188
brevicornis Broun (Platyomida) 447
brevicornis Boh. (Otiorrh.) 161
brevicornis Desbr. (Phyllobius) 472
brevicornis Fairm. (Taphrorrhinus) 531
brevicornis Hust. (Amphitmetus) 347
brevicornis Hust. (Anaptoplus) 506
brevicornis Hust. (Systates) 281
brevicornis Sol. (Trachyploeus) 321
brevinasus Reitter 161
brevipennis Stierl. 210
brevipes Apfelb. 6
brevipilis Apfelb. 28, 534
brevior Heller 526
brevipennis Faust (Episomus) 366
brevipennis Hust. (Leptosphaer.) 270
brevipennis Hust. (Dicasticus) 352
brevirostris Auriv. (Xestorhinus) 290
brevirostris Ch. Bris (Trachyphloeus) 321
brevirostris Motsch. (Opilomorphus) 502
brevis Boh. (Trachyphloeus) 321
brevis Gyllh. (Phyllobius) 454
brevis Hust. (Cathormioc.) 336
brevis Hust. (Syst.) 281
brevis Van Dyke (Rhyncog.) 310
brevisetis Desbr. (Caenopsis) 248
brevisetis Desbr. (Caenopsis) 249
brevisetis Hust. (Barianus) 348
brevisetis Reitter (Meiran.) 237

brevitalus Thoms. 493
brevitarsis Apfelb. (Otiorrh.) 31
brevitarsis Kôno (Phyllobius) 500
brevithorax Desbr. 336
breviusculus Desbr. (Phyllobius) 491
breviusculus Heller (Elytrocheilus) 301
breviusculus Stierl. (Otiorrh.) 161
Brisouti Desbr. (Phyllobius) 496
Brisouti Stierl. (Otiorrh.) 184
britannicus Blair 336
Bruchi Hust. (Platyomus) 528
Brucki Bach (Otiorrh.) 176
Brucki Seidl. (Pseudomeira) 265
Brucki Stierl. (Otiorrh.) 134
Bructeri Germ. 66
brumalis Casey 247
brunnea Hust. 374
brunneimaculatus Hust. 281
brunnescens Pic (Aomus) 434
brunnescens Pic (Leianis.) 421
brunneus Faust (Arrhines) 375
brunneus Hust. (Anoptoplus) 506
brunneus Hust. (Parasystates) 276
brunneus Hust. (Peribrotus) 359
brunneus Matsum. (Myllocerus) 380
brunneus Van Dyke (Rhyncogonus) 310
brunneus Steven (Otiorrh.) 161
Brusinae Stierl. 107
brutius Reitter 28
Bryani Perkins 310
Bryki Auriv. 355
buccator Mars. 440
buccatrix Woll. 440
Buchwaldi Kolbe 358
Bugnioni Stierl. 29
bulgaricus Apfelb. (Phyllobius) 473
bulgaricus Apfelb. (Otiorrh.) 13
bulgaricus Apfelb. (Otiorrh.) 182
Bureschi Apfelb. 218
Burgeoni Hust. (Amphit.) 347
Burgeoni Hust. (Trepimetus) 363
Burgeoni Mshl. (Parasystates) 276
buruana Heller 531

cadoricus Dan. 29
caecicollis Boh. 351
caenopsiformis Formán. 321
caeruleipes Champ. 510
caeruleovittatus Champ. 518
caesareus K. Daniel 162
caesicollis Desbr. 410
caesipes Rey 29
caesius Heller (Coptorhyn.) 295
caesius Mshl. (Phyllobius) 475
caesius Steph. (Phyllobius) 494
calabrensis Stierl. 162
calabrus Stierl. 107
calcaratus Desbr. (Phyllobius) 493
calcaratus Stierl. (Otiorr.) 40
calcaratus F. (Phyllobius) 473
calcaratus Mshl. (Systates) 281
calcator Mars. 436
calcatrix Woll. 436
californicus Motsch. (Lepidosoma) 502
californicus Seidl. (Parapt.) 278
calvus Fiori 102
callicnemis Apfelb. 199, 540
callizonatus Fairm. 374
callosa Hust. 276
callosicollis Hust. (Myllocerus) 380
callosicollis Mshl. (Ellimenistes) 353
callosus Boh. 243
camaldulensis Rottenb. 230
cameleon F. 523
camerunensis Hust. 380
canalicornis Lea 380
canaliculatus Boh. (Mylloc.) 380
canaliculatus Schauf. (Trachyphl.) 321
canalirostris Mars. 439
canariensis Boh. 436
cancasanus Reitter 28, 534
cancellatus Boh. (Otiorrh.) 108
cancellatus Desbr. (Cathormioc.) 336
canescens Boh. (Exophthalm.) 518
canescens Boh. (Compsus) 510
canescens Germ. (Phyllobius) 451
canescens Mshl. (Myllocer.) 383
canoixoides Kôno 380
cantabricus Escal. (Cathorm.) 339
cantabricus Secane (Otiorrh.) 159
canus Boh. (Compsus) 512
canus Gyllh. (Exophthalm.) 518
canus Gyllh. (Phyllobius) 477
capellae Apfelb. 9
Capiomonti Seidl. 340
caprasiae Sol. 269
capreae Stierl. 66
capricornis Apfelb. 93
capsicalis Mshl. 518
carbonarius Hochh. 108
carbonicolor Reitter 108
carbunculus Heller 308
Carceli Gyllh. 29, 534
carceliformis Stierl. 199

carcelioides Stierl. 29, 534
cardiniger Host 30, 534
cardinigeroides Reitter 83
Cardoni Mshl. 380
cardui Auriv. 276
carinaerostris Boh. 394
carinatus Gyllh. (Otiorrh.) 106
carinatus Payk. (Otiorrh.) 204
carinatus Boh. (Synthli.) 531
carinatus Lea (Myllocerus) 380
carinatus Olliff (Exorides) 525
carinatus Pascoe (Exorides) 525
carinicollis Fairm. (Trigonops) 314
carinicollis Heller (Heteroglymma) 305
carinicollis Hust. (Systates) 281
carinicollis Motsch. (Phyllobius) 500
carinifrons Desbr. 416
carinirostris Boh. (Exophthalm.) 519
carinirostris Heller (Sphenogaster) 313
carinirostris Mshl. (Stelorrhinus) 377
carinithorax Heller 314
carinulifera Heller 305
carinthiacus Latr. (Otiorrh.) 27
carinthiacus Germ. (Otiorrh.) 27
carinulatus Stierl. 184
carmagnolae Villa 108
carneipes Champ. 519
carniolicus Gmel. (Phyllobius) 475
carniolicus Stierl. (Otiorr.) 129
Caroli Pic (Nucterocephalus) 411
Caroli Stierl. (Otiorr.) 31
carpathicus Daniel 31, 534
carpathorum Csiki 31
carpetanus Uhagon 336
Carri Buchanan 238
Carteri Chevr. 508
caspius Stierl. (Myllocerus) 380
caspius Stierl. (Phyllobius) 484
castaneipennis Hust. 281
castaneipes Apfelb. 93
castaneus Roel. 380
Castelnaui Faust 366
castellanus Faust 282
castiliana K. Daniel 418
castilianus K. Daniel 427
cataleucus Chevr. 366
castor Lea 380
catechu Mshl. 380
catenulatus Panz. 181
catharvensis Reitter (Otiorr.) 30
catharvensis Stierl. (Otiorr.) 30
catoptoides Broun 527
caucasica Stierl. 237
caucasicus Stierl. (Otiorrh.) 31
caucasicus Stierl. (Otiorrh.) 51
caucasicus Stierl. (Rhinomias) 430
caucasicus Stierl. (Phyllobius) 450
caudata Broun (Platyomida) 447
caudatus Broun (Tigones) 399
caudatus Guér. (Sphaeropt.) 312
caudatus Mshl. (Exorides) 525
caudatus Pascoe (Elytrogonus) 302
caudatus Rossi (Otiorrh.) 32
caunicus Stierl. 32
Cavelli Broun 399
cavicollis Quedf. 373
cavifrons Hust. 445
cavirostris Boh. 528
cecyropioides Broun 321
celata Faust 356
celatus Pascoe 352
celebensis Faust 366
celejensis Müll. 230
celeutheticus Heller 295
celmisiae Lea 441
censoria Pascoe 447
centralis Hust. (Barianus) 348
centralis Escal. (Trachyph.) 328
centropus Mshl. 241
cephalonicus Pic 32
cephalotes Faust (Ptochus) 394
cephalotes Hust. (Mylloc.) 380
cephalotes Pascoe (Synomus) 398
ceps Stierl. 182
ceratorhinus Lea 381
cerdanensis Jacquet 193
cerigensis Apfelb. 162
certus Broun 399
cerussatus Boh. 515
cervina Broun 527
cervinus Boh. (Cosmorh.) 351
cervinus Broun (Tigones) 399
cervinus Gyllh. (Exophth.) 519
cervinus Hochh. (Phyllobius) 500
cetjniensis Apfelb. 90
ceylonensis Mshl. 502
ceylonicus Faust 367
chalceus Stierl. 32
chalciditanus Reitter 199
Championi Escal. (Cathorm.) 336
Championi Reitter (Otiorr.) 162
Championi Formán. (Trachyph.) 321
Championi Lona (Brachycyrtus) 349
Championi Reitter (Argoptochus) 401
Chaudoiri Hochh. 33
chaunoderus Lea 381

cherchevillei Desbr. 336
chesgicus Kol. 193
Chevalieri Hust. 381
Chevrolati Gyll. (Otiorrh.) 145
Chevrolati Reiche (Elytrodon) 419
Chevrolati Seidl. (Cathorm.) 336
chinensis Faust 372
chionophilus Apfelb. 122, 538
chiridensis Mshl. 282
chiriquensis Champ. 446
chloris Boh. (Phyllobius) 500
chloris Mshl. (Hyperstylus) 375
chlorizans Boh. (Phyllobius) 461
chlorizans Faust (Myllocerus) 381
chlorizans Heller (Hoplotrigonops) 305
chlorizans Reitter (Phyllobius) 461
chlorophanus Germ. 119
chlorostictus Er. 510
chlorostigma Wiedem. 366
Chobauti Desbr. (Myllocerus) 381
Chobauti Hust. (Otiorr.) 33
Chobauti Hust. (Caenopsimor.) 404
Christophi Stierl. (Myllocerus) 381
Christophi Stierl. (Otiorr.) 162
chrysorhoeus Schönh. (Cercopeus) 345
chrysocomus Germ. 162
chrysomus Bh. 33
chrysops Herbst 219
chrysopterus Stierl. 216
chrysopus Champ. (Pseudocyphus) 33, 530
chrysopus Chevr. (Exophothalm.) 519
chrysorrhoeus Say (Cercopeus) 345
chrysosticus Gyll 164
chrysotrichus Apfelb. 94
cicur Heller 507
cimex Heller 305
cinctus Boh. (Sciobius) 246
cinctus Boisd. (Elytrogonus) 302
cinerarius G. H. Horn 238
cinerascens Blackb. (Celeuthetes) 293
cinerascens Blanch. (Compsus) 510
cinerascens F. (Exophthalmodes) 519
cinerascens F. (Phyllobius) 450
cinerascens Pascoe (Myllocerus) 381
cinerascens Sol. (Otiorr.) 188
cinerea Broun 527
cinereidorsum Desbr. 381
cinereipennis Gyllh. 460
cinereus Boh. (Phaylomerinthus) 393
cinereus Faust (Syst.) 282
cinereus Formán. (Myllocerops) 376
cinereus Formán. (Myllocerus) 381
cinereus Gyllh. (Phyllobius) 455
cinereus Hust. (Catalalus) 350
cinereus Mshl. (Auklandius) 507
cinereus Mshl. (Hyperstylus) 375
cinereus Mshl. (Sciobius) 244
cinereus (Tourn.) Schilsky (Phyllobius) 458
cinereus A. F. Sol. (Trachyphloeus) 321
cinereus Stierl. (Otiorr.) 199
cinereus Van Dyke (Rhyncogonus) 310
cinericius Champ. 446
cinifer Germ. 27
circassicus Reitter (Nastus) 442
circassicus Reitter (Phyllobius) 479
circassicus Reitter (Urometopus) 426 34
circassicus Reitter (Otiorr.) 199
circumcinctus Boh. (Ptochus) 394
circumcinctus Hust. (Mylloc.) 381
circumductus Germ. 515
cireneus Faust 28
cirrhocnemis Apfelb. 109, 537
cirricollis Boh. 354
cirrogaster Apfelb. 6
cirrorrhynchoides Reitter 180
citimus Broun 399
civis Stierl. 34
Clairi Stierl. (Pseudomeira) 264
Clairi Stierl. (Otiorrh.) 108
claroscutellatus Vitale 489
clarus Broun (Trachyploeus) 321
clarus F. (Compsus) 510
clathratus Boh. (Episomus) 369
clathratus Germ. (Otiorrh.) 109
clathratus Champ. (Exophthal.) 519
clavalis Apfelb. 34, 534, 536
clavatus Woll. 436
claviceps Mars. 408
claviger Faust (Phyllobius) 499
claviger Penecke (Otiorrh.) 26
clavipes Bonsd. (Otiorrh.) 34
clavipes Boh. (Otiorrh.) 86
clemens Gyll. 220
Clermonti Normand 234
clitellarius Boh. 353

Cloueti Desbr. 416
cnides Marsh. 475
coarctatus Stierl. 199, 540
coarcticornis A. & F. Sol. 19
cochinchinensis Faust 366
coecus Germ. 63
coelestinus Rosensch. (Compsus) 511
coelestinus Seop. (Phyllobius) 475
coenobita Mars. 157
coerulea Faust 305
coerulatus Pascoe (Elytrocheilus) 301
coerulescens Blanch. 314
cognata Mshl. 435
cognatus Mshl. (Sciobius) 244
cognatus Mshl. (Isaniris) 241
collaris F. (Otiorrh.) 176
collaris Hartm. (Systates) 282
collaris Lea (Hadrorrhinus) 357
collaris Motsch. (Alsus) 501
collectivus Reitter 39
collinus Gredler 24
coloratus Allard 321
comatus Peyerimh. (Cyclobarus) 404
comatus Petri (inc. sedis) 532
comes Solari 163
cometes Pascoe 511
comosellus Boh. 66
comosus K. & J. Daniel 420
compactus Lea (Merimnetes) 441
compactus Woll. (Laparocerus) 436
comparabilis Boh. 163
complanatus Müll. 536
complutensis Escal. 321
compressa Pascoe 364
compressus Stierl. 39
concavirostris Boh. 163
concavirostris Hust. (Amphit.) 347
concava Heller 305
concinna Broun (Nicaeana) 527
concinna Pascoe (Epilaris) 514
concinnus Boh. (Catergus) 239
concinnus Gyll. (Otiorrh.) 39
concinnus Boh. (Omias) 427
concinnus Faust (Embrithes) 354
concinnus Faust (Nastus) 442
concinnus Mshl. (Ptochus) 394
concolor Blackb. 346
concors Sol. 164
confinis Faust (Elytrocheilus) 301
confinis Faust (Episomus) 366
confinis Lea (Mylloceru s) 381
confinis Steph. (Trachyphloeus) 320
confinis Friv. (Otiorrh.) 109
confluens Mshl. (Compsus) 511
confluens Reitter (Otiorrh.) 164
confusus Boh. (Otiorrh.) 142
confusus Formán. (Trachyphl.) 325
confusus Hust. (Caenopsis) 248
confusus Hust. (Trachyphl.) 326
confusus Schilsky (Phyllobius) 456
conglobatus Seidl. 411
congoanus Hust. (Chaunoderus) 364
congoanus Hust. (Mylloc er.) 381
congoanus Hust. (Parasystates) 276
congoanus Hust. (Ptochus) 394
congoanus Hust. (inc. sed.) 272
coniceps Daniel (Otiorr.) 39
coniceps Desbr. (Mylacus) 423
coniceps Desbr. (Peritelus) 260
conicirostris Hust. (Systates) 282
conicirostris Hust. (Leptosph.) 270
conicirostris Sharp (Cyclomaurus) 406
conicirostris Stierl. (Otiorrh.) 164
conicollis Faust (Eupiona) 356
conifer Heller 295
conirostris Formán. 376
conjungens Apfelb. 39
connexus Mshl. 366
conorhynchus Solari 535
Conradti Hust. (Mylloc.) 381
Conradti Faust (Otiorrh.) 199
consentaneus Boh. 6
consobrinus Mshl. (Exoph.) 519
consobrinus Reitter (Otiorr.) 40
consocius Mshl. 381
conspersus Gerst. (Systates) 282
conspersus Mshl. (Mylloc.) 381
conspersus Herbst (Otiorr.) 164
conspiciabilis Falderm. 40
conspurcatus Stierl. 9
constricticollis Lea (Mylloc.) 381
constricticollis Stierl. (Otiorr.) 221
constrictus Fåhr. (Ellim.) 353
constrictus Faust (Syst.) 282
contemptus Stev. 477
contiguus Hust. 282
contractus Stierl. 7
convexicollis L. Müller (Stom.) 235
convexicollis Stierl. (Otiorr.) 173
convexifrons Fairm. (Anaptop.) 506
convexifrons Faust (Mylloc.) 381
convexiusculus Sol. 164
convexus Hust. (Amphit.) 347

convexus Hust. (Ischnobrotus) 526
coptocnemis Apfelb. 109, 537
Coquereli Fairm. (Elytrogonus) 302
Coquereli Fairm. (Barianus) 349
corallipes Stierl. 8
cordata Heller 292
cordatus Auriv. (Systates) 282
cordatus Desbr. (Cathormiocr.) 339
cordicollis Seidl. 343
cordipennis Broun (Nicaeana) 527
cordipennis Broun (Hygrochus) 240
cordipennis Pascoe (Ocynoma) 307
cordipennis Pascoe (Platyomicus) 373
cordubensis Escal. 342
coriaceus Panz. 18
coriarioides Reitter 109
coriarius Stierl. 131
corinthius Fairm. 282
corneolus Weise 200
cornicinus Stierl. (Otiorrh.) 199
cornicinus Stierl. (Otiorrh.) 52
corniculatus Reitter 145
cornirostris Boh. (Porpacus) 361
cornirostris Formán. (Mylloceropsis) 155
cornirostris Reitter (Otiorrh.) 109
cornutus Boh. (Ellimen.) 353
cornutus Pascoe (Apirocalus) 291
cornutus Stierl. (Otiorr.) 103
coronata Sharp (Platyomida) 447
coronata Stierl. (Param.) 238
corpulentus Broun (Trachyph.) 321
corpulentus Schilsky (Phyllobius) 497
corrugatus Gmel. (Otiorr.) 77
corrugatus Mshl. (Exorides) 525
corruptor Host 109
corsicus Desbr. (Meira) 268
corsicus Fairm. (Otiorr.) 40, 535
corticalis Lucas 56
coruscus Pascoe 511
corvulus Reitter 40, 535, 538
corvus Boh. (Otiorr.) 110, 537
corvus Van Dyke (Rhycogonus) 310
corycaeus Boh. 381
coryli Chevr. 25
cosmopterus Daniel 40
costaricensis Voß 511
costatus Formán. (Nastus) 442
costatus Auriv. (Entypotrach.) 355
costatus F. (Otiorr.) 71
costatus Gyllh. (Exophthalm.) 519
costatus Stierl. (Otiorrh.) 106
costicollis Boh. (Ellimenistes) 353
costicollis Mshl. (Dysommat.) 514
costifer Broun 240
costipennis Fåhrs. (Glyptosomus) 275
costipennis Rosenh. (Otiorr.) 40
costipennis Stierl. (Otiorr.) 41
costulatus Auriv. (Parasystates) 276
costulatus Fairm. (Cyclobarus) 404
costulatus Formán. (Otiorr.) 41
costulatus Hust. (Pseudocratopus) 244
costulatus J. Thoms. (Isaniris) 241
Cottae Fairm. 506
coxalis Heller 435
Coyei Mars. 164
crassiceps Reitter 165
crassicollis Stierl. (Phyllobius) 478
crassicollis Stierl. (Otiorr.) 200
crassicornis Faust (Elytrocheilus) 301
crassicornis Formán. (Phyllobiodes) 501
crassicornis Hust. (Neomias) 527
crassicornis Jacq. (Meira) 266
crassicornis Kirsch (Exophth.) 519
crassicornis Luc. (Platyomus) 528
crassicornis Seidl. (Meira) 268
crassicornis Stierl. (Otiorr.) 44
crassifrons Broun (Nicaeana) 527
crassifrons Woll. (Laparocerus) 436
crassior Desbr. (Phyllobius) 498
crassior Desbr. (Phyllobius) 500
crassipes Stierl. (Otiorr.) 153
crassipes Motsch. (Phyllobius) 478
crassirostris Pascoe (Coptorh.) 295
crassirostris Pascoe (Evas) 517
crassirostris Woll. (Laparoc.) 436
crassiscapus Escal. 336
crassulicornis Mars. 266
crassus Motsch. (Phyllobius) 497
crassus Woll. (Anemophil.) 344
crataegi Germ. (Otiorrh.) 200
crataegi Stierl. (Otiorrh.) 201
cratoscelis Reitter 157

Cremieri Boh. (Homorhyt.) 250
Cremieri Boh. (Otiorr.) 41
crenatipennis Fairm. 282
crenatus Guér. 369
crepsensis J. Müller 110
cretensis Pic (Argoptochus) 401
cretensis Pic (Ptochus) 394
creticus Faust (Phyllobius) 499
creticus Stierl. (Otiorr.) 203
cribrarius Oliv. 508
cribratostriatus Stierl. 183
cribricollis Gyll. (Otiorr.) 165, 539
cribricollis Hust. (Neomias) 527
cribellarius Stierl. 121
cribripennis Hochh. (Otiorr.) 166
cribripennis Fairm. (Isaniris) 241
cribrirostris Leoni 110, 537
cribrosicollis Boh. 166
cribrosus Germ. 94
crinipes L. Miller 94
crinita Pascoe 346
crinitarsus Stierl. 41
crinitellus Daniel 166
crinitus Mshl. (Myllocerus) 381
crinitus Mshl. (Sphrigodes) 362
crinitus Redtb. (Omias) 428
crinitus Redtb. (Ptochus) 394
crinitus Reitter (Mylacus) 422
crispata Pascoe 447
crispus Boh. 162
crissolensis Reitter 86
cristatus Boh. 351
cristirostris Schönh. 351
crivoscianus Apfelb. 8
croaticus Stierl. (Phyllobius) 469
croaticus Stierl. (Otiorrh.) 111
cruciatus Faust (Coptorhynch.) 295
cruciatus Seidl. (Trachyphl.) 321
cruciatus Stierl. (Rhinomias) 430
crucirostris Hochh. 210
crudus Broun 399
cruralis Stierl. 221
cukalensis Apfelb. 200, 540
culmacensis Lona 537
cultratus Mshl. 244
cultricollis Germ. 528
cuneatus Van Dyke 310
cuneiformis Waterh. 532
cuprealis Broun (Phaeocharis) 243
cuprealis Broun (Platyomida) 447
cupreipes Champ. 519
cuprens Laich. 190
cupreoaureus Stierl. 478
cupreosparsus Fairm. 41
cupreotinctus Champ. 448
cupreoviridis Champ. 448
cupreus Broun 239
cuprifer Stierl. 190
cupripubens Reitter 422
cuprirostris Champ. 519
curticollis Mars. 263
curtipennis Pic (Choeroceph.) 416
curtipennis Pic (Myllocerus) 381
curtipilis Escal. 340
curtus Hust. 352
curvicornis F. 381
curvimanus Champ. (Eustales) 515
curvimanus Reitter (Otiorr.) 167
curvipes Stierl. (Otiorr.) 124, 538
curvipes Mshl. (Catorygma) 503
curvipes Pic (Phyllobius) 465
curvipes Woll. (Cathormioc.) 337
curviscapus Seidl. 337
curviscelis Mars. 124
cuspidaticollis Voß 381
cyanipes Chevr. 309
cyclophthalmus Heller 295
cyclops Mshl. 353
cylindricollis Gyllh. 478
cylindricus Stierl. (Otiorr.) 41
cylindricus Mshl. (Exorides) 525
cymophanus Germ. 111
cypricola Reiche & Saulcy 221
cypricus Seidl. 428
cyrtops Lea 381
cyrtus Fairm. 404
Czikii Reitter 394

dacicus Daniel 41
daghestanicus Formán. 375
daisetsuzanus Kôno 499
daivius Escal. 97
dajtitensis Lona 538
Dalmani Boh. 511
dalmaticus Gyll. 13
Damryi Fourn. 266
damascenus L. Miller 382
Danieli Apfelb. 111, 537
Darius Reitter 195
dauricus Stierl. 532
Darwini Blackb. 382
Davidowi Suvorov 496
Davisi Blatchley & Leng 322
davricus Lona 201
Deae Perkins 310
dealbatus Fåhrs. 244
debilicornis Sol. 167
debilis Fairm. (Mylloc.) 382
debilis Faust (Mylacus) 425
debilis Woll. (Laparocerus) 436
deciduus G. H. Horn 238
decipiens Lea (Merimnetes) 441
decipiens Lea (Myllocerus) 382
decipiens Mshl. (Episomus) 366

decipiens Pascoe (Sphaeropterus) 312
declivis Faust 372
decoratus Faust (Platyacus) 308
decoratus Roel. (Anosimus) 374
decoratus Stierl. (Otiorrh.) 201
Decorsei Hust. (Eurhynch.) 357
Decorsei Hust. (Myllocerus) 382
decorum Blackb. 517
decorus Stierl. 42
decretus Pascoe 382
decussatus Hochh. 221
defloratus Schilsky 499
defoliator Mshl. 375
deformis Stierl. 201
dehiscens Desbr. 241
Dejeani Boh. (Compsus) 512
Dejeani Boh. (Otiorrh.) 219
Dejeani Faust (Episomus) 366
Delagrangei Desbr. 478
delatus Faust 532
deleticollis Reitter 111
delicatulus Boh. (Myllocerus) 382
delicatulus Fähr. (inc. sedis) 532
delicatulus Hust. (Leptosphaeratus) 270
delicatulus Mars. (Otiorrh.) 111
delta Faust 347
Demaisoni Desbr. (Altonomus) 400
Demaisoni Desbr. (Cyclomaurus) 405
Demeyeri Heller 295
demirkapensis Apfelb. 113
demissus Heller 295
demotus Boh. 66
denigrator Boh. (Otiorrh.) 112, 535, 537
denigrator Hust. (Myllocerus) 382
densatus Boh. (Otiorrh.) 42
densatus Schilsky (Phyllobius) 476
densesquamosa Smerecz 538
densestriatus Reitter 337
densepunctatus Auriv. 282
densicollis Reitter 167
densus Broun 239
denticollis Hartm. 282
denticulatus Escal. 322
dentifer F. 382
dentipennis Fairm. 302
dentipes Graëlls (Otiorrh.) 42
dentipes Mshl. (Systates) 282
dentitibia Reitter 201
depilis Luigioni (Phyll.) 489
deplanatus Boh. (Sciobius) 245
depilis Smrecz. (Otiorh.) 536
deplanatus Kirsch (Compsus) 511
deplanatus Boh. (Atactus) 292
deportatus Boh. 395
depressa Broun 447
depressicollis Gyllh. 515
depressifrons Mshl. (Sphrigodes) 362
depressifrons Pic (Choeroc.) 416
depressior Faust (Elytrocheilus) 301
depressior Mars. (Otiorrh.) 225
depressipennis Sol. 167
depressus Auriv. (Parasystates) 277
depressus Auriv. (Systates) 282
depressus Faust (Mecomerinthus) 358
depressus Perkins (Rhyncogonus) 310
depressus Stierl. (Otiorrh.) 221
depubes Boh. ♀ 252
Derjugini Smirnow 478
Desbrochersi Pic (Caenopsimorphus) 404
Desbrochersi Reitter (Elytrodon) 419
Desbrochersi Reitter (Mylacus) 422
Desbrochersi Reitter (Nucterocephalus) 411
Desbrochersi Stierl (Otiorrh.) 29, 534
Desbrochersi Stierl. (Otiorrh.) 221
Desbrochersi Stierl. (Phyllobius) 499
Desbrochersi Stierl. (Trachyphloeus) 322
deserticola Mars. 396
desertus Motsch. (Ptochus) 396
desertus Rosenh. (Otiorrh.) 201, 540
desquamatus Mshl. 382
destructor Blackb. 441
Deubeli Ganglb. 112, 538
deustus Blanch. 532
devians Faust 442
Deyrollei Tourn. 478
diabolicus Reitter 113
Dianae Boh. 528
dicatus Mshl. 419
Diecki Desbr. (Cyrtolepus) 406
Diecki Seidl. (Cathormiocerus) 337
Diecki Stierl. (Otiorrh.) 153
Dieckianus Mars. 153
Dieckidius Mars. 153
difficilis Heller (Behrensiellus) 292
difficilis Hust. (Peritmetus) 360
difficilis Stierl. (Otiorrh.) 113

difformis Formán. 322
digitalis Gyll. 322
dilatatus G. H. Horn (Rhypodillus) 279
dilatatus J. L. Leconte (Trachyphloeus) 322
dilaticolle Faust 356
dilaticollis Hust. (Systates) 282
dilaticollis Pic (Elytrodon) 419
dilatipes Desbr. (Cyrtolepus) 407
dilatipes Guilleb. (Otiorrh.) 38
dilatisignatus Heller 309
Dillwyni Steph. 138
dimorphus Hust. (Systates) 282
dimorphus Sol. (Otiorrh.) 7
dinaricus Apfelb. (Otiorrh.) 43, 535
dinaricus J. Müller (Otiorrh.) 15
diotus Reitter 167
discoidalis Ch. O. Waterh. 312
discoideus Ol. 382
discolor Boh. 382
discors Desbr. 337
discretus Faust (Coptorhynchus) 295
discretus Stierl. (Otiorrh.) 209
disjunctus Pascoe 295
dispar Stierl. (Otiorrh.) 202
dispar Broun (Tigones) 399
dispar Pascoe (Cyrtozemia) 435
dispar Redtb. (Phyllobius) 455
dispar Saund. & Jekel (Trinops) 314
dispar Woll. (Laparocerus) 436
distans Faust (Episomus) 366
distans Faust (Coptorhynchus) 295
distans Rey (Trachyphloeus) 325
distans Rey (Trachyphloeus) 322
distigma Champ. 519
distincticornis Rosenh. (Otiorrh.) 43
distincticornis Pic (Elytrodon) 419
distinguendus Desbr. (Meira) 267
distinguendus Faust (Episomus) 366
distinguendus Desbr. (Hyph.) 241
distinguendus Formán. (Trachyph.) 322
distortus Woll. 436
diutinus Faust 366
divaricatus C. O. Waterh. 302
diversesculptus Pic (Otiorrh.) 43
diversesculptus Pic (Otiorrh.) 60, 535
diversipennis Pic 270
diversus Broun (Tigones) 399
diversus Pascoe (Piezonotus) 308
dives Boh. (Coptorhynchus) 296
dives Germ. (Otiorrh.) 113, 538
dives Guér. (Compsus) 511
dives Heller (Neopyrgops) 307
dives Oliv. (Compsus) 511
divisus Mshl. 386
dobrudschae Stierl. 56
Doderoi Sol. (Solariola) 234
Doderoi Sol. (Trogl.) 230
Doddi Lea 383
Dohertyi Mshl. 366
Dohrni Faust 383
Doii Kôno 458
dolabratus Peyerimh. 158
dolichocephalus Apfelb. 8
Dollei Fairm. 282
dolomitae Stierl. 8
donabilis Reitter 195
doramasensis Uyttenboogaart 436
Doriae Sol. 230
dorotkanus Reitter 43
dorsalis Broun (Platyomida) 447
dorsalis Faust (Episomus) 366
dorsalis Mannerh. (Phyllobius) 451
dorsatus Fähr. (Ellimenistes) 353
dorsatus F. (Myllocerus) 383
dorymeroides Sol. 539
Douei Montrouz. 291
dryadis Apfelb. 8
dubiosus Sol. 170
dubitabilis Fairm. 221
dubius Har. (Ceratocrates) 364
dubius Voß (Compsus) 511
dubius Perkins (Rhyncogonus) 310
dubius Ström (Otiorrh.) 65
duinensis Germ. 114
dukatiensis Apfelb. 43
dulcis Germ. 15
duplicata Lea 346
duplicatus Pascoe (Myllocerus) 383
duplicatus Champ. (Exophth.) 519
duplopilosus Reitter 167
Duponti Boh. 528
durianus Heller 300
duricornis Gyllh. (Eustales) 516
duricornis Reitter (Otiorrh.) 106
durus Reitter 85
Durvillei Blanch. 303
Duvivieri Faust 364
Dyris Peyerimh. 167
Dzieduszykii Lomnicki 215

ebenina Hust. 349
ebeninus Gyll. 58
ebrius Faust 291

Ecchelii Gredler 80
echidna Daniel (Otiorrh.) 56
echidna Seidl. (Pseudomeira) 262
echinarius Mshl. 383
echinata Heller 305
echinatoides Reitter 43
echinatus F. (Celeuthetes) 293
echinatus Herbst (Otiorrh.) 80
echinatus Hochh. (Otiorrh.) 43
echinatus Lea (Myllocerus) 383
echinatus Mshl. (Ellimenistes) 353
echinus F. 373
eclectus Broun 504
edelenginus Reitt. 43
edentatus Seidl. 167, 539
Edithae Reitt. 114
edoughensis Desbr. 270
Eduardi Pic 77
effusus Pascoe 530
egenus Boh. (Pyctoderes) 361
egenus Faust (Embrithes) 354
egenus Faust (Systates) 283
egregius L. Miller 124, 538
Ehlersi Stierl. 43
eibesensis Reitter 464
elaboratus Gyll. 115
elatior Stierl. 167
Eldae Passauro 431
elegans Oliv. (Compsus) 510
elegans Faust (Ectemn.) 300
elegans Guér. (Coptorhynchus) 296
elegans Guér. (Exophthalmodes) 519
elegans Lea (Myllocerus) 383
elegans Stierl. (Otiorrh.) 197
elegantulus Apfelb. (Trachyphl.) 327
elegantulus Hust. (Platyomus) 528
elegantulus Hust. (Systates) 283
elegantulus Germ. (Otiorrh.) 114
elegantulus Roel. (Myllocerus) 383
elendeensis Hust. 383
elephas Reitter 322
elgonensis Auriv. 347
elliptica Lea 517
ellipticus Faust (Coptorhyn.) 296
ellipticus Hust. (Systates) 283
ellipticus Woll. (Laparocerus) 436
elongatulus Fairm. (Meira) 268
elongatulus Uhagon (Cathorm.) 337
elongatus Auriv. (Systates) 283
elongatus Blanch. (Sphaeropt.) 312
elongatus Heller (Behrensiellus) 292
elongatus Hochh. (Omias) 428
elongatus Hochh. (Otiorrh.) 202
elongatus Hochh. (Stom.) 236
elongatus Hust. (Parasystat.) 276
elongatus Pic (Aomus) 434
elongatus Stierl. (Otiorrh.) 38
elongatus Stierl. (Otiorrh.) 128
Emeryi Desbr. 479
Emgei Stierl. (Argoptochus) 401
Emgei Stierl. (Phyllobius) 456
Emgei Stierl. (Otiorrh.) 202
Emiliae Apfelb. 167
Enysi Broun 447
Ephialtes Apfelb. 8
ephippiatus Mshl. (Eusty.) 446
ephippiatus Mshl. (Myllocerus) 385
epiroticus Apfelb. 115
episomoides Heller 306
Eppelsheimi Apfelb. 8
equatorius Mshl. 525
eques Chevr. (Mylacomias) 421
eques Reitter (Otiorrh.) 168
equestris Richter 115, 538
equicaudatus Mshl. 525
equinus Lea 296
eremicola Rosenh. 115
eremita Blackb. 505
ericius Peyerimh. 407
erinaceus Apfelb. (Otiorrh.) 202
erinaceus F. (Cathormioc.) 339
erinaceus Faust (Embrithes) 354
erinaceus Faust (Myllocerus) 383
erinaceus Hust. (Systates) 283
erinaceus Redtb. (Trachyph.) 330
erinaceus v. Dyke (Peritelinus) 278
erivanensis Reitter 202
erminens Boh. 511
erroneus Faust (Otiorrh.) 186
erroneus Faust (Otiorrh.) 218
Ertli Hust. 283
erubescens Broun (Catodryob.) 239
erubescens Faust (Mylloc.) 380
erythropus Boh. (Otiorrh.) 36
erythropus Gmel. (Phyllobius) 487
Esau Stierl. (Otiorrh.) 168
Esau Apfelb. (Otiorrh.) 194
Escalerae Lona 322
Escherichi Reitter 168
espletiae Kirsch 525
estrellaiensis Zumpt 60
estrellanus Escal. 338
etropolensis Apfelb. 116, 538
etruscus Apfelb. (Phyllobius) 473
etruscus Desbr. (Phyllobius) 477

euboicus Apfelb. (Phyllobius) 481
euboicus Apfelb. (Otiorrh.) 116
euchromus Reitter 479
Eugeni Reitter 116
eugibinus Sol. 69
eupholoides Heller 309
europaeus Stierl. 202, 540
eurynotus Reitter 395
~~eusomoides Stierl. 142~~
eusomoides Stierl. 142
euxinus Apfelb. 202
evanescens Sol. 44
evasus Mshl. 383
everandensis Blackb. 517
Evertsi Uyttenboogaart 38
exaequatus Faust 456
exanguis Boh. 511
exaptus Mshl. (Syst.) 283
exaptus Faust (Myllocerus) 383
exaratus Faust 366
excavatus Woll. 437
excelsa Woll. 437
excellens Faust (Idiopsis) 305
excellens Kirsch (Otiorrh.) 116
excelsior Apfelb. 69
excursor Seidl. (Cathorm.) 338
excursor Stierl. (Cathorm.) 338
exigua Heller 309
exiguus Stierl. 266
exiguus Stierl. 267
exilis Boh. (Otiorrh.) 192
exilis Lea (Mylloc.) 383
eximius Boh. (Mylloc.) 383
eximius Voß (Pseudocyphus) 530
exophthalmus Heller 314
expansus Faust (Elytrocheilus) 301
expansus Reitter (Otiorrh.) 161
expansus Waterh. (Elytrogonus) 303
extraneus Perkins 310
exul Perkins 310

Fabricii Faust (Platyomicus) 373
Fabricii Guér. (Myllocerus) 383
Fabricii Stierl. (Otiorr.) 126
Fabriciusi Faust 367
fabrilis Reitter 83
faeculentus Gyllh. 477
fagi Gyllh. (Otiorrh.) 36
fagi Lea (Merimnetes) 441
Fagniezi Desbr. 269
Fairmairei Mars. (Cyclomaurus) 406
Fairmairei Reitter (Trachyphloeus) 322
Faldermanni Rosensch. (Platyomus) 528
Faldermanni Hochh. (Otiorrh.) 202
fallaciosus Desbr. 270
fallax Apfelb. (Otiorrh.) 537
fallax Desbr. (Choerocephalus) 416
fallax Gyllh. (Eustales) 516
fallax Perkins (Rhyncogonus) 310
fallax Stierl. (Phyllobius) 450
fallax Mars. (Otiorr.) 173
fallens Desbr. 271
falsarius Reitter 168
falsoconfinis Heller 301
familiaris Boh. 256
famularis Gyllh. 256
farinolentus Boh. 518
farinosus Formán. (Otiorrh.) 116
farinosus Hust. (Systates) 283
farinosus Motsch. (Alsus) 501
fasciatus Blackb. (Myllocerus) 379
fasciatus Boh. (Platyomus) 528
fasciatus Champ. (Exophthal.) 519
fasciatus Faust (Myllocerus) 383
fasciatus Hust. (Catalalus) 350
fasciculatus Ménétr. 221
fasciolatus Fairm. (Choeroceph.) 415
fasciolatus Gebler (Ptochus) 395
fastidiosus Desbr. 337
Fausti Hartm. (Episomus) 367
Fausti Heller (Bonthaina) 292
Fausti Reitter (Nastus) 442
Fausti Stierl. (Otiorrh.) 44
favosum Auriv. 290
Felicitanae Reitter 116
femoralis Boh. (Otiorrh.) 73
femoralis Boh. (Phyllobius) 456
Ferdinandi Deville (Pseudomeira) 264
Ferdinandi Reitter (Otiorrh.) 168
ferox Dan. 419
Ferrarii L. Miller 168
ferrugineus Formán. 433
fessus Boh. 475
Festae Sol. 499
Fieldi Lea 383
figulus Boh. 367
figurata Pascoe 346
figuratus Karsch 367
filicornis Reitter 376
fimbriatus Pascoe 367
finitimus Faust 359
fischtensis Reitter 116
fissirostris Chevr. (Temnoscapus) 448

fissirostris Schönh. (Caenopsis) 248
fissirostris Mshl. (Ellimen.) 353
Flachi Weise 234
flavipennis Jacq. 257
flavimanus Stierl. 168
flavipes Motsch. 501
flavoguttatus Stierl. 123
flavopilosus Apfelb. 203
flavulus Boh. 351
Flecki Reitter (Phyllobius) 479
Flecki Reitter (Otiorrh.) 95
flectiscapus Broun 399
Fleischeri Formán. (Trachyphl.) 322
Fleischeri Stierl. (Otiorrh.) 169
flexicaulis Schaeffl. 530
flexuosocostatus Perroud 507
Florae Woll. 439
florentinus Apfelb. (Otiorr.) 7
florentinus Stierl. (Meira) 266
floricola Gyllh. 464
fontanensis Zumpt 44
foraminosus Boh. 44
Formaneki Leonhard (Caenopsis) 249
Formaneki Reitter (Otiorr.) 44
Formaneki Reitter (Chiloneonasus) 404
Formaneki Reitter (Mylacus) 422
Formaneki Reitter (Amicromias) 415
Formaneki Tyl. (Omias) 428
formicarius Stierl. 203
forticornis Boh. (Rhinomias) 431
forticornis Heller (Trigonops) 314
forticornis Stierl. (Otiorr.) 44
fortipes Fairm. 239
fortis Reitter (Myllocerops) 376
fortis Rosenh. (Otiorr.) 44
Forsstroemi Gyllh. 522
fortispinus Reitter 201
fossicollis Kirsch (Compsus) 511
fossicollis Mars. (Lichenophagus) 441
fossor Boh. 25
fossulatus Kolbe 283
foveatus Auriv. 355
foveiceps Lea 383
foveicollis Chevr. (Exophthalm.) 519
foveicollis Desbr. (Cyclobarus) 405
foveicollis Hochh. (Otiorr.) 45
foveicollis Linell (Cyphoides) 513
foveicollis Voß (Myllocerus) 383
foveifrons Lea 383
foveiger Broun 239
foveolatostriatus Stierl. 73
foveolatus Faust 364
foveipennis Mshl. 347
foveithorax Desbr. 262
fractilineatus Mshl. 511
francolinus Schauf. 37
frater Stierl. 203
fraterculus Faust (Coptorhyn.) 296
fraterculus Reitter (Otiorrh.) 83
fraternus Faust (Nastus) 444
fraternus Stierl. (Otiorrh.) 83
fraxini Germ. 116, 538
frenatus Mshl. (Exophthal.) 519
frenatus Fairm. (Arrhines) 374
frenatus Mshl. (Episomus) 367
Frescati Boh. 45, 54, 535
Freyi Zumpt 169
freycinetiae Perkins 310
frigidus Muls. (Otiorrh.) 117
frigidus Stierl. (Otiorrh.) 88, 536
fringilla Faust 384
frisius O. Schneider 54, 535
fritillus Woll. 440
friulicus Herbst 88
Frivaldszkyi Kuthy (Trachyphl.) 323
Frivaldszkyi Rosenh. (Otiorr.) 203
Froggatti Heller 314
frontalis Faust (Myllocerus) 386
frontalis Schilsky (Phyllobius) 484
Fuentei Desbr. 338
fugitivus Lea 384
fulgidipes Bovie 511
fulgidus Formán. 428
fulliformis Reitter 203
fullo Schrank 203
fulvago Stev. 496
fulvagoides Reitter 496
fulvicomus Lona 162
fulvidipes Mars. 396
fulvipes F. (Phyllobius) 487
fulvipes Gyllh. (Phyllobius) 496
fulvipes Gyllh. (Otiorr.) 45
fulvipes Ol. (Otiorr.) 35
fulvipes Hochh. (Ptochus) 396
fulvipes Payk. (Phyllobius) 459
fulvipilis Apfelb. (Phyllobius) 472
fulvipilis Apfelb. (Phyllobius) 473
fulvipilis Desbr. (Phyllobius) 482
fulvipilis Luigioni (Phyllobius) 479
fulvipilis Penecke (Phyllobius) 485
fulvotessellatus Reitter 290
fulvovirgatus Mshl. 16

fulvus F. 75
fumeus Broun 240
fumidus Broun 240
fumigatus Boh. 473
funebris Apfelb. 117
funereus Perkins 310
funestus Broun (Getopsephus) 240
funestus Pascoe (Straticus) 442
funicularis Chevr. (Dicasticus) 352
funicularis Chevr. (Systates) 283
funicularis Gyllh. (Otiorr.) 117
funicularis Hust. (Platyom.) 373
funicularis Kirsch (Eustylus) 446
furcatus Guér. 511
furiosus Reitter 169
furinus Chevr. 269
fuscatus Stierl. 80
fuscella Broun 447
fuscicornis Fairm. 283
fuscipes Ol. (Otiorr.) 35
fuscipes Faust (Coptorhyn.) 296
fusciscapus Desbr. (Trachyphloeus) 319
fusciventris Fuß 117, 538
fuscoaeneus Fairm. 283
fuscofemoratus Faust 306
fuscomaculatus Lea 384
fuscofumosus Reitter 476
fuscus Waterh. (Drepanoderes) 503
fuscus Laich. (Phyllobius) 463
fuscus Perkins (Rhyncogonus) 310
Fussi Schilsky (Phyllobius) 494
Fussi Küster (Otiorr.) 117
Fussianus Csiki 118

gaditanus Escal. 338
Gaheryi Hust. 407
gallicanus Gyllh. 54
gallicus Stierl. 86
gallina Sparrm. 361
Galloisi Hust. 500
Galteri Apfelb. 169
ganalensis Gestro 384
Ganglbaueri Apfelb. (Phyllobius) 495
Ganglbaueri Apfelb. (Otiorr.) 9
Ganglbaueri Formán. (Omias) 428
Ganglbaueri Wagner (Stom.) 235
Ganglbaueri Stierl. (Otiorr.) 169
Garibaldinus A. & F. Sol. 118
Gastonis Fairm. 169
Gattereri Stierl. 432
Gautardi Stierl. 100
gazella Reitter 201
Gebleri Faust 238
gemellatus Beck (Otiorr.) 80
gemellatus Stierl. (Otiorr.) 169
geminatus Kolbe 352
geminus Champ. 530
gemmatus Faust (Systates) 283
gemmatus Scop. (Otiorr.) 118
gemmeus Faust (Compsus) 511
gemmeus Pascoe (Episomus) 367
gemmifer Guilleb. 499
generosus Faust 296
geniculatus Faust (Sciobius) 244
geniculatus Germ. (Otiorrh.) 9
geonomoides Pascoe 531
Georgi Lona 46
georgicus Reitter 433
germanus Broun 310
Germari Stierl. 119
Gerstäckeri Faust (Isaniris) 241
Gerstaeckeri Faust (Dicasticus) 352
Gertrudae Zumpt 46
Gestroi Mshl. (Myllocerus) 385
Gestroi Pascoe (Apirocalus) 291
Gestroi Pascoe (Coptorhynchus) 296
Gestroi Sol. (Solar.) 234
Getschmanni Stierl. 46
Ghestleri Stierl. 137
Ghilianii Fairm. 46
Giaquintoi Sol. 230
gibbicollis Blackb. (Proxyrus) 505
gibbicollis Boh. (Otiorrh.) 204
gibbifrons Apfelb. 333
gibbosus Desbr. (Cyrtolepus) 406
gibbosus Hust. (Amphitm.) 347
gibbosus Hust. (Barianus) 348
gibbus Boh. 308
Giffardi Sharp 310
giganteus Fairm. 416
ginfushanensis Voß 384
giraffa Germ. 109
gitgita Heller 305
glabellus Rosenh. 205
glaber Hust. 283
glabratus Krnyn. (inc. sedis) 532, 535
glabratus Pascoe (Behren.) 292
glabratus Stierl. 46, 535
glabricollis Boh. (Otiorr.) 46
glabricollis Mshl. (Oreorrh.) 277
glacialis Apfelb. (Otiorr.) 212
glacialis Hust. (Neomias) 527
glacialis Hust. (Leptospyris) 275
glaucinus Pascoe 384
glauca Faust 517
glaucus Boh. (Compsus) 511
glaucus Hust. (Peritmetus) 360
glaucus Stierl. (Phyllobius) 476
globatus Mars. (Otiorrh.) 47

globatus Reitter (Pimelorhinus) 412
globicollis Hochh. (Otiorrh.) 205
globicollis Stierl. (Trachyphloeus) 323
globinasus Heller 296
globipennis Reitter 323
globipes Apfelb. 205, 540
globithorax Boh. (Otiorr.) 192
globithorax Fiori (Otiorr.) 202
globiventris J. L. Lec. 278
globosus Gyllh. (Mitophorus) 242
globosus Gyllh. (Mylacus) 422
globulicollis Seidl. 257
globulipennis Gyll. (Otiorr.) 212
globulipennis Woll. (Laparocerus) 437
globulosipennis Mars. 434
globulosus Escal. 338
globulus Gredler (Otiorrh.) 47
globulus Boh. (Mylacus) 422
globulus Fairm. (Catalalus) 350
globulus Mshl. (Sphrigodes) 362
globulus Oliv. (Mylacus) 425
globus Boh. 119
glomeratus Gyllh. 422
glomulus Schönh. 422
gloriosus K. Daniel 465
gnopholotus Lea 384
Gobanzi Gredler 47
Godarti Seidl. 323
Göbli Reitter 120
Godeti Gyll. 192
goerzensis Herbst 30
gossypiipes Chevr. 51
gomeraecola Mars. 437
Goryi Boh. 443
Gougeleti Seidl. 257
gracens Mars. 338
gracilentus Desbr. 271
gracilicollis Heller 307
gracilicornis Broun (Nicaeana) 527
gracilicornis Rits. (Episomus) 367
gracilicornis Stierl. (Otiorr.) 143
gracilicornis Seidl. (Trachyphl.) 323
gracilior Brancs. (Stomodes) 236
gracilior Fairm. (Cathormiocerus) 338
gracilipes Panz. (Rhinomias) 431
gracilipes Reitt. (Otiorrh.) 120
gracilipes Schilsky (Phyllobius) 457
gracilis Chevr. (Leptosphaerotus) 270
gracilis Gyllh. (Dorymerus) 120
gracilis Mshl. (Myllocerus) 384
gracilis Perkins (Rhyncogonus) 310
gracilis Seidl. (Cathormiocerus) 338
gracilis Sharp (Tigones) 399
gracilis Woll. (Laparocerus) 437
graciliscapus Hust. 373
graecoinsularis Reitter 120
graecus Schilsky (Phyllobius) 481
graecus Stierl. (Argoptochus) 402
graecus Stierl. (Cyrtolepus) 406
graecus Stierl. (Mylacus) 422
graecus Stierl. (Otiorr.) 120
grajus Daniel 151
gramineus Pascoe 312
granaticollis Fairm. 283
granatus Fairm. (Elytrogonus) 303
granatus Stierl. (Otiorr.) 103
grandicollis Boh. 47
Grandii Lona 187
grandicornis Stev. 401
grandifrons Reitter 129
grandineus Germ. 120
Grandini Desbr. 338
grandis Broun (Cator.) 239
grandis Desbr. (Homorhyt.) 251
grandis Pic (Chorocephalus) 416
granicollis Boh. (Otiorr.) 121
granicollis Boh. (Caterectus) 274
granicollis Faust (Eupiona) 356
granicollis Lea (Timareta) 346
granifer Broun (Hygrochus) 240
granifer Faust (Coptorhynchus) 296
graniger Pascoe (Elytrocheilus) 301
graniger Reiche (Otiorr.) 29, 534
granipennis Boh. 245
granithorax Reitter 210
graniventris L. Miller 131
granosa Boh. (Calyptop.) 239
granosa Heller (Calidiopsis) 292
granosus Boh. (Sphaeropterus) 312
granosus Fåhrs. (Sciobius) 245
granosus Faust (Celeuthetes) 293
granosus Faust (Systates) 283
granulatissimus Reitter 205
granulatopunctatus Stierl. 170
granulatostriatus Stierl. 47
granulatus Herbst (Otiorr.) 144
granulatus Seidl. (Trachyph.) 323
granulicollis Hust. 348
granulifer Auriv. 279
granuliger Dufour 73
granulipennis Hust. (Sen.) 279
granulipennis Formán. (Otior.) 47

granulipennis Hust. (Syst.) 283
granulipennis Hust. (Otiorr.) 171
granulosus Auriv. (Ceratroc.) 364
granulosus Boh. (Otiorr.) 55
granulosus Faust (Celeuthetes) 293
granulosus Faust (Eupyrgops) 304
granulus Mars. (Trachyphl.) 323
gratiosus Sharp 375
gratus Faust (Coptorhynch.) 296
gratus Pascoe (Myllocerus) 384
gravidus Gerst. (Mitophorus) 242
gravidus Stierl. (Otiorr.) 170
Grayanus Woll. 437
Gredleri Daniel 26
Grenieri Allard (Trogl.) 230
Grenieri Seidl. (Peritelus) 257
grisea Fairm. (Trigonops) 314
grisea Faust (Idiopsis) 306
grisellus Schilsky (Phyllobius) 482
griseolus (Myllocerus) 384
griseolus Sharp (Nonnotus) 504
griseolus Schilsky (Phyllobius) 484
griseolus Sol. (Otiorrh.) 170
grisescens Desbr. (Oarius) 502
grisescens Fairm. (Anaptoplus) 506
grisescens Muls. (Otiorr.) 42
griseopunctatus Degeer (Otiorr.) 79, 149
griseopunctatus Boh. (Otiorr.) 85
griseus Blatch. (Aphrastus) 503
griseus Broun (Tigones) 399
griseus Chevr. (Episomus) 367
griseus Guér. (Elytrogonus) 303
griseus Gyllh. (Sciobius) 245
griseus Horn (Achrastenus) 445
griseus Horn (Aragnomus) 273
griseus Kirsch (Otiorr.) 205
griseus Hust. (Amphit.) 347
griseus Hust. (Sphrigodes) 362
griseus Lea (Myllocerus) 384
griseus Oliv. (Peritelus) 261
griseus Pascoe (Coptorhyn.) 296
griseus Roel. (Myllocerus) 384
griseus Van Dyke (Rhyncogonus) 310
grossepunctatus Woll. 437
Grouvellei Stierl. (Meira) 268
Grouvellei Stierl. (Otiorr.) 85
gryphus Faust 367
grypsatus Boh. 446
guadarramus Seidl. 323
Gudini Reitter 377
Guerini Faust 296
Guillebeaui Desbr. 38
guineensis Lona 296
Gundlachi Chevr. 519
guttatus Petri (Otiorr.) 123
guttatus Boh. (Episomus) 367
guttatus Pascoe (Coptorh.) 296
guttiger Blanch. 296
guttula Fairm. 47
guttulus Matsum. 384
Gyllenhali Faust (Episom.) 368
Gyllenhali Boh. (Platyom.) 528
Gyllenhali Tourn. (Phyllobius) 493
gylippus Reitter 83
gymnopterus Daniel 170
gyraticollis Stierl. 182
gyratus Gyllh. 497
gyrosicollis Boh. 235

habenatus Mshl. 283
Haberhaueri Apfelb. 479
Hacquardi Hust. 283
Hackeri Zumpt 50
hadrocerus Daniel 48
haedillus Reitter 205
haematopus Boh. (Otiorr.) 63
haematopus Rosenh. (Mylacus) 423
haematopus Stierl. (Otiorr.) 37
haemorrhoidalis Faust 352
haifensis Formán. 428
haitiensis Bovie 519
Halbherri Stierl. 22, 48
hamata Lea 346
hamaticollis Fairm. (Diaecod.) 239
hamaticollis Hust. (Isaniris) 241
hamatus Seidl. 267
Hamiltoni Broun 447
Hampei Stierl. 213
Hanaki Friv. 428
Hancocki Mshl. 277
haplolophus Reitter 205
Hardcastlei Lea 384
Hardenbergi Mshl. 324
harmonicus Germ. 516
Haroldi Faust 364
hastilis Reitter 206
Hauseri Faust (Mesostylus) 290
Hauseri Faust (Ptochus) 395
Havelkae Apfelb. 111
hebes Boh. (Phyllobius) 478
hebes Reitter (Otiorr.) 206
hebraeus Stierl. 170
hebridarum Faust 293
Helenae Faust (Elytrocheilus) 301
Helenae Reitter (Otiorr.) 206
Heeri Stierl. 48
Heinzlii Reitter 160

Helferi Faust 502
hellenicus Stierl. (Otiorr.) 170
hellenicus Apfelb. (Phyllob.) 473
Helleri Lona (Coptorhynch.) 297
Helleri Hartm. (Asmaratrox) 432
Helleri Reitter (Mylacus) 423
Helleri Form. (Nastus) 443
Hellerianus Reitter (Otiorrh.) 170
helveticus Desbr. (Otiorrh.) 80
helveticus Boh. (Otiorrh.) 156
hemipterus Chevr. 520
Henoni Desbr. (Choerocoeph.) 416
Henoni Desbr. (Peritelus) 257
Henoni Desbr. (Nucterocephalus) 411
Henoni Fairm. (Otiorrh.) 48
Henschi Apfelb. (Otiorrh.) 183
Henschi Reitter (Henschia) 403
herbaceus Pascoe 384
herbiphagus Apfelb. 9
herbivorus Lea 384
Herrerai Escal. 324
herzegovinensis Stierl. 95
heteroclavatus Heller 297
heteromorphus Rottenb. 223
heterostictus Daniel 207
Heydeni Formán. (Nastus) 443
Heydeni Stierl. (Otiorr.) 10
Heydeni Stierl. (Omias) 428
Heydeni Stierl. (Phyllobius) 483
Heymesi Hubenth. 324
Heynei Voß 36
hiaticollis Mshl. 351
hibisci Montrouz. 293
Hickeri Penecke 121
hieroglyphicus Chevr. (Exophthalm.) 520
hieroglyphicus Sturm (Exophth.) 523
Hilfi Reitter 82
Hildebrandti Har. 364
Hilleri Faust 384
Hilli Lea 384
himalayensis Stebbing 312
hinnulus Faust 379
hipponensis Pic (Cyclobarus) 405
hipponensis Pic (Otiorrh.) 49
hircus Desbr. 338
hirsutus Formán. (Rhin.) 334
hirsutus Stierl. (Otiorrh.) 206
hirtellus Reiche 532
hirticornis Herbst 251
hirticulus Seidl. 338
hirtipennis Hust. 384
hirtula Sol. (Solar.) 234
hirtus Faust (Arrhines) 375
hirtus Gerst. (Systates) 284
hirtus Seidl. (Phyllobius) 491
hirtus Woll. (Laparocerus) 437
hispalensis Mars. 258
hispanicus Stierl. 59
hispanus Chevr. (Peritelus) 257
hispanus Heyd. (Otiorr.) 59
hispida Stierl. 238
hispidulus Casey (Aragnomus) 273
hispidulus Stierl. (Otiorr.) 54
hispidulus Thoms. (Syntaphoc.) 363
hispidulus Herbst (Trachyphl.) 330
hispidulus Mshl. (Hyperstylus) 375
hispidulus Steph. (Trachyphloeus) 318
hispidus Hartm. (Lalagetes) 357
hispidus G. H. Horn (Geodercodes) 275
hispidus Mshl. (Myllocerus) 384
hispidus Stierl. (Otiorr.) 171
histrio Gyll. (Otiorrh.) 171
histrio Faust (Brachyomus) 508
histrioides Reitter 171
histrix Escal. (Cathor.) 335
histrix Jac. (Tqrachyphloeus) 344
histrix Hust. (Anaptoplus) 506
Hochhuthi Faust (Phyllobius) 457
Hochhuthi Mars. (Otiorr.) 43
Hochhuthi Stierl. (Phyllobius) 456
Hochstetteri Redt. 447
Holdhausi For. (Mylloc.) 376
Holdhausi Sol. (Pseud.) 263
Holdhausi Sol. (Otiorr.) 206
Holtzi Schilsky (Phyllobius) 499
Holtzii Schilsky (Phyllob.) 478
Hopfgarteni Stierl. (Otiorr.) 14
Hopfgarteni Stierl. (Otiorr.) 195
hoplosternus Lea 384
Horni Mshl. (Sciobius) 245
Horni Van Dyke (Nemocestes) 274
horizontalis Fairm. 304
Hormuzachii Penecke 539
horrescens Mshl. 347
horrens Gyllh. 339
horridulus Faust 395
horridus Boh. (Oosomus) 358
horridus Boh. (Porpacus) 361
horridus Mshl. (Ellimen.) 353
horridus Stierl. (Otiorr.) 121
hospes Apfelb. (Otiorr.) 180
hospes Faust (Coptorh.) 297
hospitelensis Hust. 49
hospitus Reitter 174, 539

hostilius Reitter 408
hostis Heller 297
hoverlanus Reitter 61
humatus Germ. 443
humeralis Broun (Platyom.) 447
humeralis Broun (Tigon.) 399
humeralis Chevr. (Episom.) 368
humeralis Faust (Platyomicus) 373
humeralis Heller (Piezonotus) 308
humeralis Hust. (Dinosius) 514
humeralis Hust. (Leptosphaer.) 270
humeralis Mshl. (Amphit.) 128
humeralis Mshl. (Apotmetus) 273
humeridens Mshl. 520
humilis Er. (Eustylus) 446
humilis Faust (Coptorhyn.) 297
humilis Germ. (Otiorrh.) 192
humerosus Gestro 242
Hummleri Flach 231
hungaricus Germ. (Otiorr.) 49, 535
hungaricus Stierl. (Phyll.) 495
Hustachei Hoffm. (Trachyphl.) 324
Hustachei Lona (Otiorr.) 171
Hustachei Lona (Mylloc.) 384
Hustachei Winkler (Trachypl.) 326
hybridus Chevr. (Exophth.) 520
hybridus Rosensch. (Compsus) 511
hybridus Seidl. (Peritelus) 258
hyperoides Ragusa 420
hypocrita Rosenh. 49
hypocritus Faust 297
hypsibatus Apfelb. (Phyll.) 456
hypsibatus Ganglb. (Otiorr.) 49, 535
hypsicola Apfelb. 112, 538
hypsobius Apfelb. 89
hystericus Faust 206
hystricodes Mshl. 284
hystricosus Germ. (Platyomus) 528
hystricosus Hust. (Ischnobrotus) 526
hystricula Broun 447
hystrix Gerst. (Systates) 284
hystrix Gyllh. (inc. sed.) 221
hystrix Hust. (Neobryoch.) 358

iconicus Pascoe 368
ignambius Heller 507
ignaria Pascoe 505
ignarus Faust 334
ignavus Mshl. 384
ignoratus A. F. Sol. 252
iliganus Heller 297
illepidus Broun 240
illibatus Tourn. 491
illitus Reitter 384
illotus Hochh. 431
illustris Apfelb. (Otiorrh.) 197
illustris Faust (Episomus) 368
illyricus Apfelb. 142
imbellis Mars. (Elytrodon) 420
imbellis Mshl. (Ptochus) 395
imbricatus Formán. (Myllocer.) 376
imbricatus Motsch. (Ptochus) 395
imereticus Reitter 433
imitator Apfelb. 171, 539
immaculatus Faust (Enaptomias) 304
immaculatus Faust (Episomus) 365
immitis Pascoe 297
immunis Desbr. 416
impallescens Mshl. 385
impeditus Hust. 385
impexus Gyll. 171
imponticus Boh. 138
impositus Pascoe 520
impressiceps Reitter 172
impressicolle Faust 356
impressicollis Boh. (Sciobius) 245
impressicollis Hust. (Opseot.) 359
impressicollis Stierl. (Trachyphl.) 323
impressicollis Faust (Ptochus) 395
impressicollis Mshl. (Mylloc.) 385
impressicollis Woll. (Lichenophagus) 441
impressicollis Stierl. (Caenopsis) 248
impressifrons Boh. (Phyllobius) 491
impressifrons Desbr. (Choeroceph.) 416
impressifrons Linell (Cyphoides) 513
impressipennis Brullé 126
impressirostris Boh. 460
impressithorax Hust. 385
impressiventris Fairm. 121
impressus F. (Exoph.) 520
impressus Hust. (Dicasticus) 352
improvidus Heller (Coptorhyn.) 296
improvidus Mshl. (Coptor.) 297

improvidus Mshl. (Myllocerus) 385
impunctatus Escal. 339
impura Boh. 314
impurus Boh. 293
imuganus Heller 297
imus Boh. 59
inaequalis Boh. (Pyctoderes) 361
inaequalis Gyll. (Exoph.) 520
inaequalis Woll. (Laparocerus) 437
inaliparum Rost 231
incanus Gyll. 479
incertus Sol. 177
incisicollis Lea 505
incisipes Chevr. (Episomus) 368
incisipes Lea (Timareta) 346
incisus Montrouz. 293
incivilis Falderm. 50
inclivis Kol. 50
inclusus Mshl. 446
incomptus Faust (Episomus) 368
incomptus G. H. Horn (Nemocestes) 275
incomptus Sharp (Phyllobius) 500
incomptus Woll. (Laparocerus) 440
inconspicuus Lea (Synomus) 398
inconstans Casey (Stenoptochus) 280
inconstans Lea (Timareta) 346
inconstans Woll. (Laparocerus) 437
incurvus Lea 385
indefinitus Reitter 172
indemnis Faust 395
inderiensis Motsch. 501
indiscretus Faust 297
indubitus Reitter 122
inductus Gyll. 222
indutus Kiesenw. (Mylacus) 423
indutus Seidl. (Mylacus) 425
indutus Woll. (Laparocerus) 431
ineptus Mshl. 385
inermicollis Mshl. 368
inermipes Lea 385
inermis Auriv. (Myllocerus) 385
inermis Boh. (Elytrodon) 420
inermis Boh. (Trachyphloeus) 324
inermis Sol. (Mylacus) 423
infaustus Gyll. 117
inferior Mshl. 391
infernalis Germ. 122
infensus Faust 50
inflata Broun 345
inflatipennis Escal. 339
inflatiscapus Escal. 339
inflatoides Reitter 10
inflatus Gerst. (Mitophorus) 242
inflatus Gyll. (Otiorrh.) 10
inflatus Kol. (Urometopus) 433
inflatus Lea (Neomerimnetes) 441
inflatus Mshl. (Exorides) 525
inflatus Woll. (Laparocerus) 437
infortunata Lea 346
infranotatus Mshl. 284
infuscata Broun 527
infuscatus Hust. 270
inhabilis Reitter 172
inhumeralis Pic 339
innocuus Boh. 172, 539
innotatus Pic 402
inops Boh. 309
inornata G. H. Horn 289
inornatus Pascoe (Coptorh.) 297
inornatus Sharp (Phyllobius) 500
insculptus Stierl. 44
insidiosus Faust 405
insignis G. H. Horn 274
insolitus Sharp 526
instabilis Woll. 437
insubricus Uyttenboogaart 86, 536
insulanus Heller (Machaer.) 306
insulanus Schilsky (Phyllob.) 480
insularis Boh. (Caterectus) 274
insularis Boh. (Celeuthetes) 293
insularis Desbr. (Pseudomeira) 263
insularis Escal. (Cathorm.) 337
insularis Kolbe (Ellimorrhinus) 354
integrirostris Mshl. 375
intercalaris Boh. (Otiorrh.) 222
intercalaris Faust (Episomus) 368
intercoxalis Lea 385
intermedius Faust (Elytrocheilus) 301
intermedius Hust. (Leptosph.) 270
intermedius Hust. (Trogl.) 231
intermixta Lea 346
interpositus Champ. 520
interruptevittata Heller 305
interrupto-punctatus Ménétr. 428
interruptus Chevr. (Exophthalm.) 520
interruptus Desbr. (Argoptochus) 402
interruptus Faust (Myllocerus) 385
interruptus Faust (Syntaphocerus) 362

interruptus Heller (Sphaeropt.) 312
interruptus Pascoe (Coptorhyn.) 297
interruptus Pascoe (Eustales) 516
intersetosus Chevr. 270
interstitialis Fairm. 284
intricatus Stierl. 59
intrusicollis Rosenh. 172
intrusus Heller (Asmaratrox) 435
intrusus Reiche (Otiorrh.) 222
inunctus Stierl. 122
inviridis Pic 262
iratus Reitter 50
iris Mshl. 511
irrasus Seidl. 339
irregularis Faust (Embrithes) 354
irregularis Faust (Systates) 284
irregularis Mshl. (Episomus) 368
irregularis Stierl. (Otiorrh.) 206
irritabilis Faust 172
irritans Herbst 61
irritus Pascoe 507
irrorata Heller 314
irroratus Boh. (Phyllobius) 455
irroratus Eydoux (Psomeles) 309
irroratus Faust (Isopterus) 526
irroratus Stierl. (Otiorrh.) 103
irroratus Seidl. (Phyllobius) 487
irrorellus Germ. (Phyllobius) 488
isabellinus Boh. 511
islamita Mars. 238
issensis J. Müller 31
istriensis Germ. 28
italicus A. F. Sol. (Phyllob.) 488
italicus Schilsky (Phyllobius) 489
italicus Stierl. (Otiorrh.) 172
italus Mars. 264

Jacobsoni Suvorov (Myllocerus) 385
Jacobsoni Smirnov (Phyllob.) 480
Jacobsoni Suvorov (Phyllob.) 501
Jacqueti Stierl. 162
jaënensis Stierl. 50
Jakovlevi Faust 461
jaltensis Formán. 50
Jansoni Pascoe 297
jamaicensis Bovie 520
Jamamurai Kôno 372
japonicus Faust (Phyllobius) 500
japonicus Kôno (Phyllobius) 457
japonicus Sharp (Asphalmus) 507
jarpachlinus Reitter 172
javanus Faust 308
Javeti Stierl. 101
Jekeli Pascoe (Heteroghym.) 305
Jekeli Stierl. (Otiorrh.) 117
Jekelianus White 520
Joakimoffi Apfelb. 123, 538
Johannis Stierl. 51, 535
Johnstoni Mshl. 277
Jovis L. Miller 206
judaicus Stierl. 173
judicariensis Reitter 86
jugicola Stierl. 51
jugigradens Hänel 123
juglandiformis Reitter 207
juglandis Apfelb. 206
julicus Lona 536
juldusanus Reitter 207
juniperi Desbr. 252
juvencus Gyll. 173
juvenilis Gyll. 178

kabylianus Desbr. (Cyrtolepus) 407
kabylianus Pic (Homorhythmus) 252
Kaci Peyerimh. 51
Kaeshoveni Mshl. 385
kairuanus Reitter 173
kalidupae Heller 308
kalukembensis Hust. 385
kanaiensis Perkins 310
kapirensi Hust. 284
Karamani Apfelb. 95
karissimbi Auriv. 273
kasbekianus Stierl. 104
kashmirensis Formán. (Otiorrh.) 123
kashmirensis Mshl. (Mylloc.) 385
katanganus Hust. 385
katonaense Hust. 284
Kelecsenyi Friv. 95
kenyae Auriv. (Amphitm.) 348
Kenyae Hust. (Peritelus) 272
kenyae Hust. (Neomias) 527
kenyae Hust. (Parasystates) 277
kenyanus Mshl. (Seneciobius) 279
kenyanus Lona (Parasyst.) 277
khayesicus Hust. 385
Kiesenwetteri Desbr. (Phyllobius) 464
Kiesenwetteri Schilsky (Phyllobius) 498
Kiesenwetteri Seidl. (Peritelus) 258
Kiesenwetteri Stierl. (Otiorrh.) 123
kigomanus Hust. 284
Kindermanni Stierl. 173
kiorensis Apfelb. (Phyllobius) 473
kiorensis Apfelb. (Otiorrh.) 90, 536

kirgisicus Csiki 457
Kirschi Stierl. 51
kivuanus Hust. 284
kivuensis Hust. (Amphit.) 348
kivuensis Hust. (Parasystates) 277
klabatica Heller 305
Klecki Sharp 479
Koebelei Perkins (Rhyncogonus) 310
Koebelei Van Dyke (Nemocestes) 275
Koebeli Van Dyke (Nemocestes) 275
Koki Heller 306
Kollari Gyll. 123, 538
Koltzei Reitter 395
kombuisana Mshl. 314
Königi Faust 124
kopaonicensis Apfelb. 124, 538
koracensis Stierl. 183
Korbi Schilsky (Phyllobius) 491
Korbi Stierl. (Cathormiocerus) 339
koritnicensis Apfelb. 124, 538
Koronae Stierl. 184
Kotulae Smulikowski 222, 537, 540
Koziorowiczi Stierl. 122
Kozlovi Suvorov 395
Kraatzi Faust (Episomus) 368
Kraatzi Faust (Nastus) 443
Kraatzi Tourn. (Pseudomeira) 263
Kraatzi Stierl. 134
Krajniki Roubal 428
Krattereri Boh. 124, 538
Kratteri Mars. 124
Kraussi Ganglb. 133
Kricheldorffi Zumpt 46
Krüperi Faust (Stom.) 237
Krüperi Faust (Param.) 238
Krüperi Stierl. (Mylacus) 423
Krüperi Stierl. (Otiorrh.) 174
Krüperi Stierl. (Phyllobius) 480
kubanensis Reitter 31
kuchibutonus Kôno 385
Kuenburgi Stierl. 124, 539
Kuennemanni Reitter 52
Kükenthali Faust 297
kuldzhanus Suvorov (Phyllobius) 500
Kulzeri Zumpt 207
Kummeri Schneider 19
kurdistanus Stierl. 409
Kuschakewitschi Stierl. (Otiorrh.) 207
Kuschakewitschi Faust (Nastus) 443
Küsteri Stierl. 123
kwanhsiensis Heller 368
kyllenensis Apfelb. 174
kytherus Reitter 207

labilis Stierl. 125
Labrami Montrouz. 303
labyrinthicus Kirsch 525
lacernatus Reitter 219
lacerta F. (Episomus) 368
lacerta Heller (Coptorhyn.) 297
laconicus Kirsch 174
lacophilus Heller 297
lacteus F. 511
lacteolus Motsch. 397
laesicollis Fåhr. 353
laesipes Quedf. 373
laeta Blackb. 505
laetevirens Mshl. 385
laetificator Reitter 91
laetus Boh. (Eustales) 516
laetus Oliv. (Exophthalmodes) 520
laetus Rey (Peritelus) 261
laevicollis Mshl. (Episomus) 369
laevigatocollis Gredler 163
laevigatus Gyll. (Otiorrh.) 21
laevigatus F. (Otiorrh.) 52
laevinasus Hust. 284
laevior Auriv. 352
laevipennis Stierl. 207
laevirostris Hust. 284
laevis Auriv. (Seneciobius) 279
laevis Hust. (Leptosphyris) 275
laevistriatus Hust. 284
laeviusculus Stierl. (Otiorrh.) 207
laeviusculus Broun (Heterexis) 240
Lafertei Stierl. 25
lagenaria Muls. 222
lahainae Perkins 310
Lajoyei Bovie 525
lamellipes Woll. 437
Lameyi Hust. 271
laminirostris Reitter 174
lanaiensis Perkins 311
lanatus Woll. 437
languidus Gyllh. 374
laniger Faust 174
lanipes Hust. 242
lanosimanus Chevr. 417
lanugineus Faust 375
lanuginosus Boh. (Otiorrh.) 52
lanuginosus Chevr. (Choeroceph.) 417
lanuginosus Gyllh. (Trachyl.) 332
Lapeyrousei Boisd. 303
lapidicola Chevr. 339
lapsus Mshl. 395

lar Panz. 487
larinoides Reitt. 420
Larraldi Perris 249
lasioscelis Reitter 194
lasius Germ. 53
latacungae Kirsch (Platyomus) 528
latenotata Pic 411
lateobscurus Pic 498
lateralis Auriv. (Leptospy.) 275
lateralis Boh. (Sciobius) 245
lateralis Boisd. (Coptorhy.) 297
lateralis Chevr. (Myllocerus) 385
lateralis Eydoux (Episomus) 369
lateralis Hartm. (Dicastic.) 352
lateralis Hust. (Mecostylus) 358
lateralis Reiche (Phyllobius) 481
lateralis Van Dyke (Rhyncogonus) 311
lateritius Fairm. (Catalalus) 350
lateritius Faust (Embrithes) 354
latialis Sol. 7
latibasis Lea 385
laticolle Heller (Colpost.) 294
laticolle Kolbe (Epipedosoma) 356
laticollis Heller (Exophth.) 517
laticollis Boh. (Trachyphl.) 324
laticollis Hoffm. (Trachyphl.) 325
laticollis Lea (Myllocerus) 385
laticollis Pascoe (Dicasticus) 352
laticollis Pascoe (Episomus) 369
laticollis Pascoe (Systates) 284
laticornis Reitter 385
latifrons Form. (Nastus) 443
latifrons Hochh. (Ptochus) 395
latifrons Stierl. (Otiorrh.) 174
latifrons Stierl. (Otiorrh.) 77
latinasus Reitter 174
latipennis Broun (Platyomida) 447
latipennis Boh. (Otiorrh.) 78
latipennis Casey (Geoder.) 275
latipennis Fairm. (Catalalus) 350
latipennis Fåhrs. (Sciobius) 245
latipennis Lea (Evas) 517
latipunctus Penecke 125
latirostris Pic (Cathorm.) 340
latirostris Bargagli (Trogl.) 231
latirostris Hust. (Systates) 284
latirostris Penecke (Omias) 428
latirostris Reitter (Ptochella) 377
latiscapus Heller (Platyspartus) 308
latiscapus Hust. (Barianus) 348
latiscapus Hust. (Catalalus) 350
latiscrobs Desbr. 267
latissimus Stierl. 24
latitarsis Apfelb. 125, 538
latitarsis Penecke (Trachyphl.) 325
latithorax Desbr. (Leptosph.) 271
latithorax Desbr. (Phyllobius) 500
Laurae Sol. 231
lauri Stierl. 7
lauripotens Woll. 438
lavandus Germ. 125
Lazarevici Csiki 157
Lebasii Boh. 512
lecideosus Pascoe 505
Ledereri Stierl. 177
Lederi Stierl. (Otiorrh.) 176
Lederi Reitter (Nastus) 443
Lederi Schilsky (Phyllobius) 481
Leechi Sharp 500
Lefebvrei Gyll. 24
Lefroyi Mshl. 385
Leggei Mshl. 348
leliensis Reitter 72, 536
lenkoranus Reitter (Otiorrh.) 43
lenkoranus Schilsky (Phyllobius) 481
lentus Er. (Episomus) 369
Leonhardi Formán. (Omias) 428
Leonhardi Reitter (Otiorrh.) 77
Leonhardi Schilsky (Argoptochus) 402
Leonhardi Schilsky (Phyllobius) 481
Leonhardi Wagner (Stom.) 236
Leonii Schilsky (Phyllobius) 479
Leonii Sol. (Trogl.) 231
Leonisi Pic 479
Leopoldi Mshl. 297
lepidopterus Boh. (Cladeyterus) 509
lepidopterus Faust (Aphyonotus) 434
lepidopterus F. (Otiorrh.) 139
lepidopterus Gyll. (Exophth.) 520
lepidopterus Gyllh. (Exophth.) 523
lepidopterus Gyll. (Hadrorrhinus) 257
lepidopterus Woll. (Laparocerus) 438
lepidotus Boh. (Eustales) 516
lepidotus Hust. (Systates) 284
lepidotus Perris (Omias) 428
lepidus Boh. (Compsus) 512
lepidus Boisd. (Coptorhynchus) 297
lepidus Chevr. (Exophthalm.) 520
lepontinus Daniel 152
leptosphaeroides Seidl. 267

lesinicus Reitter 31
Lesnei Mshl. 284
Lethierryi Chevr. (Cathormioc.) 340
Lethierryi Desbr. (Cyrtol.) 407
Letzneri Reitt. 235
leucofasciatus Voß 503
leucogaeus Germ. 516
leucogrammus Germ. 255
leucographus Gyll. 520
leucophoeus Gyll. 291
leucopleurus Faust 298
leucostictus Heller (Coptorhy.) 297
leucostictus Pascoe (Coptorhy.) 298
leucozonus Boh. 528
leurops Mshl. 357
Leveillei Bris. 257
levistici Müll. 176
Lewisi Sharp 500
liburnicus Reitter 125
ligatus Pascoe 298
ligneoides Stierl. 53
ligneus Ol. 53, 535
liguricus Apflb. (Otiorrh.) 79
liguricus A. F. Sol. (Pseudom.) 263
ligustici L. 174, 540
ligusticiformis Formán. 178
liliputanus Apfelb. (Otiorrh.) 54
liliputanus Mars. (Cathor.) 342
lima Marsh. 532
limbaticollis Mshl. 369
limbatus Mshl. 396
Lindblomi Auriv. 284
Lindemanni Lindem. 494
Lindigi Kirsch 525
linearis Stierl. 149
lineata Blanch. (Timareta) 346
lineata Schultze (Calidiopis) 293
lineatocollis Boh. 386
lineatulus Hust. 284
lineatus Kôno (Sphaerh.) 313
lineatus Faust (Nastus) 443
lineatus Faust (Syntaphocerus) 363
lineatus Pascoe (Evadodes) 517
lineolatus Blanch. 312
linussae A. F. Sol. 168
liophloeoides Apfelb. 178
lithanthracius Boh. 112
litoralis Champ. (Barianus) 349
litoralis Faust (Phyllobius) 481
lividianus Pic 465
livnensis Apfelb. 96
livonicus Seidl. 160
ljumanus Reitter 127
lobeliae Auriv. 290
Loennbergi Auriv. 360
Logesi Pic (Meira) 267
Logesi Ragusa (Phyllobius) 458
Lokayi Form. 443
lombardus Stierl. 54
Lonae Sol. (Mylacus) 423
Lonae J. Müller (Otiorr.) 72, 536
longefemoratus Fairm. 284
longehirtus Hust. 284
longiceps Broun 399
longicollis Boh. (Ptochus) 390
longicollis Faust (Trigonops) 314
longicollis Heller (Coptorhyn.) 298
longicollis Gyll. (Otiorrh.) 27
longicollis Reitter (Urometopus) 433
longicornis Fairm. (Eurhynchom.) 357
longicornis Fairm. (Phyllobius) 377
longicornis Stierl. (Otiorrh.) 125
longicornis Form. (Nastus) 443
longicornis Pascoe (Epherina) 504
longicornis Roel. (Phyllobius) 481
longicornis Stierl. (Urometopus) 433
longior Pic 271
longipennis Pic (Choerocephalus) 417
longipennis Stierl. (Otiorrh.) 126, 538
longipes Stierl. 199
longipilis Apfelb. (Phyllob.) 485
longipilis Boh. (Phyllobius) 482
longipilis Hust. (Myllocerus) 386
longipilis Pic (Cyclobarus) 405
longirostris Formán. (Trachyph.) 325
longirostris Hust. (Mitophorus) 243
longirostris Stierl. (Otiorrh.) 116, 538
longiscapus Pic (Cathorm.) 340
longisetis Sol. 402
longiusculus Stierl. 54
longiventris Küster 126
longulus Mars. (Otiorrh.) 38
longulus Van Dyke (Nemocestes) 275
longus Lea 386
lopadusae A. F. Sol. 178
loricatus Stierl. 157
Lostiae Desbr. 263
Lovéni Auriv. (Oreorr.) 277
Lovéni Auriv. (Seneciobius) 279
Lovéni Auriv. (Systates) 284
lubriculus Faust 207
lubricus Boh. 178

lucae Stierl. 203
lucanus A. F. Sol. 483
lucidulus Apfelb. 95
lucidus Hartm. 369
luctuosus Boisd. (Sphaeropter.) 312
luctuosus Desbr. (Myllocerus) 386
luctuosus Guér. (Psomeles) 309
luctuosus Gyllh. (Exophthalmodes) 520
luctuosus Latr. (Otiorrh.) 74
lucusensis Escal. 325
Ludovici Reitter 183
Ludyi Stierl. 33
luganensis Stierl. 108
lugdunensis Boh. 37
lugens Germ. 126
lugubris Gmel. (Otiorrh.) 190
lugubris Motsch. (Phyllobius) 475
lugubris Boh. (Idorhynchus) 306
luhuanus Heller 298
Luigionii Desbr. (Elytrod.) 420
Luigionii A. F. Sol. (Otiorrh.) 55
lumenifer Reitter 178
lumensis Apfelb. 127, 538
luminifer Quedf. 284
lunaris Champ. 521
luridus Stierl. 73
lusitanicus Stierl. 340
luteosquamosus Heyden 443
luteus Stierl. 178
lutosus Broun 239
lutosus Stierl. 127

Mac Leayi Montrouz. 313
macedonicus Reitter 55
macrocerus Motsch. 501
macroscapus Champ. 530
maculatus Blackb. (Proxy.) 505
maculatus Perris (Trachyph.) 331
maculatus Auriv. (Entypotr.) 355
maculatus Tourn. (Phyllob.) 482
maculatus Van Dyke (Miloderoides) 526
maculicollis Heller 303
maculicornis Desbr. (Cyrtol.) 407
maculicornis Germ. (Phyllob.) 482
maculifer Desbr. (Hyph.) 241
maculifer Desbr. (Phyllob.) 480
maculiscapus Reitter 207
maculosa Faust 306
maculosus Auriv. (Systates) 285
maculosus Chevr. (Exophthal.) 521
maculosus Desbr. (Mylloc.) 392
maculosus Desbr. (Phyllob.) 480
maculosus Fairm. (Catalalus) 350
maculosus Motsch. (Phyllob.) 500
maculosus Sol. 14
madagascariensis Fairm. (Catalalus) 350
madagascariensis Boh. (Catalalus) 350
Madari Formán. 95
Maderi Formán. 127
maderiensis Pic 250
maderae Woll. 340
Maderianus Penecke 81
madurensis Mshl. 386
magdalensis Mshl. 446
magnicollis Desbr. (Peritel.) 258
magnicollis Stierl. (Otiorr.) 55
magnificus Hust. 386
Mairei Peyerh. 232
major Hust. (Neomias) 527
major Desbr. (Cyclobarus) 405
major Desbr. (Peritelus) 258
major Stierl. (Leptosphaer.) 270
majusculus Sol. 232
makalicus Escal. 405
malacensis Esc. 336
malaccensis Faust 369
malefidus Gyll. 55
malachiticum Heller 294
mali F. (Phyllob.) 463
mali Payk. (Phyllob.) 488
malignus Faust 386
malissorum Apfelb. 127, 538
Malyi Obenb. 433
mamillosus Form. 325
mamillatus Heller 307
manadensis Heller 298
Mancinii Sol. 178
Manderstjernae Baillon 532
mandibularis Redtb. (Otiorrh.) 55
mandibularis Chevr. (Omias) 427
mandibularis Kuhnt (Phyllob.) 464
manicanus Mshl. 280
manipurensis Mshl. (Episom.) 369
manipurensis Mshl. (Myll.) 386
Mannerheimi Boh. 521
Maquilingi Heller 304
margaritaceus Gerst. (Sphr.) 362
margaritaceus Gyllh. (Exoph.) 521
margaritaceus Hust. (Sphr.) 362
margaritifer Reitter 28
margelanicus Faust 443
marginalis Faust (Chaunod.) 364
marginalis Hust. (Systates) 285
marginalis Faust (Phyllob.) 497
marginatus Fåhrs. (Sciobius) 245
marginatus Saund. (Elytroch.) 303
marginicollis Chevr. 521

Mariae Faust 500
maricao Wolcott 512
maritimus Rye (Cathorm.) 340
maritimus Stierl. (Otiorr.) 153
marmorata Pascoe 505
marmoratus Faust (Mylloc.) 392
marmoratus Hust. (Syst.) 285
marmoratus Mshl. (Pseudocyphus) 530
marmoreus Gyllh. 521
marmota Stierl. 127
maroccanus Desbr. (Choerocph.) 415
maroccanus Peyerh. (Phyllobius) 484
maroccanus Pic (Peritelus) 258
maroccanus Sol. (Caenopsis) 249
maroccanus Stierl. (Cathormioc.) 341
Marquardti Falderm. (Otiorr.) 144
Marquardti Stierl. (Otiorr.) 154, 178
Marquardti Stierl. (Otiorr.) 154
Marquardti Reitter (Ptochus) 396
Marquardtianus Reitter 178
Marqueti Desbr. (Cathorm.) 341
Marqueti Gautier (Omias) 427
Marqueti Gautier (Peritelus) 260
marraquensis Esc. 335
Marseuli Stierl. 179
Marshalli Bovie (Exorides) 525
Marshalli Heller (Epis.) 369
Marshalli Heller (Trachyodes) 347
Marhalli Lona (Mylloerus) 386
Marshalli Sol. (Otiorrh.) 540
Marthae Reitter 128
martinensis Cl. Müller 86, 536
Martinezi Escal. 341
martinicensis Chevr. 521
Martini Faust (Otiorr.) 169
Martini Fairm. (Trogl.) 232
Martini Pic (Mylacus) 422
Masoni Mshl. 525
massaicus Hust. 386
Mastersi Lea 386
mastix Ol. 11
matutinus Reitter 179
Maugei Boh. 516
mauritanicus Hust. 180
maurulus Redtb. 429
maurus Gyllh. (Otiorr.) 65
maurus Schrank (Otiorr.) 181
maxillosus Gyll. (Otiorrh.) 207
maxillosus Petri (Rhinomias) 432
Mayeti Fairm. 232
Maynei Mshl. 285
Mazurai Formán. 207
mecops Daniel 209
medianus Pic 405
mediatus Reitter 470
megacephalus Sol. 402
megareus Reitter 56, 535
Megerlei F. 219
Mehelyi Stierl. 128, 538
Meyeri Kolbe 355
melancholicus Boh. (Catom.) 509
melancholicus Boisd. (Coptor.) 298
melanopus Zumpt (Otiorr.) 60
melanopus Apfelb. (Otiorr.) 94
melanothrix G. H. Horn (Nemocestes) 274
melanothrix Kirby (inc. sed.) 532
meledanus Reitter 56
Melichari Formán. 395
melitanus Reitter 126
melvillensis Lea 386
memnonius Gyllh. 58
mendax Apfelb. (Otiorr.) 179, 540
mendax Woll. (Laparoc.) 438
mendicus Woll. 438
Mequignoni Hoffm. 341
merditanus Apfelb. (Otiorr.) 56
merditanus Apfelb. (Phyllob.) 456
meridionalis Desbr. (Phyllob.) 495
meridionalis Gyll. (Otiorr.) 56, 535
Merkli Stierl. 208
meruensis Lona 285
mesatlanticus Peyerimh. 57
Meschniggi Petri 128, 538
Mesnili Hoffm. 535
messenicus Stierl. 179
metallescens Boh. (Oocomus) 358
metallescens Broun (Zenag.) 247
metallescens Lucas (Cyclo.) 405
metallescens Pascoe (Brachyomus) 508
metallescens Seidl. (Cyrtol.) 407
metallescens Seidl. (Omias) 429
metallicus Gerst. (Systates) 285
metallicus Reiche (Tanyoerus) 289
metapocyrtoides Heller 298
methobiensis J. Müller 30
metkovicensis Apfelb. 8
metokianus Apfelb. 30
micans Hust. (Entyp.) 355
micans Hust. (Systates) 281
micans Kirsch (Eustales) 516
micans Lacord. (Phyllobius) 498
micans Seidl. (Omias) 429
microps Lea (Titinia) 506

microps Hust. (Otiorr.) 179
microphthalmus Champ. (Brachystylus) 445
microphthalmus Seidl. (Meira) 267
microphthalmus Sol. (Trogl.) 232
micros Hust. 386
microscabris Reitter 186
Midas Reitt. 128
migrans Faust 298
Milleri Stierl. 114
Millerianus Reitter 128, 538
mimetis Hust. 242
mimicus Walk. 382
mingrelicus Reitter 433
minimus Formán. (Argoptochus) 402
minimus Mshl. (Systates) 285
minimus Stierl. (Meira) 269
minor Auriv. (Parasystates) 277
minor Champ. (Brachycyrtus) 349
minor Fairm. (Brachycyrtus) 349
minor Hust. (Babaultia) 349
minor Hust. (Peritmetus) 360
minor Kolbe (Peribrotus) 359
minor Perkins (Rhyncogonus) 311
minor Pic (Leptosphaerotus) 271
minor Stiller (Otiorr.) 19
minor Vitale (Otiorr.) 103
minuscula Desbr. (I. s.) 272
minusculus Lea 386
minutesquamosus Sol. 76
minutissimus Desbr. (Meira) 268
minutissimus Pic (Aomus) 434
minutus Formán. (Mylloc.) 376
minutus Hust. (Catalalus) 350
minutus Hust. (Pseudocrat.) 244
minutus Hust. (Systates) 285
minutus Pic (Cathormiocerus) 341
minutus Steph. (Phyllobius) 460
minutus Stierl. (Meira) 269
minutus Stierl. (Otiorr.) 189
mirabilis Lea 386
miramarae Schauf. 179
mirandus Desbr. 499
misellus Stierl. 57
miser Faust (Embrithes) 355
miser Kirsch (Otiorr.) 208
Mithras Reitter 395
mitis Reitter 376
mixtus Chevr. (Exophthal.) 521
mixtus Faust (Systates) 285
mixtus Hochh. (Phyllobius) 500
mixtus Hust. (Leptosphaerotus) 271
mixtus Hust. (Peribrotus) 359
mixtus Hust. (Sphrigodes) 362
mlanjensis Mshl. 352
Mocquerysi Hust. 514
Mocsaryi Csiki 128
Moczarskii Breit (Trogl.) 232
Moczarskii Penecke (Omias) 429
modesta Pascoe 527
modestus Gyllh. (Exophthal.) 524
modestus Pascoe (Myllocer.) 386
modestus Stierl. (Otiorr.) 179
moerens Pascoe 298
moesiacus Apfelb. 128
moestificus Schönh. 208
moestus Gyll. 128
mogadoricus Escal. 341
Moissoni Hust. 271
mokragorensis Apfelb. 6
molarius Faust 391
moldovensis Apfelb. 12
molitor Rosensch. (Compsus) 512
molitor Schilsky (Phyllobius) 450
mollinus Boh. 429
mollis Faust 528
molokaiensis Perkins 311
moluccanus Heller 292
molytoides Reitter 179
monachus Fauvel 512
Monardi Hust. 285
monedula Stierl. 222
mongolicus Reitter 179
moniliatus Fairm. 285
monilicornis Desbr. (Cyrt.) 407
monilicornis Hust. (Neomias) 527
monilifer Broun 240
mononychus Seidl. 258
monspeliensis Hust. 325
monstrosus Boh. (Pyct.) 361
monstruosus Tourn. (Phyll.) 465
montanus Boh. (Otiorrh.) 63
montanus Chevr. (Otiorrh.) 208
montana Auriv. 275
montanus Guér. (Episomus) 369
montanus Lea (Merimnetes) 441
montanus Mshl. (Apotmetus) 273
montanus Mill. (Phyllobius) 489
montanus L. Miller (Phyllobius) 484
montanus Petri (Omias) 428
montanus Sol. (Homorhyth.) 250
montanus Van Dyke (Nemocestes) 275
Montandoni Sol. 180
monticola Germ. (Otiorr.) 21
monticola Champ. (Otiorr.) 21
monticola Dufour (Otiorr.) 21
montigena Mars. (Otiorrh.) 208
montigena Friv. (Otiorrh.) 128

montivagus Boh. (Otiorrh.) 129
montivagus Boh. (Otiorrh.) 129
Moraguesi Desbr. (Cathorm.) 341
Moraguesi Desbr. (Cyrtolepus) 407
mori Kôno 369
moriger Reitter 180
morio Boh. (Laparocerus) 438
morio Boh. (Myllocerus) 386
morio Bonsd. (Otiorr.) 58
morio F. (Otiorr.) 57, 535
morio Payk. (Otiorr.) 34
morio Redtb. (Otiorr.) 100
Moroderi Escal. 327
morosa Broun 447
morosus Faust 180
morulus Boh. (Otiorrh.) 24
morulus Hust. (Cissodic.) 351
mossorensis Reitter 71
Motschoulskyi Faust 497
mucoreus Formán. 444
mucronatus Faust 531
mughus Apfelb. 94, 537
mulhacensis Hoffm. 535
Mülleri Gmel. (Otiorr.) 176
Mülleri Lona (Stom.) 236
Mülleri Rosenh. (Otiorr.) 60
Müllerianus Winkler 15
multicarinatus Boh. 354
multicolor Gmel. (Otiorr.) 79
multicostatus Ol. (Otiorr.) 62
multicostatus Stierl. (Otiorr.) 129
multifoveolatus Desbr. 417
multimaculatus Lea 386
multipunctatus F. (Otiorr.) 60
multipunctatus Ol. (Otiorr.) 62
multipunctatus Stierl. (Otiorr.) 23
Mumfordi Van Dyke 311
munda Blackb. 346
mundus Sharp (Episomus) 369
mundus Sharp (Phyllobius) 457
mundus Voß (Mylloc.) 386
munelensis Apfelb. 129, 538
muralis Bedel 326
muricatus Boh. (Sciobius) 245
muricatus Chevr. (Leptosp.) 271
muricatus Stierl. (Trachyph.) 326
murinus Boh. (Mylacus) 423
murinus Boh. (Pyctoderes) 361
murinus Broun (Tigones) 399
murinus Rosensch. (Exophthal.) 521
Murrayi Pascoe 374
mus F. (Phyllobius) 450
mus Stierl. (Otiorr.) 222
muscicola Desbr. 263
muscorum H. Bris. (Otiorr.) 201
muscorum Desbr. (Pseudomeira) 263
muscosus Gerst. (Embrithes) 355
muscosus Mshl. (Oreosyst.) 277
musculus Boh. 391
mutabilis Boh. (Platyomus) 528
mutabilis Desbr. (Phyllobius) 490
mutabilis Faust (Myllocerus) 390
mutandus Mars. 336
mutans Mshl. 313
mutator Fairm. 409
mutatus Perkins (Rhyncog.) 311
mutatus Pic (Perit.) 263
muticus Sol. 177
mutilans Boisd. 298
mutus Gyllh. 488
myops Reitter 232
myrmecophilus Seidl. 341
mysticus Faust 353

naevius Pascoe 516
nanus Fährs. (Trachyphl.) 326
nanus Mshl. (Sciobius) 245
napaeus Mshl. 395
narinosus Heller 298
narynensis Reitter 460
nasalis Broun 399
naso Leconte (Evotus) 517
naso Sharp (Myllocerus) 386
nasuta Pascoe 304
nasutus Pascoe (Mylloc.) 386
nasutus Stierl. (Otiorrh.) 208
Naudini Lucas 532
navarricus Gyllh. 59
navicularis Mshl. (Rhyncog.) 311
navicularis Woll. (Laparocerus) 438
neapolitanus Faust (Meira) 267
neapolitanus Pic (Phyllobius) 452
neapolitanus Stierl. (Otiorrh.) 185
Neavei Mshl. (Parasystates) 277
Neavei Mshl. (Platyomicus) 373
nebrodensis Daniel 251
nebulosa Pascoe 398
nebulosus Mshl. (Episomus) 369
nebulosus Motsch. (inc. sed.) 532
necessarius Gyllh. (Peritelus) 258
necessarius Stierl. (Otiorrh.) 61
necessus Mars. 61
necopinus Mshl. 386
nefandus Faust 209
neglectus Stierl. 53
negojensis Lona 61
nemoralis Hust. 285
nemorosus Hust. 386
nepenthicola Champ. 242
neovittatus Auriv. 285
nesophila Broun 527
nevadensis Casey (Thinoxenus) 289

nevadensis Escal. (Cathor.) 342
nevadensis Stierl. (Otiorrh.) 61
nevadicus Van Dyke 513
nevesinjensis Reitter 183
nicaeicivis Gozis 231
nicaeensis Stierl. 263
nicaraguaensis Bovie 521
niger Aur. (Myllocerus) 387
niger Broun (Platyomida) 447
niger (Chevr.) Auriv. (Systates) 280
niger F. (Otiorrh.) 62, 535
niger Hust. (Entypotrach.) 355
niger Mshl. (Otiorrh.) 34
niger Steph. (Otiorrh.) 159
nigerrimus A. e F. Sol. 86
nigra Horn 506
nigrans Fairm. 254
nigricans Steph. 330
nigriceps Stierl. 84
nigriclava Hust. 285
nigricornis Auriv. 364
nigrimaculatus Roel. 387
nigrinus Apfelb. (Phyllob.) 473
nigrinus Hust. (Systates) 285
nigripes Faust (Elytrocheilus) 301
nigripes Gerhardt (Phyllobius) 476
nigripes Ragusa (Otiorrh.) 76
nigripes Boh. (Otiorrh.) 84
nigripes Rey (Peritelus) 261
nigrita Rossi (Otiorrh.) 23
nigrita Ol. (Otiorrh.) 226
nigrita F. (Otiorrh.) 189
nigritus Chevr. (Synthoph.) 363
nigritus Sharp (Phyllobius) 500
nigrociliatus Reitter 12
nigrocristata Heller 305
nigrodorsum Hust. 373
nigrofemoralis Zumpt 46
nigrofemoratus Apfelb. (Phyll.) 491
nigrofemoratus Gabriel (Phyll.) 476
nigrogranatus Fairm. 285
nigroguttatus Champ. 530
nigrolineatus Wiedem. 370
nigropilosus Reitter 396
nigroplagiatus Faust 300
nigropunctatus Champ. 512
nigropustulatus Faust 369
nigrosparsus Chevr. 367
nigrosuturalis Mshl. 387
nigrovarius Lea 387
nilgirensis Mshl. 502
nilgirinus Heller 370
nitens Hust. (Seneciobius) 279
nitens Hust. (Systates) 285
nitens Mars. (Otiorrh.) 209
nitidicollis Dufour 59
nitidipennis Auriv. (Seneciobius) 279
nitidipennis Apfelb. (Otiorrh.) 132, 538
nitidiventris Fairm. 180
nitidula Faust 313
nitidulus Oliv. (Eustales) 515
nitidulus Vitale (Mylacus) 424
nitidus Boh. (Omias) 429
nitidus Gestro (Aphyonotus) 435
nitidus Perkins (Rhyncogon.) 311
nitidus Reiche (Otiorrh.) 209
nivalis Stierl. 106
niveovittatus Auriv. 285
niveus F. (Compsus) 512
niveus Lea (Myllocerus) 386
niveopictus Apfelb. 95
niveovittatus Auriv. 30
nobilis Faust (Episom.) 370
nobilis Germ. (Otiorrh.) 64
nociturus Kolbe 362
noctivagans Woll. 438
nocturnus Reitter 65
Nodieri Hustache 387
nodicollis Mshl. 387
nodipennis Chevr. (Trachyph.) 326
nodipennis Lea (Timareta) 346
nodipennis Mshl. (Parasyst.) 277
nodipennis Lacord. (Asceparnus) 274
nodipennis Sahlb. (Platyomus) 528
nodiscapus Escal. (Cathor.) 342
nodosus O. Müller 65, 536
nodulosa Blanch. 314
nodulosus Faust (Ptochus) 396
nodulosus Hust. (Dicasticus) 352
Noesskei Apfelb. (Otiorrh.) 67
Noesskei Apfelb. (Phyllobius) 495
Normandi Hust. 271
notabilis Hartm. 361
notaticollis Heller 314
notatipennis Pic (Cathorm.) 344
notatipennis Pic (Trachyph.) 325
notatus Steph. (Otiorrh.) 145
notatus Bonsd. (Otiorrh.) 144
notulatus Boh. 326
Noui Fairm. 67
Novaki J. Müller 129
Novellae Lona 130
novemdecimpunctatus F. 521
novemmaculatus Boh. 529
noxius Boh. (Peritelus) 258
noxius Faust (Ptochus) 397
noxius Hust. (Systates) 285
nubeculosus Boh. 369

nubilosus Faust 390
nubilus Boh. (Otiorrh.) 130
nubilus Rosensch. (Exophth.) 521
nudiamplus Reitter 484
nudiformis Reitter 209, 540
nudus MacLeay (Coptor.) 298
nudus Stierl. (Phyllobius) 472
nudus Stierl. (Otiorrh.) 215
nudus Westh. (Phyllobius) 475
nuncius Faust 180
nyamukubianus Hust. 285
nyctelius Reitter 194
nysalis Mshl. 285

obcoecatus Schönh. 180
obductus Petri 18
Oberti Faust 130
obesulus Desbr. (Laparocerus) 438
obesulus Faust (Episomus) 370
obesulus Mars. (Otiorr.) 130
obesus Stierl. (Otiorr.) 130
obesus Auriv. (Systates) 285
obesus Boh. (Embrithes) 355
obesus Faust (Opseotrophus) 359
obesus Hust. (Leptosphaerotus) 271
obesus Hust. (Platyomicus) 373
obesus Mshl. (Exorides) 525
obesus Mshl. (Sciobius) 245
obliquecostatus Perroud 512
obliquefasciatus Mshl. (Eustylus) 446
obliquefasciatus Lea (Myllocerus) 387
obliquesignatus Formán. (Myllocer.) 376
obliquesignatus Reitter (Ptochus) 397
obliquicollis Lea 387
obliquus Desbr. (Phyllobius) 484
obliquus Mshl. (Episomus) 370
oblitus Desbr. 407
oblongicollis Hust. 342
oblongus Blanch. (Psomeles) 309
oblongus Boh. (Omias) 427
oblongus Boh. (Oosomus) 358
oblongus Hust. (Peritmetus) 360
oblongus L. (Phyllobius) 461
oblongus Mshl. (Episomus) 370
oblongus Smrecz. (Otiorrh.) 536
obockianus Reitter 387
obovatus Gebler 497
obscurellus Mars. 438
obscuricolor Pic (Cyrtolepus) 407
obscuricolor Pic (Myllocerus) 388
obscuripes Apfelb. (Otiorr.) 6
obscuripes Motsch. (Ptochus) 397
obscuripes Schilsky (Phyllobius) 457
obscurus Auriv. (Entyptrach.) 355
obscurus Broun (Tigones) 399
obscurus Gyll. (Otiorr.) 181
obscurus Germ. (Catalalus) 350
obscurus Horn (Sciopithes) 247
obscurus Lea (Myllocerus) 387
obscurus Sharp (Protolobus) 529
obscurus Sol. (Pseudomeira) 264
obscurus Woll. (Laparocerus) 438
obsidianus Boh. 131, 538
obsimulatus Dufour 25
obsitus Gyll. (Otiorr.) 23
obsitus Woll. (Laparocerus) 438
obsoletus Stierl. (Otiorr.) 12
obsoletus Faust (Episomus) 366
obsoletus Hust. (Syntaphoc.) 363
obsoletus Oliv. (Exophthalmodes) 521
obsoletus Perkins (Rhyncogonus) 311
obstrusus Mshl. 370
obsulcatus Stierl. 131
obtectus Casey 278
obtriangularis Woll. 438
obtusatus Fairm. 303
obtusidens Apfelb. 107
obtusoides Stierl. 89
obtusus Boh. 131
obuncus Mshl. 370
occidentalis Hust. (Otiorr.) 73
occidentalis Woll. (Laparocerus) 438
ocellatus Chevr. 367
ocellifer Reitter 181
ochraceus Van Dyke 311
ochroleucus Er. 512
Ocskayi Stierl. 112
octodecimsignatus Champ. 513
octotuberculatus Fab. 508
ocularis Lea 298
oculatus Broun (Hygrochus) 240
oculatus Faust (Enaptomias) 304
Oertzeni Stierl. (Mylacus) 424
Oertzeni Stierl. (Otiorr.) 181
oleae Stierl. 56
oligolepis Apfelb. 132, 538
Olivieri Bedel (Trachyphloeus) 326
Olivieri Chevr. (Exophthalm.) 521
Olivieri Desbr. (Leptosphaer.) 271
olympicola Penecke 132
omioides Hochh. 500
omisiensis Heller 370
ontigolensis Escal. 327

Oneili Mshl. 245
oodemaformis Van Dyke 306
opacus Auriv. (Systates) 285
opacus Desbr. (Paracyclom.) 411
opacus Woll. (Laparocerus) 438
opalinus Boh. (Compsus) 512
opalinus Mshl. (Sciobius) 245
opertosus Reitter 124
ophthalmicus Chevr. (Eupiona) 356
ophthalmicus Daniel (Argoptochus) 402
ophthalmicus Stierl. (Phyl'obius) 451
opposita Faust 356
oppositus Van Dyke 311
opulentus Boh. (Coptorhyn.) 298
opulentus Boh. (Exophthalm.) 521
opulentus Germ. (Otiorr.) 132, 539
opulentus Heller (Polycatus) 309
opulentus Kirsch (Compsus) 512
oranensis Hust. 260
orbicularis Herbst (Otiorr.) 181
orbicularis Ol. (Otiorr.) 23
orbipennis Desbr. 327
orbitalis Seidl. 327
oregonus Van Dyke 278
oribates Peyerimh. (Cyclobarus) 405
orientalis Gyll. 222
Ormayi Stierl. 222
ornata Faust 306
ornatus Champ. (Exophth.) 521
ornatus Fåhrs. (Inc. s.) 272
ornatus Stierl. (Otiorr.) 110
ornatus Schultze (Coptorhyn.) 298
orni Apfelb. 14
orologus Heyden 115
Oschanini Faust 444
oscitans Broun 240
osculans Broun 400
osmanlis Stierl. 209
ostentatus Blanch. (Coptor.) 297
ostentatus Gyllh. (Coptor.) 298
ostentatus Gyllh. (Otiorr.) 223
ostentatus Pering. (Ellim.) 353
ostracion Pascoe 512
Othriades Reitter 209
otiorrhynchoides Desbr. (Eupl.) 409
otiorrhynchoides Emden (Eptocus) 409
otiorrhynchoides Fairm. (Elytrog.) 303
otiorrhynchoides Fairm. (Holcorh.) 410
otiorrhynchoides Hust. (Syst.) 285
Otsukai Kôno 387
ottomanus Stierl. 209
Ottonis Heller (Parasphenog.) 307
Ottonis Reitter (Homorhytm.) 252
ovalipennis Boh. 210
ovarius Boh. 246
ovatulus Boh. 181
ovatus L. (Otiorrhyn.) 210
ovatus Ol. (Mylacus) 425
ovatus Sharp (Omiotus) 234
Overlaeti Hust. 286
ovinus Penecke 182
ovipennis Formán. (Trachyph.) 327
ovipennis Hust. (Systates) 286
ovipennis Lea (Synomus) 398
ovoideus Reitter 10
ovulum Faust 397
oxyanus Reitter 184
oxygaster Montr. 301

pabulator Reitter 132
pabulinus Panz. 211
pachydermus Chevr. 169
pachyscelis Stierl. 194
pacificus Motsch. 500
padi Bonsd. 487
paetus Mshl. 387
Paganettii Flach (Solar.) 234
Paganettii Stierl. (Otiorr.) 194
Paganettii Schilsky (Phyllob.) 451
Paganettii A. F. Sol. (Pseudomeira) 264
paganus Gyllh. 294
paivanus Woll. 245
pajarensis Reitter 67
pallescens Broun (Nonnotus) 504
pallescens Perkins (Sphaer.) 313
palliatus Pascoe 363
pallidicolor Hust. 387
pallidipennis Hochh. 484
pallidipes Reitter 479
pallidus Broun (Aporolobus) 507
pallidus F. (Phyllobius) 480
pallidus Roel. (Anosimus) 374
pallidus Roel. (Anosimus) 374
pallipes Fåhrs. (Lalagetes) 357
pallipes Gyllh. (Phyllobius) 465
pallipes Roel. (Hyperstylus) 376
panayensis Schultze (Neopyrgops) 307

panayensis Schultze (Polycatus) 309
pantherinus Apfelb. 132
panzanus Mshl. 246
papillatus Faust 308
papuanus Heller (Elytrogonus) 303
papuanus Kirsch (Episomel.) 515
paradoxus Lea (Platypterocis) 529
paradoxus Stierl. (Otiorrh.) 165
paralleliceps Reitter 67
parallelus Escal. (Trachyphl.) 322
parallelus Seidl. (Trachyphl.) 327
parameiroides Reitter 51
Paravicinii Heller 314
parcestriatus Heyden 19
parentheticus Mshl. 522
Paringii Petri 121
parnassicola Formán. 273
parnassius Schilsky (Phyll.) 496
parnassius Apfelb. (Otiorr.) 132, 539
Parreyssi Stierl. 182
partalis Boh. 130
partitialis Boh. 130
parva Lea 506
parviceps Desbr. 484
parvicollis Gyllh. (Otiorr.) 67
parvicollis Seidl. (Cyrtolep.) 408
parvicollis Seidl. (Cyrtolep.) 407
parvulicollis Mars. 407
parvulus Boh. (Omias) 427
parvulus Desbr. (Pseudomeira) 264
parvulus Gyllh. (Phyllobius) 469
parvulus Oliv. (Phyllobius) 457
parvulus Seidl. (Pseudomeira) 264
parvulus Stierl. (Otiorr.) 205
parvulus Stierl. (Otiorr.) 208
parvulus Van Dyke (Cyrtolepidoptes) 513
parvus Stierl. 409
Pascoei Faust 363
pascuorum Peyerimh. 68
pastoralis Reitter 217
patruelis Stierl. 68
pauculus Voß 387
Paulinoi Stierl. 68
Paulinus Lona 132
pauper Boh. (Otiorr.) 66
pauper Boh. (Oosomus) 358
pauper Faust (Myllocer.) 387
pauperatus F. (Episom.) 370
pauperatus Gyllh. (Episomus) 366
pauperculus Stierl. 140
pauxillus Rosenh. 213
pectoralis Faust 298
pectorosus Faust 435
pedemontanus Stierl. 132, 539
pedestris Pascoe (Platyomic.) 373
pedestris Schilsky (Phyllob.) 461
pedinorrhynchus Petri 68, 536
pedunculatus Mshl. 525
Peirolerii Stierl. 85
pelionis Penecke 132, 539
pellax Faust 299
pelliceus Boh. 68
pellitus Boh. 485
pellucidus Fairm. (Syst.) 286
pellucidus J. Sahlb. (Otiorrh.) 540
pellucidus J. Sahlb. (Otiorrh.) 223
pelagosanus Müll. 539
Peneckei Reitter (Rhinomias) 432
Peneckei Sol. (Phyllobius) 485
Peneckei Voß (Myllocerus) 387
penicilligera Heller 314
pennata Faust 418
pennatus Formán. (Mylloc.) 376
pennatus Formán. (Mylloc.) 387
pentachordius Germ. 516
Pentheri Reitter 72
peraffinis Hust. 286
perarmatus Lea 387
perblandus Mshl. 286
percussus Faust 397
perdix Boh. (Ptochus) 397
perdix Ol. (Otiorr.) 68, 536
perdixoides Reitter 206
perdurus Reitter 151
peregrinus Stierl. (Otiorrh.) 132
peregrinus Mshl. (Otiorrh.) 540
pereques Reitter 168
Perezi Stierl. 159
perforatus Redtb. 131
Peringueyi Mshl. 246
periscelis Gyllh. 13
peristericus Apfelb. 69, 536
periteliformis Reitter 236
periteloides Desbr. (Atoporhyn.) 404
periteloides Fuß (Henschia) 403
periteloides Pascoe (Phlyda) 504
Perkinsi Van Dyke 311
perniciosa Broun 445
perlatus Richter 62
perlepidus Boh. 529
perlongus Sol. 12
perlucens Reitter 182
permundus Reitter 69
perniciosa Broun 448
perniger Penecke 128
pernornatus Heller 299
perplexa Faust 306
perplexus Gyll. (Otiorr.) 223

perplexus Hust. (Mylloc.) 380
persimilis Desbr. (Cyclobarus) 405
persimilis Hust. (Mylloc.) 387
persimilis Woll. (Lichenophagus) 441
persitus Mars. 138
personatus Mshl. 503
pertinax Faust 213
pertusicollis Faust 301
pertusus Stierl. 66
peryanus Mshl. 286
perversus Hust. 387
perviride Heller 305
Petersi Mallasz 75
petiginosus Stierl. 223
petrensis Boh. 182
Peyerimhoffi Form. (Trachyph.) 327
Peyerimhoffi Hust. (Caenopsis) 249
Peyerimhoffi Hust. (Otiorr.) 69
Peyerimhoffi Pic (Cyrtolepus) 407
Peyerimhoffi Pic (Leptosphaer.) 271
Peyrissaci Stierl. 56
Pfisteri Stierl. 267
phaeostictus Fairm. 533
phasma Rottenb. 233
phariseus Hust. 387
phreatus Reitter 213
phrygius Reitter 183
Philpotti Broun 400
piceus Boh. (Laparocerus) 438
piceus Allard (Cyrtolepus) 408
piceus Stierl. (Otiorr.) 223
Pici Desbr. (Cathorm.) 342
Pici Desbr. (Caenopsis) 249
Pici Desbr. (Peritelus) 259
Pici Formán. (Trachyphl.) 327
Pici A. & F. Sol. (Otiorr.) 183
picimanus Stierl. 183
picipes Motsch. (Phyllobius) 500
picipes F. (Otiorr.) 144
picipennis Stierl. 11
picitarsis Rosenh. 133
pictidorsis Fairm. 350
picturatus Desbr. (Cathor. 342
picturatus Fuente (Trach.) 321
pictus Guér. (Exophth.) 522
pictus Lea (Myllocerus) 387
pictus Petri (Dorym.) 121
pictus Schilsky (Phyllobius) 465
pictus Stev. (Phyllobius) 464
pierinus Reitter 127, 538
piger Mshl. 369
pignoris Reitter 133
pigra Heller 305
pigrans Stierl. 69
pilicornis Chevr. (Otiorr.) 159
pilicornis Desbr. (Phyllobius) 495
pilidorsum Desbr. 496
pilifer Boh. (Ellimenistes) 353
pilifer Stierl. (Otiorr.) 213
pilifer Faust (Myllocer.) 387
pilifer Gyllh. (Phyllobius) 477
pilifer Motsch. (Ptochus) 397
piliger Apfelb. 70
piliferus Motsch. 397
pilifrons Hust. 286
pilipennis Hust. 286
pilipes Desbr. (Phyllobius) 485
pilipes Leoni (Otiorr.) 95
pilipes Hust. (Isaniris) 242
pilipes Pascoe (Timareta) 346
piliporus Reitter 213
pilosellus Apfelb. 213, 540
pilosulus Chevr. (Holcorh.) 410
pilosulus Fairm. (Systates) 286
pilosulus Penecke (Otiorr.) 70, 536
pilosus Gyll. (Otiorr.) 223
pilosus Hust. (Mitoph.) 243
pilosus Lea (Timareta) 346
pilosus Roel. (Arrhaptogaster) 507
pimelioides Oliv. 533
pinastri Herbst 133, 539
pindicus Sol. 184
pineti Redtb. 470
pinetorum Schrank 13
pinguis Lea 346
pinicola Kiesenw. 499
pinivorus Apfelb. 95
Piochardi Stierl. 138
Pipitzi Stierl. 184
piri Gyllh. (Phyllobius) 493
piri Herbst (Phyllobius) 494
piri L. (Phyllobius) 485
piscatorius Germ. 529
pistor Faust 392
placida Broun 527
placidus Boh. (Compsus) 512
placidus Er. (Eustylus) 446
plagiator Apfelb. 184, 540
plagiatus Faust (Embrithes) 355
plagiatus Faust (Sphrigodes) 362
plagiatus Blanch. (Psomeles) 309
planatus Herbst (Otiorr.) 81
planatus Van Dyke (Rhyncog.) 311
planiceps Daniel 133
planicollis Reitter (Otiorr.) 83
planicollis Heller (Trigonops.) 314
planicollis Hust. (Platyomus) 529
planicollis Mshl. (Antispyris) 273
planicollis Mshl. (Peudeust.) 448

planidorsis Fairm. (Otiorr.) 55, 535
planidorsis Broun (Rhyncogon.) 311
planidorsis Reitter (Homorhyth.) 251
planidorsis Seidl. (Homorhyth.) 252
planidorsis Stierl. (Otiorr.) 129
planipennis Mshl. 246
planirostris Gyllh. (Phyllobius) 455
planirostris Heller (Exophth.) 517
planirostris Stierl. (Otiorrh.) 129
planithorax Boh. 184
planiusculus Hust. 286
planoculis Mshl. (Mylloc.) 387
planoculis Mshl. (Ptochus) 397
planophthalmus Heyden (Trog.) 233
planophthalmus Reitter (Trachy.) 328
planum Broun 400
plasensis Apfelb. 537
platessa Heller 314
platina Sparrm. 370
platysomus Seidl. 252
platypennis Montrouz. (Celeuthetes) 294
platypennis Montr. (Trigonops) 314
plebejus Hartm. (Myloc.) 387
plebejus Hartm. (Parapl.) 359
plebejus Mshl. (Hyperst.) 376
plebejus Stierl. (Otiorr.) 70
pleuroleucus Wiedem. 361
plicatus Champ. (Exoph.) 522
plicatus Gerst. (Pyctod.) 361
plicicollis Germ. (Embrith.) 354
plicicollis Boh. (Cycliscus) 351
plicicollis Reitter 152
plicirostris J. Müller 95, 537
plumbeus Formán. (Mylloc.) 376
plumbeus Van Dyke (Rhyncogonus) 311
plumipes Germ. 96
podgorensis Lona 194
poianae Penecke 70
politus Gyll. (Otiorr.) 70, 536
politus Pic (Aomus) 434
politus Stierl. (Otiorr.) 110
pollicatus Formán. 328
pollinosus Gerst. (Systates) 286
pollinosus Fåhrs. (Sciobius) 246
pollux Lea 387
polonicus Sol. 184
polycoccus Gyll. 134
polydrusoides Sharp 500
polylineatus Hust. 387
pomonae Oliv. 459
pondo Mshl. 246
ponticus Stierl. 70
popayanus Kirsch 512
Popovi Faust 184
populeti Boh. 134
porcatus Gyllh. (Sciobius) 246
porcatus Herbst (Otiorr.) 70
porcellus Boh. (Ptochus) 397
porcellus Daniel (Otiorr.) 213, 540
porculus Desbr. (Caenopsim.) 404
porculus Pascoe (Trachyphl.) 328
porculus Uhagon (Cathormioc.) 342
porculus Desbr. (Cathorm.) 344
poricollis Schönh. 184
porosa Mshl. 532
poster Mars. 231
postfasciatus Mshl. 387
Posthi Hust. 388
posthumus Boh. 375
posticalis Mshl. 503
posticus Faust 299
Potanini Reitter 398
pozuelensis Escal. 342
pracuae Faust 388
praecanus Faust 370
praecellens Stierl. 71
praelongus Fairm. 55, 535
praemorsus Gerst. 351
praeteritus Mshl. 525
prainae Faust 371
prasina Heller 307
prasinus Boh. (Platyomus) 529
prasinus Latr. (Phyllobius) 493
prasinus Mshl. (Sciobius) 246
prasinus Oliv. (Phyllobius) 493
prenjus Apfelb. 102
preslicensis Apfelb. 8
pretiosus Faust (Mylloc.) 388
pretiosus Stierl. (Otiorr.) 134
primigenius Apfelb. 107
priscus Reitter 92
prisrensis Apfelb. 135, 539
pristodon K. Daniel 216
procerus Faust (Myllocerus) 388
procerus Rottb. (Elytrodon) 420
procerus Stierl. (Otiorr.) 135
profanus Faust (Phyllobius) 497
profanus Faust (Episomus) 370
prokeliensis Apfelb. 72
proletarius Boh. (Otiorr.) 223
proletarius Vitale (Trachyph.) 325
prolixus Fairm. (Systates) 286
prolixus Faust (Nastus) 444
prolixus Faust (Peribrotus) 359
prolixus Rosenh. (Otiorr.) 214

prolixus Kiesenw. (Peritelus) 259
prolongatus Motsch. (Phyllob.) 497
prolongatus Stierl. (Otiorr.) 214
promissus Mars. 259
proreus Reitter 193
prosternalis Lea 388
prostratus Heyden 224
protensus Fairm. (Cnemido.) 294
protensus Stierl. (Otiorr.) 208
proteus Hust. 388
provincialis Stierl. 120
provocator Reitter 89
proximophthalmus Reitt. 185
proximus Faust (Elytrocheil.) 302
proximus Hust. (Syst.) 286
proximus Sol. (Trachyphloeus) 328
proximus Uhagon (Cathorm.) 342
proximus Stierl. (Otiorrh.) 72
pruinosa Desbr. 418
pruinosus Blanch. (Mylloc.) 388
pruinosus Gerst. (Mithophor.) 243
pruinosus Germ. (Otiorrh.) 11
pruni Scop. 463
psaliidiformis Reitt. 185
psegmaticus Boh. 121
pseudaffaber Reitt. 72
pseudandarensis Zumpt 51
pseudobosnarum J. Müller 72
pseudobrachialis Reitter 214
pseudochlorizans Reitter 461
pseudodensatus Reitter 476
pseudoetruscus Sol. 473
pseudogemellatus Reitter 170
pseudogoerzensis Reitter 30
pseudolinearis Reitter 135
pseudomecops Reitter 214
pseudomias Hochh. 214
pseudonothus Apfelb. (Phyllobius) 456
pseudonothus Apfelb. (Otiorr.) 79
pseudopauper Reitter 67
pseudopomonae Reitter 460
psittacinus Germ. (Phyllob.) 467
psittacinus Redtb. (Mylloc.) 376
pteroderes Lea (Mylloc.) 388
ptochoides Hust. (Syst.) 286
ptochoides Reitter (Otiorr.) 214
ptochoides Pic (Cycloptochus) 406
pubens Boh. 84
puber Oliv. 446
puberulus Stev. 425
pubescens Bohem. (Aomus) 434
pubescens Faust (Mylloc.) 388
pubescens Hust. (Syst.) 286
pubifer Boh. 162
pubipennis Apfelb. (Otiorr.) 94
pubipennis Apfelb. (Phyllob.) 494
pudibundus Faust 370
pudicus Faust (Episomus) 370
pudicus Pascoe (Mylloc.) 388
pugionatus Mshl. 512
pugnax Oliv. 522
pulchellus Stierl. (Otiorr.) 185
pulchellus Boh. (Exophthalm.) 522
pulchellus Formán. (Mylloc.) 388
pulcher Broun 522
pulcherrima Broun 447
pullus Gyll. (Otiorr.) 224
pullus Sparrm. (Sciobius) 246
pulverulentus Germ. (Otiorr.) 13
pulverulus Boh. 224
pulvinaticollis Boh. 353
pulvinatus Hochh. 214
pumilus Faust (Systates) 286
pumilus Mshl. (Myll.) 388
punctatissimus Gyll. 18
punctatus Allard (Cyrtolepus) 408
punctatus Broun (Phaeocharis) 243
puncticollis Casey (Nemocestes) 275
puncticollis Faust (Coptorhyn.) 299
puncticollis Hust. (Cyclobar.) 405
puncticollis Lea (Timareta) 346
puncticollis Mshl. (Sphaer.) 313
puncticollis Mars. (Otiorr.) 72
puncticollis Stierl. (Otiorr.) 71
puncticollis Tourn. (Stom.) 236
puncticollis Woll. (Laparoc.) 439
puncticornis Gyll. 72
punctifrons Stierl. 72
punctiger Faust 370
punctipennis Hust. (Oreor.) 277
punctipennis Thoms. (Platyom.) 373
punctirostris Stierl. (Otiorr.) 185
punctirostris Stierl. (Otiorr.) 224
punctiscapus Boh. 105
pupillatus Gyll. (Otiorr.) 135
pupillatus auct. (Otiorr.) 147
pupillatus Hust. (Syst.) 286
Purvesi Roel. 522
pusilla Blackb. (Timareta) 346
pusilla Lea (Timareta) 346
pusillus Hust. (Isaniris) 242
pusillus Pascoe (Syntaphoc.) 363
pusillus Stierl. (Otiorr.) 135
pusio Fåhrs. (Lalagetes) 357
pusio Gyllh. (Otiorr.) 185
pusio Mshl. (Ptochus) 398
pustulata Pascoe 346

pustulatus Faust (Systates) 286
pustulatus Seidl. (Trachyphloeus) 328
pustulatus Seidl. (Mylacus) 424
pustulatus Vitale (Otiorr.) 162
pustulifer Mars. 328
pustulosus Auriv. (Seneciobius) 279
pustulosus Faust (Simophorus) 505
pustulosus Gerst. (Peribrotus) 359
Putoni Stierl. 73
pygmaeolus Reitter 484
pygmaeus Stierl. (Otiorr.) 213
pygmaeus Seidl. (Cathorm.) 342
pygmaeus Seidl. (Paracyclom.) 411
pygmaeus Stierl. (Inc. s.) 272
pygmaeus Stierl. (Rhinomias) 432
pygmaeus Van Dyke (Rhyncogon.) 311
pyrenaeus Gyll. 73, 536
pyri F. (Phyllobius) 473
pyri Steph. (Phyllobius) 475
pyri Schönh. (Phyllobius) 493
pyriformis Auriv. (Syst.) 286
pyriformis Mshl. (Episomus) 370
pyriformis Mshl. (Exorides) 525
pyriformis Mshl. (Ptochus) 398
pyrorhinus Daniel 432
pyrus Sharp 526

quadraticollis Desbr. 253
quadratopunctatus Stierl. 73
quadricolor Lea 388
quadrigibbus Champ. 446
quadrilineatus Blanch. (Sphaeropt.) 313
quadrilineatus Kirsch (Compsus) 512
quadrimaculatus Mshl. (Epis.) 371
quadrimaculatus Faust (Syntaphoc.) 363
quadrinodosus Boh. 508
quadrinus Pascoe 353
quadrisignatus Bach (Argoptoch.) 402
quadrisignatus Boh. (Compsus) 512
quadripustulatus Faust 307
quadrispinosus Quedf. 286
quadritaenia Chevr. 522
quadrituberculatus Boh. (Brachyomus) 508
quadrituberculatus Faust (Platyomicus) 373
quadrivittatus Kirsch (Exorides) 525
quadrivittatus Oliv. (Exophthalm.) 522
quadruplex Heller 299
quattuordecimmaculatus Chevr. 299
quatuornotatus Desbr. 371
quercicola Apfelb. 489
querneus Geoffr. 463
querulus Boh. 410
quinarius Pascoe 299

rabdetanus Hust. 388
Raddei Stierl. 215
raddensis Pic 388
radiatiformis Heller 306
radiolata Heller 305
radschensis Stierl. 50
radusensis Apfelb. 96
Raffrayi Fairm. (inc. sedis) 533
Raffrayi Hust. (Peritmetus) 360
Raffrayi Pic (Meira) 268
Ragusae Stierl. (Phyllobius) 495
Ragusae Vitale (Cathorm.) 337
ragusensis Boh. 76
Rambouseki Apfelb. (Otiorrh.) 136, 539
Rambouseki Purkyne (Trachy.) 328
ramosus Mshl. 286
rasus Woll. 439
raucoides Reitter 92
raucus F. (Otiorrh.) 73
raucus Faust (Episomus) 371
raucus Herbst (Otiorrh.) 79
Ravasinii Lona (Otiorrh.) 89
Ravasinii Sol. (Argoptochus) 402
Raverae Sol. 489
Raymondi Gautier (Otiorr.) 129
Raymondi Gautier (Cathor.) 337
Raymondi Gautier (Omias) 424
Rebmanni Zumpt 186
Reclairei Zumpt 50
reclinatus Reitter 215
recognitus Hoffm. 328
recticollis Weise 165
rectirostris Broun 448
rectus C. G. Thoms 325
refrigeratus Stierl. 186
regalis F. 522
regliae Reitter 174, 536, 540
regularis Heller (Coptor.) 297
regularis Hust. (Amphit.) 348
regularis Hust. (Ceratocr.) 364
regularis Stierl. (Otiorrh.) 115
Reichei Desbr. (Phyllobius) 489
Reichei Seidl. (Trachyph.) 328
Reichei Tourn. (Caenopsis) 249
Reichei Stierl. (Otiorrh.) 136

Reicheianus Mars. (Trach.) 328
Reicheidius Desbr. (Phyllobius) 489
Reiseri Apfelb. 14
Reitteri Formán. (Henschia) 403
Reitteri Stierl. (Otiorrh.) 215
Reitteri Kirsch (Myllocerus) 388
Reitteri Stierl. (Mylacorhina) 376
Reitteri Stierl. (Desbrochersella) 418
Reitteri Stierl. (Mylacus) 424
Reitteri Stierl. (Phyllobius) 501
Reitteri Stierl. (Trachyphloeus) 328
Reitteri Vitale (Pseudomeira) 234
relictus Apfelb. 75, 536
religiosus Oliv. (Compsus) 512
religiosus Schrank (Otiorrh.) 119
remotegranulatus Stierl. 75
repandus Faust 371
repletus Boh. 75, 536
respersus Stierl. (Otiorrh.) 136
respersus Reitter (Otiorrh.) 125
reticollis Boh. 165
reticulalus Chevr. 523
retifer Apfelb. 136
Retowskii Reitter 136
retratiens Walker 388
retusus Rey 332
reynosae Ch. 59
rhacusensis Germ. 76
rhaeticus Stierl. 23
rhamni Apfelb. 136
rhamnivorus Apfelb. 110
rhilensis Stierl. 76
rhilicola Reitt. 182
rhincoloides Stierl. 198
rhinoceros Heller 302
rhinocerulus Penecke 136
rhinolophus Seidl. 417
rhinorhytus Auriv. 287
rhodesicus Faust 465
rhododendri Stierl. 147
rhodopensis Apfelb. (Otiorrh.) 6
rhodopensis Apfelb. (Phyllob.) 489
rhodopicola Apfel. (Otiorrh.) 180
rhodopus Krauß 116
rhysa Pascoe 307
Riessi Fuß 136
rigidus Rey 249
riguus Stierl. 54
Risbeci Mshl. 303
Ritchiei Mshl. 353
rivalis Faust 373
rivierae Stierl. 112
rivularis Lea 442
roboretanus Gredler 457
robusticeps Pic 382
robustus Sharp (Tigones) 400
robustus Stierl. (Otiorrh.) 134
Rodhaini Hust. 388
rodus Mars. 77
Roelofsi Sharp 334
romanus Boh. (Otiorrh.) 103
romanus Faust (Phyll.) 489
Ronchettii Reitter 131
Ronchettinus Reitter 77
roralis Boh. 523
Rosae Degeer 211
roscidus Gyll. (Otiorrh.) 160
roscidus Mshl. (Mylloc.) 388
roseipes Heller 299
Rosenhaueri Stierl. 20
roseomicans Pic 252
roseus Hust. (Myllocerus) 388
roseus Blanch. (inc. sedis) 533
Rossi Gahan 312
Rosti Reitter (Urometopus) 433
Rosti Stierl. (Dorym.) 136
rostralis Kôno 388
rostratus C. G. Thoms. 320
Rotroui Peyerimh. 405
Rothschildi Auriv. (Systates) 287
Rothschildi Faust (Enaptomias) 304
rotundatus F. (Mylacus) 424
rotundatus Gmel. (Otiorrh.) 159
rotundatus Sieb. (Otiorrh.) 215, 540
rotundicollis Friv. (Stom.) 236
rotundicollis Roel. (Phyllobius) 490
rotundicollis Stierl. (Otiorrh.) 77
rotundipennis Fairm. (Trigonops) 314
rotundipennis Escal. (Cathor.) 342
rotundus Mars. 215
Roubali Penecke 186
ruandanus Hust. 388
rubiginosus Hust. (Myllocer.) 388
rubiginosus Stierl. (Otiorrh.) 77
rubripes Desbr. (Leptosph.) 271
rubripes Hust. (Systates) 287
rubripes Mars. (Mylacus) 423
rubripes Sol. (Otiorrh.) 14
Rucconii Lona 540
rudicollis Desbr. 271
rudis Boh. (Param.) 238
rudis Boh. (Pseudomeira) 265
rudis Mshl. (Systates) 287
rudis Stierl. (Otiorrh.) 77
rufescens Boh. (Exophthalmodes) 523
rufescens Marsh. (Phyllobius) 463
rufescens Pic (Cathor.) 342

ruficollis Faust (Elytrocheilus) 302
ruficollis Reitter (Otiorrh.) 85
ruficolor Pic 271
ruficornis Ch. Bris. (Peritelus) 259
ruficornis Fairm. (Systates) 287
ruficornis Redtb. (Phyllobius) 480
rufidorsum Faust 315
rufimanus Hochh. 215
rufipennis Heller (Pyrgops) 310
rufipennis Kirsch (Phyllobius) 484
rufipes Auriv. (Systates) 287
rufipes Blanch. (Sphaeropt.) 313
rufipes Boh. (Aptolemus) 445
rufipes Boh. (Compsus) 512
rufipes Boh. (Omias) 430
rufipes Boh. (Otiorrh.) 25, 534
rufipes Bonsd. (Phyllobius) 487
rufipes Faust (Elytrocheilus) 302
rufipes Gebler (Ptochus) 397
rufipes Faust (Synthlib.) 531
rufipes Heller (Celeuthetes) 293
rufipes Hust. (Entypotrach.) 355
rufipes Lacord. (Synt.) 531
rufipes Schilsky (Phyllobius) 482
rufipes Scop. (Otiorrh.) 211
rufipes Sturm (Otiorrh.) 35
rufitarsis Pic (Phyllobius) 490
rufitarsis Reitter (Myllocerus) 389
rufitarsis Stierl. (Otiorrh.) 216
rufiventris Stierl. 533
rufofemoratus O. Schneider 19
rufolimbatus Pic 417
rufomarginatus Stierl. 137
rufomorio Zumpt 60
rufulipes Mars. 430
rufula Broun (Tigones) 400
rufulus Mshl. (Dysommat.) 514
rufulus Schilsky (Phyllobius) 453
rufus Hust. 271
rugaticollis Mars. 329
rugiceps Lea 517
rugicollis Boh. (Cycliscus) 351
rugicollis Boh. (Rhinomias) 431
rugicollis Germ. (Otiorrh.) 194
rugicollis Lea (Myllocerus) 389
rugicollis Seidl. (Trachyph.) 329
rugicollis Steph. (Otiorrh.) 138
rugifrons Gyll. (Otiorrh.) 137
rugifrons Hochh. (Urometopus) 433
rugipennis Boh. 63
rugirostris Stierl. 213
rugosa Guér. 314
rugosicephalus Kôno 313
rugosicollis Gestro (Mitoph.) 243
rugosicollis Hust. (Dinosius) 514
rugosifrons Mars. 434
rugosipennis Hust. 360
rugosissimus Villers 77
rugosogranulatus Stierl. 122
rugosostriatus Goeze 77, 536
rugosus Broun (Tigones) 400
rugosus Broun (Trachyph.) 329
rugosus Hummel (Otiorrh.) 139, 539
rugosus Hust. (Peritmetus) 360
rugosus Schrank (Otiorrh.) 176
rugosus Taschenb. (Exorides) 525
rugulipennis A. Costa (Otiorrh.) 157
rugulipennis Hust. (Parasystates) 277
rugulipennis Hust. (Systates) 287
rumelicus Apfelb. (Amicromias) 415
rumelicus Apfelb. (Phyllobius) 473
rumicis Apfelb. (Otiorrh.) 14, 534
ruminalis Faust 186
ruptus Champion 446
ruralis Faust 308
russicus Stierl. (Otiorrh.) 186
russicus Stierl. (Phyllobius) 458
rusticus Boh. (Ellimenistes) 354
rusticus Boh. (Peritelus) 259
rusticus Faust (Myllocerus) 389
rusticus Pascoe (Elytrogonus) 83
rutilipes Hochh. 166

sabinionis Auriv. 287
sabulosus Mshl. (Myllocerus) 389
sabulosus Redtb. (Trachyphl.) 324
sabulosus Gyll. (Otiorr.) 78
saccatus J. L. Lec. 425
Saeuberlichi Faust 287
saevus Boh. 224
sagax Faust (Episomus) 371
sagax Reitter (Otiorr.) 79
sagrensis Escal. 342
Sahlbergi Faust 453
saitus Faust 371
Sakaguchii Kôno 389
salebrosus Boh. 10
salicicola Heyden 79, 536
salicis Ström (Otiorr.) 139
salicis Stierl. (Otiorr.) 79
salinionis Auriv. 32
salinus Escal. 342
Sallei Faust 508
salomonis Heller 314
saltuarius Heyden 465
saltus Perkins 311

saluber Faust 334
samoensis Mshl. 303
sanctus Faust (Phyllobius) 497
sanctus Sol. (Otiorr.) 90
sandakanus Mshl. 504
Sandneri Reitter 425
sanguinipes Boh. 37
saraenus Hust. 389
Sarasini Faust 291
saravajensis Apfelb. 96
sardonius Reitter 252
sardous A. Costa (Pseudomeira) 265
sardous Sol. (Trogl.) 233
sareptanus Faust 444
sassariensis Desbr. 268
satellina Pascoe 346
Saturnini Suvorow 389
saturnus Reitter 216
saucius Boh. 512
sauri Sharp 412
Sayi Boh. 533
scaber Boh. (Trachyphloeus) 320
scaber L. (Otiorr.) 79
scaber Steph. (Otiorr.) 137
scaber Redtb. (Trach.) 317
scaberrimus Stierl. 81
scabratus F. 313
scabricollis Germ. 12
scabriculus Gyllh. (Trachyph.) 319
scabriculus Herbst (Trachyph.) 330
scabriculus L. (Trachyph.) 329
scabriculus Oliv. (Trachyph.) 332
scabridus Steph. 54
scabrior Reitter 12
scabripennis Gyll. (Otiorr.) 23
scabripennis Schönh. (Omias) 430
scabripes Stierl. 161
scabrosoides Stierl. 164
scabrosus Mshl. (Otiorr.) 78
scabrosus Fairm. (Barianus) 348
scalaris Boh. 523
scalptus Gyllh. (Otiorr.) 126
scalptus Champ. (Exophthal.) 523
scaposus Pascoe 312
scapha Faust 531
scapularis Boh. (Sciobius) 246
scapularis Mshl. (Eustylus) 446
scapularis Roel. (Mylloc.) 389
scapularis Woll. (Laparocerus) 439
schamylianus Reitter 216
Schatzmayri Lona (Otiorr.) 186
Schatzmayri Sol. (Argoptochus) 402
Schaubergeri Lona 81
Schaufussi L. Miller 237
Schaumi Stierl. (Otiorr.) 141, 539
Schaumi Woll. (Laparoc.) 436
Schelli Reitter 290
Schilskyi Faust (Phyllobius) 475
Schilskyi Kôno (Phyllobius) 457
Schilskyi Reitter (Periteloneus) 411
Schimperi Hust. 389
Schlaeflini Stierl. 141, 539
Schaumi Stierl. (Dorym.) 141
Schaumi Woll. (Lapar.) 439
Schmidti Stierl. 81
Schmonli Stierl. 186
Schneideri Stierl. (Otiorrh.) 224
Schneideri Schilsky (Phyllobius) 451
Schönherri Boh. (Homorhyt.) 253
Schönherri Faust (Episomus) 368
Schönherri Stierl. (Otiorr.) 31
Schönlandi Mshl. 246
Schoutedeni Mshl. 374
Schumacheri Stierl. 216
Schusteri Stierl. 216
Schwiegeri Reitter 61
Schwarzi Reitter 402
scintillans Hust. (Peritm.) 360
scintillans Rosensch. (Eustales) 516
scintillus Reitter 186
scitulus Lea 389
scitus Gyll. 141
scobinatus A. F. Sol. 186
Scopolii Poda 211
scopularis Hochh. 216
Scotti Hust. (Amphitmet.) 348
Scotti Hust. (Systates) 287
scrobiculatus Gyllh. 63
sculptipennis Broun (Heterex.) 240
sculptipennis Woll. (Lichenoph.) 441
sculptirostris Hochh. 141
sculpturatus Hust. 279
sculptus Brullé 439
scutellaris Broun (Hygrochus) 240
scutellaris Broun (Tigones) 400
scutellaris Kiesw. (Phyllobius) 467
scutellaris Redtb. (Phyllobius) 490
scutellatus Hust. 349
secretus Reitter 81
sectator Reitter 376
secundarius Reitter 216
Sedilloti Ch. Bris. 266
seductor Stierl. 224
sedulus Faust 216
segnis Gyll. (Otiorr.) 225

segnis Perkins (Rhyncogonus) 311
seguranus Escal. 342
Seidlitzi Ch. Bris. (Trachyphl.) 331
Seidlitzi Desbr. (Meira) 268
Seidlitzi Faust (Opseotrophus) 359
Seidlitzi Faust (Nastus) 444
Seidlitzi Kr. (Mylacus) 425
Seidlitzi Schilsky (Phyllobius) 480
Seidlitzi Tourn. (Cyrtolepus) 408
Seidlitzi Tourn. (Holcorhinus) 410
sejuncta Heller (Heteroglym.) 305
sejunctus Pascoe 512
sejugatus Schönh. 521
seladonius Brullé 490
Sellae Stierl. 85
sellatus Boh. (Paraptochus) 278
sellatus Heller (Syntaphoc.) 363
sellatus Mshl. (Pseudocyphus) 530
semiaeneus Gerst. 243
semidepressus Pic 342
semifasciatus Heller 299
semigranulatus Stierl. 186
semigranulosus Retowski 31
seminuda G. H. Horn 289
seminudus Gerst. 287
seminulum F. (Mylacus) 425
seminulum Fåhr. (Lalaget.) 357
semiopacus Reitter 216
semiotus Heller 527
semipolitus Faust 364
semitarius Reitter 81
semituberculatus Stierl. 187
semiviridus Chevr. 363
Semperi Faust 304
Sénaci Desbr. 425
senex Boh. (Peritelus) 259
senex Ol. (Otiorr.) 71
senex Stierl. (Otiorr.) 138
seniculus Woll. 439
Sennae Faust 371
sensitivus Scop. 81
separatus Desbr. 271
septemcostatus Mshl. 525
septemmaculatus Boh. 529
septempunctatus Boh. 529
septentrionis Herbst (Otiorr.) 80
septentrionis Stierl. (Otiorr.) 87
septentrionis C. G. Thoms (Trach.) 320
Sequensi Reitter 127
serbicus Apfelb. (Otiorr.) 216
serbicus Apfelb. (Henschia) 403
serbicus Apfelb. (Phyllobius) 494
serdicanus Apfelb. 216
serenus Reitter 142
seriatellus Desbr. 411
seriatogranosus Heller 307
seriatopunctata Heller 315
seriatosetosulus Hänel 82
sericeus Boh. (Omias) 427
sericeus Faust (Mylloc.) 389
sericeus Piller 469
seriegranatus Fairm. 313
seriehirtus Mars. 82
seriehispidus Stierl. (Otiorr.) 82
seriehispidus Boh. (Ellimen.) 354
seriehispidus Boh. (Holcorhin.) 410
seriehispidus Gyll. (Phyllob.) 455
seriehispidus Roel. (Myos.) 526
seriepunctatus Petri 104
serietuberculatus Hust. (Plat.) 373
serietuberculatus Voß (Compsus) 513
sesquidentatus Daniel 209
serrator Peyerimh. 342
serripes Desbr. 464
serrulatus C. O. Waterh. 303
servilis Pascoe 299
setabensis Hust. 260
setarius Gyllh. (Trachyphl.) 330
setarius Reitter (Myllocerops) 377
setermis Mars. 331
setestriata Lea 346
setidorsis Reitter 168
setifer Auriv. (Systates) 287
setifer Broun (Notiopatae) 345
setifer Boh. (Otiorr.) 76
setiferus Van Dyke (Paraptochus) 278
setiger Fåhrs. (Trachyphloeus) 331
setiger Faust (Chaunoderus) 365
setiger Faust (Choerorh.) 294
setiger Horn (Chaetechus) 345
setiger Pascoe (Celeuthetes) 294
setiger Seidl. (Trachyphl.) 331
setiger Stierl. (Otiorr.) 91
setiger Waltl (Otiorr.) 225
setigera Fairm. 315
setipennis Champ. (Eustylus) 446
setipennis Chevr. (Coptorh.) 299
setipennis Lea (Synomus) 398
setistriatus Lea 389
setiventris Mshl. 303
setosa Hust. (Neobry.) 358
setosa Mshl. (Heterogl.) 305
setosa Seidl. (Param.) 238
setosapex Heller 306
setosellus Zumpt 536
setosipennis Fairm. 287

setosofasciatus Fairm. 349
setosulus Hust. (Anaptopl.) 506
setosulus Stierl. (Otiorr.) 187
setosum Roel. (Trachyphloesoma) 334
setosum Woll. (Trachyphloeosoma) 334
setosus Blatch. Leng (Paragraphus) 243
setosus Boh. (Lalagetes) 357
setosus Boh. (Ptochus) 398
setosus Broun (Tigones) 400
setosus Casey (Panormus) 345
setosus Casey (Sciopithes) 247
setosus Formán. (Myllocer.) 377
setosus Kôno (Myllocerus) 389
setosus F. (Otiorr.) 80
setosus Lea (Hadrorhinus) 357
setosus Mshl. (Trachyph.) 318
setosus Roel. (Trachyphl.) 334
setosus Stierl. (Otiorr.) 54
setosus Van Dyke (Aragnomus) 273
setulifer Boh. (Cosmorh.) 351
setulifer Desbr. (Myllocerus) 389
setulifer Reitter (Homorhy.) 252
setuliferus Desbr. 272
setulosus Auriv. (Systates) 283, 287
setulosus Boh. (inc. sedis) 533
setulosus Desbr. (Leptosph.) 272
setulosus Fåhrs. (Ellim.) 354
setulosus Hust. (Ischnobrotus) 526
Severini Faust (Epilaris) 514
Severini Mshl. (Myllocer.) 389
sexcostatus Latr. 71
sexguttatus Champ. 446
sexmaculata Heller 315
sexspinosus Mshl. 287
sextuberculatus Hust. 373
Seydeli Hust. 242
shardaghensis Apfelb. 142, 539
Sharpi Perkins 311
shatorensis Apfelb. 82
siamensis Faust 371
sibiricus Gebler 501
siccensis Peyerimh. 187
siculus Baudi (Phyllobius) 458
siculus Desbr. (Meira) 267
siculus Ragusa (Choerocephalus) 417
siculus Seidl. (Holcorhinus) 410
siculus Seidl. (Peritelus) 257
siculus Stierl. (Otiorrh.) 76
Sidama Gestro 287
Sieversi Faust 216
sigillatus Pascoe 530
signatipennis Gyll. 142
signatus Faust (Isopterus) 526
signatus Hartm. (Lalagetes) 357
signatus Rosensch. (Platyomus) 529
significans Casey 247
Silbermanni Rosensch. 529
Silvestrii A. F. Sol. (Pseudomeira) 265
silvestris Chevr. 51
silvicola Perkins 311
similaris Pic 434
similipictus Desbr. 342
similis Drury (Exophthalm.) 523
similis Sol. (Otiorr.) 187
similis Schilsky (Phyllob.) 458
simo Oliv. 251
Simoni Bedel (Otiorr.) 82
Simoni Faust (Compsus) 513
Simoni Hust. (Leptosph.) 272
simplex Auriv. (Systates) 287
simplex Brullé (Laparocerus) 440
simplex Desbr. (Cathorm.) 342
simplex Faust (Myllocerus) 389
simplex Mshl. (Eustylus) 446
simplex Perkins (Rhyncogonus) 311
simplex Stierl. (Otiorr.) 187
simplicatus Stierl. 180
simplicipennis Lea 441
simplonicus Stierl. 113
Simpsoni Pascoe 304
simulans Heller (Pseudosphaer.) 309
simulans Stierl. (Otiorr.) 143
simulator Faust (Episomus) 371
simulator H. Horn (Thricolepis) 289
simulatrix Sharp 448
simulatus Mshl. 446
singularis Faust (Episomus) 371
singularis Reitter (Phyllobius) 454
singularis L. (Otiorr.) 143
sinjanus Penecke 6
sinuatiscapus Pic 342
sinuatus Chevr. (Peritelus) 260
sinuatus F. (Phyllobius) 452
sinuatus Faust (Isaniris) 242
sinuosiscapus Escal. 342
sirbenus Faust 375
siretensis d'Amore 111
Sjöstedti Auriv. (Peritmetus) 360
Sjöstedti Heller (Syntaphocer.) 363
Sjöstedti Lona (Adorhabdotus) 347
sitonoides Apfelb. 82
skopljensis Purkyne 331

smaragdifer Kiesenw. 481
smaragdina Motsch. 315
smaragdinus Mshl. 389
Smeei Mshl. 287
sobrinus Faust (Episomus) 371
sobrinus Lea (Neomerimnetes) 442
socius Boh. (Cathormiocerus) 343
socius Chevr. (Cathormiocerus) 336
socius Rye (Cathormiocerus) 341
socius Seidl. (Cathormiocerus) 342
socors Faust 368
sodalis Faust 435
Solarii Schilsky 464
Solariorum Formán. (Trachyphl.) 331
Solariorum Lona (Otiorrh.) 146
solifuga Fauvel 507
solitaria Heller 292
solitarius Apflb. (Otiorrh.) 146. 539
solitarius Sharp (Trachyphloemimus) 347
solitarius Sharp (Trachyphloeus) 331
Solskyi Faust 458
somilae Zumpt 50
soputana Heller 305
sorbivorus Reitter 146
sordidus Boh. (Compsus) 513
sordidus Faust (Trachyphloeoides) 334
sordidus Hust. (Leptosphaerotus) 272
sordidus Lea (Myllocerus) 389
sordidus Mshl. (Eustylus) 446
sordidus Perkins (Rhyncogonus) 311
sordidus Perkins (Sphaerorrhinus) 313
sordidus Stierl. (Otiorrh.) 82
sordidus Van Dyke (Nemocestes) 275
soricinus Mars. 424
soror Faust 356
Spaethi Reitter 26
spalatensis Ulanowski 343
spalatrensis Boh. 83
sparsiridis Reitt. 59
sparsutus Faust (Systates) 287
sparsutus Fairm. (Myllocerus) 389
spartanus Kirsch 127
spathulatus Boh. (Trachyphl.) 331
spatulatus Mshl. (Leiobius) 246
speciosa Heller 293
speciosus Blackb. 389
spectabilis Faust 513
spectator Mshl. 389
speculator Faust 444
Speiseri Apfelb. 14
sphacellatus Ol. 523
sphaericus Boh. (Mylacus) 423
sphaericus Faust (Systates) 287
sphaeroides Mäkl. (Peritelus) 272
sphaerosoma Apfelb. 83, 536
spinidens Apfelb. 146, 539
spinifer K. Dan. (Otiorrh.) 217
spinifer Seidl. (Nucteroceph.) 410
spinimanus Germ. (Trachyphl.) 331
spinimanus Gyllh. (Trachyphl.) 330
spinimanus Steph. (Trachyphl.) 317
spinimanus Thoms. (Trachyphl.) 325
spinipes Heller 292
spinithorax Hust. 242
spinosulus Gautier 325
spinosus Goeze 326
splendens Faust (Apotomorh.) 291
splendens Form. (Myllocerops.) 377
splendens Mars. (Phyllobius) 498
splendidus Reitt. 83
spoliatus Stierl. 33
spongicollis Fairm. 315
spumans Mars. 141
spurcatus Walker 390
spurius Faust 389
sputator Mshl. 166
spurcus Champ. 347
squalens Horn (Thinoxenus) 289
squalens Leconte (Trachyphl.) 322
squalida Mshl. 532
squalidus Boh. 332
squamans Desbr. (Nucteroceph.) 411
squamans Mars. (Meira) 268
squamatilis Mars. 140
squamatus Rainbow 303
squameus Boh. 140
squamicornis Lea 390
squamifer Boh. (Otiorr.) 83
squamifer Boh. (Ellim.) 354
squamifer Boh. (Trachyphl.) 331
squamifer F. (Otiorr.) 140
squamifer Stierl. (Otiorr.) 68
squamiger F. (Otiorr.) 140
squamiger Ol. (Otiorr.) 119
squamiger Mshl. (Otiorr.) 144
squamiger Casey (Orthoptochus) 278

squamiger Perkins (Rhyncog.) 311
squaminasus Champ. 530
squamipennis Gemm.-Har. 523
squamiperdix Reitter 84
squamipes Reitter 84
squamipunctatus Pierce 516
squamosus Boh. (Hadrorrhinus) 357
squamosus Brullé (Laparocerus) 439
squamosus Ch. Bris. (Phyllobius) 491
squamosus Gyllh. (Trachyphl.) 319
squamosus Hust. (Systat.) 287
squamosus Reitter (Ptochus) 398
squamosus Miller (Otiorr.) 140, 539
squamosus Schilsky (Phyllob.) 498
squamulatus Boh. (Lalagetes) 357
squamulatus Oliv. (Trachyphl.) 326
squamulatus Reiche (Meira) 268
squamulatus Stierl. (Otiorr.) 140
squamulifer Mars. 83
squamulipennis Reitter 172
squamulosa Auriv. 275
squarrosus Desbr. 491
stagnalis Hust. 272
Starcki Retowski 217
Staudingeri Schilsky 496
Steindachneri Auriv. 217, 540
stellaris Pascoe 520
stellata Heller 310
stellio Vollenh. 371
stenopterus Sol. 164
stenorostris Apfelb. 114
Stephani-magni Penecke 146
steppensis Faust 39
sternalis Broun (Notiop.) 345
sternalis Hartm. (Chaunod.) 365
sternalis Heller (Coptorhynch.) 299
Stevensi Mshl. 372
stichopterus Apfelb. 84
Stierlinensis Desbr. (Phyllobius) 481
Stierlini Desbr. (Cathormioc.) 343
Stierlini Desbr. (Phyllobius) 481
Stierlini Deville (Meira) 268
Stierlini Faust (Nastus) 444
Stierlini Gemm. (Otiorr.) 84
Stierlini Faust (Phyllobius) 473
Stierlini Guilleb. (Trachyphl.) 332
Stierlini Uyttenboogaart (Otiorr.) 38
Stierlinianus Uyttenboogaart 38
Stierlinianus Reitter 134
stipulatus Germ. 318
Stöckleini Zumpt 536
Stolzi Holdhaus 233
stomachosus Gyllh. 84
strabo Mshl. 398
Strebloffi Stierl. 187
striatosetosus Boh. (Otiorr.) 165
striatosetosus Stierl. (Otiorr.) 190
striatus Boh. (Eustylus) 446
striatus Hust. (Barianus) 348
stricticollis Fairm. 86
strictus Gmel. 149
strigifrons Gyllh. (Urometop.) 433
strigifrons Heller (Coptorh.) 299
strigifrons Reitt. (Urometopus) 433
striginurus Reitter 87
strigirostris Hochh. (Ptochus) 396
strigirostris Boh. (Otiorr.) 101
strigirostris Mars. (Ptochus) 396
striolaticeps Mshl. 225
striolatus Auriv. 288
strix Stierl. 225
Strobli Reitter 401
strongylus Retowski 218
strophosomoides Hust. 288
strumosus Heller 187
stupidus Gerst. 365
Sturanyi Apfelb. 87
Stussineri Stierl. 87
stygius Perkins 311
styriacus Stierl. 146
styphloides Stierl. 238
suavis Faust (Coptorh.) 299
suavis Faust (Episomus) 371
suavis Faust (Myllocerus) 390
subacutus Heller (Copter.) 299
subacutus Stierl. (Ptochus) 396
subaequivestis Sol. 188
subalatum Heller 294
subangulatus Fairm. 303
subannulatus Faust 304
subapterus Chmp. (Eustylus) 446
subapterus Lea (Myllocer.) 390
subargentatus Desbr. 260
subauriculus Reitter 28, 534
subaequivestis Sol. 188
subbidentatus Stierl. 217
subcoerulatus Heller 302
subconiceps Desbr. 272
subconicirostris Pic 406
subcontractus Sol. 188

subcontrictus Reitter 420
subconvexus Auriv. 277
subcoriaceus Reitter 146
subcostatus Kol. (Myllocerus) 390
subcostatus Hust. (Dicas.) 353
subcostatus Stierl. (Otiorr.) 87
subcretaceus Faust 398
subcruciatus Chevr. (Syntaph.) 363
subcruciatus Voß (Myllocer.) 390
subcylindricus Faust (Coptor.) 299
subcylindricus Hust. (Leptosph.) 272
subdentatus auct. (Otiorr.) 117
subdentatus Bach. (Otiorr.) 146
subdentatus Boh. (Phyllob.) 458
subdentatus Pic (Aomus) 434
subdenudatus Hust. (Sphrigodes) 362
subdepressus Muls. (Homor.) 253
subdepressus Muls. (Peritelus) 257
subdepressus Stierl. (Otiorr.) 225
subellipticus Apfelb. 217
subeques Reitter 188
subfasciata Blackb. (Telenica) 399
subfasciata Blackb. (Timareta) 346
subfasciata Boh. (Trigonops) 315
subfasciatus Boh. (Celeuthet.) 294
subfasciatus Boh. (Lalagetes) 357
subfasciatus Faust (Systates) 288
subfasciatus Guér. (Myllocerus) 390
subfasciatus Schilsky (Phyll.) 497
subfasciatus Voß (Eustylus) 446
subfilum Reitter 147
subfuscus Pic 406
subglaber Faust (Chaunod.) 365
subglaber Faust (Myllocerus) 390
subglaber Reitter (Otiorr.) 38
subglaucus Mshl. 390
subglobatus Desbr. 430
subglobosus Blanch. (inc. sedis) 533
subglobosus Hust. 514
subguttatus Mshl. 446
subimpressus Pic 252
sublaevigatus Reitter 60
subligatus Mshl. 299
sublimbata Pascoe 399
submarginatus Champ. 503
submaculatus Fairm. 350
submetallicus Van Dyke 311
subnebulosus Woll. 439
subnitens Mshl. 371
subnitidus Pic 407
subnodosus Woll. (Lichenophagus) 441
subnodosus Woll. (Sciobius) 246
subnuda Hust. 349
subnudus Kôno (Phyllobius) 501
subnudus Stierl. (Aramm.) 169
subopacus Woll. (Laparoc.) 439
subopacus Petri (Otiorr.) 188
subparallelus Stierl. 41
subpilosus Heller 432
subplanus Desbr. 270
subplumbeus Desbr. 426
subpubescens Stierl. 147
subpustulatus Reitter 168
subquadratus Rosenh. 147
subrostralis Lea 390
subrotundatus Stierl. (Otiorr.) 188
subrotundatus Apfelb. (Otiorr.) 164
subseriatus Sol. 188
subsetosus Rey 265
subsetulosus Stierl. (Otiorr.) 204
subsetulosus Escal. (Trach.) 332
subsigillatus Mars. 147
subsignatus Gyllh. (Otiorr.) 147
subsignatus Boh. (Argoptoch.) 403
subsignatus Stierl. (Otiorr.) 143
subspinosus Stierl. 87, 536
subsquamosus Schilsky 491
subsquamulatus Stierl. 217
substriatus Heller (Behren.) 292
substriatus Silberm. (Otiorr.) 36
subsulcatus Apfelb. 195, 540
subterranea Lea 346
subtessellatus Woll. 344
subtilis Faust 299
subtuberculata Heller 309
subtuberculatus Heller 371
subuniseriatus Reitter 206
subvestitus Reitter 57
subvirens Heller 292
subvittatus Mshl. (Eusty.) 446
subvittatus Pascoe (Elytrog.) 303
subvittatus Voß (Platyomus) 529
sudarae Heller 305
sudeticus Reitter 467
sufflata Pascoe 363
sufflatus Faust 359
suffusus Pascoe 509
sulcatellus Daniel 87
sulcatus Hust. (Systates) 288
sulcatus F. (Otiorr.) 147
sulcatus Bonsd. (Otiorr.) 190
sulcatulus Desbr. 266

sulcibasis Reitter 188
sulcicollis Broun (Platyomida) 448
sulcicollis Kirsch (Brachyomus) 508
sulcicollis Pascoe (Episomus) 371
sulcicollis Thoms. (Platyomicus) 373
sulcicornis Lea 390
sulcicrus Champ. 523
sulcifrons Gyllh. (Otiorr.) 225
sulcifrons Boh. (Hyph.) 241
sulcifrons Faust (Syst.) 288
sulcifrons Form. (Nastus) 444
sulcipennis Champ. (Exoph.) 523
sulcipennis Hust. (Amphit.) 348
sulcipennis Thoms. (Syntaphoc.) 363
sulcirostris Ballion (Inc. s.) 273
sulcirostris Boh. (Phyllobius) 455
sulcirostris Chevr. (Cathorm.) 339
sulcirostris Heller (Coptorh.) 299
sulcirostris Boh. (Otiorr.) 225
sulcirostris Stierl. (Otiorr.) 190
sulcirostris Woll. (Laparocerus) 439
sulciscapus Auriv. 243
sulcogemmatus Boh. 88
sulculus Rey 318
sulfurifer F. (Otiorr.) 88
sulphuratus Chevr. 524
sulphurifer Herbst (Otiorr.) 23
superelegans Hust. 390
supremus Reitter 188
suramensis Reitter 217
suratus Gyllh. 455
sus Faust (Acoptorhyn.) 290
sus Mars. (Ptochus) 397
sus Stierl. (Otiorr.) 43
Susanae Seidl. 262
susicus Escal. 408
suspiciens Mshl. 390
sutomorensis Apfelb. (Otiorrh.) 14
sutomorensis Weise (Phyllobius) 491
sutorinensis Apfelb. 491
suturalis Gyllh. (Piezonotus) 308
suturalis Har. (Embrithes) 355
suturalis Heller (Platyacus) 308
suturalis Hust. (Syst.) 288
suturalis Lea (Myllocerus) 390
suturalis Mshl. (Amphit.) 128
suturalis Mshl. (Apotmetus) 273
suturellus Fairm. 268
Suvorovi Smirnov (Phyllobius) 501
Suvorovi Suvorov (Ptochus) 398
swaneticus Reitt. (Urometop.) 434
swaneticus Reitt. (Otiorr.) 217
swanseaensis Lea 346
sylvaticus Hust. (Leptos.) 275
sylvaticus Hust. (Syst.) 288
sylvicola Hust. 348
syracusanus Fiori 167
syriaca Stierl. 344
syriacus Pic (Mylacus) 426
syriacus Seidl. (Trachyphl.) 332
syriacus Stierl. (Cyclomaurus) 406
syrus Mars. 333
szetschuanus Voß 390
szörenyensis Csiki 9

taeniatus Say 503
tagenoides Stierl. 88
Takahashii Kôno 371
t-album Hust. 365
talyschensis Reitter 433
tamaulipanus Champ. 445
tanycerus Apfelb. 151
tardipes Reitter 188
tarentinus Sol. 15
Tarnieri Stierl. 141
tarnovensis Apfelb. 96
tarphideroides Reitter 217
tarphiderus Reitter 217
tarsalis Broun 527
Tatarchani Reitter 151
Tatei Blackb. 390
tatricus Reitter 72
tauri Schilsky 412
tauricus Sol. (Otiorrh.) 188
tauricus Stev. (Otiorrh.) 104
tavetanus Hust. 390
taygetanus Reitter 498
Taylori Lea 391
tbatanicus Reitter 217
teberdensis Reitter 89
tebricus Broun 239
tectus Mars. 437
telueticus Escal. 188
tenebricosus Herbst (Otiorr.) 225
tenebricosus Gyll. (Otiorrh.) 34
tenebricosus Ol. (Otiorrh.) 34
tenellus Woll. 439
tener Stierl. 151
tenietensis Pic (Caenops.) 404
tenietensis Pic (Peritelus) 260
tenuiclavis Mshl. 391
tenuicornis Escal. (Cathorm.) 343
tenuicornis L. (Otiorrh.) 116
tenuicornis Mshl. (Sciobius) 246
tenuicornis Schauf. (Peritelus) 262
tenuicostis Hust. 89

tenuimanus Faust 188
tenuior Rey 469
tenuipes Formán. 333
tenuirostris Apfelb. 179
tenuis Germ. (Titinia) 506
tenuis Stierl. (Otiorrh.) 226
tenuis Stierl. (Otiorrh.) 115
tenuis Stierl. (Otiorrh.) 224
tenuiscapus Apfelb. (Otiorrh.) 179
tenuiscapus Fairm. (Cathor.) 343
tenuitarsis Desbr. 408
tephreus Schilsky 470
tereticollis Gyllh. 470
teretirostris Desbr. (Hyphant.) 241
teretirostris Stierl. (Otiorrh.) 151
ternatensis Guér. 299
terolensis Escal. 343
terrea Blackb. (Titinia) 506
terrea Pascoe (Idaspora) 504
terrenus Hust. (Syntaphocerus) 363
terrenus Mshl. (Coptorhynchus) 300
terrestris Mars. 165
terricola Broun (Notiopatae) 345
terricola Linder (Trogl.) 233
terrifer Stierl. 89
tersus Desbr. 458
tessellatus Auriv. (Myllocerus) 391
tessellatus Blanch. (Coptorhy.) 300
tessellatus Boh. (Neoptochus) 377
tessellatus Brullé (Laparocerus) 439
tessellatus Brullé (Omias) 430
tessellatus Champ. (Exoph.) 524
tessellatus Desbr. (Chaerocephalus) 417
tessellatus Heller (Isopterus) 526
tessellatus Hust. (Cyclomaurus) 406
tessellatus Mshl. (Trachyph.) 320
tessellatus Suvorov (Nastus) 444
tessellus Woll. (Laparocerus) 215
tesserula Faust (Myllocerus) 383
tesserula Woll. (Lichenophagus) 441
testaceicornis Pic 272
testatus Boh. 358
teter Gredler 89
Tetrarchus Reitter 217
tetricus Boh. 439
teucrius Reitter 217
thalassinus Apfelb. (Otiorrh.) 89
thalassinus Boh. (Eustales) 516
thalassinus Gebler (Phyllob.) 491
Thaliarchus Reitter (Otiorrh.) 218
Theodosianus Retowski 218
Theryi Pic 272
thessalicus Apfelb. (Otiorrh.) 152
thessalicus Penecke (Trachyph.) 333
Thomsoni Faust (Isaniris) 242
Thomsoni Waterh. (Apirocalus) 291
thoracicus Broun (Tigones) 400
thoracicus Stierl. (Otiorrh.) 152
thracicus Stierl. 90
Thumbergi Boh. (Eustales) 516
Thunbergi Dalman (Eustales) 516
tiaretanus Reitter 90
tibetanus Formán. 152
tibialis Broun (Platyomida) 448
tibialis Desbr. (Cyrtolepus) 408
tibialis Hust. (Isaniris) 242
tibialis Lea (Myllocerus) 391
tibialis Schilsky (Phyllobius) 477
tibialis Woll. (Laparocerus) 440
tibiellus Schilsky (Phyllobius) 482
ticinensis Stierl. 92
Tieffenbachi Schilsky 464
tiflensis Reitter 152
tigrellus Desbr. 409
tigrinus Faust (Nastus) 444
tigrinus Redtenb. (Ptochus) 398
timidus Faust 372
tingens Reitter 152
tirolensis Stierl. 109
Titan Apfelb. 188
Tizin'Testi Escal. 343
t-nigrum Faust 288
tolutarius Boh. 236
tomentifer Boh. 226
tomentosus Gyllh. 173
tomoricensis Lona 174, 540
tonnaiensis Kôno 501
torosus Reitt. 100
torridus Blackb. 391
Torrnezyi Peyerimh. 189
tosanus Kôno 391
tottus Sparrm. (Phlyctinus) 243
tottus Sparrm. (Sciobius) 246
Tournieri Smirnov (Phyll.) 491
Tournieri Stierl. (Otiorrh.) 67
tournieroides Apfelb. 90
transadriaticus Reitter 90
transmarinus Boh. (Myllocerus) 381
transmarinus Herbst (Mylloc.) 391
transmontanus Escal. 343
transpadanus Gortani 32

transparens Stierl. 189
transsylvanicus Stierl. (Tourn.) 218
transsylvanicus Stierl. (Phyllob.) 492
transversalis Faust (Polyrhabd.) 361
transversalis Faust (Chaun.) 365
transversesignatus Boh. 529
transversolineatus Hust. 363
transversus Kolbe 348
trapezicollis Ballion (Myllocerus) 391
trapezicollis Faust (Nastus) 444
trapezicollis Hust. (Neobryoch.) 358
trapezicollis Faust (Isaniris) 242
travnikanus Stierl. 73
tredecimmaculatus Guér. 524
trepidus Pascoe 391
triangulifer Champ. 524
triangulum Hust. 353
tricarinatus Chevr. 126
tricarinirostris Lea 391
trichographus Stierl. 226
tridentinus Daniel (Otiorrh.) 81
tridentinus Stierl. (Phyllobius) 501
trifasciatus Voß 391
trigonocephalus Hust. 363
triimpressus Hust. 348
trilineatus Lea 391
tripartita Faust 356
tripunctatus Kirsch 529
trisinuatus Lea 391
tristis F. (Otiorr.) 74
tristis Latr. (Otiorrh.) 74
tristis Lea (Mylloc.) 391
tristis Mshl. (Catamonus) 509
tristis Scop. (Otiorrh.) 189, 540
tristis Stierl. (Otiorrh.) 84
tristriatus Stierl. (Otiorrh.) 203
tritonis Reitter 190
trivialis Boh. (Inc. s.) 273
trivialis Boh. (Ellimenistes) 354
trivialis Boh. (Phyllobius) 471
trivitticollis Lea 391
trivittatus Lea 300
troglavensis Apfelb. 7
trojanus Stierl. 152
Trophonius Reitter 190
trossulus Woll. 344
Troyeri Stierl. 40
truchmenus Faust 290
truncatellus Graëlls 90
truncatirostris Fairm. 372
truncatus Stierl. 90
Truquii Seidl. 333
tsibindanus Hust. 288
tuberculata Faust 315
tuberculatum Hartm. 356
tuberculatus Boh. (Brachyomus) 508
tuberculatus Faust (Dicasticus) 353
tuberculatus Pascoe (Phraotes) 307
tuberculatus Stierl. (Otiorrh.) 45
tuberculatus Perkins (Rhyncogon.) 311
tuberculatus Van Dyke (Nemocestes) 275
tuberculifer Chevr. (Phyll.) 492
tuberculifer Hartm. (Syst.) 288
tuberculosus Hust. 364
tuberosus Quedf. 373
tumefactus Stierl. 25
tumens Mars. (Laparocerus) 437
tumens Pascoe (Ellimen.) 354
tumidiceps Pascoe 354
tumidicollis Stierl. 533
tumidipes Stierl. 195
tunisens Pic (Choerocephal.) 417
tunisens Pic (Otiorrh.) 191
tunisens Pic (Nucteroceph.) 411
turbator Sol. 191
turbatus Faust (Nastus) 444
turbatus Schönh. (Otiorrh.) 226
turbida Mshl. 280
turbidus Faust 300
turca Boh. 152
turcicus Seidl. (Mylacus) 426
turcicus Seidl. (Trachyph.) 333
turgidus Germ. (Otiorrh.) 15
turgidus Peyerimh. (Cyclobarus) 405
turkestanus Schilsky 426
turritus Chevr. (Episomus) 372
turritus Gyllh. (Episomus) 372
turritus Pascoe (Episomus) 372
tusicollis Mshl. 391
tutus Faust 375
typicus Hust. 526

Uhagoni Escal. 333
ulmi Becker 461
umbilicatoides Reitter 191
umbilicatus Stierl. 191
uncatus Faust 372
uncinatus Desbr. (Hyph.) 241
uncinatus Hust. (Systat.) 288
uncinatus Germ. (Otiorrh.) 91
unctuosus Germ. (Otiorrh.) 191
undatus Mshl. (Myllocerus) 391
undatus Schilsky (Phyllobius) 497
undatus Woll. (Laparocerus) 440
undecimpustulatus Faust 392

undulatus Boh. (Platyomus) 529
undulatus Champ. (Thamiras) 345
undulatus Woll. (Laparocerus) 440
undulatus Uhler (Hormorus) 526
unicolor G. H. Horn (Aphr.) 503
unicolor Herbst (Otiorrh.) 58
unicolor Hust. (Neosphrig.) 526
unicolor Penecke (Argoptoch.) 403
unifasciatus Faust 300
uniformis Boh. (Merimnetes) 441
uniformis Desbr. (Meira) 267
uniformis Fairm. (Barianus) 348
uniformis G. H. Horn (Aph.) 503
uniformis Mshl. (Myllocer.) 383
uniformis Mshl. (Phyllobius) 459
uniformis Pascoe (Episomus) 372
uniformis Pic (Peritelus) 257
uniformis Steph. (Phyllobius) 457
uniformis Van Dyke (Paraptochus) 278
uniformis Van Dyke (Rhyncogonus) 311
ursus Gebler 226
urticae Degeer 492
usitatus Lea 392
uviranus Hust. 288
Uyttenboogaarti Zumpt 535

vagans G. H. Horn 274
vagefasciatus Fairm. 506
vagepictus Desbr. 393
vagus Schilsky 480
valachiae Fuß 93
valarsae Reitter 45
V-album Champ. 530
valdemosae Schauf. 191
valens Heller 300
Valentinus Escal. 328
valgus Gyllh. 478
validicornis Daniel (Ot.) 48
validicornis Fald. (inc. sedis) 533
validicornis Märkel (Rhin.) 431
validiscapus Rouget (Cath.) 343
validiscapus Stierl. (Otiorrh.) 124
validus Heller (Elytroch.) 302
validus Stierl. (Otiorrh.) 46
vallis-clausae Abeille 269
valonensis Apfelb. (Otiorr.) 91, 536
valonensis Apfelb. (Phyllob.) 494
valtellinus Daniel 22
Valvasori Penecke 152
Vanderijsti Hust. 392
Vanduzeei Van Dyke 280
vanikorae Heller 304
variabilis Faust (Trigonops) 315
variabilis Hust. (Systates) 288
variabilis Roel. (Myllocer.) 392
varians Marseul 153
variatus Broun 400
varicolor Mshl. 372
variegatum Motsch. 502
variegatus Auriv. (Systates) 288
variegatus Boh. (Lalagetes) 358
variegatus Boh. (Myllocerus) 383
variegatus Boh. (Homorhyth.) 251
variegatus Broun (Tigones) 400
variegatus Casey (Peritelinus) 278
variegatus Desbr. (Trachyphloeus) 328
variegatus Fåhrs. (Periderces) 527
variegatus Hartm. (Sphrig.) 362
variegatus Hochh. (Piochus) 395
variegatus Kirsch (Compsus) 513
variegatus Küster (Trachyphl.) 344
variegatus Sol. (Meira) 269
variolosus Gerst. 359
varius Boh. (Oosomus) 358
varius Boh. (Otiorrh.) 153
varius Brullé (Phyllobius) 465
varius Lea (Myllocerus) 392
varius Mshl. (Nothognathus) 374
vastator Mshl. 145
vastus Apfelb. 96
Vaucheri Peyerimh. 191
vauclusianus Desbr. 269
Vaulogeri Pic (Otiorrh.) 191
Vaulogeri A. F. Sol. (Otiorrh.) 26
Vaulogeri Pic (Cathormiocer.) 344
Vaulogeri Desbr. (Caenopsimorph.) 404
Vaulogeri Desbr. (Omias) 430
Vaulogeri Pic (Desbrochers.) 418
vecors Boh. 354
vehemens Boh. 91
velatus Mars. 440
velebiticola Winkler 15
velebiticus Stierl. (Otiorrh.) 153
velebiticus Apfelb. (Otiorrh.) 15
velezianus Apfelb. 14
vellicatus Germ. 173
veluchianus Apfelb. 218, 540
velutinus Fairm. (Cyclomaur.) 406

velutinus Germ. (Otiorrh.) 191
venalis Faust 533
ventralis Mars. 408
ventricola Weise 23
ventricosus Chevr. (Aomus) 434
ventricosus Germ. (Trachyphloeus) 333
ventricosus Steph. (Caenopsis) 250
ventrosus Woll. 440
venustus Stierl. 49
veraepacis Champ. 446
verecundus Boh. (Phyllobius) 493
verecundus Chevr. (Exophthalm.) 524
vermiculatus Champ. 524
vernalis Stierl. 153
verruca Stev. 426
verrucicollis Stierl. 226
verrucifer Apfelb. (Otiorrh.) 154
verrucifer Boh. (Hyph.) 241
verrucipes Apfelb. 153
verrucosa Broun 448
verrucosus Broun 240
verruculatus Mshl. 353
versicolor Broun 448
versipellis Apfelb. (Otiorrh.) 12
versipellis Apfelb. (Phyllobius) 494
versutus Faust 372
vesiculatus Mshl. 361
vespertilio Faust 458
vespertinus F. (Phyllobius) 487
vespertinus Pascoe (Compsus) 513
vespertinus Woll. (Laparocerus) 440
vestalis Pascoe 513
vestita Broun 345
vestitus Boh. (Mylacus) 423
vestitus Broun (Catodryob.) 239
vestitus Sharp (Rhyncogonus) 311
vestitus Woll. (Laparocerus) 440
vestitus Gyllh. (Otiorrh.) 92
vestitus Küster (Otiorrh.) 87
vesulianus Reitter 86
veterator Hust. (Isaniris) 242
veterator Hust. (Myllocerus) 392
veterator Uyttenboogaart (Otiorr.) 154, 539
Vethi Hartm. 372
vetula Faust 356
vexator Reitt. 193
viator Chevr. 531
vicarius Sol. 193
vicinalis Faust 288
vicinus Apfelb. (Otiorrh.) 12
vicinus Hartm. (Sphrig.) 362
vicinus Hust. (Amphit.) 348
vicinus Hust. (Diatmetus) 351
viduus Mshl. 246
Viertli Weise 432
vilis Gemm. u. Harold 218
villosicollis Hust. 272
villosipennis Lea 392
villosopunctatus Gyll. 63
villosulus Guér. 313
villosus Desbr. (Cyrtolepus) 407
villosus Formán. (Omias) 430
villosus Hust. (Systates) 288
villosus Reitter (Mylacorhina) 376
villosus Stierl. (Otiorrh.) 193
vinculatus Faust 355
vindobonensis Formán. 403
virens Faust (Argoptochus) 403
virens Mshl. (Ellimenistes) 354
virescens Auriv. (Parasystates) 277
virescens Auriv. (Systates) 288
virescens Heller (Heteroglym.) 305
virescens Heller (Paratactus) 307
virgatus Motsch. (Epicalus) 504
virgatus Boh. (Eustales) 516
virginalis Apfelb. (Otiorrh.) 143
virginalis Faust (Compsus) 513
virginalis Oliv. (Eustales) 516
virgineus Pascoe 513
virgo Reitter 92
virgulatus Hust. 363
viridans Boh. (Eustales) 516
viridans Boh. (Phyllobius) 470
viridanus Faust (Ectemnom.) 301
viridanus Faust (Myllocerus) 382
viridanus F. (Myllocerus) 392
viridanus Fåhr. (Ellimen.) 354
virideaeris Laich. 458
viridiaureus Suvorov 392
viridicollis F. 453
viridicomus Stierl. 163
viridifasciatus Waterh. 503
viridilimbata Bovie (Xestog.) 532
viridilimbatus Apfelb. (Otior.) 91
viridilimbatus Apfelb. (Argopt.) 403
viridilineatus Champ. 524
viridimaculatus Boh. 513
viridimicans Lea (Myllocerus) 392
viridimicans J. Thoms. (Isaniris) 242
viridipictus Lea 505
viridis Auriv. (Myllocerus) 392
viridis Lea (Merimnetes) 441
viridis Mshl. (Sciobius) 246

viridis Pascoe (Syntaphocerus) 363
viridis Voß (Compsus) 513
viridis Voß (Pseudocyphus) 530
viridisetosus Stierl. 31
viridisquamosum Kolbe 356
viridisquamosus Boh. (Eustales) 516
viridivittatus Guér. 513
viridulus Fåhr. (Lalagetes) 358
viridulus Hust. (Systates) 288
viridulus Kolbe (Peritmetus) 360
viridulus Mshl. (Myllocerus) 386
viridulus Roel. (Myllocerus) 392
viriosus Faust 372
Vitalei Desbr. (Pseudomeira) 265
Vitalei Sol. (Solar.) 234
vitellus Gyllh. 92, 535, 537
vitis Gyllh. 218
Vitraci Fleutiaux & Sallé 524
vittata Auriv. 276
vittaticollis Faust (Mecostylus) 358
vittaticollis Heller (Coptor.) 300
vittatus Auriv. (Systates) 288
vittatus Gahan (Rhyncholobus) 312
vittatus Germ. (Otiorrh.) 19
vittatus L. (Exophthalm.) 524
vittatus Mshl. (Sciobius) 247
vittatus Pascoe (Mitoph.) 243
vittatus Perkins (Rhyncogonus) 311
vittatus Reitter (Ptochus) 398
vitticollis Champ. (Exoph.) 524
vitticollis Fairm. (Trigonops) 315
vitticollis Mshl. (Arrhines) 375
viverra Herbst 330
vlasuljensis Apfelb. 6
vochinensis Stierl. 28
vodonensis Formán. 92
vonguensis Hust. 392
vorticosus Gyllh. 211
Vossi Lona 392
vranensis Apfelb. 15
vranicensis Apfelb. 95
Vuillefroyi Ch. Bris. 340
vulgaris Har. (Systates) 289
vulgaris Mars. (Otiorrh.) 70
vulneratus Boh. 351
vulsus Olliff. 240
vulturensis Lona 193

Wagneri Har. 525
Wahlbergi Boh. 247
Wahlenbergii Boh. 529
Wakefieldi Sharp 239
Walkeri Escal. (Trachyph.) 317
Walkeri Perkins (Rhyncog.) 311
Walloni Smith 35
Weiratherianus Lona 537
Wernerianus Reitter 154
Waltoni Boh. (Coptor.) 300
Waltoni Boh. (Caenopsis) 249
Wankae Reitter (Phyllob.) 490
Wankae Reitter (Otiorrh.) 170
Watanabei Kôno 372
Waterhousei Broun (Agatholobus) 506
Waterhousei Woll. (Lapar.) 440
Weberi Merkl. 154
Websteri Faust 308
Weisei Hust. (Systates) 289
Weisei Reitter (Otiorrh.) 92, 537
Welchii Perkins 311
Wernerianus Reitter 154
Westermanni Boh. 513
Whymperi Olliff 525
Wiedemanni Faust 372
Wilsuri Stierl. 66
Winkleri Sol. 535, 537
Winneguthi Apfelb. 94
Winthemi Boh. 361
Wohlberedti Emden 409
Wollastoni Mars. 439

xanthocnemis Desbr. 467
xanthocnemus Kiesenw. 494
xanthorhoeae Lea 346
xanthotrichus Apfelb. 176

yeboensis Hust. 392
ypsilon Seidl. 333

zanguebaricum Chevr. 356
zanzibaricum Kolbe 356
zariedoides Reitter 218
Zebei Stierl. 193
zebra Champ. (Pseudocyphus) 530
zebra F. (Otiorrh.) 204
zebra Mshl. (Compsus) 513
Zernianus F. 120
zeylanicus Mshl. 393
zopherus Lea 393
zophosioides Faust 435
zukwalanus Hust. 289
Zumpti Lona 193
zygopsicus Heller 300