

# **Coleopterorum Catalogus**

**auspiciis et auxilio**

**W. Junk**

**editus a**

**S. Schenkling.**

---

Pars 113:

**K. W. von Dalla Torre (†) et A. Hustache**

**Curculionidae:  
Ceuthorrhynchinae.**



**W. Junk  
Berlin W. 15  
1930.**

## **Subfam. Ceuthorrhynchinae.**

Auct. K. W. von Dalla Torre (†) et A. Hustache.

- Circulionidae* s. fam. *Rhynchaenides* trib. *Ceuthorrhynchina* C. G. Thomson, Skand. Col. I, 1859, p. 138; VIII, 1865, p. 229; X, 1868, p. 164, 194  
*Ceuthorrhynchina* s. trib. *Ceuthorrhynchides* C. G. Thomson, Skand. Col. I, 1859, p. 139; VI, 1865, p. 244; X, 1868, p. 197.  
*Ceuthorrhynchidae* H. Brisout, Rev. et Mag. Zool. (2) XI, 1860, p. 537—539.  
*Ceuthorrhynchides* Lacordaire, Gen. Col. VII, 1866, p. 190.  
*Ceuthorrhynchidae* Ch. Brisout, Abeille V, 1868—69 (1869), p. 436—464.  
*Ceuthorrhynchini* Redtenbacher, Fn. Austr. ed. 3, I, 1874, p. CXXX, CXXXVII; II, 1874, p. 385.  
*Circulionidae* trib. *Ceuthorrhynchini* J. Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 123, 267 [The Rhynchophora of America North of Mexico by J. L. Leconte, assisted by G. G. Horn]; Smiths. Misc. Coll. XXVI, No. 507, 1888, p. 491—92.  
*Circulionidae* trib. *Ceuthorrhynchini* Bedel, Fn. Col. Bassin de la Seine VI, 1882—88 (1884), p. 69; (1885), p. 159; (1887), p. 321.  
*Circulionidae* trib. *Ceuthorrhynchina* Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 215.  
*Ceuthorrhynchini* Stierlin, Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1891), p. 208, 361.  
*Ceuthorrhynchini* Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 154; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 154, 166.  
*Ceuthorrhynchini* A. Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 205.  
*Ceuthorrhynchini* Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1896, p. 347—480.  
*Ceuthorrhynchines* Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 474, 538.  
*Circulioninae* trib. *Ceuthorrhynchini* Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 550, 556, 667.  
*Circulioninae* gr. *Ceuthorrhynchina* Champion, Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1907), p. 138; I. c. IV, 7, 1910, p. 198.  
*Ceuthorrhynchinae* trib. *Ceuthorrhynchini* Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 982.  
*Ceuthorrhynchini* subtrib. *Ceuthorrhynchina* Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) [Best.-Tab. 68], p. 64, 66; Fn. Germ. V, 1916, p. 140, 143.

*Ceuthorrhynchini* Wagner et Schaufuß in Calwer, Käferb. ed. 6, 1907—16 (1915), p. 1084, 1119; gr. *Ceuthorrhynchina* l. c. p. 1119.

*Ceuthorhynchini* Blatchley & Leng, Rhynchophora N. E. America 1916, p. 424—426.

*Ceuthorhynchini* Hustache, Rev. des Ceuthorhynchini Gallo-Rhénans, Miscellanea Ent. 1920—25.

## 1. Tribus Mononychini.

*Mononychi* J. L. Leconte, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, nr. 96, 1876, p. 267 [Rhynchoph. N. Amer. par J. Lec. et Horn]; Smiths Misc. Coll. XXVI, nr. 507, 1888, p. 491.

*Mononychidae* Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 205.

*Mononychina* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) [Best.-Tab. 68], p. 65, 71; Fn. Germ. V, 1916, p. 141, 181.

*Mononychi* Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 389. — Blatchl. et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 426.

*Mononychina* Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rhén. 1918, p. 9.

*Mononychini* Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 115.

### Mononychus Germ.

Germ. Ins. sp. nov. I, 1824, p. 241. — Schönh. Cure. Disp. Meth. 1826, p. 299. — Stephens, Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 43. — Gutf. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 584. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 388; ed. 2, 1858, p. 789; ed. 3, II, 1874, p. 335. — Bach, Käferf. II, 1854, p. 335. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68, p. 58, 93. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1866, p. 193. — Bedel, Fn. Bassin Seine VI, 1882—88 (1885), p. 160, 161. — Seidlitz, Fn. Balt. 1872, p. 443; ed. 2, 1891, p. 621; Fn. Transsylv. 1891, p. 692. — Stierl. Fn. Col. Helv. 1894, p. 363. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 205 (Catalogus). — Lameere, Man. Fn. Belge II, 1900, p. 541. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 667. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) [Best.-Tab. 68], p. 65, 71; Fn. Germ. V, 1916, p. 181. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 982. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rhén. 1918, p. 9. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 115.

*amurensis* Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, Amour p. 223; l. c. 1902, p. 205.

*angustus* Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, La Calle, p. 301; l. c. 1901, p. 62; l. c. 1902, p. 205. Maroc

*euphraticus* Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, Kurdistan p. 305; l. c. 1902, p. 205.

*ireos* Pallas, Itin. II, 1773, App. p. 463 (*Curculio*). — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 1790, p. 1771. — Bohem. in Schönh. Gen. Sp. Cure. IV, I, 1837, p. 308; VIII, 1, 1844, p. 401. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 61; l. c. 1902, p. 205.

Caucase,  
Sibérie,  
Arménie  
russe

*bubo* F. Spec. Ins. I, 1781, p. 165 (*Curculio*); Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 404; Syst. El. II, 1801, p. 444 (*Rhynchaenus*). — Herbst, Käfer VI, 1795, p. 194 (*Curculio*). — Villers, Ent. Linn. I, p. 186, IV, p. 267. — Ol. Encycl. Méth. V, 1790, p. 479 (*Curculio*); Ent. V, 1807, 88, p. 122, t. 10, f. 118 (*Rhynchaenus*).

- var. *Schönherrii* Kolen. Bull. Mosc. XXXII, 1859, III, p. 389. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 61; 1902, p. 205.
- var. *Kolenatii* Kolen. l. c. p. 386.
- var. *interruptus* Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 61; l. c. 1902, p. 205.
- Biologie:** Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1771.
- pallidicornis** Pic, Echange XXIV, 1900, p. 34.
- punctum-album** Herbst in Flüessl. Arch. 1784, p. 74, t. 24, f. 175 (*Curculio*); Käf. VI, 1795, p. 392, t. 91, f. 2. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1755 (*Curculio*). — Ol. Encycl. Méth. V, 1790, p. 498. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 160; (1887), p. 321. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1891, p. 621; Fn. Transsylv. 1891, p. 692. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 190; 1902, p. 205. — Lameere, Man. Fn. Belge II, 1900, p. 550. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 668. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 982. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 181. — Hust. Misc. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1918, p. 10, f. 8. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 116.
- pseudacori** F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 408 (*Curculio*); Syst. El. II, 1801, p. 450 (*Rhynchaenus*). — Herbst, Käfer VI, 1795, p. 448. — Panz. Fn. Germ. XVII, 1801, p. 5 (*Curculio*); Ent. Germ. p. 303. — Ol. Ent. V, 1807, 83, p. 130, t. 33, f. 496 (*Rhynchaenus*). — Rossi, Fn. Etr. I, 1795, p. 116. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 135. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 44. — Bohem. in Schönh. Gen. Sp. Cuc. IV, 1, 1837, p. 309; l. c. VIII, 1, 1844, p. 401. — Gutfl. u. Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 534. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 388; ed. 2, 1858, p. 789; ed. 3, II, 1874, p. 335. — Bach, Käferf. II, 1854, p. 335. — Seidl. Fn. Balt. 1872, p. 443. — Stierl. Fn. Col. Helv. 1894, p. 363.
- var. *salviae* Germ. Ins. Sp. nov. I, 1824, p. 241; Fn. Ins. Eur. VIII, 1824, nr. 11. — Boh. in Schönh. Gen. Sp. Cuc. IV, 1, 1837, p. 310; l. c. VIII, 1, 1844, p. 402. — Jacq. du Val, Gen. Col. IV, 1854—68, t. 25, f. 121. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 161; (1887), p. 321. — Du Buysson, Bull. Soc. Ent. Fr. 1891, p. CXIV. — Stierl. Fn. Col. Helv. 1894, p. 363. — Lameere, Man. Fn. Belge II, 1900, p. 550. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 982. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 181, t. 160, f. 16. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. p. 11. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 116.
- var. *syracus* Redtb. Russegg. Reise Col. Syr. 1843, p. 988.
- Caucase,  
Sibérie
- Perse  
Sibérie occ.
- Tanger  
Europe
- Syrie,  
Caucase

- caucasicus* Kolen. Bull. Moscou XXXII, 1859, II, p. 391. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 205.
- var. *sulcato carinatus* Schultze, l. c. 1901, p. 61; 1902, p. 205.
- var. *spermaticus* Beck. Bull. Moscou XXXV, 1862, IV, p. 349. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 62; l. c. 1902, p. 205.
- var. *interponens* Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 61; l. c. 1902, p. 205. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 187.
- var. *Rondoui* Vuillet, Feuille Jeun. Nat. XXXXI, 1911, p. 63; Insecta I, 1911, p. 10. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1918, p. 11.
- Biologie:** F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 408; Syst. El. II, 1801, p. 450. — Rossi, Faun. Etr. 1790, p. 116, 297. — Westw. Intr. Ent. 1839, p. 345, fig. 41. — Curtis, Brit. Ent. VII, 1823, p. 297. — Altum, Nat. und Off. VII, 1862, p. 98. — Kaltenb. Pflanzf. 1872, p. 715. — Perris, Larv. Col. 1876, p. 407. — Ruperstb. Biol. Käf. 1880, p. 213—214. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 311. — Bedel, l. c. p. 321; VI bis, 1924, p. 82. — J. Lichtenstein, Bull. Soc. Ent. Fr. 1918, p. 93. — Hust. l. c. p. 11. — Urban, Ent. Blätt. XXV, 1929, p. 24.
- superciliaris** Bohem. in Schönh. Gen. Sp. Cucr. VIII, 1, 1844, p. 401. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 62; 1902, p. 205.
- algerinus* (Lucas) Gandolphe, Abeille, Nouvelles et Faits (2) nr. 115, p. 74; Bull. Ac. Hippone XIII, p. 98. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 63; 1902, p. 205.
- var. *quadritossulatus* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1872, p. 412. — Schultze, l. c. 1901, p. 63; 1902, p. 205.
- Biologie:** Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXVIII, 1919, p. 239.
- tangerianus** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (5) II, 1872, p. 412. — Schultze, l. c. 1901, p. 63; 1902, p. 205.
- variegatus** Brullé in Webb et Berthel. Canar. Isl. 1838, p. 72, t. 1, f. 16. — Woll. Col. Atlant. 1865, p. 269. <sup>1835</sup>
- vittatus** Fald. Mém. Acad. Petr. II, 1808, p. 430; Coleopt. Illustr. 1835, p. 94. — Schönh. Gen. Sp. Cucr. IV, 1, 1837, p. 310; l. c. VIII, 1, 1844, p. 402.
- vulpeculus** F. Syst. El. II, 1801, p. 890 (*Rhynchaenus*). — Ol. Ent. V, 1807, 83, p. 129, t. 29, f. 437. — Say, Deser. Cucr. N. Amer. 1831, p. 20; ed. Lec. I, 1859, p. 286. — Bohem. in Schönh. Gen. Sp. Cucr. IV, 1, 1837, p. 309; VIII, 1, 1844, p. 401. — J. Leconte, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 268. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 390.
- Lenkoran
- Sarepta
- Europe mér.
- Pyrénées  
franc.
- Espagne mér.,  
Portugal,  
Maroc,  
Algérie
- Tanger
- I. Canaries
- Chine sept.
- Etats Unis,  
Canada

— Blatchl. & Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 426.  
*Biologie*: Hamilton, Ent. News V, 1894, p. 297. — Blatchl. & Leng, l. c. p. 426.  
 11

## 2. Tribus Scleropterini.

*Scleropteridæ* Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 209.

*Scleropterina* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) [Best.-Tab. 68], p. 64, 65; Fn. Germ. V, 1916, p. 140, 141.

*Scleroptini* Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 115.

### Scleropterus Schönh.

Schönh. Disp. Meth. Curae. 1826, p. 290; Gen. Sp. Curae. IV, 1, 1837, p. 358. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 386; ed. 2, 1858, p. 792; ed. 3, II, 1874, p. 338. — Bach, Käferf. II, 1854, p. 339. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1854, p. 536. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 196. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1891, p. 623; Fn. Transsylv. 1891, p. 694. — Stierl. Fn. Col. Helv. 1894, p. 366. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 209. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) [Best.-Tab. 68], p. 65; Fn. Germ. V, 1916, p. 141. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 985.

**offensus** Bohem. in Schönh. Gen. Sp. Curae. IV, 1, 1837, p. 359. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 339. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1891, p. 694. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 489. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 161.

**serratus** Germ. Ins. Sp. nov. I, 1824, p. 279 (*Geuthorhyachus*). — Bohem. in Schönh. Gen. Sp. Curae. IV, 1, 1837, p. 359. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 386; ed. 2, 1858, p. 792; ed. 3, 1874, p. 332. — Bach, Käferfn. III, 1854, p. 339. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. 1854 — 1868, t. 25, f. 120. — Gutfl. u. Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 536. — Seidlitz, Fn. Balt. 1822, p. 445; ed. 2, 1891, p. 623; Fn. Transsylv. 1891, p. 694. — Stierl. Fn. Col. Helv. 1894, p. 366. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 985. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 141, t. 161, f. 1.

*carpathicus* Brancs. in litt.

**vereundus** Faust, Öfv. Finska Vet. Soc. XXXII, 1890, p. 99.

3

Alpes de  
Transsyl-  
vanie

Allemagne,  
Silésie,  
Autriche,  
Carpathes

### Rhytidosomus Schönh.

Schönh. Gen. Sp. Curae. IV, 1, 1837, p. 594. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 377; ed. 2, 1858, p. 811; ed. 3, III, 1874, p. 351. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 374. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 550. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 200. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 176; (1887), p. 342. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1891, p. 623; Fn. Transsylv. 1891, p. 694. — Stierl. Fn. Col. Helvet. 1894, p. 366. — Lameere, Man. Fn. Belge II, 1900, p. 541. — Schultze, Deutsche Ent.

Zeitschr. 1902, p. 209. — Everts, Col. Néerl. II, 1903, 692. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) [Best.-Tab. 68], p. 65; Fn. Germ. V, 1916, p. 141. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV, 1916, p. 108, 109; Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1918, p. 12. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 147. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 119, 134. — Bokor, Folia Ent. Hung. I, 1926, p. 62—63 (Synopsis).

*Rutidosoma* Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 45.

*Scleropteridius* Otto, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLVII, 1897, p. 65.

**austriacus** Otto, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLVII, 1897, p. 68. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 210.

Alpes or.,  
Carpathes

**fallax** Otto, l. c. p. 65 (*Scleropteridius*). — Schultze, l. c. 1902, p. 210. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 162.

Alpes autr.

**globulus** Herbst, Käfer VI, 1795, p. 398, t. 91, f. 7 (*Curculio*). — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 235 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. Sp. Cure. IV, 1, 1837, p. 596 (*Rhytidosomus*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 45 (*Rutidosoma*). — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 377; ed. 2, 1858, p. 811; ed. 3, II, 1874, p. 351. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68, t. 24, f. 124. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 374. — Gutfl. u. Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 550. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 253; X, 1868, p. 144. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 176; (1887), p. 342. — Seidlitz, Fn. Balt. 1872, p. 445; ed. 2, 1891, p. 623; Fn. Transsylv. 1891, p. 694. — Stierl. Fn. Col. Helvet. 1894, p. 366. — Lameere, Man. Fn. Belge III, 1900, p. 548. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 209. — Everts, Col. Néerl. II, 1903, p. 692. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 985. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 142, t. 161, f. 2. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 147. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1923, p. 13, fig. 9. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 184.

Europe centr.

**denticipes** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1885, p. 998. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, p. 115. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 209. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 142.

**Biologie:** Gyllenh. l. c. p. 235. — Redt. l. c. ed. 3, 1874, p. 351. — Mathieu, Ann. Soc. Ent. Belg. III, 1858, p. 229. — Bargagli, Rincof. Eur. 1883—87, p. 269. — Hust. l. c. p. 14.

**monticola** Otto, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XLVII, 1897, p. 67. — Schultze, l. c. 1902, p. 210

Mt. Rodna:  
Alpes autr.

**Biologie:** Penecke, Wien. Ent. Zeit. XXXIX, 1922, p. 187.

**orobinus** Schiödte, Berl. Ent. Zeitschr. III, 1859, p. 141. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 210.

Kamtschatka,  
Grönlandia

**Pici** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 298; l. c. 1902, p. 210 [err. bibliogr.]. — Hust.

Alpes marit.

Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rhén. 1918, p. 14,  
fig. 10.

**Weisel** Faust, Öfv. Finsk. Vet. Soc. XXX, 1890, p. Sibérie,  
(37), 92. — Schultze, l. c. 1902, p. 209 [err. Japon  
syn.]. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV,  
1916, p. 109.

7

### Oreorhynchus Otto.

Otto, Wien. Ent. Zeit. XIII, 1894, p. 1. — Schultze, Deutsche Ent.  
Zeitschr. 1902, p. 210 [err. bibl.]. — Reitt. Verh. Nat. Brünn LI, 1912  
(1913) [Best.-Tab. 68], p. 65; Fn. Germ. V, 1916, p. 141.

**alpicola** Otto, l. c. 1894, p. 2. — Schultze, l. c. 1902, Schneeberg,  
p. 210 [err. bibl.]. Alpes autr.

~~focarilei~~ <sup>tot. 1959, Coll. Soc. Ent. A., N. 57</sup> ~~Nom.~~ <sup>per Dr. Dröste</sup>  
~~hispanicus Wgn.~~ <sup>Hispánia</sup>  
~~spectator Holzhaus, 1936, Rev. fig. Ent. p. 50~~ <sup>Venez. Alpes: Mts.</sup>  
~~J. Weyra~~ **Brachiodontus** Schultze.

Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 187; 1902, p. 210. — Ganglb.  
Verh. zool.-bot. Ges. Wien LII, 1902, p. 100 (Révision). — Reitt. Verh.  
Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) [Best.-Tab. 68], p. 65; Fn. Germ. V,  
1916, p. 141.

**alpinus** Hampe, Berl. Ent. Zeitschr. X, 1866, p. 375 Alpes autr.  
(*Amalus*). — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, III, 1874,  
p. 357 (*Amalus*). — Schultze, Deutsche Ent.  
Zeitschr. 1897, p. 187; 1902, p. 210.

*Ganglbaueri* Reitt. (nec Schultze) Wien. Ent. Zeit. X, 1891, p. 261. — Ganglb. l. c.  
— Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908,  
p. 287.

**Deubelli** Ganglb. l. c. p. 108.

Transsylvanie

**Kraussi** Ganglb. l. c. p. 107.

Carniole

**Reitteri** Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXII, 1878, p. 61 (*Rhytidosomus*). — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 187; 1902, p. 210. — Ganglb. l. c.

Hongrie,

Transsylvanie

**Schultzei** Ganglb. l. c. p. 107.

Alpes orient.

*Ganglbaueri* Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 188; l. c. 1902, p. 210.

5

### Homorosoma Friv.

Friv. Term. Füzet. XVI, 1893, p. 87. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn  
LI, 1912 (1913) [Best.-Tab. 68], p. 66; Fn. Germ. V, 1916, p. 143.

*Homeosoma* Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 210.

**validirostris** Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, Crimée  
1837, p. 565 (*Ceuthorhynchus*). — Schultze,  
Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 166; 1902,  
p. 210; l. c. 1908, p. 287; Term. Füzet. 1893,  
p. 87.

*Speiseri* Friv. l. c. p. 87.

Hongrie mér.

*Kaufmanni* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX,  
1901, p. 86 (*Cidnorhinus*). — Schultze, l. c.  
1902, p. 210; 1908, p. 287.

<sup>1</sup>  
*asper* Roel. Jap., Sib. or. (unter Cest., p. 42)

### 3. Tribus Hypurini.

*Hypuridae* Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 209.  
*Hypurina* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) [Best.-Tab. 68], p. 64, 66; Fn. Germ. V, 1916, p. 140, 142. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1918, p. 8, 15.

#### Hypurus Rey.

Rey, Rev. d'Ent. I, 1882, p. 189. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1891, p. 696. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 163. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 209. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) [Best.-Tab. 68], p. 66; Fn. Germ. V, 1916, p. 142. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1920, p. 15.

*basicornis* Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, Turkestan p. 232; l. c. 1902, p. 209.

*Bertrandi* Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon 1852, p. 183 (*Ceuthorhynchus*). — Rey, Rev. d'Ent. I. 1882, p. 189. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 209. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1920, p. 16, fig. 11.

*carnaeus* Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) IV, 1857, p. 146 (*Ceuthorhynchus*).

var. *nigritulus* Vitale, Riv. Ital. III, 1905, p. 207.

*biimpressus* Ch. Bris. Abeille V, 1869, p. 444 (*Ceuthorhynchus*). — Schultze, l. c. p. 209.

*biskrensis* Desbr. Frelon XVI, 1908, p. 64.

*flavicornis* Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXXVIII, 1894, p. 148. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 209.

*Fuentei* Desbr. Frelon XVI, 1908, p. 64.

*luctuosus* Desbr. Frelon V, 1895—96, p. 54. — Schultze, l. c. p. 209.

var. *tangerianus* Pic, Miscell. Ent. IV, 1896, p. 115.

*optimemaculatus* Pic, Echange XVI, 1909, p. 70.

*portulaceae* Hust. Bull. Soc. Ent. Egypte X, 1926, p. 262.

*transversus* Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 199; Horae Soc. Ent. Ross. XVIII, 1894, p. 148. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 209.

10

#### Pseudophytobius Desbr.

Desbr. Col. Nord Afr. Bull. Acad. Hippone 1884, sep. p. 96. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 209. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 142; Best.-Tab. p. 66. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1920, p. 15, 17.

*acalloides* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 639. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 209. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1920, p. 18.

*Biologie*: Hust. l. c. p. 19.

*Antoinei* Hust. Bull. Soc. Sc. Maroc III, 1923, p. 72.

*continuatus* Desbr. Frelon, V, 1895—96, p. 54. — Schultze, l. c. p. 209.

France mérid., Corse, Sardaigne, Espagne, Algérie  
Maroc  
Espagne mér., Algérie, France

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>glaucii</b> Chevr. Rev. Zool. 1859, p. 387. — Schultze, l. c. p. 209.  | Algérie                |
| <b>podagricus</b> Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 18; l. c. 1902, p. 209.  | "                      |
| <b>runicum</b> Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXVIII, 1919, p. 241.   | "                      |
| <b>salicorniae</b> Hust. Bull. Soc. Ent. Fr. 1930, p. 194.  | France mér.            |
| <b>saltator</b> Desbr. Bull. Ac. Hippone 1884, p. 97. — Schultze, l. c. p. 209.   | Algérie                |
| <b>sphaerion</b> Bohem. in Schönh. Gen. Sp. Curc. VIII, 2, 1845, p. 145 ( <i>Ceuthorhynchus</i> ). — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 357. — Gutfl. u. Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 543. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1891, p. 704. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 209. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 142. | Saxe, Autriche         |
| <b>sphaeroides</b> Pic, Miscell. Ent. IV, 1896, p. 5.   | Algérie                |
| <b>subglobosus</b> Ch. Bris. Abeille V, 1869, p. 442 ( <i>Ceuthorhynchus</i> ). — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 209. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1920, p. 19.   | Pyrénées, Alpes franç. |
| <b>veronicae</b> Frivaldszky, Term. Füz. VIII, 1884, p. 284. — Schultze, l. c. p. 209.  | Hongrie, Transylvanie  |

12

### Hypohypurus Hust.

|   |            |
|---|------------|
| Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXVIII, 1919 (1920), p. 334.       |            |
| <b>madagascariensis</b> Hust. l. c. p. 335.                   | Madagascar |
| <b>madecassus</b> Hust. l. c. p. 337.                         | "          |
| <b>Perrieri</b> Hust. l. c. p. 336.                           | "          |
| <b>testaceirostris</b> Hust. Bull. Soc. Ent. Fr. 1930, p. 82. | Caméroun   |

4

## 4. Tribus Coeliodini (pars).

### Coeliodes Schönh.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Schönh.</b> Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 282; VIII, 1, 1844, p. 392. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 388; ed. 2, 1858, p. 787; ed. 3, III, 1874, p. 335. — Bach, Käferfn. III, 1854, p. 331. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 532. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 246. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1866, p. 194. — Seidlitz, Fn. Balt. 1877, p. 443; ed. 2, 1891, p. 621; Fn. Transsylv. 1891, p. 692. — Stierl. Fn. Col. Helvet. 1894, p. 364. — Lameere, Man. Fn. Belge II, 1900, p. 541. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 206 (Catalogue). — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 668. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) [Best.-Tab. 68], p. 67; Fn. Germ. V, 1916, p. 145. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 147. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1920, p. 58. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 115. |             |
| <b>Megacetes</b> C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 139; l. c. VII, 1865, p. 249. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1866, p. 196.   |             |
| <b>aequabilis</b> Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 227; l. c. 1902, p. 206 [ <i>aequalibis</i> err.: l. c. 1903, p. 287 (corr.)].   | Rhodes.     |
| <b>albovarius</b> Bohem. Eugen. Resa 1859, p. 142.  | Brésil      |
| <b>bicoloratus</b> Desbr. Frelon V, 1895—96, p. 51. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 206.   | Alger       |
| <b>Bovlei</b> Hust. Bull. Soc. Ent. Fr. 1921, p. 116.   | Congo Belge |

|                         |   |             |
|-------------------------|---|-------------|
| <b>brevirostris</b>     | Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898,<br>p. 226; l. c. 1902, p. 206.  | Caucase     |
| <b>Bruchi</b>           | Hust. An. Mus. Nac. N. Hist. Buenos-Aires<br>XXXIV, 1926, p. 257, t. 4, f. 3.   | Argentine   |
| <b>brunneus</b>         | Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV, 1916,<br>p. 117.  | Japon       |
| <b>celastri</b>         | Rosensch. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1,<br>1837, p. 296.   | Caffrerie   |
| <b>cinctus</b>          | Geoffr. in Fourcr. Ent. Par. I, 1785, p. 124<br>( <i>Curculio</i> ). — Rossi, Fn. Etr. Mant. I, 1795,<br>p. 38 ( <i>Curculio</i> ). — Villers, Ent. Linn. I,<br>1789, p. 191; IV, 1789, p. 271. — Auriv.<br>Svensk Insekt. 9, 1924, p. 117, 118.  | Europe      |
| <i>erythroleucus</i>    | Gmel. in L. Syst. Nat. ed.<br>1750 13, I, 4, 1788, p. 1805. — Geoffroy, Hist. abr.<br>Ins. I, 1762, p. 283 (sans nom.). — Stierl.<br>Fn. Col. Helvet. III 1894, p. 365. — Schultze,<br>Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 206. —<br>Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913,<br>p. 983. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 145.<br>— Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 152.<br>— Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1922<br>— 1923, p. 60, 61.   |             |
| <i>subrufus</i>         | Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI,<br>1795, p. 418, t. 92, f. 14 ( <i>Curculio</i> ). — F. Syst.<br>El. II, 1801, p. 454 ( <i>Rhynchaenus</i> ). — Ol. Ent.<br>V, 1807, nr. 83, p. 137, t. 29, f. 443 ( <i>Rhyn-<br/>chaenus</i> ). — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 149;<br>in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 299;<br>VIII, 1, 1844, p. 397. — Redt. Fn. Austr. 1849,<br>p. 389; ed. 2, 1858, p. 788; ed. 3, 1874, p.<br>336. — Bach, Käferfn. 1854, p. 383. — Gutfl.<br>u. Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 532. — C. G.<br>Thoms. Skand. Col. VIII, 1865, p. 252; X, 1868,<br>p. 143. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—<br>1888 (1885), p. 163; (1887), p. 323. — Seidlitz,<br>Fn. Balt. 1872, p. 444; ed. 2, 1891, p. 622;<br>Fn. Transsylv. 1891, p. 693. — Lameere, Man.<br>Fn. Belge 1900, p. 550. — Everts, Col. Neerl.<br>II, 1903, p. 668. |             |
| <i>tricinctus</i>       | Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 497<br>( <i>Curculio</i> ). — Walcken. Fn. Par. I, 1802, p.<br>246 ( <i>Curculio</i> ).   |             |
| var. <i>andalusicus</i> | Schultze, Deutsche Ent.<br>Zeitschr. 1908, p. 292; l. c. p. 1902, p. 206.   | Andalousie  |
| <b>conformis</b>        | Grilat, Echange III, nr. 32, 1887, p. 1,<br>( <i>Ceuthorhynchus</i> ). — Schultze, Deutsche Ent.<br>Zeitschr. 1902, p. 206.   | Algérie     |
| <b>cristatus</b>        | Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837,<br>p. 294.   | Indes or.   |
| <b>Decorsei</b>         | Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXVIII, 1919,<br>p. 342.   | Madagascar  |
| <b>dentatus</b>         | Pic, Echange XXXIX, 1923, p. 13.  | Turkestan   |
| <b>dentimanus</b>       | Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 31.<br>— Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902,<br>p. 206.   | Afghanistan |
| <b>dentipes</b>         | Schultze, Abeille XXIX, 1894, p. 255;<br>Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 206.  | Tunis       |
| <b>Desbrochersi</b>     | Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898,<br>p. 230; l. c. 1902, p. 206.  | Algérie     |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| <b>echinatus</b> Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Cure. IV, 1, 1837,<br>p. 306.   | Cap                               |
| <b>edoughensis</b> Desbr. Frelon V, 1895—96, p. 51. —<br>Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 206.   | Algérie                           |
| <b>fimicornis</b> Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897,<br>p. 305; l. c. 1902, p. 206.   | Dalmatie                          |
| <b>flavicaudis</b> Bohem. in Schönh. Gen. Sp. Cure. VIII,<br>1, 1845, p. 397. — Blatchley et Leng, Rhyn-<br>choph. N. E. America 1916, p. 438.<br><i>a p i c a l i s</i> Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc.<br>XXIII, 1896, p. 417. — Blatchley & Leng,<br>l. c. p. 439.  | Amer. sept.                       |
| <b>Galloisi</b> Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV, 1916, p. 116.  | Japon                             |
| <b>ganglionus</b> Bohem. in Schönh. Gen. Sp. Cure. VIII,<br>1, 1845, p. 393.   | Buenos Aires                      |
| <b>glabrirostris</b> Fähr. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1871, p. 276.   | Caffrerie                         |
| <b>illicis</b> Bedel, Fn. Bassin Seine VI, 1882—88 (1885),<br>p. 164; (1887), p. 322. — Schultze, Deutsche<br>Ent. Zeitschr. 1902, p. 206. — Reitt. Fn.<br>Germ. V, 1916, p. 147. — Hust. Miscell.<br>Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1922—23, p. 60, 66.<br><b>B i b l o g i e :</b> Bedel, l. c. VI bis, 1924, p. 83.<br>— Hust. l. c. p. 66.  | Europe mér.,<br>Algérie,<br>Maroc |
| <b>imitator</b> H. Wagn. Col. Centralbl. III, 1928—29, p.<br>120, fig.   | Espagne                           |
| <b>Kolenatii</b> Kolen. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXII,<br>1859, II, p. 386.   | Caucase                           |
| <b>Mathieui</b> Hust. Bull. Soc. Ent. Fr. 1926, p. 156.  | Oran                              |
| <b>Maynei</b> Hust. Rev. Zool. Afr. XII, 1926, p. 380.<br>var. <i>aeneus</i> Hust. l. c. p. 381.<br>var. <i>concolor</i> Hust. l. c. p. 381.<br>var. <i>setulosus</i> Hust. l. c. p. 381.  | Congo Belge                       |
| <b>mysticus</b> Kolen. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXII, 1859,<br>II, p. 386. — Schultze, Deutsche Ent. Zeit-<br>schr. 1902, p. 207.   | Perse                             |
| <b>nakanoensis</b> Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV, 1916,<br>p. 114.  | Japon                             |
| <b>pallidulus</b> Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p.<br>261; l. c. 1902, p. 207.   | Autriche,<br>Turquie              |
| <b>parcesquamatus</b> Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV,<br>1916, p. 115.   | Japon                             |
| <b>pilosus</b> Matsu. Journ. Coll. Sapporo IV, 1911, p. 132.   | Sachalin                          |
| <b>plagiatus</b> Desbr. Frelon V, 1895—96, p. 50. — Tyl.<br>Ent. Blätt. X, 1914, p. 6.   | Asie mineure                      |
| <b>plurituberculatus</b> Hust. Ann. Soc. cient. Argent.<br>XCVIII, 1924, p. 91.  | Bolivie                           |
| <b>proximus</b> Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895,<br>p. 422; l. c. 1902, p. 206. — Reitt. Fn. Germ.<br>V, 1916, p. 146.  | Hongrie,<br>Turquie,<br>Allemagne |
| <b>quercus</b> F. Mant. Ins. I, 1787, p. 102 ( <i>Curculio</i> );<br>Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 412 ( <i>Curculio</i> ); Syst.<br>El. II, 1801, p. 455 ( <i>Rhynchaenus</i> ). — Vil-<br>lers, Ent. Linn. IV, 1789, p. 287 ( <i>Curculio</i> ).<br>— Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 486. —<br>Herbst, Natursyst. Käf. VI, 1795, p. 412, t.<br>92, f. 7. — Panz. Deutsche Ins.-Fn. 1795, p.<br>305. — Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 261;<br>Mon. Cure. p. 72. — Latr. Hist. Nat. Crust.<br>et Ins. XI, 1804, p. 137. — Gyll. Ins. Suec.<br>III, 1813, p. 138 ( <i>Rhynchaenus</i> ); in Schönh. | Europe                            |

Gen. Sp. Cure. IV, 1, 1837, p. 283 (*Coeliodes*); l. c. VIII, 1, 1844, p. 392. — Germ. Ins. Sp. nov. I, 1824, p. 221. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 21. — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1835, p. 56 (*Rhynchaenus*). — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 787; ed. 3, II, 1874, p. 336. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 332. — Gutfl. u. Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 532. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 250; X, 1868, p. 143. — Seidlitz, Fn. Balt. 1872, p. 444; ed. 2, 1891, p. 622; Fn. Transsylv. 1891, p. 692. — Stierl. Fn. Col. Helv. III, 1894, p. 365. — Lameere, Man. Fn. Belge 1900, p. 550. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 206. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 669. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 117, 118.

*dryados* Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1748. — Gyll. l. c. var. c. — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1835, p. 56, var. c. — Bedel, Fn. Bassin Seine VI, 1882—88 (1885), p. 164; (1887), p. 322. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 983. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 146, t. 160, f. 17. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 151, fig. 96. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1922—23, p. 60, 65.

*pallens* Marsh. Ent. Brit. I, 1804, p. 251.

*melanorhynchus* Marsh. l. c. p. 250. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 22 (*Ceuthorhynchus*).

**Biology:** Kaltenb. Pflanzenf. 1872, p. 647. — Bedel, l. c. p. 322, — Hust. l. c. p. 66.

**quinquetuberculatus** Rosensch. in Schönh. Gen. Sp. Cure. IV, 1, 1837, p. 297.

**riguus** Bohem. in Schönh. Gen. Sp. Cure. VIII, 1, 1845, p. 395.

**ruber** Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 251. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 22. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 332. — Gutfl. u. Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 533. — Redt. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 337. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 251; X, 1868, p. 143. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 163; (1887), p. 323. — Seidlitz, Fn. Balt. 1872, p. 444; Fn. Transsylv. 1891, p. 693. — Stierl. Fn. Col. Helv. 1894, p. 365. — Lameere, Man. Fn. Belge II, 1900, p. 550. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 206. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 669. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 983. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 146, t. 160, f. 18. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 152. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1922—23, p. 60, 63, fig. 17. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 117, 118.

**ranas** F. Mant. Ins. I, 1787, p. 101. — Bedel, l. c. p. 323.

**Mannerheimi** Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Cure. IV, 1, 1837, p. 298.

Caffrerie

Colombie

Europe,  
Caucase,  
Algérie

*rufirostris* Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 23.

Biologie: Silvestri, Boll. Zool. Portici XII, 1918, p. 155—174, fig. — Bedel, l. c. VI bis, 1924, p. 83. — Hust. l. c. p. 64.

**rubicundus** Herbst, Natursyst. Ins. Käfer VI, 1795, p. 267, t. 80, f. 6. — Payk. Fn. Suec. III, 800, p. 268 (*Curculio*). — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 136 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 286 (*Coeliodes*); l. c. VIII, 1, 1843, p. 392. — Germ. Ins. Sp. nov. I, 1824, p. 221 (*Ceuthorhynchus*). — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 481 (*Rhynchaenus*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 23. — Bach, Käferfn. 1854, p. 332. — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1885, p. 55 (*Rhynchaenus*). — Gutfl. u. Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 532. — Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 388; ed. 2, 1858, p. 787; ed. 3, 1874, p. 336. — Thoms. Skand. Col. VIII, 1865, p. 250; X, 1868, p. 143. — Bedel, Fn. Bass Seine VI, 1882—88 (1885), p. 163; (1887), p. 322. — Seidlitz, Fn. Balt. 1872, p. 444; ed. 2, 1891, p. 621; Fn. Transsylv. 1891, p. 692. — Stierl. Fn. Col. Helvet. 1894, p. 364. — Hartmann, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 315. — Lameere, Man. Fn. Belge II, 1900, p. 549. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 207. — Everts, Col. Neerl. III, 1903, p. 668. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 983. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 146, t. 160, f. 19. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 150. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1922—23, p. 60, 62. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 117, 118.

*quercus* var. β Payk. Mon. Curc. 1792, p. 73. — Gyll. l. c. var. b. — Zetterst. Fn. Lapp. I, 1828, p. 481, var. b. — Bedel, l. c. p. 322.

*mela nocephalus* Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 23. — Gyll. l. c. var. c. — Zett. l. c. var. b. — Sahlb. l. c. var. b. — Auriv. l. c. p. 117.

var. *r ubricollis* Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 93; l. c. 1902, p. 207.

var. *nigritarsis* Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 315. — Schultze, l. c. 1902, p. 207. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 146.

var. *sibiricus* Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 146.

var. *subrubicundus* Reitt. l. c. p. 146, nota.

Biologie: Bedel, l. c. p. 322. — Hust. l. c. p. 63.

**rubricus** Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 285; l. c. VIII, 1, 1844, p. 392. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 264; 1902, p. 206.

Europe

Caucase

Forêt Noire

Sibérie or.

Transbaikalie

Asie mineure

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <i>rubicundulus</i> Bohem. in Schönh. Gen. Sp. Curc. VIII, 2, 1845, p. 155. — Schultze, l. c. p. 206.  | Rhôdes                      |
| <i>Schuppeli</i> Bohem. l. c. VIII, 1, 1844, p. 396.   | Sicile, Caucase Sicile      |
| <i>puicus</i> Rottenb. Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 237. — Schultze, l. c. 1895, p. 430.  | Istrie, Croatie             |
| <i>Hoffmanni</i> Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1883, p. 219. — Schultze, l. c. 1895, p. 430; l. c. 1902, p. 206.  | Caucase                     |
| var. <i>murinus</i> Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 98; 1902, p. 206.   | Caffrerie                   |
| <i>serletuberculatus</i> Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 295.  | Japon                       |
| <i>setifer</i> Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 225; l. c. 1902, p. 207. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV, 1916, p. 114.   | Caffrerie                   |
| <i>setosus</i> Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1871, p. 274.  | Grèce, Caucase              |
| <i>simulans</i> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 90. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 64; l. c. 1902, p. 206.   | Croatie                     |
| <i>stigma</i> Fährs. Öfv. Vet. Ak. Förh. 1871, p. 275.   | Caucase                     |
| <i>Stilleri</i> Reitt. Col. Rundschan II, 1913, p. 174.  | Algérie: Batna              |
| <i>strigirostris</i> Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 97; l. c. 1902, p. 206.  | Europe centr. et mérid.     |
| <i>subfarinosus</i> (Desbr.) Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 228; l. c. 1902, p. 206.   |                             |
| <i>subplagiatus</i> Desbr. Frelon VII, 1899, p. 31. — Tyl, Ent. Blätt. X, 1914, p. 6.  |                             |
| <i>trifasciatus</i> Bach, Käferfn. 1854, p. 332. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 164; (1887), p. 322. — Gerhardt, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 400. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1891, p. 622; Fn. Transsylv. 1891, p. 693. — Stierl. Col. Helvet. 1894, p. 365. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 206. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 669. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 983. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 146. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 152. — Hust. Missell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1922—23, p. 60, 64. |                             |
| <i>suberufus</i> Seidl. (nec Herbst) Bed. l. c. p. 322.  | Sicile                      |
| var. <i>siculus</i> Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 98; l. c. 1902, p. 206.   | Etats Unis                  |
| Biologie: Bedel, l. c. Suppl. VI bis, 1924, p. 83.   | Amér. mér.                  |
| <i>umbraculatus</i> F. Syst. El. II, 1801, p. 453. — Gyll. in Schönh. Gen. sp. Curc. IV, 2, 1837, p. 286.  | Alpes, Europe mér., Balkans |
| <i>vittiosus</i> Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1895, p. 418. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 439.  | Italie                      |
| <i>zonatus</i> Germ. Fn. Ins. Eur. XXIV, 1845, nr. 9. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 206. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 145.  |                             |
| <i>mirabilis</i> Villa, Col. Eur. Suppl. 1835, p. 49.  |                             |

**Oxyonyx Faust.**

**Faust**, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 192. — **Reitt.** Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) [Best.-Tab. 68], p. 68. — **Hust.** Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1920, p. 98, 66. — **Peyerimhoff**, Ann. Soc. Ent. Fr. XCIV, 1925, p. 22 (Tableau des espèces algériennes).

**Biologie**: Peyerimhoff, l. c. p. 21.

|                     |  |                |
|---------------------|--|----------------|
| <b>acutangulus</b>  | Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 242.  | Sibérie        |
| <b>auritus</b>      | Kirsch, Verh. Nat. Ver. Brünn XVII, 1878 (1879), p. 45; in Schneider & Leder, Beitr. Kenntn. Kaukas. Käferfauna 1878, p. 301.  | Cauçase        |
| <b>beryticus</b>    | Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 289; l. c. 1902, p. 208.  | Beyrouth       |
| <b>Brisouti</b>     | Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 192. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 208.   | Turkestan      |
| <b>Burgeoni</b>     | Hust. Bull. Soc. Ent. Fr. 1930, p. 81.   | Congo Belge    |
| <b>Cailloli</b>     | Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXVIII, 1919, p. 240; l. c. 1919, p. 330; l. c. 1925, p. 22.  | Algérie,       |
| <b>cinctus</b>      | Chevr. Rev. Zool. 1861, p. 122 ( <i>Coeliodes</i> ). — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 206 ( <i>Coeliodes</i> ). — Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. 1911, p. 304; l. c. 1912, p. 304; l. c. 1919, p. 239; l. c. 1925, p. 22; l. c. 1926, p. 372 (Biologie). | Maroc          |
|                     | var. <i>albipilumis</i> Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. XCXV, 1926, p. 372.   | Maroc          |
| <i>japhoenensis</i> | Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 291; 1902, p. 208. — Peyerimhoff, Ann. Soc. Ent. Fr. 1919, p. 239.  |                |
|                     | var. <i>piceonotatus</i> Pic, Echange XXXIX, 1923, p. 14.  | Jaffa          |
| <b>conicollis</b>   | Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 231; l. c. 1902, p. 208. — Peyerimhoff, l. c. 1925, p. 21, fig. 6.  | Algérie, Maroc |
|                     | <b>Biologie</b> : Peyerimhoff, Ann. Soc. Ent. Fr. 1915, p. 54; 1926, p. 373.   |                |
| <b>crassipes</b>    | Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 290; l. c. 1902, p. 208 (Alger, erreur).  | Jaffa          |
| <b>fallaciosus</b>  | Desbr. Frelon V, 1895—96, p. 55 ( <i>Ceuthorhynchus</i> ). — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 208; 1903, p. 287.   | Maroc, Algérie |
| <b>Faustinus</b>    | Desbr. Frelon V, 1895—96, p. 53. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 208.   | Caucase        |
| <b>hispanicus</b>   | Hust. Bull. Soc. Ent. Fr. 1926, p. 155. — <b>Biologie</b> : H. Wagn. Col. Centralbl. V, I, 1926, p. 285.   | Espagne        |
| <b>inornatus</b>    | Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 241.  | Transcapienne  |
| <b>latipennis</b>   | Pic, Echange XXI, 1905, p. 130. — Peyerimhoff, l. c. 1925, p. 23.  | Algérie, Maroc |
|                     | <b>Biologie</b> : Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. 1926, p. 373.   |                |
| <b>lunatus</b>      | Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 162. — J. Faust, Stett. Ent. Zeit. LI, 1890, p. 115. — Schultze, l. c. 1902, p. 208.   | Arax           |

- maceratus** Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. XCV, 1926, p. 373.  
**Biologie:** Peyerimh. l. c. p. 373.
- massageta** Kirsch in Schneider & Leder, Verh. Nat. Ver. Brünn XVII, 1878 (1879), p. 43, t. 6, f. 51; Beitr. Kenntn. kaukas. Käferfn. 1878, p. 299. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 208; 1903, p. 287. — Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. 1919, p. 239; l. c. 1925, p. 22. — A. Hoffmann, Bull. Soc. Ent. Fr. 1930, p. 106.  
**Biologie:** Peyerimh. l. c. 1926, p. 372.
- multidentatus** Pic, Echange XXX, 1914, p. 17.
- octotuberculatus** Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXVIII, 1919, p. 339.
- Pici** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 17; l. c. 1902, p. 208.
- reectus** Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIV, 1925, p. 20, 23, fig. 6.
- Solskyi** Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 193. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 208.
- splendidus** Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) IX, 1889, Bull. p. CLVIII (*Coeliodes*). — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 208. — Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. 1925, p. 22.  
**Biologie:** Peyerimh. l. c. 1911, p. 304 (*superbus* lapsus); 1926, p. 372.
- strigatirostris** Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, I, p. 569 (*Coeliodes*). — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 57; l. c. 1902, p. 208.
- subtriangularis** Hust. Bull. Soc. Ent. Fr. 1923, p. 116.
- syriacus** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 292.
- Tournieri** Tourn. Entom. Genevois I, 1891, p. 192. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 208. — Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. 1925, p. 23.  
**Biologie:** Peyerimh. l. c. 1919, p. 239; 1926, p. 373.

27

### Neoxyonyx Hoffm.

A. Hoffmann, Bull. Soc. Ent. Fr. 1930, p. 107.

- monticola** Desbr. Frelon V, 1895—96, p. 52. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 208. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1920, p. 67. — A. Hoffmann, Bull. Soc. Ent. Fr. 1930, p. 106, 107.

1

### Platygasteronyx Reitt.

Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) [Best.-Tab. 68], p. 67.  
**spinitalus** Reitt. l. c. p. 67, nota.

Turkestan

28

### Platygaster Faust.

- Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 190.  
**venustus** Faust, l. c. p. 190. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 208.

1

Oran

Caucase,  
Maroc,  
Algérie.Turkestan  
MadagascarPalestine:  
Jaffa  
Algérie,  
Maroc  
CaucaseAlgérie,  
MarocArménie  
russeTonkin  
Syrie  
Algérie,  
Maroc

**Acalloides J. Lec.**

- J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 271 [Rhynch. N. Amer. by Leconte et Horn]. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 414. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 428, 437.  
*lysimachiae* Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, Massachusetts  
 1913, p. 64. — Blatchley & Leng, l. c. p. 438.  
*saltoides* Dietz, l. c. p. 416, t. 13, f. 20. — Blatchley & Leng, l. c. p. 438.  
*ventricosus* J. Lec. l. c. p. 272. — Dietz, l. c. p. 415, t. 13, f. 19, 19a. — Blatchley & Leng, l. c. p. 437, fig. 101 D.*

3

**Craponius J. Lec.**

- J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 268. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 390, 391. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 427, 428.  
*bigibbosus* Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV, 1916, Japon  
 p. 119.  
*inaequalis* Say, Descr. N. Amer. Cire. 1831, p. 20; Compl. Writ. Say, ed. Leconte I, 1859, p. 286 (*Ceuthorhynchus*). — Leconte, l. c. p. 268. — Dietz, l. c. p. 391, t. 12, f. 1. — Blatchley & Leng, l. c. p. 428, fig. 100a, b.  
 Biologie: Walsh, First Report Nox. Ins. III, 1868, p. 13, tab. f. 1, 1a—b. — Brooks, Buil. U. S. Dep. Agric. 730, 1918, p. 1—19. — Blatchley & Leng, l. c. p. 429, fig. 100c, d, e, f.*

2

**Cnemogonus J. Lec.**

- J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 269. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 392. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 427, 429.  
*carinirostris* Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XL, 1921, p. 130.  
*cristulatus* Hust. l. c. p. 129.  
*ferrugineus* Hust. l. c. p. 128.  
*Lecontei* Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 392, t. 12, f. 2. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 430, fig. 99a.*

4

**Acanthoscelidius nom. nov.**

*Acanthoscelis* Dietz (nec Dej. 1825), Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 393. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 427, 430.

- acephalus* Say, Journ. Phil. Acad. Nat. Sc. III, 1824, p. 309 (*Coeliodes*); Compl. Writ. Say, ed. Lec. I, 1859, p. 273. — Germ. in Schönh. Gen. Sp. Cire. IV, 1, 1837, p. 289. — Gyll. l. c. p. 288 (*Coeliodes*). — Dietz, l. c. p. 394, 397, t. 12, f. 9, 9a, 9b. — Blatchley & Leng, l. c. p. 431.  
*leprosus* Bohem. in Schönh. Gen. Sp. Cire. VIII, 1, 1845, p. 394 (*Coeliodes*).  
 var. *tenebrosus* Dietz, l. c. p. 398.  
*californicus* Dietz, l. c. p. 394, t. 12, f. 5, 5.a

"

|  |            |
|--|------------|
| <b>curtus</b> Say, Deser. N. Amer. Curc. 1831, p. 29; Compl. Writ. Say, ed. Leconte I, 1859, p. 298 ( <i>Ceuthorhynchus</i> ). — Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 287 ( <i>Coeliodes</i> ). — Dietz, l. c. p. 396, t. 12, f. 10 ( <i>curtus</i> Gyll.); l. c. p. 476 [corr.]. — Blatchley & Leng, l. c. p. 431, fig. 99b. | Etats-Unis |
| <b>frontalis</b> Dietz, l. c. p. 395, t. 12, f. 6, 6a.   | "          |
| <b>griseus</b> Dietz, l. c. p. 395, t. 12, f. 7.   | "          |
| <b>guttatus</b> Dietz, l. c. p. 399, t. 12, f. 13.   | "          |
| <b>ilex</b> Dietz, l. c. p. 396, t. 12, f. 8.  | "          |
| <b>mendicus</b> Dietz, l. c. p. 400. — Blatchley & Leng, l. c. p. 431.   | "          |
| <b>perplexus</b> Dietz, l. c. p. 400.  | "          |
| <b>pusillus</b> Dietz, l. c. p. 401, t. 12, f. 14.   | "          |
| <b>tarsalis</b> Dietz, l. c. p. 398, t. 12, f. 11.   | "          |

11

### Auleutes Dietz.

Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 402. — Champ. Biol. Centr.-Amer. IV, 5, 1907, p. 145. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 427, 432.

|   |  |
|---|--|
| <b>asper</b> J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876 [Rhynch. Am. N. of Mex.] p. 270 ( <i>Coeliodes</i> ). — Dietz, l. c. p. 404, t. 12, f. 15a. — Blatchley & Leng, l. c. p. 432.  | Etats-Unis   |
| <b>asperipennis</b> Champ. l. c. p. 147.  | Amér. centr.   |
| <b>ater</b> Dietz, l. c. p. 405. — Blatchley & Leng, l. c. p. 433.  | Etats-Unis   |
| <b>Biolleyi</b> Champ. l. c. p. 150, t. 9, f. 3.  | Amér. centr.   |
| <b>cavisternum</b> Champ. l. c. p. 148.   | Etats-Unis   |
| <b>cruralis</b> J. Lec. l. c. p. 270 ( <i>Coeliodes</i> ). — Blatchley & Leng, l. c. p. 435.  | Amér. centr.   |
| <b>curvipes</b> Dietz, l. c. p. 403, t. 12, f. 15.  | Etats-Unis   |
| <b>dispersus</b> Champ. l. c. p. 150.   | Amér. centr.   |
| <b>epilobii</b> Payk. Fn. Suec. III, 1806, p. 259 ( <i>Curculio</i> ); Ins. Suec. III, 1813, p. 151 ( <i>Rhynchaenus</i> ). — Sahlb. Ins. Fenn. III, 1835, p. 63 ( <i>Rhynchaenus</i> ). — Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 288 ( <i>Coeliodes</i> ). — Redtenb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 787; ed. 3, II, 1874, p. 336. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 334. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 532. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 247; X, 1868, p. 143. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 164; (1887), p. 342 ( <i>Cnemogonus</i> ). — Seidlitz, Fn. Balt. 1872, p. 444; ed. 2, 1891, p. 623; Fn. Transsylv. (1891), k. 694 ( <i>Craponius</i> ). — Stierl. Fn. Col. Helvet. 1894, p. 365. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 207 ( <i>Craponius</i> ). — Everts, Col. Neerl. III, 1903, p. 669 ( <i>Craponius</i> ). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 984. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) [Best.-Tab. 68], p. 69 ( <i>Craponius</i> ); Fn. Germ. V, 1916, p. 147, t. 160, f. 21. — Blatchley & Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 435 ( <i>Auleutes</i> ). — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1923, p. 71, fig. 19 ( <i>Auleutes</i> ). | Europe centr.<br>et sept.,<br>Sibérie,<br>Amérique septentr. |

*tes).* — Auriv. Svensk Insect. 9, 1924, p. 116, 117, fig. 32a.

**B i o l o g i e :** Mathieu, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 228. — Kaltenbach, Pflanzf. 1872, p. 246. — Bedel, l. c. p. 342; Suppl. VI bis, 1924, p. 84. — Szépligeti, Term. Füzet. XIII, 1890, p. 15. — Hust. l. c. p. 72.

**inermis** Champ. l. c. p. 150.

**inspersus** Champ. l. c. p. 148.

**instabilis** Champ. l. c. p. 148, t. 12, f. 2.

**longirostris** Dietz, l. c. p. 407, t. 12, f. 156.

**marionis** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIX, 1913, p. 68. — Blatchley & Leng, l. c. p. 434.

**megalops** Champ. l. c. p. 146.

**mexicanus** Champ. l. c. p. 149.

**nasalis** J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 271. — Dietz, l. c. p. 409.

**nebulosus** J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 271 (*Coeliodes*). — Dietz, l. c. p. 410, t. 12, f. 14a. — Blatchley & Leng, l. c. p. 435.

**similis** Champ. l. c. p. 149.

**subfasciatus** Dietz, l. c. p. 406, t. 12, f. 12. — Blatchley & Leng, l. c. p. 433, fig. 101, A.

**sulcifrons** Champ. l. c. p. 147.

**tachygonoides** Dietz, l. c. p. 407, t. 12, f. 13. — Blatchley & Leng, l. c. p. 434.

**tenuipes** J. Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 270. — Dietz, l. c. p. 404, t. 12, f. 14. — Blatchley & Leng, l. c. p. 433.

**tuberculatus** Dietz, l. c. p. 406.  
24

Amér. centr.

"

Etats-Unis

"

Amér. centr.

Etats-Unis

"

Amér. centr.

Etats-Unis

"

Amér. centr.

Etats-Unis

"

Amér. centr.

Etats-Unis

"

### Pelenosomus Dietz.

Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 411. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 427, 436.

**cristatus** Dietz, l. c. p. 411, t. 12, f. 16. — Blatchley & Leng, l. c. p. 436, fig. 101, B.

1

### Hypocoeliodes Faust.

J. Faust, Stett. Ent. Zeit. LVII, 1896, p. 100. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 427, 536.

**O r c h e s t o m e r u s** Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 412. — Champion, Biol. Centr.-Amer. IV, 5, 1907, p. 139.

**affinis** Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XC, 1921, p. 113, Brésil  
117.

**angulatus** Champ. l. c. p. 141, t. 8, f. 29. Amér. centr.

"

**chiriquensis** Champ. l. c. p. 144, t. 9, f. 1. Brésil

125.

**coronatus** Faust, l. c. p. 101. — Champ. l. c. p. 140, 143, t. 8, f. 32. Venezuela

**Dietzi** Champ. l. c. p. 143. Amér. centr.

**gibbicollis** Champ. l. c. p. 142, t. 8, f. 30. Brésil

**gibbosus** Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XC, 1926, p. 114, 119. Brésil

**granulatus** Champ. l. c. p. 140. Amér. centr.

|  |              |
|--|--------------|
| <i>griseus</i> Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XC, 1921, p. 114, 121.   | Brésil       |
| <i>guyanensis</i> Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XC, 1921, p. 114, 123.  | Guayane fr.  |
| <i>inaequalis</i> Champ. l. c. p. 140, t. 8, f. 28.  | Amér. centr. |
| <i>maculata</i> Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XC, 1921, p. 113, 116.  | Brésil       |
| <i>melanocephalus</i> Hust. l. c. p. 113, 118.   | Venezuela    |
| <i>monostigma</i> Hust. l. c. p. 113, 115.   | Brésil       |
| <i>muricatus</i> Hust. l. c. p. 114, 122.  | "            |
| <i>nebulosus</i> Hust. l. c. p. 114, 126.  | Amér. centr. |
| <i>obliquus</i> Champ. l. c. p. 143.   | "            |
| <i>phytobioides</i> Champ. l. c. p. 144, t. 8, f. 33.  | Venezuela    |
| <i>pleurostigma</i> Faust, l. c. p. 108.   | Amér. centr. |
| <i>pulvereus</i> Champ. l. c. p. 142, t. 8, f. 31.   | Costa Rica   |
| <i>sexnodosus</i> Champ. Ent. Monthly Mag. LVI, 1920, p. 220.  |              |
| <i>tessellatus</i> Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XC, 1921, p. 114, 120.   | Brésil       |
| <i>Ulkei</i> Dietz, l. c. p. 413, t. 12, f. 17, 17a ( <i>Orchestomerus</i> ). — Blatchley & Leng, l. c. p. 487, fig. 101, C. | Etats-Unis   |
| <i>unguiculatus</i> Champ. l. c. p. 141.   | Amér. centr. |
| <i>vicus</i> Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XC, 1921, p. 114, 122.   | Brésil       |
| <i>Wickhami</i> Dietz, l. c. p. 414, t. 13, f. 18, a, b, c. 27   | Etats-Unis   |

### Aegrius Pascoe.

|  |            |
|--|------------|
| Pascoe, Journ. of Ent. III, 1865, p. 428. — Champ. Biol. Centr.-Amer. IV, 5, 1907, p. 139, nota. |            |
| <i>camelus</i> Pascoe, l. c. p. 428, t. 17, f. 9. 1  | Port Natal |

## 5. Tribus Ceuthorrhynchini.

### Marmoropus Schönh.

Schönh. Gen. Spec. Cerc. IV, 1, 1837, p. 310; VIII, 2, 1845, p. 402. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. CXXIV et 789; ed. 3, I, 1874, p. CXXXVII; II, 1874, p. 352. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 203. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 166; Fn. Transsylv. 1888—1891 (1891), p. 166. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 212. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 918, 988. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) [Best.-Tab. 68], p. 71; Fn. Germ. V, 1916, p. 140, 175, 180.

**Besseri** Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Cerc. IV, 1, 1837, p. 312; l. c. VIII, 2, 1845, p. 402. — Redtb. Fn. Austr. 1858, p. 790; 1874, p. 358. — Guttfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 534. — Seidlitz, Fn. Balt. 1891, p. 623; Fn. Transsylv. 1891, p. 694. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 212.

Biologie: Pfeil, Stett. Ent. Zeit. XVI, 1885, p. 305. — Dohrn, Stett. Ent. Zeit. XVII, 1856, p. 190. — Letzner, Jahrb. Schles. Ges. vaterl. Kultur 1866 (1867), p. 170. — Rupertsberger, Biol. Käf. Eur. 1880, p. 216; 1891, p. 214. —

Allemagne:  
Mark,  
Poméranie,  
Silésie;  
Bohême,  
Russie

Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 328; XIX, 1887, p. 22. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 248. — Wagner in Calwer-Schau-fuß, Käferb. ed. 6, 1916, p. 1128.  
**testaceitarsis** Pic, Echange XXIV, 1908, p. 34.

2

Syrie

### Stenocarus C. G. Thoms.

C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1865, p. 292. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1891, p. 621; Fn. Transsylv. 1891, p. 693. — Stierl. Fn. Col. Helvet. 1894, p. 364. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 207 (Catalogue). — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 670. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) [Best.-Tab. 68], p. 68; Fn. Germ. V, 1916, p. 143. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1923, p. 68.

**cardui** Herbst in Füssly, Arch. V, 1784, p. 79, t. 24, f. 22. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—1888 (1885), p. 165; (1887), p. 323. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 207. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 670. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 147, t. 160, f. 20. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 150. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1923, p. 68, fig. 18. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 116, 117.

**guttula** F. Mant. Ins. I, 1787, p. 107 (*Curculio*); Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 436; Syst. El. II, 1801, p. 482 (*Rhynchaenus*). — Vill. Ent. Linn. IV, 1789, p. 289 (*Curculio*). — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1768. — Ol. Encycl. Méth. V, 1790, p. 513; Ent. V, 1807, 88, p. 213, t. 23, f. 325 (*Rhynchaenus*). — Rossi, Fn. Etr. Mant. II, App. p. 99 (*Curculio*). — Panz. Deutschl. Ins.-Fn. 1795, p. 314 (*Curculio*). — Herbst, Käf. VI, 1795, p. 393, t. 91, f. 3 (*Curculio*). — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 143. — Gyll. Fn. Suec. IV, 1, 1827, p. 592 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 290 (*Coeliodes*). — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1831, p. 25 (*Ceuthorhynchus*). — Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 389; ed. 2, 1858, p. 788; ed. 3, II, 1874, p. 337. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 334. — Gutfleisch & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 533. — Seidlitz, Fn. Balt. 1872, p. 444; ed. 2, 1891, p. 622; Fn. Transsylv. 1891, p. 693. — Lameere, Man. Fn. Belg. Fn. 1900, p. 549.

**Hedenborgi** Bohem. in Schönh. Gen. Sp. Curc. VIII, 2, 1845, p. 160 (*Ceuthorhynchus*). — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 207.

Rhôdes

**var. frater** Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 189; Horae Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 151. — Schultze, l. c. 1902, p. 207.  
**var. Purkynei** Tyl, Ent. Blätt. X, 1914, p. 7.

Algérie,  
Turkestan,  
Caucase  
Bohême

**Biologie:** Rupertsb. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XIX, 1869, Sitzber. p. 6; XX, 1870, p. 837. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. It. XVIII,

- 1885, p. 312. — Bedel, l. c. Suppl. VI bis, 1924, p. 84.
- faedus** Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVIII, 1887, p. 299. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 207.
- fuliginosus** Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 280. — Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 291. — Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 389; ed. 2, 1858, p. 788; ed. 3, II, 1874, 337. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 335. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 588. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1865, p. 249; X, 1868, p. 143. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 165; (1887), p. 323. — Seidlitz, Fn. Balt. 1872, p. 444; ed. 2, 1891, p. 622; Fn. Trans-sylv. 1891, p. 698. — Stierl. Fn. Col. Helvet. 1894, p. 364. — Lameere, Man. Fn. Belg. 1900, p. 549. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 207. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 670. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 147. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 149. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1923, p. 70. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 116, 117.
- guttula* var. b Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 592.
- ruficornis* Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1831, p. 25.
- canaliculatus* Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 293.
- umbrinus* Gyll. l. c. p. 292.
- pruni* Bohem. in Schönh. Gen. Sp. Curc. VIII, 2, 1845, p. 159. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 207.
- Biologe**: Bedel, l. c. p. 323; Suppl. VI bis, 1924, p. 84. — Schreiner, Trudi Ent. IV, 6, 1909, p. 1—7, fig. — Hust. l. c. p. 71.
- impressus** Rosenh. Thiere Andal. 1856, p. 285 nota. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 207.
- litura-alba** Desbr. Frelon V, 1895—96, p. 58.
- Reitteri* Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 307; l. c. 1902, p. 207.
- lividus** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 306; l. c. 1902, p. 207.

6

### Zacladus Reitt.

- Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) [Best.-Tab. 68], p. 66; Fn. Germ. V, 1916, p. 143; Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 129 (Tableau des Allodactylus). — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV, 1916, p. 109; Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rhén. p. 58, 75.
- Allodactylus* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1883, p. 255. — Schultze, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 174 (Revision).
- affinis** Payk. Mon. Curc. 1792, p. 68 (Curculio). — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 164; (1887), p. 330. — Schultze, l. c. p. 175. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 670. —

Turkestan  
russeEurope,  
Sibérie,  
Algérie

Tyrol

Turkestan,  
Tokat,  
Arménie  
russe

Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 986. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 145, — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 148, fig. 95. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1923, p. 75, fig. 21. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 116, 117.

*gerani* Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 256 (*Curculio*). — Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 140 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. Sp. Curr. IV, 1, 1837, p. 303 (*Coeliodes*). — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 324 (*Rhynchaenus*). — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1831, p. 24 (*Ceuthorynchus*). — Sahlb. Ins. Fenn. 1834—39 (1835), p. 57 (*Rhynchaenus*). — Bohem. in Schönh. Gen. Sp. Curr. VIII, 1, 1844, p. 399. — Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 390; ed. 2, 1858, p. 788; ed. 3, III, 1874, p. 337. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 335. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 534. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 248; X, 1868, p. 143. — Seidlitz, Fn. Balt. 1872, p. 446; ed. II, 1891, p. 622; Fn. Transsylv. 1891, p. 693. — Stierl. Fn. Col. Helv. 1894, p. 364.

**Biology:** Hammerschmidt, Observat. phys.-path. 1832, t. 6. — Bedel, l. c. p. 330; Suppl. VI bis, 1924, p. 85. — Hust. l. c. p. 77.

**asperatus** Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curr. IV, 1, 1837, p. 305; l. c. VIII, 1, 1844, p. 400. — Schultze, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 176; Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 209.

*macrasper* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 287. 130

**asperulus** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 204. — Schultze, l. c. 1902, p. 209; Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 176.

**exiguus** Ol. Ent. V, 1807, 88, p. 138, t. 33, f. 504 (*Rhynchaenus*). — Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curr. IV, 1, 1837, p. 304 (*Coeliodes*); VIII, 1, 1843, p. 400. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 389; ed. 2, 1858, p. 788; ed. 3, III, 1874, p. 337. — Bach, Käferfn. III, 1854, p. 335. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 533. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 164; (1887), p. 330. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1891, p. 693. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 549. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 208; Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 175. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 670. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 984. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 145. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1923, p. 76.

**var. *pulvillus*** Schultze, Abeille XXIX, 1899, p. 255; Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 208; 1903, p. 287; Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 175.

**Biology:** Curtis, Brit. Ent. XIII, 1836, p. 670. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV,

Crimée,  
Turquie or.

Sibérie

Europe centr.  
et mérid.,  
Algérie

Algérie,  
Sicile

- 1854—68, p. 59. — Bedel, l. c. p. 330; Suppl. VI bis, 1924, p. 85. — Hust. l. c. p. 77.
- fallax** Bohem. in Schönh. Gen. Sp. Cire. VIII, 2, 1845, p. 142 (*Ceuthorhynchus*). — Schultze, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 175.
- simplicicollis* Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 86. — Schultze, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 175 nota; Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 287.
- radula** Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XXIV, 1851, I, p. 95. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 86. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 209; Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 176.
- Stierlini** (Faust) Schultze, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 176; Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 290.
- Thomsoni** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 100; I. c. 1902, p. 209; Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 176.
- transversicollis** Faust. Horae Soc. Ent. Ross. XXVIII, 1894, p. 147. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 209; Münch. Kol. Zeitschr. I, 1902, p. 175. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV, 1916, p. 129.
- turkestanicus** Hust. Bull. Soc. Ent. Fr. 1930, p. 193. 10
- Turkestan

### Micrelus C. G. Thoms.

- C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 140; VIII, 1865, p. 267; X, 1868, p. 200. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 199. — Bedel, Fn. Bass. Seine III, 1882—88 (1885), p. 161; (1887), p. 342. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 625; Fn. Transsylv. 1891, p. 696. — Stierl. Fn. Col. Helvetic. III, 1886—89 (1894), p. 385. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 212. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 675. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 918, 989. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) [Best.-Tab. 68], p. 66; Fn. Germ. V, 1916, p. 143. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 185. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1923, p. 91. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 118.
- Alluaudi** Hust. Bull. Soc. Ent. Fr. 1916, p. 169.
- bipustulatus** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 181.
- bisquamosus** Hust. Bull. Soc. Ent. Fr. 1916, p. 169.
- cruciatus** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 182.
- ericae** Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 147 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. Sp. Cire. IV, 1, 1837, p. 499 (*Ceuthorhynchus*); l. c. VIII, 2, 1845, p. 145. — Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 220 (*Ceuthorhynchus*). — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 325 (*Rhynchaenus*); Ins. Lapp. I, 1838 (1840), col. 182. — Steph. III. Brit. Ent. IV, 1831, p. 33 (*Nedyus*); Man. Brit. Col. 1839, p. 221. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1835), p. 61 (*Rhynchaenus*). — Bach, Käferfn. II, 1852—54, p. 345, 352 (*Ceuthorhynchus*). — Redtb. Fn. Austr. 1858, p. 806; ed. 3, II, 1874, p. 341. — Gutfl.
- Afrique centr. Usambara
- Afrique centr. Usambara
- Europe

& Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 541. — C. G. Thoms. I. c. I, p. 140; VII, p. 267; X, 1868, p. 200. — Bedel, I. c. 1887—88 (1885), p. 172; (1887), p. 342. — Fowler, Col. Brit. Isl. VI, 1891, p. 347. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1891, p. 632; Fn. Transsyrv. 1891, p. 704. — Stierl. I. c. p. 385. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 268; 1902, p. 212. — Everts, I. c. p. 675. — Kuhnt, I. c. p. 989. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 144. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1916, p. 185. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1923, p. 91. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 122.

*albosetosus* Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 500 (*Ceuthorhynchus*); I. c. VII, 2, 1845, p. 145. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 212.

var. *Olcesei* Pic, Miscell. Ent. IV, 1896, p. 95 (*Allodactylus*); VII, 1899, p. 116. — ? Kuhnt, I. c. p. 989. — ? Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 144 nota.

var. *rufescens* Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 267; 1901, p. 94; 1902, p. 212, 288.

*ericae* Gyll. var. β I. c. p. 499. — Schultze, I. c. p. 212. — Pic, Bull. Soc. Ent. Fr. 1910, p. 154.

**Biologie:** Curtis, Brit. Ent. XIII, 1836, p. 670. — Mathieu, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 232. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68, p. 61. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 341. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon 1877, p. 249; Larves Col. 1877, p. 409. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVIII, 1885, p. 319; XIX, 1887, p. 19. — Bedel, I. c. p. 342. — Bourgeois, Mittheil. Nat. Ges. Colmar IX, 1908, p. 175. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 244.

*excavatus* Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV, 1916, p. 128.

*ferrugatus* Perris, Mém. Acad. Sc. Lyon II, 1847, p. 477 (*Ceuthorhynchus*). — Bedel, I. c. p. 174, 342. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 212. — Kuhnt, I. c. p. 989. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 144. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1923, p. 93.

**Biologie:** Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIII, 1877, p. 249; Larves Col. 1877, p. 409. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 319; XIX, 1887, p. 19.

*humilis* Hust. Bull. Soc. Ent. Fr. 1930, p. 80.

*Jeannelli* Hust. Bull. Soc. Ent. Fr. 1916, p. 169.

*minutissimus* Hust. I. c. p. 169.

*usambaricus* Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 183.

Maroc

Japon

France mér.,  
Corse,  
Sardaigne,  
Andalousie,  
Maroc

Cap de B. E.  
Afrique centr.

"

Balt. ed. 2, 1891, p. 621; Fn. Transsylv. 1891, p. 694. — Stierl. Fn. Col. Helv. 1894, p. 366. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 208. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 671. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn 41, 1912 (1913) [Best.-Tab. 68], p. 69; Fn. Germ. V, 1916, p. 143. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1923, p. 78.

**lamii** F. Ent. Syst. I, 2, p. 437 (*Curculio*); Syst. El. II, 1801, p. 483 (*Rhynchaenus*). — Panz. Ent. Germ. 1794, p. 314 (*Curculio*) ?; Fn. Germ. XVII, p. 13. — Herbst, Käf. VI, 1795, p. 408, t. 92, f. 2. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 389; ed. 2, 1858, p. 788; ed. 3, II, 1874, p. 337. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 333. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 533. — Seidlitz, Fn. Balt. 1872, p. 444; ed. 2, 1891, p. 623; Fn. Transsylv. 1891, p. 694. — Bedel, l. c. p. 176, 328. — Stierl. Fn. Col. Helv. 1894, p. 366. — Lameere, Man. Fn. Belg. 1900, p. 549. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 208. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 671. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 148. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 153. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1923, p. 78, f. 22.

**punctulum** Herbst, Käf. VI, 1795, p. 407, t. 91, f. 17 (*Curculio*). — Germ. Ins. Sp. nov. 1824, p. 229 (*Ceuthorhynchus*). — Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Cure. IV, 1, 1837, p. 308. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 334. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 533. — Stierl. Fn. Col. Helv. 1894, p. 366.

**abruptestriatus** Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Cure. IV, 1, 1837, p. 521 (*Ceuthorhynchus*); l. c. VIII, 2, 1845, p. 152. — Schultze, l. c. 1902, p. 208. — Bedel, l. c. p. 328.

**mendosus** Gyll. l. c. p. 529 (*Ceuthorhynchus*); l. c. VIII, 2, 1845, p. 154. — Bedel, l. c. p. 328. — Schultze, l. c. p. 208.

**minimus** Rye, Ent. Monthly Mag. III, 1865, p. 12 (*Ceuthorhynchidius*). — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 266; l. c. 1902, p. 208.

**congener** Först. Verh. Ver. Preuss. Rheinl. VI, 1849, Suppl. p. 28. — v. Heyden, Rev. d'Ent. X, 1891, p. 20. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 265; l. c. 1902, p. 208.

**Biologie:** F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 437; Syst. El. II, 1801, p. 483. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 145. — Mathieu, Ann. Soc. Ent. Belg. III, 1858, p. 229. — Perris, Larves Col. 1877, p. 408. — Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. 1915, p. 54. — Bedel, l. c. p. 328; Suppl. VI bis, 9124, p. 84. — Hust. l. c. p. 78.

Europe centr.  
et mérid.,  
Algérie

Crimée

Paris

Angleterre

Allemagne

### Cidnorrhinus C. G. Thoms.

C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 249. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1891, p. 621; Fn. Transsylv. 1891, p. 693. — Stierl. Fn. Col. Helv. 1894, p. 365. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 86; Fn. Germ. V,

1916, p. 147. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 207 (Catalogue). — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 670. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 984. — Hust, Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1920, p. 58, 73.

**Fausti** Hartm. Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 94.

Afr. or.:

Tanga

Europe,

Sibérie

**quadrimaculatus** L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 380.

— Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 165; (1887), p. 324. — Stierl. Fn. Col. Helvet. 1894, p. 366. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 207. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 671. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 984. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 148, 160, f. 22. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 149. — Hust. l. c. p. 73, fig. 20. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 117, 118.

**urticace** Scop. Ent. Carn. 1763, p. 28 (*Curculio*). — Müll. Zool. Dan. Prodr. 1776, p. 88. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1771. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1891, p. 622; Fn. Transsylv. 1891, p. 693.

**oleraceus** Scop. l. c. p. 29 (♀). — Gmel. l. c. p. 1757.

**albopunctatus** Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 396. — Gmel. in L. l. c. p. 1778.

**tripunctatus** Fourcr. Ent. Paris. I, 1785, p. 130.

**urticarius** Clairv. Ent. Helv. I, 1798, p. 98, f. 1, 2.

**viduus** Panz. Fn. Germ. 42, 1797, t. 11, nr. 17.

var. *gibbipennis* Germ. Ins. Sp. nov. 1824, p. 228. — Kuhnt, l. c. p. 984.

var. *nigrirostris* Bohem. in Schönh. Gen. Sp. Cure. VIII, 2, 1845, p. 157.

**didymus** F. Spec. Ins. I, 1781, p. 178 (*Curculio*); Mant. Ins. I, 1787, p. 108; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 487; Syst. El. II, 1801, p. 482 (*Rhynchaenus*). — Gmelin in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1768. — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 200; IV, p. 273. — Walck. Fn. Par. I, 1802, p. 242. — Ol. Eneyel. Méth. V, 1790, p. 513 (*Curculio*); Ent. V, 1807, 88, p. 212, t. 23, f. 226. — Panz. Ent. Germ. 1794, p. 314. — Herbst, Käf. VI, 1795, p. 397, t. 91, f. 6. — Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 213; Monogr. Cure. 1792, p. 29. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 144. — Gyll. Ins. Suec. III, 1815, p. 225 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. Sp. Cure. IV, 1, 1837, p. 900 (*Coeliodes*). — Germ. Ins. Sp. nov. I, 1824, p. 220 (*Ceuthorhynchus*). — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 311. — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1831, p. 24 (*Ceuthorhynchus*). — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 389; 1858, p. 788; 1874, p. 337. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 333. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 533. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 249;

- X, 1868, p. 144. — Seidlitz, Fn. Balt. 1872, p. 444.  
**var. *rimulosus*** Germ. Ins. Sp. nov. 1824, p. 230.  
***immaculatus*** Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curr. IV, 1, 1837, p. 301.  
***urticace*** Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 281. — Kuhnt, l. c. p. 981. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 266; 1902, p. 207.  
**var. *melancholicus*** Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curr. IV, 1, 1837, p. 518.  
**var. *nigrotibialis*** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 94; l. c. 1902, p. 207. — Kuhnt, l. c. p. 984.  
**var. *rufipes*** Jacob, Ent. Zeitschr. (Frankfurt) XXXIX, 1925—26 (1926), p. 166.  
**Biology:** F. Ent. Syst. 1792, p. 437; Syst. El. II, 1801, p. 482. — Zetterst. Ins. Lapp. I, 1828, p. 311. — Mathieu, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 229. — Goureau, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 172. — Kaltenb. Pflanzenf. 1872, p. 527. — Perris, Larves Col. 1877, p. 408. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. It. XVII, 1885, p. 312. — Bedel, l. c. p. 324; Suppl. VI bis, p. 84. — Hust. l. c. p. 74.  
**tener** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 432. — Schultze, l. c. 1902, p. 207.

3

### Phrydiuchus Gozis.

Gozis, Revue d'Ent. IV, 1885, p. 129. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1887), p. 323. — Stierl. Fn. Col. Helvet. III, 1886—98 (1894), p. 363, 374. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 212 (Liste). — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 152, 193. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1923, p. 58, 93.

**Speiseri** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 313 (*Ceuthorhynchus*); l. c. 1902, p. 212 (*Phrydiuchus*); l. c. 1903, p. 288.

**toparius** Germ. Ins. sp. nov. I, 1824, p. 239 (*Ceuthorhynchus*). — Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curr. IV, 1, 1837, p. 476; VIII, 2, 1846, p. 131. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 345. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 380; ed. 3, III, 1874, p. 799. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 256 (subg. *Marmoropus*). — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 166; (1887), p. 323 (*Ceuthorhynchus* subg. *Phrydiuchus*). — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1894, p. 374 (subg. *Phrydiuchus*). — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 212 (*Phrydiuchus*); Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova XLII, 1906, p. 541. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 988, fig. 294, a, b. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 153 (subg. *Phrydiuchus*). — Hust. l. c. p. 94, fig. 26.

**cocartatus** Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68, p. 62 nota. — Bedel, l. c. p. 323. — Schultze, l. c. p. 212.

Allemagne

Grèce

Hongrie  
mér.,  
Slavonie,  
Dalmatie

France,  
Allemagne  
mér.,  
Hongrie,  
Autriche,  
Turquie,  
Crimea,  
Italie,  
Algérie,  
Kurdistan  
russe

**B i o l o g i e:** Brisout, Ann. Soc. Ent. Fr. 1859, Bull. p. CXXXII. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIII, 1876 (1877), p. 248; Larves Col. 1877, p. 410. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 332; XIX, 1887, p. 25. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 242. — Hust. I. c. p. 95. — Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. 1915, p. 54. — H. Wagner, Col. Centralbl. III, 1928—29 (1929), p. 243.

2

### Ceuthorrhynchidius Jacq. du Val.

Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68, p. 60. — Schultze, Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906, p. 1—10 (Caractères du genre et révisions des espèces); Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 212 [Catalogue des espèces]. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) [Best.-Tab. 68], p. 69; Fn. Germ. V, 1916, p. 144, 190. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1922, p. 59; 1923, p. 79. — Crotch, Entomol. III, 1864—65 (1865), p. 60. — Rye, Ent. Monthly Mag. II, 1866, p. 63. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 200. — Redtb. Fn. Austr. ed. 8, I, 1874, p. CXXXVII; II, 1874, p. 349. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 161; (1887), p. 339. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1891, p. 166, 624; Fn. Transsylv. 1891, p. 166, 695. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1894, p. 363, 371, 372. — C. G. Champ. Biol. Centr.-Amer. IV, 5, 1907, p. 153. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 918, 988. — Wagner in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 1120, 1128.

**baldensis** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 263; I. c. 1902, p. 212; I. c. 1903, p. 288; Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906, p. 9. — Fiori, Riv. Col. Ital. IV, 1906, p. 228.

Mte Baldo,  
Grand  
Snt. Bernard,  
Bosnie,  
Alpes Fr.

**Barnevillei** Gren. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, Bull. p. LXV. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 265; 1902, p. 212; 1903, p. 288; Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906, p. 5. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 989. — Fowler, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 315. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 151. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1916, p. 187. — Hust. I. c. 1923, p. 81, 90. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 127.

Hautes Pyré-  
nées,  
Hautes  
Alpes,  
Bavière,  
Autriche,  
Croatie,  
Caucase,  
Danemark,  
Suède  
Angleterre

**chevrolati** (Bris.) Tylden, Ent. Monthly Mag. VIII, 1871—72 (1872), p. 205 (s. descr.). — G. Crotch, Entomol. II, 1864—65 (1865), p. 260. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 366; VI, p. 315. — Champ. Ent. Monthly Mag. XLIV, 1908, p. 2.

**troglodytes** var. d Gyll. Fn. Suec. I, 4, 1827, p. 597. — Rye, Ent. Monthly Mag. X, 1873, p. 18.

**Bedeli** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 308; I. c. 1902, p. 212; Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906, p. 8.

Algérie

**Biologe:** Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. 1915, p. 55; 1919, p. 242.

**bellus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 161. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 212; Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906, p. 5.

Araxes

**campanellae** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 423; l. c. 1902, p. 212; Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906, p. 9.

Croatie,  
Bosnie,  
Dalmatie,  
Caucase

**centrimacula** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 302; l. c. 1902, p. 212; l. c. 1903, p. 288; Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906, p. 6.

Algérie,  
Grèce,  
Sicile,  
Syrie

**Dawsoni** Ch. Bris. Abeille V, 1869, p. 438 (*Ceuthorhynchus*). — G. F. Crotch, Entomol. II, 1864—65 (1865), p. 160. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 179. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 366; VI, p. 315. — Bayley, Ent. Monthly Mag. XXXVIII, 1902, p. 178. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 212; 1903, p. 288; Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906, p. 3. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1923, p. 81, 84.

Angleterre,  
France,  
Espagne

**Biologie**: Fowl. Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 367. — J. Ste. Claire Deville, Abeille XXXI, p. 143; Fn. Bass. Seine VI bis, 1924, p. 103. — Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. 1911, p. 304. — Hust. l. c. p. 85.

**hassicus** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 244, 290 (*Ceuthorhynchus*); Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906, p. 10 (*Ceuthorhynchidius*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 988 (*Ceuthorhynchus*). — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 151 (*Ceuthorhynchidius*) et nota 1.

Allemagne,  
Hongrie

**horridus** Panz. Fn. Ins. Germ. 84, 1801, nr. 9 (*Curculio*); Krit. Revis. I, 1805, p. 131. — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1831, p. 38 (*Nedyus*); Man. Brit. Col. 1839, p. 222. — Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 505 (*Ceuthorhynchus*); l. c. VIII, 2, 1845, p. 147. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 385; 1858, p. 804; 1874, p. 350. — Bach, Käferf. II, 1854, p. 348, 368 (*Ceuthorhynchus*). — Gutfl.-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 547. — Crotch, Entomol. II, 1865, nr. 18, p. 259. — Bedel, Fn. Bass. Seine VII, 1882—88 (1885), p. 178; (1887), p. 341. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 364. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1891, p. 624; Fn. Transsylv. 1891, p. 695. — Stierl. Fn. Col. Helvet. 1894, p. 372. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 212; Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906, p. 2. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 672. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1910, p. 988, fig. 293, 294, c, d. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 150, t. 161, f. 2. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1923, p. 81, 82.

Europe  
centrale et  
méríd.

**spinosus** Gemm. & Harold (nec Goeze), Col. Cat. VIII, 1871, p. 2612. — Bedel, l. c. p. 341. — Schultze, l. c. 1903, p. 288.

**Biologie**: Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIII, 1876 (1877), p. 248; Larves Col. 1877, p. 408. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 243. — Hust. l. c. p. 83.

- hypocritus** Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV, 1916, p. 126.
- hystrix** Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon II, 1852, p. 181 (*Ceuthorhynchus*). — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 265; 1902, p. 212; Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906, p. 4. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 989. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 151. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1923, p. 81, 86.
- Biologie:** Bauduer, Petites Nouv. Ent. 1869, p. 13. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1885, p. 327; XIX, 1887, p. 22. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 243.
- magnicollis** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 245; Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906, p. 8.
- rufulus** <sup>“</sup> Dufour, Act. Soc. Linn. Bordeaux XVII, 1851, p. 346. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1887), p. 341. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 366. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 212; 1903, p. 288; Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906, p. 4. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 672. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 989. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 151. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1923, p. 81, 85.
- cruciger** Dufour, Act. Soc. Linn. Bord. XVII, p. 346 (non Herbst).
- frontalis** Ch. Bris. Abeille V, 1869, p. 438 (*Ceuthorhynchus*). — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1885, p. 179. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1894, p. 372. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 212.
- Biologie:** Bauduer, Petites Nouvelles Entomol. 1869, p. 13. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIII, 1877, p. 249; Larves Col. 1877, p. 409. — Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. 1919, p. 242. — Bedel, l. c. p. 341; VI bis, 1924, p. 103. — Hust. l. c. p. 86.
- Spurnyi** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 98; 1902, p. 212; Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906, p. 10.
- Thalhammeri** Schultze, Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906, p. 7. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1923, p. 81, 89, fig. 24.
- Biologie:** J. Ste. Claire Deville, Abeille XXXI, 1909, p. 143. — Hust. l. c. p. 90.
- troglodytes** F. Mant. Ins. I, 1787, p. 108 (*Curculio*); Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 489; Syst. El. II, 1801, p. 485 (*Rhynchaenus*). — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1763 (*Curculio*). — Vill. Ent. Linn. IV, 1789, p. 289. — Ol. Encycl. méthod. V, 1790, p. 516; Ent. V, 1807, nr. 83, p. 234, t. 23, f. 327 (*Rhynchaenus*). — Payk. Monogr. Curr. Suec. 1792, p. 30 (*Curculio*); Fn. Suec. III, 1800, p. 214. — Herbst, Natursyst. Käfer VII, 1795, p. 473. — Panz. Deutschl. Ins.-Fn. 1795, p. 315. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 281. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XV, 1807, p. 146. — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 233 (*Rhynchaenus*); in Europe, Maroc, Algérie, Sibérie
- Japon
- France mér., Italie, Grèce, Espagne, Algérie
- Algérie, Tunisie
- Angleterre, France, Allemagne mér., Autriche, Hongrie, Italie, Turquie, Caucase, Algérie
- Angleterre, France, Allemagne mér., Hongrie, Italie, Turquie, Caucase, Algérie
- Tyrol
- Alpes occ., Hongrie, France mér.

Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 563; VIII, 2, 1845, p. 169. — Germ. Ins. Sp. nov. I, 1824, p. 221. — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1831, p. 39 (*Nedyus*); Man. Col. Brit. 1839, p. 222. — C. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834 (1835), p. 101 (*Rhynchaenus*). — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 385; 1858, p. 805; 1874, p. 350. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 348, 367. — Gutfl.-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 458. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 259; X, 1868, p. 199. — Crotch, Entom. III, 1864—65 (1865), p. 259. — Waterh. Ent. Monthly Mag. VIII, 1871—72 (1871), p. 66 (Copulation). — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 179; (1887), p. 341. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 365. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1891, p. 624; Fn. Trans-sylv. 1891, p. 695. — Stierlin, Fn. Col. Helv. II, 1894, p. 372. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 54, f. 5. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 212; 1903, p. 288; Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906, p. 7. — Everts, Col. Neerl. III, 1903, p. 672. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 989. — Wagner in Calwer, Käferb. ed. 6, 1907—16 (1916), p. 1128. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 151, t. 161, f. 12. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 187. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1923, p. 81, 87, f. 23. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 128.

*spiniger* Herbst, Käf. VIII, 1796, p. 410, t. 92, f. 4 (*Curculio*). — Steph. Ill. Brit. Ent. 1831, p. 39 (*Nedyus*); Man. Brit. Col. 1839, p. 223. — Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 564. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 212.

*pusio* Panz. Deutschl. Ins.-Fn. 1795, p. 311 (*Curculio*); Fn. Ins. Germ. III, 1796, nr. 36, t. 15; Krit. Revis. I, 1805, p. 129. — Steph. Ill. Brit. Ent. IV, 1831, p. 39 (*Nedyus*); Man. Brit. Col. 1839, p. 223. — Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 564.

**Biologie:** Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXIII, 1876 (1877), p. 248; Larves Col. 1877, p. 408. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 328; XIX, 1887, p. 22. — Buddeberg, Jahrb. Nassau. Ver. Nat. XXXVIII, 1885, p. 88. — Bourgeois, Mitteil. Nat. Ges. Colmar IX, 1907—08 (1908), p. 167. — Waterh. Ent. Monthly Mag. VIII, 1872, p. 66 (en copulation avec *C. didymus* ♀). — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 244. — Hust. l. c. p. 89. — Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. 1926, p. 375.

**urens** Gyll. in Schönh. Gen. Curc. IV, 1, 1837, p. 564; l. c. VIII, 2, 1845, p. 169. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 212; Münch. Kol. Zeitschr. III, 1906, p. 3. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1923, p. 81, 83.

Europe mér.,  
France mér.,  
Espagne,  
Portugal,  
Italie,

- albohispidus* Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 640. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 212.  
*Biologie*: P. de Peyerimhoff, Ann. Soc. Ent. Fr. 1911, p. 304. — Hust. l. c. p. 83.  
 17

### Ceuthorrhynchus Germ.

Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 217 (*Ceuthorrhynchus*). — Schönh. Disp. meth. Curc. 1826, p. 298 (*Ceuthorrhynchus*); Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 475; VIII, 2, 1845, p. 131. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. III, 1840, p. 359. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 112. — Redtb. Gatt. Deutsch. Käferf. 1845, p. 42; Fn. Austr. 1849, p. 42, 379; ed. 2, 1858, p. CXXIV, 796; ed. 3, III, 1874, p. CXXXVII, 389. — Bach, Käferf. II, 1852—54 (1854), p. 159, 344. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 458, 539. — H. Bris. Rev. et Mag. Zool. (3) XII, 1860, p. 587 (Synonyms). — Crotch, Entomol. II, 1864—65, nr. 18, 1865, p. 259. — J. Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1872, p. 272; Rhynchoph. N. E. America by Lee. et Horn 1876 (sépar. du précédent). — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 221—232. — Leprieur, Trad. du travail de Weise, sep. 1—12. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 160; 1887, p. 322—342 (Biologie); (1888), p. 426; VI, bis par J. Ste. Claire Deville 1924, p. 85—104 (Biologie). — J. Faust, Öfv. Finska Förh. XXXII, 1890, p. 100—102 (gr. *signatus*). — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 166; Fn. Transsylv. 1891, p. 166. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 542. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895—1903; 1902, p. 193—227, Catalogue systématique des espèces connues. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 391, 419. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1910, p. 918, 989. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) [Best.-Tab. 68], p. 68; Fn. Germ. V, 1916, p. 143, 191, 169, 166. — Blatchley & Leng, Rhynch. N. E. Amer. 1916, p. 440. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 153. — Hust. Miscell. Rev. Fn. Gallo-Rhén. 1922, p. 59, 87. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 115 (*Ceuthorrhynchus*). — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 417—421 (gr. *chalybeus*); 1903, p. 260 (groupe *arator*). — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 376 (gr. *marginatus*); l. c. XXVIII, p. 321 (groupe *chalybeus*). — Edwards, Ent. Monthly Mag. XLVII, 1911, p. 208 (gr. *marginatus*); l. c. L, p. 30 (gr. *chalybeus*). — Tyl, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 117—123, fig. (gr. *chrysanthemi*). — Künemann, Ent. Mitt. IX, 1920, p. 124—130 (gr. *chalybeus*). — Penecke, Wien. Ent. Zeit. XLIII, 1926, p. 29 (gr. *chrysanthemi*, *triangulum*). — H. Wagner, Col. Centralbl. II, 1927, p. 201—217, fig. (groupe *geographicus*).

Subg. *Nedysus* Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1881, p. 31; Man. Brit. Col. 1889, p. 210. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 161; (1887), p. 324.

Subg. *Calonsirus* C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 254.

Subg. *Hadroplontus* C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 140; VII, 1865, p. 262; X, 1868, p. 199. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 161. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 152, 154.

Subg. *Thamioculus* C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 140; VII, 1869, p. 262; X, 1868, p. 199. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 161; (1887), p. 328. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1891, p. 625; Fn. Transsylv. 1891, p. 696. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 155, 159.

Subg. *Sirocalus* Heyd. Cat. Col. Eur. 2. ed. 1906, p. 672.

- Subg. *Dionorephus* Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 153.  
 Subg. *Ethelcus* Reitt. l. c. p. 152.  
 Subg. *Glocianus* Reitt. l. c. p. 153.  
 Subg. *Marklissus* Reitt. l. c. p. 153.  
 Subg. *Mogulones* Reitt. l. c. p. 152.  
 Subg. *Oprohinus* Reitt. l. c. p. 153.  
 Subg. *Orethelcus* Reitt. l. c. p. 152.  
 Subg. *Prenesdus* Reitt. l. c. p. 153.  
 Subg. *Prisistus* Reitt. l. c. p. 152.  
 Subg. *Hesperorhynchus* Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. XCIV, 1926, p. 390.  
 Subg. *Eremonyx* Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1927, p. 262.  
 Morphologie: Flach, Wien. Ent. Zeit. XXVIII, 1908, p. 51—52 (Prothorax).  
 Biologie: Laboulbène, Ann. Soc. Ent. Fr. (8) IV, 1856, p. 145—168, figs. — Rye, Ent. Monthly Mag. IV, 1867—68 (1867), p. 66—67. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXIII, 1876 (1877), p. 217—248; Larves Col. 1877, p. 408—409. — Trail, Scot. Natural. XXXVII, 1880, p. 213—217. — Thomas, Alpine Phytoplocécid. 1885, p. 4; Ent. Nachr. XIX, 1893, p. 295. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1887, p. 322—342; l. c. VI, bis 1924, par J. Ste Claire Deville, p. 85—104. — Waterh. Ent. Monthly Mag. VIII, p. 66 (Copulation monstreuse). — Hieronymus, Zoocécid. 1910, p. 210, 214, 215, 222. — Kieffer, Ent. Nachr. XVII, 1891, p. 254. — Chitten-den, Bull. 23 U. S. Dep. Agr. Div. Ent. 1900, p. 50—53. — Gerhardt, Zeitschr. f. Ent. Breslau XXVI, 1900, p. 17—18; Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 21. — Cordemoy, Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 119—121 (Cécidies). — Jakowlew, Revue Russe d'Ent. III, 1902, p. 262—263. — Bourgeois, Mittheil. Nat. Ges. Colmar (n. s.) IX, 1907—08 (1908), p. 168 note; Cat. Col. Vosges VI, 1908, p. 482 note (Larves). — Reh in Sorauer, Handb. Pflanz. III, 1906—13 (1913), p. 562 (hôte des Crucifères). — Urban, Ent. Blätt. XVII, 1921, p. 19. — F. Vitale, Mem. Soc. Ent. Ital. VIII, 1929, p. 73—89 (Espèces de Sicile). — Scheuch, Münch. Kol. Zeitschr. IV, p. 153—158 (Espèces d'Autriche).

**abbreviatulus** F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 436 (*Curculio*); Europe centr.  
 Syst. El. II, 1801, p. 482 (*Rhynchaenus*). — et mérid.

Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 417 (*Curculio*). — Panz. Deutschl. Ins.-Fn. 1795, p. 314. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 144. — Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curr. IV, 1, 1837, p. 510 (*Ceuthorhynchus*); l. c. VIII, 2, 1845, p. 147 (*C. abbreviatulus*). — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 626 (*Ceuthorhynchus*); Fn. Transylv. 1888—1891 (1891), p. 698. — Stierl. Fn. Col. Helv. II, 1886—98 (1898), p. 376 (*Ceuthorhynchus*). — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 213 (*Ceuthorhynchus*). — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 680 (*Ceuth.* subg. *Nedyus*). — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 156 (subg. *Hadropontus*). — Hust. Miscell. Rev. Fn. Gallo-Rh. 1924, p. 100, 147.

**abreviatatus** Redt. Fn. Austr. 1849, p. 385 (*Ceuthorh.*); l. c. ed. 2, 1858, p. 805; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 346. — Bach, Käferf. II, 1854, p. 348, 369 (*Ceuthor.*). — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 67.

- invassor* Herbst, Käfer VII, p. 414, t. 92, f. 10.  
*variegatus* Grav. Vergl. Übers. Zool. Syst  
1807, p. 205.
- Biologie:** Kaltenbach, Pflanzenf. 1874, p. 20, 447 (*C. abbreviatus*). — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 315; l. c. XIX, 1887, p. 16. — Bourgeois, Mitth. Nat. Ges. Colmar (n. s.) IX, 1907—1908 (1908), p. 109; Cat. Col. Vosges VI, 1908, p. 488. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 244.
- abchasicus** Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXII, 1888, p. 173. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 257; l. c. 1902, p. 213. 3  
var. *Tylis* Roub. Soc. Ent. XXVIII, 191<sup>4</sup>, p. 69; Ent. Blätt. XI, 191<sup>4</sup>, p. 170/1915
- Abeillei** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1894, p. 297; l. c. 1902, p. 221. — Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1927, p. 262 (subg. *Eremonyx*).
- aculeatus** Penecke, Col. Centralbl. III, 1928, p. 145.
- adjunctus** Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 436.
- adspersulus** Dietz, l. c. p. 441. — Champ. Biol. Centr.-Amer. IV, 5, 1907, p. 153.
- adversus** Desbr. Frelon V, 1895—96, p. 56. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 222.
- planicollis* Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 222; 1903, p. 251. — Peyerimhoff, Ann. Soc. Ent. Fr. 1915, p. 55.
- Biologie:** Peyerimh. l. c. p. 55.
- aeneicollis** Germ. Ins. Sp. nov. I, 1824, p. 284. — Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 556; l. c. VIII, 2, 1845, p. 166. — Redtb. Fauna Austr. 1849, p. 379; l. c. ed. 2, 1858, p. 797; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 340. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 322, 329. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 225. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 996. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 170 (subg. *Marklissus*). — Hust. Miscell. Rev. Fn. Gallo-Rh. 1924, p. 118, 299.
- metallinus** Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. 1852, p. 90. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 225.
- Biologie:** Redt. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 340. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 315; l. c. XIX, 1887, p. 17. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 264. — Penecke, Wien. Ent. Zeit. XLIII, 1926, p. 30.
- aenescens** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 425; l. c. 1902, p. 225.
- aeratus** Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 431 (♂). — Blatchley et Leng, Rhynchosph. N. E. Amer. 1916, p. 442.
- affinis** Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1888, p. 1915 — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 225.
- africanus** Schultze, Abeille XXIX, 1899, p. 265; Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 218. —
- Caucase
- Caucase, Arabie
- Russie
- Algérie
- Bukowine Syreczka Etats-Unis
- „
- Algérie:  
Mt. Edough
- Allemagne,  
Hongrie,  
Autriche,  
France,  
Espagne,  
Algérie
- Asie mineure,  
Turkménie,  
Askhabad  
Ohio
- Sibérie or.,  
Taschkent
- Espagne mér.,  
Algérie

- Fuente, Boll. Soc. Esp. Hist. Nat. IV, 1904, p. 381, 390.
- Ahngeri** Schultze, Horae Soc. Ent. Ross. XXXVI, 1902, p. 79; Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 258 ( $\delta$ ), 289 ( $\varphi$ ); (*Angheri* (err.) l. c. p. 220).
- akbesianus** Pic, Echange XXIV, 1908, p. 34.
- albolimbatus** Pic, Echange XX, 1904, p. 93.
- albopilosulus** Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 448.
- albosignatus** Gyll. in Schönh. Gen. sp. Cura. IV, 1, 1837, p. 517; l. c. VIII, 2, 1845, p. 150. — Redt. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 343. — Bedel, Faune Col. Bass. Seine VI, 1882—88 1885), p. 173; (1887), p. 326 (subg. *Nedyus*). — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 626; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 698. — Stierl. Fn. Col. Helvet. III, 1886—98 (1894), p. 376. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 290; l. c. 1902, p. 215. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 686 (subg. *Nedyus*); Tijdschr. Ent. I, 1907, p. 3. — Reitter Fn. Germ. V, 1916, p. 160 (subg. *Hadropodontus*). — Hustache, Miscell. Rev. Fn. Gallo-Rh. 1924, p. 113, 173.
- var. *Kaufmanni* Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1893—97 (1894), p. 120. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 290; l. c. 1902, p. 215.
- Biologie:** Mathieu, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 238. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 315; l. c. XIX, 1887, p. 17. — J. Ste Claire Deville, Abeille XXXI, 1909, p. 143. — Kleine, Ent. Blatt. VI, 1910, p. 262. — Hust. l. c. p. 173.
- albosuturalis** Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1885, p. 178 (*Ceuthorhynchidius*). — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXII, 1887, p. 162 (*Ceuthorhynchus*). — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 222 (*Ceuthorhynchus*). — Hustache, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV, 1916, p. 129, 132 (*Ceuthorhynchus*).
- albovittatus** Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 231. — Gyll. in Schönh. Gen. sp. Cura. IV, 1, 1837, p. 477; l. c. VIII, 2, 1845, p. 132. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 381; l. c. ed. 2, 1853, p. 799; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 341. — Bach, Käferf. II, 1854, p. 345, 353. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 542. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 700. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 185; l. c. 1902, p. 217. — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 164 (subg. *Glocianus*). — Hust. Miscell. Rev. Fn. Gall.-Rh. 1924, p. 105, 206.
- Biologie:** Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68, p. 61. — Redt. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 341. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 316; l. c. XIX, 1887, p. 17. — Bourgeois, Mitt. Nat. Ges. Colmar (n. s.) IX, 1907—08 (1908), p. 174; Cat. Col. Vosges VI,
- Turkestan,  
Askabad
- Syrie: Akbès  
Tunis  
Etats-Unis
- Allemagne,  
Autriche,  
Hongrie,  
Hollande,  
Belgique,  
France
- Hongrie
- Japon,  
Sibérie or.:  
Chabarowsk
- Europe  
moyenne et  
méridionale,  
Alsace

|  |   |
|--|---|
| 1908, p. 488. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910,<br>p. 244.   |   |
| <b>algiricus</b> Ch. Bris. Abeille V, 1869, p. 456. — Schultze,<br>Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 224.   | Algérie,<br>Sicile  |
| <b>Biologe</b> : Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr.<br>1919, p. 306.   |   |
| <b>altaicus</b> Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 246<br>(subg. <i>Thamiocolus</i> ); l. c. 1902, p. 213; l. c.<br>1908, p. 291; Term. Füzet. XXI, 1898, p. 254.  | Altai   |
| <b>alternans</b> Ch. Bris. Abeille V, 1868, p. 439. — Schultze,<br>Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 216.   | Espagne cen-<br>trale,<br>Madrid  |
| <b>alyssi</b> Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1925, p. 282; Ann.<br>Soc. Ent. Fr. 1926, p. 375.  | Maroc: Grand<br>Atlas   |
| <b>ambiguus</b> Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897,<br>p. 308; l. c. 1912, p. 216.   | Balkans   |
| <b>amplipennis</b> Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896,<br>p. 263; l. c. 1902, p. 215. — Kuhnt, Ill. Best.-<br>Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 992.  | Autriche,<br>Hongrie,<br>Mark,<br>Asie mi-<br>neure   |
| <b>anatolicus</b> Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900,<br>p. 21; l. c. 1902, p. 223.  | Syrie:<br>Smyrne  |
| <b>ancora</b> Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875,<br>p. 177. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr.<br>1902, p. 215. — Hustache, Ann. Soc. Ent. Fr.<br>LXXXV, 1916, p. 130, 133.   | Japon   |
| <b>angulatus</b> Lec. et Horn, Rhynchoph. N. E. America<br>1876, p. 277. — Rye, Zool. Record XIII,<br>1876 (1877), Ins. p. 95 ( <i>Ceuthorhynchidius</i> ).<br>— Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896,<br>p. 425, t. 13, f. 22.   | Vancouver,<br>Californie  |
| <b>angulicollis</b> Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896,<br>p. 268; l. c. 1902, p. 214. — Reitt. Fauna<br>Germ. V, 1916, p. 157 (subg. <i>Hadropontus</i> ).<br>— Hustache, Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh.<br>1924, p. 118, 158.  | Sud Dane-<br>mark,<br>Hongrie,<br>Styrie,<br>Transyl-<br>vanie,<br>Bohême,<br>Bavière,<br>Italie sept.,<br>Alpes franç. |
| <b>Biologe</b> : Penecke, Wien. Ent. Zeit. XLII,<br>1926, p. 301.  | Europe<br>moyenne   |
| <b>angulosus</b> Bohem. in Schönh. Gen. Sp. VIII, 2, 1845,<br>p. 160. — Bach, Käferf. II, 1852—54 (1854),<br>p. 348, 371. — Redt. Fn. Austr. ed. 2, 1858,<br>p. 808; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 349. —<br>Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 458.<br>— Bedel, Fn. Col. Bass. Seine VI, 1882—88<br>(1885), p. 168. — C. C. Thomson, Opusc. Ent.<br>XII, 1888, p. 1205. — Fowler, Col. Brit. Isl. V,<br>1891, p. 343, 352; l. c. VI, 1913, p. 314. —<br>Seidl, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 628;<br>Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 700. —<br>Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 216;<br>l. c. 1903, p. 288. — Everts, Col. Neerl. II,<br>1903, p. 680 (subg. <i>Nedyus</i> ); Tijdschr. Ent. L,<br>1907. — Newbery, Ent. Month. Mag. XLI,<br>1904, p. 86. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf.<br>Deutschl. 1912, p. 994. — Reitt. Fn. Germ. V,<br>1916, p. 155 (subg. <i>Hadropontus</i> ). — Hansen, |   |

- Danmarks Fn. IV, 1918, p. 162. — Hust. Miscell. Rev. Fn. Gallo-Rh. 1924, p. 106, 181. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 120, 124.
- balsaminae* Guill. Echange I, nr. 7, p. 3. — Fauvel, Rev. d'Ent. VIII, 1888, p. 248.
- Biologie:** Hardy, Lancashire Natural. II, 1909, p. 204. — Hust. l. c. p. 181.
- impressicollis* Little in Waterhouse, Cat. Brit. Col. 1861, p. 80 [s. deser.]. — Crotch, Entomol. II, 1864—65 (1865), p. 260.
- angustulus* Gyll. in Schönh. Sp. Cure. IV. 1, 1837, p. 498; l. c. VIII, 2, 1845, p. 144. — Faust, Steiner Deutsche Ent. Zeitschr. XLVII, 1887, p. 302. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 289; l. c. 1902, p. 221 (*angustatus*) [err.]; l. c. 1903, p. 289 [corr.]. — Hust. Miscell. Rev. Fn. Gallo-Rh. 1924, p. 110, 248.
- Biologie:** J. Ste Claire Deville, Abeille XXX, 1901, p. 71.
- Annibal** Desbr. Frelon V, 1895—96, p. 60 (♀). — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 219.
- Hannibal* Weise, Cat. Col. Eur. ed. 2, 1906, p. 676.
- var. *pardalis* Schultze, Abeille XXIX, p. 260; Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 219.
- anthonomoides** Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII 1896, p. 444. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Am. 1916, p. 449.
- aper** Bedel, Abeille XXVIII, 1892—96 (1893), p. 104. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 219.
- Biologie:** Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. 1911, p. 306.
- apicalis** Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 579 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. Sp. Cure. IV, 1, 1837, p. 489 (*Ceuthorrhynchus*); l. c. VIII, 2, 1845, p. 140. — Sahlb. Ins. Fenn. III, 1835, p. 62 (*Rhynchaenus*). — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 351. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 541. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1865, p. 258; X, 1868, p. 144. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 178; (1887), p. 340. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 291; 1902, p. 222. — Everts, Col. Neerl. II, 1908, p. 674. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 991. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 148. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 98, 121.
- ? *analis* Panz. Ins. Fn. Germ. 1813, p. 193 (*Rhynchaenus*). — Germ. Ins. Sp. nov. I, 1824, p. 221.
- var. *praecutus* Ch. Bris. Abeille V, 1869, p. 437. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 291 nota; l. c. 1902, p. 222.
- Biologie:** Bedel, l. c. VI bis, p. 102. — Hust. l. c. p. 122.
- Apfelbecki** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 318; l. c. 1902, p. 214; Wiss. Mitth. Bosnien V, 1897, p. 497.
- Russie,  
Hongrie,  
Balkans,  
France,  
Caucase,  
Transcaucasia,  
Perse
- Algérie:  
Constantine
- Sicile
- Etats-Unis
- Algérie:  
Teniet-el-Haad
- Europe
- Algérie
- Bosnie,  
Roumélie or.

- arator** Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Cure. IV, 1, 1837, p. 479; l. c. VIII, 2, 1845, p. 134. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 430, 432; l. c. 1902, p. 219; l. c. 1903, p. 261.
- ?**arator** Redt. Fn. Austr. 1849, p. 382; l. c. ed. 2, 1858, p. 800; l. c. ed. 3, III, 1874, p. 342.
- ?**arator** Bach, Käferf. I, 1854, p. 356, 358. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 243.
- neophytus** Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVIII, 1887, p. 300 ( $\Omega$ ) (*Nedyus*). — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 268; l. c. 1902, p. 219.
- aratridens** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 276; l. c. 1902, p. 214.
- Arcasi** Ch. Bris. Abeille V, 1869, p. 458. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 215. — Méquignon, Bull. Soc. Ent. Fr. 1929, p. 25.
- arcuatus** Fährs. Övers. Vet.-Akad. Holm. XXVII, 1871, p. 276.
- arduus** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 37; l. c. 1902, p. 225.
- argentinensis** Hust. Ann. Mus. Nac. H. Nat. Buenos Aires XXXIV, 1926, p. 256.
- armatus** Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 433.
- arquatus** Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 396, t. 91, f. 5 (*Curculio*). — Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Cure. IV, 1, 1837, p. 532; l. c. VIII, 2, 1845, p. 154. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 385; l. c. ed. 2, 1858, p. 804; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 346. — Bach, Käferf. II, 1854, p. 348, 367 (*arcuatus*). — Rye, Ent. Month. Mag. VI, 1869, p. 5; Ent. Annual 1870, fig. 5 (*arcuatus*). — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 173; (1887), p. 327 (subg. *Nedyus*). — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 344, 357; l. c. VI, 1913, p. 314. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—93 (1891), p. 629; Fn. Transsylv. 1888—1891 (1891), p. 700. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 267; l. c. 1902, p. 216. Lokay, Časop. Spol. Ent. IV, 1907, p. 22. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 687. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 994. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 161 (subg. *Hadropontus*). — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 114, 185.
- occultus** Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Cure. IV, 1, 1837, p. 530; VIII, 2, 1845, p. 154. — Schultze, l. c. 1902, p. 216.
- uliginosus** Boh. in Schönh. l. c. VIII, 2, 1845, p. 150. — Crotch, Entomol. II, 1864—1865, n. 18, 1865, p. 260. — Schultze, l. c. 1902, p. 216.
- var. *Favarcqi* Pie, Echange XXIV, 1908, p. 35.
- var. *oblitus* Rey, Echange XI, 1895, p. 38. — Hust. l. c. p. 187.
- Biologie:** Brisout, Ann. Soc. Ent. Fr. 1873, Bull. p. CLXV. — Perris, Ann. Soc. Linn.
- Hongrie,  
Transsyl-  
vanie,  
Russie,  
Turkestan
- Turkestan
- Hongrie
- Espagne,  
France,  
Algérie  
Cap
- Maroc
- Argentine
- Etats-Unis
- Europe centr.  
et méridion.,  
Angleterre,  
Turkestan
- Algérie:  
Philippe-  
ville

Lyon (n. s.) XXIII, 1876 (1877), p. 248 (*arcuatus*); Larves de Coléopt. 1877, p. 408. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 316; l. c. XIX, 1887, p. 17. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1900, p. 275. — Bedel, l. c. p. 327, suppl. VI bis, p. 91. — Hust. l. c. p. 187.

**asper** Roel. Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, p. 177. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 162. — Heyden, l. c. 1887, p. 298. — Schultze, l. c. 1902, p. 219. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV, 1916, p. 130, 188.

Japon,  
Sibérie or.

**asperifoliarum** Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1818, p. 221 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. Sp. Cura. IV, 1, 1837, p. 519; l. c. VIII, 2, 1845, p. 150. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 37; Man. Brit. Col. 1839, p. 222 (subg. *Nedyus*). — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 384; l. c. ed. 2, 1858, p. 804; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 345. — Bach, Käferf. II, 1854, p. 347. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 264; l. c. X, 1868, p. 200, 201 (subg. *Hadropontus*). — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 173; (1887), p. 326 (subg. *Nedyus*). — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 344, 357; l. c. VI, 1913, p. 314. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 627; Fn. Transsylyv. 1888—91 (1891), p. 698. — Stierl. Fn. Col. Helv. III, 1886—98 (1894), p. 377. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 545, 546. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 215. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 687. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 992. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 161 (subg. *Hadropontus*). — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 159. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 114, 169. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 119, 123.

Europe,  
Trans-  
caucasie,  
Corfou

**olivaceus** Scop. Ent. Carn. 1763, p. 29 (♂) (*Curculio*).

**congener** Germ. Ins. Sp. nov. I, 1824, p. 217. — Schönh. Gen. Sp. Cura. IV, 1, 1837, p. 567; VIII, 2, 1845, p. 150.

**intersectus** Germ. Ins. Sp. nov. I, 1824, p. 227.

**quadrimaculatus** Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 252 (*Curculio*).

**angustifacaces** Desbr. Frelon V, 1895—1896, p. 58. — Hust. l. c. p. 170.

Isère

**Biologie:** Curtis, Brit. Ent. XVIII, 1836, p. 670. — J. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—1868, p. 61. — Mathieu, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 203. — Kaltenb. Pflanzenf. 1874, p. 444. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXIII, 1876 (1877), p. 218; Larves Col. 1877, p. 408. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 316; l. c. XIX, 1887, p. 17. — Bourgeois, Mittheil. Nat. Ges. Colmar IX, 1907—08 (1908), p. 169; Catal. Col. Vosges 1908, p. 483. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 261. — Hust. l. c. p. 169.

- asperulus* Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 328. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 86. Indes
- assimilis* Payk. Monogr. Cerc. Suec. 1792, p. 69 Europe  
(*Curculio*); Fn. Suec. III, 1800, p. 257. — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 409; Syst. El. III, 1801, p. 451 (*Rhynchaenus*). — Herbst, Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 419 (*Curculio*). — ?Panzer, Fn. Germ. Heft 42, 1797, t. 6. — ?Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 257. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 134. — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 141 (*Rhynchaenus*); I. c. I, 4, 1827, p. 177; in Schönh. Gen. Sp. Cerc. IV, 1, 1837, p. 480; I. c. VIII, 2, 1845, p. 134. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 28 (subg. *Nedyus*); Man. Brit. Col. 1839, p. 219. — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1835), p. 57 (*Rhynchaenus*). — Redt. Fauna Austr. 1849, p. 382; I. c. ed. 2, 1858, p. 800; I. c. ed. 3, II, 1874, p. 342. — Bach, Käferf. II, 1852—54 (1854), p. 346. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 140; I. c., VIII, 1865, p. 267; I. c. X, 1868, p. 200, 202. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—86 (1885), p. 176; (1887), p. 337. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 342, 345. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—1891 (1891), p. 631; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 703. — Stierl. Fn. Col. Helv. II, 1886—98 (1894), p. 389. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 267; I. c. 1902, p. 220. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 543, 547. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 691. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 996. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 167. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 176, fig. 102. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 119, 245. — Auriv. Svensk Insekt. 1924, 9, p. 122, 125.
- fallax* Boh. in Schönh. Gen. Sp. Cerc. VIII, 2, 1845, p. 142. — Redt. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 348. — Schultze, I. c. 1895, p. 431; 1898, p. 267; 1902, p. 220.
- brassicae* Focill. in Rev. Zool. (2) IV, 1862, p. 124. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 220.
- ?var. *biskrensis* Pic, Miscell. Ent. IV, 1896, p. 48. — Biskra
- var. *fallax* Schultze [non Boh.], Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 267; I. c. 1902, p. 220. — France,  
Crimée,  
Caucase,  
Algérie  
„
- var. *lituratus* Schultze, I. c. 1903, p. 292; I. c. 1902, p. 220. — Sardaigne
- var. *sardeanensis* Schultze, I. c. 1903, p. 292; I. c. 1902, p. 220. — Porta, Riv. Col. Ital. III, 1905, p. 24.
- var. *major* Escal. Trab. Mus. Madrid XI, 1914, p. 479. — Maroc
- alauda* Herbst, Käf. VI, p. 410, t. 92, f. 5.
- granulicollis* Schönh. Gen. Sp. Cerc. IV, I, 1837, p. 307 (*Coeliodes*).

*obstrictus* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 255  
(*Curculio*). *Stephanus*, p. 28

*subrufus* Marsh. I. c. p. 282. — Steph. III.  
Brit. Ent. IV, 1831, p. 26.

**Biologie:** Kirby & Spence, Intr. Ent. 1815;  
ed. Oken I, 1823, p. 495; Intr. Ent. ed. 5, 1828,  
p. 188; People Edit. 1867, p. 103. — Chapuis  
et Candeze, Mém. Soc. Sc. Cat. Larv. Col.  
1855, p. 222. — Focillon, Revue Zool. (2) IV,  
1852, p. 124. — Laboulbène, Ann. Soc. Ent.  
Fr. (3) V, 1857, p. 792; I. c. (4) III, 1862, p.  
568—569, t. 13, f. 23—28. — Mathieu, Ann.  
Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 231. — Curtis,  
Farm Ins. 1860, p. 103—104, fig. 17, nr. 10—  
15, t. 2, f. 10—15. — Taschemberg, Natur-  
gesch. wirbell. Thiere 1865, p. 59—61. — Gou-  
reau, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) V, 1865, Bull. p.  
II, III. — Boisduval, Ent. Hort. 1867, p. 147.  
— Künstler, Kulturpfl. schädl. Ins. 1871, p.  
47; Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXI, 1871, p.  
47. — Kaltenbach, Pflanzenf. 1874, p. 29, 30,  
40. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.)  
XXIII, 1876 (1877), p. 217; Larves Col. 1877.  
— Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885,  
p. 315; I. c. XIX, 1887, p. 17. — Lampa, Ent.  
Tidskr. XV, 1894, p. 12, fig. 2, 3. — Noel,  
Le Naturaliste XXIX, 1907, p. 285—290 (sub  
*brassicae*). — Goury et Guignon, Feuille  
jeun. Natur. XXXVII, 1907, p. 97, 112, 113,  
179. — Houard, Zoocécid. Eur. I, 1908, p. 458;  
I. c. II, 1909, p. 823. — Bourgeois, Mitteil.  
Nat. Ges. Colmar (n. s.) IX, 1907—08 (1908),  
p. 174; Cat. Col. Vosges VI, 1908, p. 488. —  
Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 262. — Reh  
in Sorauer, Pflanzenkrankh. III, 1906—13  
(1913); p. 563 (notes de Raps, Rüben, Rettig).  
— Hust. I. c. p. 246. — J. Ste Claire Deville,  
Fn. Bass. Seine VI bis, 1924, p. 98. — Wolff &  
Krausse, Archiv Natg. XCI, A 4, p. 1, fig.

**aterrimus** Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV, 1916,  
p. 130, 138.

**atomus** Bohem. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VIII,  
2, 1845, p. 188. — Bedel, Fn. Bass. Seine  
VI, 1882—88 (1885), p. 166; (1887), p. 334. —  
Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p.  
221. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 675.  
— Vitale, Natural. Sicil. XX, 1908, p. 75. —  
Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p.  
996. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 169, t. 162,  
f. 5. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p.  
188. — Hust. Miscell. Revis. Ceuth. Gallo-Rh.  
1924, p. 101, 266.

**setosus** Bohem. in Schönh. Gen. Sp. Curc.  
VIII, 2, 1845, p. 139. — Bach, Käferf. 1854,  
p. 346, 356. — Redtb. Fn. Austr. 1858, p. 807;  
1874, p. 348. — Fowler, Col. Brit. Isl. V,  
1891, p. 342, 346. — Seidlitz, Fn. Balt. 1891,  
p. 631; Fn. Transsylv. 1891, p. 703. — Stierl.  
Fn. Col. Helv. 1894, p. 383. — Schultze, I. c.  
1902, p. 221.

Japon

Europe centr.  
et mérid.

Belgique

*var. miser* (Rey) Hust. l. c. p. 267.

**Biologie:** Pierre, Revue Sc. Bourbon. XIV, 1901, p. 77—78 (Galle). — Goury et Guignon, Feuille Jeun. Natur. XXXVII, 1906—07, nr. 439, 1907, p. 143. — Walton, Ent. Monthly Mag. XLVI, 1910, p. 136. — Houard, Zoocéc. Eur. I, 1908, p. 471. — Walker, Ent. Monthly Mag. XLIV, 1908, p. 136 (*setosus*). — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 268. — Britten, Ent. Monthly Mag. XLVI, 1910, p. 212—213. — Hust. l. c. p. 267.

**atriculus** Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 451. — Blatchl. & Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 453.

**atticus** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 269 (♂), 291.

**Aubei** Boh. in Schönh. Gen. Sp. Curc. VIII, 2, 1845, p. 148. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 173; (1887), p. 324 (subg. *Nedyus*). — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 214 (*Ceuthorrhynchus*). — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 156 (subg. *Hadropontus*). — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 112, 156.

**Biologie:** Peyerimhoff, Ann. Soc. Ent. Fr. 1911, p. 305. — Urban, Ent. Blätt. XVII, 1921, p. 3. — J. Ste Claire Deville, Fn. Bass. Seine VI bis, 1924, p. 86. — Hust. l. c. p. 157.

**austriacus** Ch. Bris. Abeille V, 1869, p. 462. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 215. — Tyl, Ent. Blätt. X, 1914, p. 6.

**Biologie:** Penecke, Wien. Ent. Zeit. XXXIX, 1922, p. 187.

**axillaris** Bohem. in Schönh. Gen. Sp. Curc. VIII, 2, 1845, p. 163. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 257, 260; l. c. 1898, p. 164; l. c. 1902, p. 219.

**aztecus** Champ. Biol. Centr.-Am. IV, 5, 1907, p. 114 (*Ceuthorhynchidius*).

**barbareae** Suffr. Stett. Ent. Zeit. VIII, 1847, p. 88, 90. — Bach, Käferf. II, 1854, p. 354, 349. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 798; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 340. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1888, p. 322, 332. — Bedel, Fn. Bassin Seine VI, 1882—88 (1885), p. 167; (1887), p. 335. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 632; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 704. — Stierl. Fn. Col. Helv. II, 1886—98 (1894), p. 384. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 225. — Everts, Col. Neerl. II, 1908, p. 678 (subg. *Nedyus*). — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 172 (subg. *Marklissus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutsch. 1912, p. 997. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 181. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 103, 292.

**cyanopterus** Redtenb. Fn. Austr. ed. 1, 1849, p. 380; ed. 2, 1858, p. 798. — Gutfl. & Bose,

Etats-Unis

Grèce:  
Athènes  
France,  
Grèce,  
Algérie,  
Caucase

Autriche,  
Hongrie,  
Transsyl-  
vanie,  
Bosnie,  
Transcau-  
casie

Daurie

Mexico

Allemagne,  
France,  
Italie sept.,  
Autriche,  
Danemark,  
Turkestan

Käf. Deutschl. 1859, p. 540. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 225.

*var. carpathicola* Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 172.

*var. nigricollis* Gerhardt, Festschr. Ver. schles. Insektenk. 1897, p. 28.

**Biologie:** Leprieur, Bull. Soc. Hist. N. Colmar 1864, p. 68. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXIII, 1876 (1877), p. 248; Larves Col. 1877, p. 408 (sub *cyanopterus*). — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 317; l. c. XIX, 1887, p. 17. — Goury et Guignon, Feuill. Journ. Natur. XXXVII, 1906—07, p. 23, nr. 435, 1907, p. 44, 46 (Galle). — Bourgeois, Mitteil. Nat. Ges. Colmar (n. s.) IX, 1907—08 (1908), p. 173; Cat. Col. Vosges VI, 1908, p. 487. — J. Ste Claire Deville, Abeille XXXI, 1909, p. 143. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 262. — Hust. l. c. p. 293.

**Beckeri** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 26; l. c. 1902, p. 214; l. c. 1903, p. 288. — Vitale, Natural. Sicil. XIX, 1907, p. 141. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 992. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 154 (subg. *Mogulones*). — H. Wagn. Col. Centralbl. II, 1927, p. 206, 211, t. 2, f. 4a, b.

**berteroae** Penecke, Col. Centralbl. III, 1928, p. 139, 140. — H. Wagn. l. c. 1929, p. 246.

**bicollaris** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 282; l. c. 1902, p. 221. *Type fehlt in coll. Schultze*

**biplagiatus** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 279 (♀); l. c. 1902, p. 218.

**biscren<sup>K</sup>sis** Schultze, Abeille XXIX, 1899, p. 257; Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 217 (*Ceuthorrhynchus*).

**biscutellatus** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VII, 1859, Bull. p. XX (*Ceuthorhynchidius*). — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 217 (*Ceuthorrhynchus*). — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 107, 203.

**Anomalie: antennalis** Ch. Bris. Abeille V, 1869, p. 458.

**biseriatus** Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 198. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 225.

**bituberculatus** Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXII, 1888, p. 168. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 220.

**Bolteri** Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 432. — Blatchl. et Leng, Rhynchoph. 1916, p. 441.

**borraginis** F. Syst. Ent. I, 2, 1792, p. 437 (*Curculio*); Syst. El. II, 1801, p. 483 (*Rhynchaenus*). — Herbst, Natursyst. Käf. VI, 1795, p. 470 (*Curculio*). — Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 457. — Ol. Ent. V, 1807, nr. 88, p. 213, t. 23, f. 321 (*Rhynchaenus*). — Germ. Mag. Ent. IV, 1821, p. 251; Fn. Ins. Eur. IV, 1821, p. 10

Carpathes

Hanovre,  
Italie,  
Sicile,  
Turquie,  
Grèce,  
Asie mineure,  
Syrie

Bukowine,  
Algérie,  
Allemagne

Hongrie mér.,  
Banat

Vallée de  
l'Aran,  
Turkestan:  
Aulie-Ata

Algérie:  
Biskra

France mérid.,  
Algérie

Madrid

Turkestan,  
Taschkent

Turkestan

Etats-Unis

Allemagne,  
France,  
Italie,  
Maroc

(*Cryptorhynchus*). — Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 508; l. c. VIII, 2, 1845, p. 147. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 359. — Bach, Käferf. II, 1852—54 (1854), p. 360. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 802; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 343. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 169; (1887), p. 325 (subg. *Nedyus*). — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 698. — Stierlin, Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1894), p. 376. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 219. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 680 (subg. *Nedyus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 302. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 166 (subg. *Hadropontus*). — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 100, 240.

**Biologie:** F. Syst. Ent. I, 2, 1792, p. 437; Syst. El. II, 1801, p. 483. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVIII, 1885, p. 316; l. c. XIX, 1887, p. 17. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 262 [[p. p.]. — Hust. l. c. p. 240. — Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. 1911, p. 305; 1915, p. 56.

**brevicollis** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 274; l. c. 1902, p. 218.

Caucase

**brevicornis** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 311; l. c. 1902, p. 223.

Russie mér.:

Samara

**brevirostris** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 22 (♀); l. c. 1902, p. 218.

Syrie:

Smyrne,  
Palestine

Sieile

**breviuseulus** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 281; l. c. 1902, p. 217. — Tyl, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 120. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 161, 162 (subg. *Hadropontus*).

Turkestan,  
Djizah

**Brisouti** Faust (nec Friv.), Horae Soc. Ent. Ross. XXII, 1882, p. 167. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 291; l. c. 1902, p. 219.

**emeritus** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 139. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 289.

Buchara

**bucharensis** Schultze, Horae Soc. Ent. Ross. XXXVI, 1902, p. 88; Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 273; l. c. 1902, p. 218.

Bukowine  
Danmark

**buniadis** Penecke, Col. Centralbl. III, 1928, p. 142.

Anatolie:  
Konia  
Cameroun  
Europe  
moyenne

**cakilis** Hansen, Ent. Meddel. XI, 1917, p. 355 (*Ceuthorhynchidius*); Danmarks Fn. IV, 1916, p. 190.

**calcaratus** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 104 (♀); l. c. 1902, p. 213.

**camerunensis** Hust. Bull. Soc. Ent. Fr. 1930, p. 78.

**campestris** Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 523; l. c. VIII, 2, 1845, p. 153. — Bach, Käferf. II, 1854, p. 347, 365. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 805; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 345. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 629; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 701. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1894), p. 381. — Schultze,

- Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 267; l. c. 1898, p. 164; l. c. 1902, p. 216. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 687 (subg. *Nedyus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 995, fig. 302f. — Tyl, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 120. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 162 (subg. *Hadropontus*). — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 172. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 115, 187.  
**? variegatus** Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 135, t. 33, f. 505 (*Rhynchaenus*). — Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 503; VIII, 2, 1845, p. 146. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 431; 1898, p. 164; 1902, p. 216.  
**variegatus** Bed. Fn. Bass. Seine VI, 1882—1888 (1894), p. 381.  
**var. lepidus** Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 520; VIII, 2, 1845, p. 150. — Bach, Käferf. II, 1854, p. 347. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 216.  
**Biologie**: Brisout, Ann. Soc. Ent. Fr. 1873, Bull. p. CLXIV. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. 1873, p. 72; Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXIII, 1876 (1877), p. 248; Larves Col. 1877, p. 408. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 3, III, 1874, p. 345. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 317; l. c. XIX, 1887, p. 17. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1887), p. 328. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 265. — Urban, Ent. Blätt. X, 1914, p. 180, fig. — Hust. l. c. p. 189.  
**canaliculatus** Ch. Bris. Abeille V, 1869, p. 448. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 59; l. c. 1902, p. 226.  
**Kuthyi** Friv. Term. Füzet. VII, 1888, p. 18.  
**formosus** Rybinski [non Faust], Rozpr. Ak. Krak. XLIII, 1902, p. 12, t. 3, f. 3. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XXI, 1902, p. 126, 136. — Schultze, l. c. 1902, p. 226.  
**canescens** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 299; l. c. 1902, p. 219; l. c. 1903, p. 289.  
**capillatus** Schultze, Abeille XXIX, 1899, p. 263. — Tyl, Ent. Blätt. X, 1914, p. 5.  
**capucinus** Schultze, Horae Soc. Ent. Ross. XXXVI, 1902, p. 78; Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 224; 1903, p. 252.  
**carinatus** Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 559; l. c. VIII, 2, 1845, p. 168. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 170. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 225. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 168. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gall.-Rh. 1924, p. 109, 284.  
**melanocyaneus** Bohem. in Schönh. Gen. Sp. Curc. VIII, 2, 1845, p. 166. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 225.  
**Biologie**: Houard, Zoocécid. Eur. I, 1908, p. 443 (Cécidie). — J. Ste Claire Deville, Abeille XXXI, 1909, p. 143. — Hust. l. c. p. 285.
- Transsylvanie,  
Hongrie,  
Turquie  
Hongrie,  
Galicie
- Syrie
- Tunisie: Sfax
- Transcau-  
casie
- France,  
Allemagne,  
Autriche,  
Hongrie,  
Balkan,  
Russie mér.,  
Caucase,  
Algérie

- carinicollis** Ch. Bris. Abeille V, 1869, p. 457. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 257, 259, 260; l. c. 1902, p. 221.
- carinifrons** Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 507; l. c. VIII, 2, 1845, p. 147.
- carinulatus** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 177 (subg. *Nedyus*). — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 220.
- carniolicus** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 287; 1902, p. 223.
- Caroli** Desbr. Frelon V, 1895—96, nr. 4, 1896, p. 49. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 224.
- Biologie: Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. 1926, p. 375.
- caucasicus** Kirsch, Verh. Nat. Ver. Brünn XVII, 1877 (1878), p. 455; in Schneider et Leder, Beitr. Kenntn. kaukas. Käferf. 1870, p. 302. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 257, 259, 260 nota (*Ceuthorhynchidius*); l. c. 1902, p. 216 (*Ceuthorhynchus*).
- chalybaeus** Germ. Ins. sp. nov. I, 1824, p. 237. — Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 560; l. c. VIII, 2, 1845, p. 168. — Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 380; l. c. ed. 2, 1858, p. 797; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 339. — Bach, Käferf. II, 1854, p. 344, 349. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 589. — G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 275; l. c. X, 1868, p. 201, 202. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 166; (1887), p. 335. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 342. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 631; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 703. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1894), p. 383. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 417, 419, 422; l. c. 1898, p. 167; l. c. 1902, p. 226; l. c. 1903, p. 290. — Kolbe, Ent. Nachr. XXVI, 1900, p. 231. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 546, 547. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 676 (subg. *Nedyus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 997. — Edwards, Ent. Monthl. Mag. I, 1914, p. 30—33. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 174, t. 162, f. 10 (subg. *Marklissus*). — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 122, 126. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gall.-Rh. 1924, p. 102, 273.
- Thomsoni** Kolbe, Ent. Nachr. XXVI, 1900, p. 232.
- var. *aeneomicans* Pie, Echange XXIX, 1913, p. 105.
- Biologie: Bauduer, Ann. Soc. Ent. Fr. 1871, Bull. p. XXXIX. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXIII, 1876 (1877), p. 248; Larves Col. 1877, p. 408. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 317; l. c. XIX, 1887, Coleopterorum Catalogus 113.
- Syrie
- „
- Sibérie: Chabarowsk; Japon
- Carniole, Transsylvanie
- Algérie: Oran, Aïn-Sefra
- Russie mér., Samara, Kazan, Jaroslaw, Irkutsk, Turkestan, Caucase, Algérie
- Allemagne

p. 18. — Kolbe, Ent. Nachr. XXVI, 1900, p. 229. — Goury et Guignon, Feuill. Jeun. Natur. XXXVII, 1906—07 (1907), nr. 438, p. 115; nr. 442, p. 210. — Houard, Zoocéid. Eur. I, 1908, p. 447 (Cécidie). — Bourgeois, Mitteil. Nat. Ges. Colmar (n. s.) IX, 1907—08 (1908), p. 178. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 262. — Hust. l. c. p. 274.

**changaicus** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 258 (♂); l. c. 1902, p. 220; l. c. 1903, p. 289.

**chlorophanus** Rouget, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) V, 1857, p. 752; Mém. Acad. Sc. Dijon VI, 1858, p. 28; Catalog. p. 179 nota. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 322, 332. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 167; (1887), p. 335. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 166; l. c. 1902, p. 226; l. c. 1903, p. 290. — Kaufmann, Rovart. Lapok XVII, 1910, p. 69. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gall.-Rh. 1924, p. 104, 298.  
Biologie: Rouget, l. c. — Goury et Guignon, Feuill. Jeun. Nat. XXXVII, 1907, p. 30. — Hust. l. c. p. 298.

**Chobauti** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 105 (♀); l. c. 1902, p. 223. — Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1924, p. 65 [correction].

**chrysanthemi** Germ. Ins. Sp. nov. I, 1824, p. 221. — Gyl. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 596 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. Sp. Cure. IV, 1, 1837, p. 526 (*Ceuthorhynchus*); l. c. VIII, 2, 1845, p. 153. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1891, p. 36 (subg. *Nedyus*); Man. Brit. Col. 1839, p. 222. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1835), p. 101 (*Rhynchaenus*). — Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 384; l. c. ed. 2, 1858, p. 804; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 345. — Bach, Käferf. II, 1854, p. 347. — Crotch, Entomol. III, 1864—65 (1865), nr. 18, p. 260. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 174 (subg. *Nedyus*); (1887), p. 327. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 345, 348, Tab.; l. c. VI, 1893, p. 314. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 629; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 701. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1894), p. 381. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 267; l. c. 1898, p. 165; l. c. 1902, p. 217. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 545. — Everts, Col. Neerl. III, 1903, p. 689 (subg. *Nedyus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 995, fig. 302e. — Tyl, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 122, fig. 9. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 162. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 171. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 114, 189.

*rugulosus* var. c Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1817, p. 232 (*Rhynchaenus*).

var. *Escherichi* Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 165, nota; l. c. 1902, p. 217.

Mongolie  
sept., Mts. de  
Shanghai

France,  
Thuringe,  
Autriche,  
Hongrie,  
Italie sept.,  
Balkans

Algérie mér.:  
Ghardaia

Europe,  
Algérie

Angora

- var. sartus* Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXIII, 1888, p. 169. — Schultze, l. c. 1902, p. 217. Caucasie,  
Turkestan
- var. rubiginosus* Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 280; l. c. 1902, p. 217; l. c. 1903, p. 289. — Hust. l. c. p. 190. Europe mér.,  
Tunisie,  
Algérie
- Biologie: Penecke, Wien. Ent. Zeit. XLIII, 1926, p. 29.
- einapis* Desbr. Frelon III, 1893—94, nr. 4 (1893), p. 5. Tunis:  
Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 214 (*sinapis*); 1903, p. 288. Teniet-el-  
Haad
- var. defensibilis* Pic, Echange XXI, 1905, p. 131. Chypre,  
Italie:  
Biologie: Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. 1915, p. 55. Abruzzes,  
Caucase
- cineritius* Hochh. Bull. Soc. Moscou XXIV, 1851, I, p. 99. Russie mérid.
- cingulatus* Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 274; l. c. 1902, p. 214. Espagne mér.,  
Algerie,  
Crimée
- Biologie: Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. 1911, p. 305.
- cinnamomeus* Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 319 (♀); Wiss. Mittheil. Bosnien V, 1897, p. 498; Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 60; 1902, p. 216. Sicile,  
Syrie,  
Roumélie or.
- circassicus* Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 46; l. c. 1902, p. 218. Caucase
- clunicularis* Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 277 (♂); l. c. 1902, p. 225. — Porta, Riv. Col. Ital. III, 1905, p. 28 (♂). — Vitale, Natural. Sicil. XVIII, 1906, p. 82. Sicile:  
Passo Budia
- cunicularis* [err.] Heyd. Reitt. Weise, Cat. Col. Eur. ed. 2, 1906, sp. 330.
- coarctatus* Gyll. in Schönh. Gen. et Spec. Curc. IV, 1, 1837, p. 573; l. c. VIII, 2, 1845, p. 170. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 172; (1887), p. 338. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 224. — Reitt. Fauna Germ. V, 1916, p. 166. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rhén. 1924, p. 111, 257. — Auv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 122, 126. Europe centr.  
et mérid.,  
Suède,  
Turkestan or.
- granulicollis* Thoms. (non Schönh.) Skand. Col. VIII, 1865, p. 268; l. c. X, 1868, p. 200, 202. — Aurivill. l. c. p. 126.
- cochleariae* Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 144 (*Rhynchaenus*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 29 (*Nedyus*); Man. Brit. Col. 1839, p. 220. — C. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834—1839 (1835), p. 60 (*Rhynchaenus*). — Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 489 (*Ceuthorrhynchus*); l. c. VIII, 2, 1845, p. 140. — Bach, Käferf. II, 1854, p. 345, 352. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 799; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 350. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, p. 255. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 541. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 176; (1887), p. 386. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 342, 346 tab.; l. c. VI, 1913, p. 313. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 629; Fn. Europe

*Transsylv.* 1888—91 (1891), p. 701. — Stierl. Fn. Col. Helv. II, 1886—98 (1894), p. 379. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 548, 547. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 220. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 690. — Kuhnt, III. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 994. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 169. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 176. — Hust. Miscell. Rev. Ceuthorh. Gallo-Rh. 1924, p. 119, 254. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 121, 125.

*floriger* Geoff. in Fourcr. Ent. Paris I, 1785, p. 123 (*Curculio*).

? *subglobosus* Gmel. in L. Syst. Nat. ed. XIII, 1, 4, 1789, p. 1805 (*Curculio*).

*floralis* Ol. Encycl. Méth. V, 1790, p. 497 (*Curculio*).

*atratus* Gyll. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 580 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. Sp. Cure. IV, 1, 1837, p. 488 (*Ceuthorrhynchus*); l. c. VIII, 2, 1845, p. 139. — C. R. Sahib. Ins. Fenn. II, 1884—89 (1885), p. 68 (*Rhynchaenus*). — Bach, Käferfn. III, 1852—54 (1854), p. 345. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 806; ed. 3, II, 1874, p. 348. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 541. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 269; X, 1868, p. 200, 202. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 220.

*austerus* Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Cure. IV, 1, 1837, p. 481; l. c. VIII, 2, 1845, p. 184.

var. *filirostris* Reitt. Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 271 (*Rhytidosomus*). — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 115 (*Ceuthorrhynchus*). — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 220; l. c. 1903, p. 289, 293.

*vaneticus* Schultze, l. c. 1898, p. 255 (♀); 1902, p. 220.

var. *monticola* Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 293; 1902, p. 220.

**Biologie:** Mathieu, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 291. — Kaltenbach, Pflanzenf. 1874, p. 35. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXIII, 1876 (1877), p. 248; Larves Col. 1877, p. 408. — Bangagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 317; l. c. XIX, 1887, p. 18. — Goury et Guignon, Feuill. Jeun. Natur. XXXVII, 1906—07, nr. 433, 1906, p. 14; nr. 441, 1907, p. 181. — Bourgeois, Mitteil. Nat. Ges. Colmar (n. s.) IX, 1907—08 (1908), p. 174. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 262. — Hust. l. c. p. 255.

*coelodoides* Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 165 (subg. *Oprohinus*).

*coeruleascens* Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Cure. IV, 1, 1837, p. 487; l. c. VIII, 2, 1845, p. 138. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 167; l. c. 1902, p. 226. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 172 (subg. *Marklissus*). — Hust.

Caucase

Espagne:  
Valence

Europe centr.  
et mérid.,  
Brandebourg,  
Algérie

- Miscell. Rev. Ceuthor. Gallo-Rh. 1924, p. 102, 279.*
- ? *erysimi* Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 484; Ent. V, nr. 83, p. 188, t. 29, f. 438. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 183.
- Biologie:** Houard, Zoocédies Eur. I, 1908, p. 443 (Cécidie).
- cognatus** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 317; I. c. 1902, p. 215. — Tyl, Ent. Blätt. X, 1914, p. 6. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 60 (subg. *Hadropontus*).
- confusus** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 263, 291.
- consanguineus** Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 423, t. 13, f. 23.
- conspinosus** Germ. Ins. Sp. nov. I, 1824, p. 282; in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 502; I. c. VIII, 2, 1845, p. 135. — Bach, Käferf. II, 1854, p. 345, 353. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 541. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 2, II, 1874, p. 806. — Bedel, Fn. Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1887), p. 331. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 418; I. c. 1896, p. 183. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 268; I. c. 1902, p. 222; I. c. 1903, p. 289. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 689. — Vitale, Natural. Sicil. XX, 1908, p. 76. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 165 (subg. *Oprohinus*). — Hust. Miscell. Rev. Ceuthorh. Gallo-Rh. 1924, p. 117, 216.
- aegrotus** Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. VI, 1, 1837, p. 483; VIII, 2, 1845, p. 135.
- alboscutellatus** Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 478; I. c. VIII, 2, 1845, p. 132. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 348. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 222.
- rubescens** Bohem. in Schönh. Gen. Sp. Curc. VIII, 2, 1845, p. 136. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 541. — Redt. Fn. Austr. 1858, p. 806. — Stierl. Fn. Helv. 1894, p. 379. — Schultze, I. c. 1902, p. 222. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 993.
- erythropterus** Stierl. Mitteil. Schweiz. Ent. Ges. IX, 3, 1894, p. 120. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 289.
- Biologie:** Hust, I. c. p. 217. — H. Wagn. Col. Centralbl. III, 1928—29 (1929) p. 246.
- constrictus** Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 258 (*Curculio*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 30 (*Nedyus*); Man. Brit. Col. 1839, p. 220. — Bohem. in Schönh. Gen. Sp. Curc. VIII, 2, 1845, p. 141. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 348. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 171; (1887), p. 388. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 342; VII, 1913, p. 313. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1891, p. 630; Fn. Transsylv. 1891, p. 702. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 1894), p. 382. —
- Siebenbürgen,  
Caucase
- Caucase,  
Egypte  
Etats-Unis
- Europe centr.  
et mérid.
- France
- Dalmatie
- Europe centr.

Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 220.  
 — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 685. —  
 Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p.  
 996. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 166. —  
 Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 175. —  
 Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p.  
 111, 255.

**Biologie:** Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (n.  
 s.) XIII, 1876 (1877), p. 248; Larves Col. 1877,  
 p. 408. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII,  
 1885, p. 318; XIX, 1887, p. 408. — Goury et  
 Guignon, Feuille Jeun. Nat. XXXVII, 1907,  
 p. 114. — Bourgeois, Mitteil. Nat. Ges. Colmar  
 IX, 1908, p. 174. — Kleine, Ent. Blätt. VI,  
 1910, p. 263. — Houard, Zoocécid. Eur. III,  
 1913, p. 1352. — Urban, Ent. Blätt. 1918,  
 p. 130. — Penecke, Wien. Ent. Zeit. XXXIX,  
 1922, p. 187. — Bedel, l. c. VI bis, 1924, p. 99.  
 — Hust. l. c. p. 255.

**contractus** Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 250 (*Curcu-*  
*lio*). — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1818, p. 143  
*(Rhynchaenus)*; l. c. I, 4, 1827, p. 578; in  
 Schönh. Gen. Sp. Cucr. IV, 1, 1837, p. 448  
*(Ceuthorrhynchus)*; l. c. VIII, 2, 1845, p. 188.  
 — Zett. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 334  
*(Rhynchaenus)*; Ins. Lapp. I, 1838 (1840), p.  
 182. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV,  
 1831, p. 29 (subg. *Nedyus*); Man. Brit. Col.  
 1839, p. 220. — C. Sahlberg, Ins. Fenn. II,  
 1834—39 (1835), p. 55 (*Rhynchaenus*). —  
 Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 381; l. c. ed. 2,  
 1858, p. 800; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 342. —  
 Bach, Käferf. II, 1854, p. 345, 353. — Gutfl.  
 & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 542. — C. G.  
 Thomson, Skand. Col. VII, 1865, p. 273; l. c.  
 X, 1868, p. 200, 202. — Weise, Deutsche Ent.  
 Zeitschr. XXVII, 1888, p. 322, 330. — Bedel,  
 Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 176;  
 (1887), p. 326. — Fowler, Col. Brit. Isl. V,  
 1891, p. 342, 348. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2,  
 1887—91 (1891), p. 632; Fn. Transsylv. 1888—  
 1891 (1891), p. 704. — Stierl. Fn. Col. Helvet.  
 II, 1886—98 (1894), p. 384. — Lameere, Man.  
 Fn. Belg. II, 1900, p. 543, 547. — Schultze,  
 Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 225. —  
 Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 690. — Kuhnt,  
 Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 997. —  
 Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 171 (subg.  
*Marklissus*). — Hansen, Danmarks Fn. IV,  
 1918, p. 180. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924,  
 p. 122, 126. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth.  
 Gallo-Rh. 1924, p. 119, 289.

var. *pallipes* Crotch, Entomol. III, 1866—67,  
 nr. 33, 1866, p. 133. — Smith, Ent. Month.  
 Mag. XI, p. 18; Term. Füzet. p. 256. — Fowler,  
 Col. Brit. Isl. V, 1891.

var. *lunariae* (Deville) Hust. l. c. p. 289.

**Biologie:** Kirby & Spence, Intr. Ent. I, 1843,  
 p. 495; I, 1828, p. 188; People Ed. 1867,  
 p. 104. — Chapuis et Candèze, Cat. Larv. Col.

Europe

Lundy Island

1853, p. 222. — Laboulbène, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) IV, 1856, p. 145—168, t. 4, f. 1—11. — Curtis, Farm Ins. 1860, p. 106. — Cordaux, Entom. V, 1870—71, nr. 76, 1870, p. 60—61. — Frauenfeld, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXII, 1872, p. 394—395. — Girard, Traité élém. d'Ent. I, 1873, p. 688. — Kaltenbach, Pflanzenf. 1874, p. 37. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXIII, 1876—77 (1877), p. 249; Larves Col. 1877, p. 409. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 317; l. c. XIX, 1887, p. 18. — Focken, Rev. Biolog. II, 1890, p. 261—269; l. c. III, 1891, p. 37—38. — Kieffer, Feuill. Jeun. Nat. XXII, 1891—92, p. 56. — Hering, Deutsche Ent. Zeitschr. 1921, p. 138. — Kolbe, Ent. Nachr. XXVI, 1900, p. 229. — Darboux, Bull. Soc. Ent. Fr. 1902, p. 178—179. — Goury et Guignon, Feuill. Jeun. Nat. XXXVII, 1907, p. 112, 182, 212. — Houard, Zoocédies Eur. I, 1908, p. 445, 451, 458, 465. — Bourgeois, Mitteil. Nat. Ges. Colmar (n. s.) IX, 1907—08 (1908), p. 178. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 264. — Reh in Sorauer, Pflanzenkrankh. III, 1906 — 18 (1918), p. 563. — Hust. l. c. p. 289.

**convexicollis** Lec. et Horn, Rhynchoph. N. Amer. 1876, p. 276. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 443, t. 14, f. 30a, 31c.

var. *a to m u s* Dietz, l. c. p. 444.

**Coquereli** Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXVIII, 1919 (1920), p. 341.

**costatus** Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV, 1916, p. 131, 189.

**crassidentatus** Marshall in Waterh. Cat. Brit. Col. 1861, p. 80 (s. deser.). — Rye, Ent. Monthly Mag. X, 1873, p. 18.

**cribricollis** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 278 (♂), 291.

**crucifer** Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 210, t. 23, f. 319 (*Rhynchaenus*). — C. Sahlberg, Ins. Fenn. II, 1834—39 (1835), p. 94 (*Rhynchaenus*). — Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Cure. IV, 1, 1837, p. 511 (*Ceuthorrhynchus*); l. c. VIII, 2, 1845, p. 148. — Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 384; l. c. ed. 2, 1858, p. 804; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 345. — Bach, Käferf. II, 1854, p. 347, 366. — Gutfl. Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 546. — C. Thomson, Skand. Col. VII, 1865, p. 263; l. c. X, 1868, p. 200. — Stierl. Fn. Col. Helvet. 1886—98 (1894), p. 377. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 545. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 214. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 689 (subg. *Nedyus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 992, t. 301 d. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 156, t. 161, f. 17 (subg. *Hadropontus*). — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 158. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 119, 123.

**cruciiger** Herbst in Füessly, Arch. IV—V, 1784—85, p. 73, t. 24, f. 15 (*Curculio*); Natur-

Etats-Unis

Madagascar

Japon

Angleterre

Herzégovine

Europe.

Maroc.

Algérie

- syst. Käf. VI, 1795, p. 394, t. 91, f. 4. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. XIII, 4, 1790, p. 1754. — Ol. Encycl. Méth. V, 1790, p. 498. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 172; (1887), p. 825 (subg. *Nedyus*). — Vitale, Natural. Sicil. XVIII, 1905, p. 81. — Hust. Miscell. Rev. Ceuthorh. Gallo-Rh. 1924, p. 112, 153.
- quadrimaculatus* Germ. Ins. sp. nov. I, 1824, p. 220.
- tramaculatus* Payk. Monogr. Curc. Suec. 1792, p. 26; Fn. Suec. III, 1800, p. 209 nota. — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1818, p. 219; I, 4, 1827, p. 592.
- cruciger* var. 3 Hbst. Natursyst. Ins. Käf. VI, 1795, p. 394.
- Biologie:** Mathieu, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 233. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1868, p. 61. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 317; l. c. XIX, 1887, p. 18. — Bourgeois, Mitteil. Nat. Sc. Colmar (n. s.) IX, 1907—08 (1908), p. 169. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 261. — Hust. l. c. p. 153. — Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. 1911, p. 305; 1926, p. 375.
- cupidus** Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXIX, 1895, p. 106. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 291. Irkutsk
- curticornis** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 28 (♀); l. c. 1902, p. 224. Algérie
- curtulus** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 276 (♀); l. c. 1902, p. 223. Espagne mér.
- curvirostris** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, ♀ p. 240 (♂); l. c. 1902, p. 220. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 119, 256. Autriche, Italie, France
- var. *dolphinensis* Hust. Bull. Soc. Ent. Fr. 1914, p. 113; Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 256. Alpes franç.
- Biologie:** Hustache, l. c. p. 256.
- curvistriatus** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 315; l. c. 1902, p. 215; Wiss. Mittheil. Bosnien V, 1897, p. 496. — Kuhnt, Ill. Best. Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 993. Bosnie, Styrie, Munich
- pollicarius** Schultze, l. c. 1898, p. 244; 1902, p. 215.
- cyanescens** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 278; l. c. 1902, p. 224. Algérie: Teniet-el-Haad
- damascenus** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 40 (♀); l. c. 1902, p. 225. Syrie: Damas
- debilis** Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, 1866, p. 442. Ceylan
- decipiens** Lec. in Lec. et Horn, Rhynchoph. 1876, p. 275. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 430. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. 1916, p. 445. Etats-Unis
- decoratus** Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 524; l. c. VIII, 2, 1845, p. 153. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 257 (subg. Russie, Caucase

*Thamiocolus*; l. c. 1896, p. 162; l. c. 1902, p. 213.

**Decorsei** Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXVIII, 1919 (1920), p. 342.

**dentatoserratus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 58. *zu Zecotinus?*

**denticulatus** Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, p. 107 (*Curculio*). — Geoffroy in Fourer. Ent. Paris. I, 1785, p. 107. — Ol. Encycl. Méth. V, 1790, p. 496 (*Curculio*); Ent. V, 1807, nr. 83, p. 136, t. 23, f. 329 (*Rhynchaenus*). — Ill. Mag. Ins. VI, 1807, p. 330. — Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 541 (*Ceuthorrhynchus*); l. c. VIII, 2, 1845, p. 157. — Bach, Käferf. II, 1854, p. 346, 360. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 801; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 343. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 544. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 699. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1894), p. 378. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 57; l. c. 1902, p. 217. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 993, fig. 296c. — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 163, t. 161, f. 22 (subg. *Hadropontus*). — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 106, 199.

**dentatus** Panz. Fn. Ins. Germ. V, 1798, t. 13 (*Curculio*). — Bedel, Fn. Bass. Seine VII, 1882—88 (1885), p. 169; (1887), p. 332. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 217. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 681. — Hust. l. c. p. 199.

**striatodenticulatus** Gemm. et Har. Cat. Col. VIII, 1871, p. 2609 (nec Goeze). — Bedel, l. c. p. 332.

**biguttatus** Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 383 (nec Bohem. 1845).

**contusus** Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon IV, 1857, p. 145. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 217.

**var. undulatus** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 58; 1902, p. 217 (s. descr.).

**deplanatus** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 110; l. c. 1902, p. 225.

**Devillei** Hust. Bull. Soc. Ent. Fr. 1912, p. 409 (subg. *Thamiocolus*); l. c. 1914, p. 116; Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 116, 148.

Biologie: Hust. l. c. p. 143.

**Dieckii** H. Bris. in Heyden, Ent. Reis. Span. 1870, p. 159. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 191; l. c. 1902, p. 215, l. c. 1903, p. 288.

**Paganettii** (Stierl. in litt.) Schultze, l. c. 1902, p. 224; 1903, p. 290.

**Dietzi** Hust. Miscell. Ent. XXVI, 1922, p. 19.

**intermedius** Dietz (nec Bris.), Trans. Amer.

Madagascar

Caucase;  
Mt. Alexan-  
dre  
Europe centr.  
et mérid.

Caucase

Turkestan or.,  
Liban

France:  
Sud-est

Sud de l'Eu-  
rope,  
Espagne  
mér., Corfou,  
Grèce,  
Roumélie,  
Dalmatie,  
Trieste  
Etats-Unis

- Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 438. — Blatchl. & Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 449.  
**difficilis** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 237; l. c. 1902, p. 221.  
**diffusus** Hust. nom. nov.  
*difficilis* Hust. (neé Schultze 1898) Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV, 1916, p. 142.  
**dimidiatus** Friv. Magyar. Faun. Ung. Acad. 1865, p. 217, t. 12, f. 8; (Berl. Ent. Zeitschr. XII, 1868, p. 59) — Heyden, Berl. Ent. Zeitschr. XIII, 1869, p. 59. — Marseul, Abeille XII, 1875, p. 357 (traduction). — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 481; l. c. 1902, p. 214. — Semenov, Rev. Russe d'Ent. II, 1902, p. 37. — Daniel, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 125. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 156 (subg. *Hadroplontus*).  
**Biologie**: Marseul, Abeille XII, 1875, p. 357. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 19; l. c. XIX, 1887, p. 19. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 261. — Penecke, Wien. Ent. Zeit. XXXIX, 1922, p. 187.  
**distans** Hust. Bull. Soc. Ent. Fr. 1930, p. 79.  
**distinctepubens** Pic, Echange XXIV, 1908, p. 34.  
**distinctus** Ch. Bris. Abeille VII, 1870, p. 42. — Rye, Ent. Monthly Mag. VI, 1870, p. 229. — Mars. Abeille VII, p. 42. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 178; (1887), p. 330. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 364. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 261, 263; l. c. 1902, p. 218. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 98, 213.  
**disturbatus** Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 428.  
**Doderoi** Hust. Ann. Mus. Civ. Genova XXXXVIII, 1918, p. 74.  
**Dohrni** Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 189 (*Stenocarus*); Horae Soc. Ent. Ross. 1886, p. 151. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 57 (*Coeliodes*); l. c. 1902, p. 217 (*Ceuthorrhynchus*).  
**dubius** Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 116 (♂). — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 267; l. c. 1902, p. 219.  
**Duvali** Ch. Bris. Abeille V, 1869, p. 448. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 219. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 109, 219.  
**Biologie**: Hust. l. c. p. 219.  
**echinatus** Fall, Canad. Ent. XLIX, 1917, p. 386.  
**edentulus** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 271; l. c. 1901, p. 58; l. c. 1902, p. 216. — Tyl, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 122. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 162 (subg. *Hadroplontus*).  
**effrons** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 137 (♀) (*Ceuthorhynchidius*). — Schultze, l. c. 1896, p. 257; l. c. 1902, p. 223 (*Ceuthorhynchus*). — Heyden, Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 47.  
Asie mineure,  
Angora  
Japon  
Autriche,  
Hongrie,  
Elbourz  
Afrique or.  
Syrie  
France,  
Rhénanie,  
Russie mér.  
Etats-Unis  
Sardaigne  
Turkestan  
Hongrie,  
Russie mér.,  
Caucase  
France mér.,  
Italie,  
Grèce,  
Caucase,  
Perse  
Etats-Unis  
Hongrie,  
Volhynie,  
Russie  
Russie or.,  
Caucase,  
Turkestan

- rinderae* Becker, Bull. Soc. Nat. Moscou XXXVII, 1865, p. 481. — Schultze, l. c. 1902, p. 223.
- flavitarsis* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1890, p. 163. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 223.
- var. *pictaris* Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 96; l. c. 1902, p. 223.
- elegantulus* Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1887, p. 302. — Schultze, l. c. 1902, p. 221.
- var. *gracilis* Schultze, l. c. 1902, p. 221 (s. descr.).
- erivanus* Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 238; l. c. 1902, p. 221.
- var. *coniensis* Schultze, l. c. 1902, p. 221 (s. descr.).
- erysimi* F. Mant. Ins. I, 1787, p. 101 (*Curculio*); Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 410; Syst. El. II, 1801, p. 452 (*Rhynchaenus*). — Vill. Ent. Linn. IV, 1789, p. 286 (*Curculio*). — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1743. — Payk. Monogr. Cure. Suec. 1792, p. 76; Fn. Suec. III, 1800, p. 265. — Panz. Fn. Ins. Germ. XVII, 1794, t. 7; Ent. Germ. 1795, p. 304. — Walck. Fn. Paris. I, 1802, p. 246. — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 142 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. Sp. Curr. IV, 1, 1837, p. 486 (*Ceuthorrhynchus*); l. c. VIII, 2, 1845, p. 137. — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 324 (*Rhynchaenus*); Ins. Lapp. I, 1838 (1840), p. 182. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1881, p. 28 (subg. *Nedyus*); Man. Brit. Col. 1839, p. 223. — Ménétr. Cat. rais. 1832, p. 223. — C. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1894—39 (1835), p. 58 (*Rhynchaenus*). — Falderm. Fn. Ent. Transcauc. III, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou VI, 1838, p. 205. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 359. — Blanchard, Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 124. — Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 379; l. c. ed. 2, 1858, p. 797; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 340. — Bach, Käferf. II, 1854, p. 345. — J. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68, t. 26, f. 125. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 539. — C. Thoms. Skand. Col. VII, 1685, p. 273; l. c. X, 1868, p. 200. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 322; l. c. 1896, p. 183. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 176; (1887), p. 336. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 342, 347. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 632; Fn. Transsylyv. 1888—91 (1891), p. 704. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1894), p. 384. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 167; l. c. 1902, p. 225. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 546. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 690. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 997. — H. Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1916), p. 1133. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 171, t. 162, f. 8. — Hansen,
- Sarepta
- Arax
- Egypte:  
Le Caire,  
Buchara  
Caucase
- Algérie,  
Espagne mér.  
Transcaucasie,  
Erivan
- Asie mineure:  
Konia
- Europe,  
Algérie,  
Asie mineure,  
Sibérie

Danmarks Fn. IV, 1918, p. 180. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 122, 126. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 119, 288.

var. *chloropterus* Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 29 (subg. *Nedyus*); Man. Brit. Col. 1839, p. 219. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 328. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 342. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 225. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 997. — Wagner in Calwer, Käferbuch, ed. 6, 1907—16 (1916), p. 1133. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 171. — Hust. l. c. p. 288.

var. *cyaneus* Weise, l. c. 1883, p. 329. — Schultze, l. c. 1902, p. 225. — Kuhnt, l. c. 1912, p. 997. — Wagner in Calwer, l. c. p. 113. — Reitt. l. c. 1916, p. 171. — Hust. l. c. p. 288.

var. *subniger* Gerhardt, Zeitschr. Ent. (Breslau) (n. F.) XXVII, 1902, p. 22. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 997. — Wagner in Calwer, Käferb. ed. VI, 1907—18 (1918), p. 1133. — Hust. l. c. p. 289.

var. *viridicollis* Schultze, l. c. 1903, p. 294; l. c. 1902, p. 225. — Hust. l. c. p. 289.

var. *espaldensis* Schultze, l. c. 1903, p. 294; l. c. 1902, p. 225. — Hust. l. c. p. 289.

**Biologie**: Zetterstedt, Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 342; Fn. Lapp. I, 1838 (1840), col. 182. — J. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68, p. 61. — Brischke, Schrift. Naturf. Ges. Danzig (n. F.) V, 1881, p. 239. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVIII, 1885, p. 319; l. c. XIX, 1887, p. 19. — Goury et Guignon, Feuill. Jeun. Nat. XXXVII, 1907, p. 15, 29, 31, 114, 179, 210. — Hust. l. c. p. 189.

**erythropus** Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 450. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 453.

**euphorbiae** Ch. Bris. in Wencker, Cat. Col. Alsace 1866, p. 182. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 343. — Mars. Abeille IV, 1867, p. LII. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 172 (subg. *Nedyus*); (1887), p. 326. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 344. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 629; Fn. Transsylyv. 1888—91 (1891), p. 701. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1894), p. 380. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 164; l. c. 1902, p. 215. — Lokay, Casop. Spol. Ent. IV, 1907, p. 22. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 686 (subg. *Nedyus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 994. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 160 (subg. *Hadroplontus*). — Wagner, Ent. Mitt. IX, p. 178, fig. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 159. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 111, 174.

Silesie

Algérie

"

Etats-Unis

Allemagne,  
Autriche,  
France,  
Angleterre,  
Hollande

- crux* Walton in Waterh. Cat. Brit. Col. 1861, p. 80 (s. descr.). — Crotch, Entomol. II, 1864—65, nr. 18, 1865, p. 260.
- Biologie*: Hust. Bull. Soc. Ent. Fr. 1921, p. 180; Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 178.
- fabrilis* Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVIII, 1887, p. 301. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 221.
- faeculentus* Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Cura. IV, 1, 1837, p. 545; l. c. VIII, 2, 1845, p. 162. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 170; (1887), p. 334. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 219. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 683. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 168. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 109, 231.
- inclemens* Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XX, 1888, p. 170. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 219. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 168.
- Fairmairei* Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. 1860, Bull. p. XXXIII. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 266; l. c. 1902, p. 214. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 106, 111, 177.
- Falcozi* Hust. Bull. Soc. Ent. Fr. 1914, p. 382 (♂). — Hust. l. c. p. 177; l. c. 1930, p. 195.
- farsiliarum* Peyerh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1930, p. 205.
- fatidicus* Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Cura. IV, 1, 1837, p. 510; l. c. VIII, 2, 1845, p. 148. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 218.
- Fausti* Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883, p. 119 (♀). — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 214.
- fennicus* Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1894 (1895), p. 361. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 291.
- Gyllehalii* Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXIX, 1895, p. 105.
- sparusatus* Schultze, Abeille XXIX, 1899, p. 267; Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 218; 1903, p. 289.
- albonebulosus* Hansen, Ent. Medd. XII, 1916—17 (1917), p. 352; Danmarks Fn. IV, 1918, p. 165. (*fennicus* Fst. Hans. in litt.).
- Ferrarii* Ch. Bris. Abeille V, 1869, p. 447. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 224.
- figuratus* Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Cura. IV, 1, 1837, p. 526; l. c. VIII, 2, 1845, p. 153. — Bach, Käferf. II, 1854, p. 347, 365. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 546. — Redt. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 808. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 267; l. c. 1898, p. 165; l. c. 1902, p. 217; l. c. 1903, p. 289 (esp. pr.). — Tyl, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 122, fig. 8.

Angleterre

Caucase,  
Altai,  
Turkestan,  
Steppes de  
KirgiseAllemagne,  
Autriche,  
Hongrie,  
Balkans,  
Caucase,  
Sibérie,  
France

Ussuri

Alpes franç.,  
Tyrol,  
AppeninsHautes Alpes:  
Dévoluy  
Maroc:  
Hoggar  
Caucase

Baikal

Finlande,  
Hongrie,  
Caucase,  
Russie mér.

Danmark

Syrie

Russie centr.  
et orient.,  
Suède

|                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| <i>var. sartus</i>     | Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXII, 1888, p. 169, 196. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 217.   | Caucase  |
| <i>flavicornis</i>     | Hust. Bull. Soc. Ent. Fr. 1914, p. 112; Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 117, 290.   | Pyrén. franç.                                      |
| <i>flavomarginatus</i> | Lucas, Expl. sc. Algérie, Col. 1846, p. 456, t. 38, f. 7 a—d. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 224. — Fuente, Bol. Soc. Espan. Hist. Nat. IV, 1904, p. 381—390.<br>Biologie: Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. 1911, p. 306; 1915, p. 56.  | Algérie,<br>Espagne                                |
| <i>flexirostris</i>    | Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 112; l. c. 1902, p. 224.<br>Biologie: Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. 1911, p. 307.   | Algérie:<br>Biskra                                 |
| <i>floridanus</i>      | Blatchley & Leng, Rhynch. 1916, p. 452.   | Floride  |
| <i>formosus</i>        | Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 195<br>(♂); Horae Soc. Ent. Ross. XX, 1886, p. 151.<br>— Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 219; l. c. 1903, p. 288.  | Turkestan,<br>Taschkent                            |
| <i>torticornis</i>     | Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 34 (♀); l. c. 1902, p. 224.  | Syrie  |
| <i>frater</i>          | Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 111 (♀), p. 289; l. c. 1902, p. 221.<br>Biologie: Peyerimh., Ann. Soc. Ent. Fr. 1915, p. 56.   | Algérie  |
| <i>Frivaldszkyi</i>    | Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 291.<br><i>Brisouti</i> Friv. Termesz. Füzet. 1888, p. 163 [nec Faust 1888]. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 216.   | Hongrie,<br>Caucase                                |
| <i>fulvipes</i>        | Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 427, 289; l. c. 1902, p. 224.<br>Biologie: Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. 1911, p. 307.  | Espagne,<br>Algérie,<br>Maroc                      |
| <i>fulvitarsis</i>     | H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 336. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 219; l. c. 1903, p. 289. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 118, 235.<br>Biologie: Hust. l. c. p. 235.  | France mér.,<br>Italie mér.,<br>Sicile,<br>Algérie |
| <i>floralis</i>        | Payk. Monogr. Cire. 1792, p. 73 ( <i>Curculio</i> ); Fn. Suec. III, 1800, p. 266. — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 408 ( <i>Curculio</i> ); Syst. El. II, 1801, p. 450 ( <i>Rhynchaenus</i> ). — Herbst, Käf. VI, 1795, p. 448. — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 145 ( <i>Rhynchaenus</i> ); in Schönh. Gen. Sp. Cire. IV, 1, 1837, p. 498 ( <i>Ceuthorrhynchus</i> ); l. c. VIII, 2, 1845, p. 141. — Germ. Ins. Sp. nov. I, 1824, nr. 18, p. 220; Stett. Ent. Zeit. III, 1842, p. 109. — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 325 ( <i>Rhynchaenus</i> ); Ins. Lapp. I, 1838, p. 182. — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1835, p. 60 ( <i>Rhynchaenus</i> ). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 30 ( <i>Nedyus</i> ). — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 382; ed. 2, 1858, p. 801; ed. 3, II, 1874, p. 350. — Bach, Käferfn. III, 1854, p. 355. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68, t. 27, f. 128. — Gutfl. & Bose, | Europe   |

Käf. Deutschl. 1859, p. 543. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 255; X, 1868, p. 144. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 176; (1887), p. 340. — Seidlitz, Fn. Balt. 1872, p. 448; ed. 2, 1891, p. 624; Fn. Trans-sylv. 1891, p. 696. — Stierlin, Fn. Col. Helvet. 1894, p. 373. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 548. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 223. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 671. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 991. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 149, t. 161, f. 14. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 190. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rhén. 1923, p. 97, 127. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 128.

*t y p h a e* Herbst, Käf. VI, 1795, p. 415, t. 42, f. 11 (*Curculio*). — Ill. Mag. Ins. VI, 1807, p. 331 (*Cryptorhynchus*). — Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 568; l. c. VIII, 2, 1845, p. 141.

*s u l c u l u s* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 258 (*Curculio*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 32 (*Nedyus*). — Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 502; l. c. VIII, 2, 1845, p. 141.

*m o n o s t i g m a* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 257 (*Curculio*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 31 (*Nedyus*). — Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 501; l. c. VIII, 2, 1845, p. 141.

**B i o l o g i e :** Heeger, Sitzb. Ak. Wiss. Wien 1854, p. 271, t. 1. — Kaltenb. Pflanzenf., 1872. — Perris, Larves 1877, p. 408. — Bedel, l. c. p. 340; Suppl. VI, bis p. 101. — Bargagli, Rincof. Eur. 1883—87, p. 267. — Hust. l. c. p. 129.

**fulvotertius** Fall, Pan-Pacif. Ent. II, 1925—26 (1926), p. 206.

**funicularis** Ch. Bris. Abeille V, 1869, p. 445. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 224.

**galiciensis** Rybinski, Bull. Ac. sc. Cracovie XLII, 1902, p. 12, t. 3, f. 4.

**geographicus** Goeze, Ent. Beytr. I, 1777, p. 359 (*Curculio*). — Geoffr. in Fourcroy, Ent. Paris. I, 1785, p. 128. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, p. 1778. — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 201, t. 1, f. 22; l. c. IV, 1789, p. 275. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 167 (subg. *Nedyus*); (1887), p. 325. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 626; Fn. Trans-sylv. 1888—91 (1891), p. 698. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—94 (1894), p. 377. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 544, 546. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 213; l. c. 1903, p. 288. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 679 (subg. *Nedyus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 19912, p. 992. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 154, t. 161, f. 16 (subg. *Mogulones*). — Hansen, Dan-

Alaska

Algérie:

Bône  
Galicie

Europe

centr. et mér.,  
Caucase,  
Asie mineure,  
Algérie

marks Fauna IV, 1918, p. 157. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 119, 123. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 105, 148. — Wagn. Col. Centralbl. II, 1927, p. 206, 208, t. 2, f. 2a, b.

*echii* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 436 (*Curculio*); Syst. El. II, 1801, p. 482 (*Rynchaenus*). — Panz. Fn. Ins. Germ. XVII, 1794, t. 12 (*Curculio*); Ent. Germ. 1795, p. 314. — Herbst, Natursyst. Käf. VI, 1795, p. 311, t. 91, f. 1. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 279. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 144. — Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 209, t. 23, f. 317 (*Rynchaenus*). — Lamarck, Hist. Nat. anim. sans vert. IV, 1817, p. 351 (*Rynchaenus*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 38 (subg. *Nedyus*); Man. Brit. Col. 1839, p. 222. — Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 504 (*Ceutorhynchus*); l. c. VIII, 2, 1845, p. 146. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 359. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 124. — Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 383; l. c. ed. 2, 1858, p. 802; l. c. ed. 3, 1874, II, p. 344. — Bach, Käferf. II, 1854, p. 347, 362. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 545. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 325; Cat. Col. Madeira 1857, p. 105; Col. Atlant. 1865, p. 267. — C. G. Thoms. Skand. Col. X, 1868, p. 345. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 213.

*glypticus* Schaller, Abb. Nat. Ges. Halle I, 1783, p. 282 (*Curculio*). — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1770. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 566.

*Pueli* Hust. Bull. Soc. Ent. Fr. 1913, p. 233; Miscell. 1922, p. 19; Rev. 1924, p. 148.

**Biologie:** Ol. Entom. V, 1807, nr. 85, p. 209. — Mathieu, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 232. — Kaltenbach, Pflanzenf. 1874, p. 448. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 3, 1874, II, p. 344. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXIII, 1876 (1879), p. 249; Larves Col. 1877, p. 409. — Pirazzoli, Col. It. 1882, p. 182. — Buddeberg, Jahrb. Nassau. Ver. Naturk. XXXVII, 1884, p. 80. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 261. — Peyerimhoff, Ann. Soc. Ent. Fr. 1911, p. 305. — Hust. l. c. p. 150.

**Gerhardtii** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 304; l. c. 1902, p. 224, 289. — Gerhardt, Zeitschr. Ent. Breslau XXVI, 1900, p. 17. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 166.

**Biologie:** Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 263. — Wagn. Col. Centralbl. III, 1928—29 (1928), p. 57.

**gibbicollis** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 275; l. c. 1902, p. 214. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 158 (subg. *Hadropontus*).

Silésie,  
Moravie,  
Caucase,  
Russie mér.  
Jaroslaw

Hongrie,  
Transsyl-  
vanie,  
Balkans,  
Turquie,  
Espagne mér.

- var. *dilatatus* Schultze, l. c. 1898, p. 168; l. c. 1902, p. 214.
- gilvicornis** Schultze, Horae Soc. Ent. Ross. XXXVI, 1902, p. 86; Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 221; l. c. 1903, p. 272.
- gilvirostris** K. Daniel, Bull. Soc. Ent. Fr. 1914, p. 293 (♂).
- globicollis** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 260 (♂); l. c. 1901, p. 58; l. c. 1902, p. 218.
- Gougeleti** Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 339. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 332. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 269; l. c. 1902, p. 225.
- gracilicornis** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 271 (♀), p. 291.
- granifer** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 257; l. c. 1902, p. 221.  
Biologie: Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1920, p. 48; Ann. Soc. Ent. Fr. 1926, p. 375.
- granulithorax** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 23; l. c. 1902, p. 218. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 107, 210.
- gratiosus** Ch. Bris. Abeille V, 1869, p. 460. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 258; l. c. 1902, p. 214. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 113, 155.
- Grenieri** H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (3) VIII, 1860, p. 336. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1886, p. 322, 327. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 224; l. c. 1903, p. 289. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 172 (subg. *Marklissus*). — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 282.  
Biologie: Hust. l. c. p. 289.
- griseus** Ch. Bris. Abeille V, 1869, p. 450. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 170; (1887), p. 334. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, (1887—91 (1891), p. 680; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 702. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 219. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 683 (subg. *Nedyus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 995. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 168. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1818, p. 173. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 109, 228. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 121, 125.  
Biologie: Pierre, Rev. Sc. Bourbon. XIV, 1901, p. 77—78. — Goury et Guign. Feuill. Jeun. Nat. XXXVII, 1906—07, nr. 438, 439, p. 112, 143. — Houard, Zoocécidies Eur. I, 1908, p. 471 (Cécidie). — Lokay, Časop. Spol. Ent. Cruc. IV, 1907, p. 22. — Sgocki, Sprawozd. Kom. Fizyogr. XLI, 1907, p. 18 (en russe). — Hust. l. c. p. 229. — Wagn. Col. Centralb. III, 1928—29 (1928), p. 57.
- Hamiltoni** Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 440. — Leng, Journ. New York Ent. Soc. XXI, 1913, p. 312.

Transsylvanie  
Turkestan:  
Aulie-Ata  
Maroc:  
Larache  
Afghanistan,  
Thian-Schan,  
Buchara  
Espagne mér.

Kebin  
Algérie:  
Ghardaïa

Espagne,  
France mér.,  
Algérie  
France mér.,  
Espagne

France mér.,  
Corse,  
Espagne,  
Algérie,  
Balkans,  
Corfou

France,  
Allemagne,  
Danmark,  
Autriche,  
Bohême,  
Russie mér.,  
Caucase

Etats-Unis,  
Rhode Island

**Hampel** Ch. Bris. Abeille V, 1869, p. 437. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1891, p. 695. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 223. — Kuhnt, Ill. Best. Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 991. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 150.

var. *ochraceotinctus* H.Wagn. Ent. Mitt. VIII, 1919, p. 74.

**Harmandi** Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. 1916, p. 131, 141.

**Henschi** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 282 ( $\sigma^2$ ), 291.

**hepaticus** Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Cerc. IV, 1, 1837, p. 482; l. c. VIII, 2, 1845, p. 135. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 176; (1887), p. 339. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 223. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 190. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1923, p. 97, 133.

Biologie: Bedel, l. c. p. 339.

**Herbsti** Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXIX, 1895, p. 104, 106. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 258; l. c. 1898, p. 269, 270; l. c. 1902, p. 218.

Biologie: Schultze, l. c. 1898, p. 269.

**hesperus** Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 282; Col. Atlant. 1865, p. 268. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 356.

**hexatomus** Penecke, Wien. Ent. Zeit. XXXIX, 1922, p. 179.

**hirsutulus** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 242 ( $\Omega$ ); l. c. 1902, p. 220.

**hirticollis** Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 433.

**hirtulus** Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 436. — Gyll. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 595 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. Sp. Cerc. IV, 1, 1837, p. 560; l. c. VIII, 2, 1845, p. 169. — C. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1835), p. 99 (*Rhynchaenus*). — Bach, Käferf. II, 1852—54 (1854), p. 433, 349. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 797; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 340. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 589. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 275; l. c. X, 1868, p. 201, 202. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 321, 326. — Bedel, Fn. Bass. Seine, VI, 1882—88 (1885), p. 166; (1887), p. 335. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 343. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1897—1891 (1891), p. 631; Fn. Transsylv. 1888—1891 (1891), p. 703. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1894), p. 384. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 418, 422; l. c. 1902, p. 225. — Everts, Col. Neerl. III, 1903, p. 677 (subg. *Nedyus*). — Vitale, Natur. Sicil. XVIII, 1905, p. 81. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Deutschl. 1912, p. 996, fig. 303. — Reitt. Fn. Germ. V, 1906, p. 171 (subg. *Marklissus*). — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 182. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 121, 126. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 102, 272.

Autriche,  
Transsyl-  
vanie,  
Balkans,  
Caucase

Japon  
Hongrie:  
Budapest  
Paris,  
France,  
Europe  
centr.,  
Angleterre,  
Turkestan

Europe centr.  
et orient.,  
Russie mér.,  
Caucase,  
Arménie  
Canaries:  
Gomera,  
Hierro  
Trieste

Margelan

Etats-Unis

Europe,  
Algérie,  
Asie min.,  
Caucase

*var. varius* Rey, Echange XI, 1895, p. 37. —  
Hust. l. c. p. 273.

*drabae* Laboulbène, Ann. Soc. Ent. Fr. (8) IV, 1856, p. 157. — Bedel, l. c. (1887), p. 335.  
— Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 225.

France

**Biologie:** Laboulbène, l. c. p. 145—168, t. 4, f. 1—11 (*drabae*). — Kirby & Spence, Introd. Ent. Pop. Ed. 1867, p. 104. — Kaltenb. Pflanzenf. 1874, p. 37. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXIII, 1876 (1877), p. 248; Larves Col. 1877, p. 408. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 317; l. c. XIX, 1887 (*s. contractus*). — Kieff. Feuill. Jeun. Nat. XXII, 1891—92, nr. 255 (1892), p. 54. — Kolbe, Ent. Nachr. XXVI, 1900, p. 227. — Goury et Guignon, Feuill. Jeun. Nat. XXXVII, 1906—07, nr. 441, p. 182; nr. 442, p. 212. — Bourgeois, Mitteil. Nat. Ver. Colmar (n. s.) IX, 1907—08 (1908), p. 172. — Houard, Zoocéd. Eur. I, 1908, p. 469. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 264. — Hust. l. c. p. 273.

**Horni** Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 435, t. 13, f. 25.

Etats-Unis

**hovanus** nom. nov.

Madagascar

*phytobioides* Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXVIII, 1919 (1920), p. 340 [nec Woll. 1864].

**humeralis** Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Cucr. IV, 1, 1837, p. 544; l. c. VIII, 2, 1845, p. 162. — Falderm. Fn. Ent. Transcauc. II, in Nouv. Mém. Soc. Nat. Moscou V, 1837, p. 248; l. c. III, in l. c. VI, 1838, p. 205. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 259; l. c. 1902, p. 219.

Caucase,  
Perse,  
Alai,  
Djizak

**hungaricus** Ch. Bris. Abeille V, 1869, p. 461. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 215.

Hongrie

**ibukianus** Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV, 1916, p. 129, 143.

Japon

**iconiensis** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 107 (♂); l. c. 1902, p. 223.

Asie mineure:

Konia

**ignicollis** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 109; l. c. 1902, p. 225.

Sicile,

Algérie:  
Teniet-el-  
Haad,  
Mt. Edough

**Biologie:** Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. 1926, p. 375.

Allemagne,  
Russie or.,  
Danmark,  
Sibérie,  
France

**ignitus** Germ. Ins. Sp. nov. I, 1824, p. 234. — Schönh. Gen. Sp. Cucr. IV, 1, 1837, p. 568; l. c. VIII, 2, 1845, p. 167. — Bach, Käferf. II, 1852—54 (1854), p. 345, 350. — Redt. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 806; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 347. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 540. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 322, 330. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 632; Fn. Transsylyv. 1888—1891 (1891), p. 704. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1894), p. 384. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 225. — Everts, Col. Néerl. II, 1903, p. 678 (subg. *Nedyus*). —

|   |   |
|---|---|
| Vorbringer, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 303. — Kaufm. Rovart. Lapok XVII, 1910, p. 69. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 997, fig. 303d. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 172 (subg. <i>Marklissus</i> ). — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 181.  |   |
| Biologie: Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 263. — Penecke, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1922, p. 187.   |   |
| <b>imbricatus</b> Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 294 (♀); l. c. 1902, p. 213; l. c. 1903, p. 288.   | Algérie:<br>Oran  |
| <b>imperialis</b> Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 428; l. c. 1902, p. 215.   | Caucase   |
| var. <i>putchellus</i> Schultze, l. c. 1896, p. 266; l. c. 1901, p. 95; l. c. 1902, p. 215.   | "   |
| var. <i>Sieversi</i> Schultze, l. c. 1901, p. 94; l. c. 1902, p. 215.   | "   |
| <b>inaffectatus</b> Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 550; l. c. VIII, 2, 1845, p. 166. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 430, 433; l. c. 1902, p. 219; l. c. 1903, p. 200. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 166. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gall.-Rh. 1924, p. 111, 242. — Bed. Fn. Bass. Seine VI bis, 1924, p. 99.                                      | France,<br>Allemagne,<br>Autriche,<br>Hongrie,<br>Balkans,<br>Caucase,<br>Sibérie |
| ♀ <i>glabrirostris</i> Gyll. l. c. p. 550; VIII, 2, p. 166. — Schultze, l. c. 1895, p. 431, 433; l. c. 1902, p. 219.  |   |
| <b>sulcipennis</b> Schultze (nec Leconte 1876), Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 424; l. c. 1898, p. 430.   | France  |
| <b>arator</b> Bed. [nec Gyll] Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 172; (1887), p. 338.   |   |
| Biologie: Buddeberg, Jahrb. Nassau. Ver. Nat. XXXVII, 1884, p. 79 ( <i>arator</i> ). — Goury et Guignon, Feuill. Jeun. Nat. XXXVII, 1906—1907, nr. 434, p. 31 ( <i>arator</i> ). — Houard, Zoocécidies Eur. I, 1908, p. 478 (Cécidie). — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 263. — Bedel, l. c. p. 338. — Hust. l. c. p. 243. — H. Wagn. Col. Centralbl. III, 1928—29 (1929), p. 246. |   |
| <b>incertus</b> Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 219; l. c. 1903, p. 256; Horae Soc. Ent. Ross. XXXVI, 1903, p. 72.   | Turkestan:<br>Aulie-Ata   |
| <b>incisus</b> Schultze, Abeille XXIX, 1899, p. 266; Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 218. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 164 (subg. <i>Glocianus</i> ).  | Algérie,<br>Caucase,<br>Allemagne<br>sept.<br>Indes<br>Syrie                      |
| <b>indicus</b> Hust. Bull. Soc. Ent. Fr. 1930, p. 77.   | Espagne sept.,<br>Piémont,<br>Sieben-<br>bürgen,<br>Bosnie                        |
| <b>infernalis</b> Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 38.  |   |
| <b>inhumeralis</b> Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 283; l. c. 1898, p. 269; l. c. 1902, p. 218. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 153, nota (subg. <i>Prenesdus</i> ).  |   |
| Biologie: Penecke, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1922, p. 187.   |   |
| <b>insidiator</b> Desbr. Frelon V, 1895—96 (1896), p. 57. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 223.   | Algérie:<br>Sidi-bel-<br>Abbès  |

- insidiosus** Ch. Bris. Abeille V, 1869, p. 455. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 224.  
**interjectus** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 259; l. c. 1902, p. 220.
- intermedius** Ch. Bris. Abeille V, 1869, p. 449. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 219. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 109, 227.
- intersetosus** (Ch. Bris. in litt.) Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 322, 328. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 224. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 153, nota (subg. *Dionoreenus*). — Hust. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 118, 280.
- Biologie**: Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. 1911, p. 307. — Hust. l. c. p. 281.
- invisus** Fall, Canad. Ent. XLIX, 1917, p. 388.
- isolatus** Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 421.
- italicus** Ch. Bris. Abeille V, 1869, p. 463. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 258; l. c. 1902, p. 222. — Vitale, Natural. Sicil. XVII, 1904, p. 132. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 106, 262.
- var. *concolor* Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 96; l. c. 1902, p. 222; l. c. 1903, p. 294.
- Jakovlevi** Schultze, Horae Soc. Ent. Ross. XXXVI, 1902, p. 84; Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 268; l. c. 1902, p. 222.
- Javeti** Ch. Bris. Abeille V, 1869, p. 459. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 345. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 627; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 698. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 214. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 992, fig. 301 d. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 156, t. 161, f. 18) (subg. *Hadropontus*). — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 157.
- judaeus** Ch. Bris. Abeille V, 1869, p. 442. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 224.
- Karamani** Müll. Col. Rundschau IX, 1921, p. 76.
- Koenigi** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 265; l. c. 1902, p. 215.
- Korbi** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 101; l. c. 1902, p. 213; l. c. 1903, p. 288; Münch. Kol. Zeitschr. III, 1903, p. 349. — Holtz, Ent. Blätt. V, 1909, p. 112. — H. Wagner, Col. Centralbl. II, 1927, p. 205, 207, t. 2, f. 1a, b.
- Biologie**: Heyden, Ent. Blätt. V, 1909, p. 29. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 261.
- Kraatzii** Ch. Bris. Abeille V, 1869, p. 462. — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 701. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 258 (subg. *Thamiocolus*); l. c. 1902, p. 213. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912,

Espagne:  
Escorial  
Hongrie mér.:  
Mehadia,  
Herkulesbad  
Pyrénées fr.

France mér.,  
Espagne,  
Algérie,  
Palestine

Etats-Unis  
,,

France mér.,  
Italie,  
Dalmatie,  
Sicile,  
Caucase,  
Mesopotamie  
Tunis

Russie:  
Jaroslaw

Russie,  
Allemagne,  
Autriche

Jerusalem

Dalmatie  
Caucase:  
Thana  
Asie mineure,  
Turquie,  
Herzégovine,  
Grèce

Espagne,  
Autriche,  
Hongrie,  
Croatie,  
Bosnie,

- p. 990. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 158 (subg. *Hadropontus*), 159 (subg. *Thamioculus*). — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 116, 146.
- var. bosnicus* Schultze, Mittheil. Bosnien V, 1897, p. 501; Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 292; l. c. 1902, p. 213.
- laetus** Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 295. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 322, 338. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 167; l. c. 1902, p. 226. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 997. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 172 (subg. *Marklissus*). — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 104, 296.
- smaragdinus* Ch. Bris. Abeille V, 1869, p. 446. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 226. — Hust. l. c. p. 296.
- Biologie:** Saubinet, Echange IX, 1893, p. 120 (*smaragdinus*). — Goury et Guignon, Feuill. Jeun. Nat. XXXVII, 1906—07, nr. 434, 1907, p. 29. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 262. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIII, 1876 (1877), p. 248; Larv. Col. 1877, p. 408. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 325; XIX, 1887, p. 21. — Hust. l. c. p. 297.
- languidus** Schultze, Horae Soc. Ent. Ross. XXXVI, 1902, p. 75; Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 261; l. c. 1902, p. 222.
- larvatus** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 266; l. c. 1902, p. 214.
- ornatus* Bed. l. c. 1887, p. 325. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 991. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 157 (subg. *Hadropontus*). —
- Andreae* Bed. Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 173.
- ornatus* Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 160. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 113, 161.
- Biologie:** Hust. l. c. p. 161. — Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. 1911, p. 305.
- latrunculatus** Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, 1866, I, p. 442.
- Lederi** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 316 (♀); l. c. 1902, p. 215.
- Leprieuri** Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 180. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 418, 421, 422; l. c. 1896, p. 290; l. c. 1902, p. 226; l. c. 1903, p. 290. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 183. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 996. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 174 (subg. *Marklissus*). — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 102, 277. — Kolbe, Ent. Mitteil. XIII, 1924, p. 299.
- Caucase,  
Suisse
- Bosnie
- Allemagne:  
Thuringe,  
Saxe;  
France mér.,  
Espagne,  
Italie,  
Grèce
- Russie mér.:  
Saratow;  
Turkestan;  
Aulie-Ata;  
Algérie  
Allemagne  
centr. et mér.,  
Hongrie,  
France,  
Espagne,  
Madère,  
Maroc,  
Algérie,  
Russie,  
Sibérie
- Ceylan
- Arménie  
russe, Trans-  
caucasia
- Europe mér.,  
Algérie,  
Maroc

- obesulus* Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 326; 1896, p. 183. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 290. 1902, p. 226; 1903, p. 290.
- Rubsaameni* Kolbe, Ent. Nachr. XXVI, 1900, p. 229. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 677. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 226; 1903, p. 290.
- Biologie:** Kolbe, Ent. Nachr. XXVI, 1900, p. 220. — Houard, Zoocécid. Eur. I, 1908, p. 455, 456, 460, 461 (Cécidies). — Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. 1915, p. 57. — Penecke, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1922, p. 187. — Hust. I. c. p. 161.
- Lesquerellae** Pierce, Journ. Econ. Ent. III, 1910, p. 366.
- Lethierryi* Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 416. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 358. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXIX, 1895, p. 106. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 218.
- Letourneuxi* Desbr. Frelon V, 1895—96, nr. 4, 1896, p. 59. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 220.
- leucorhamma* Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 293. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 224. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 153, nota (subg. *Dionoremus*). — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 101, 259.
- levantinus* Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 251; I. c. 1902, p. 225; Term. Füzet. XXI, 1898, p. 256.
- Lewisii* Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV, 1916, p. 130, 136.
- liliputanus* Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 256; I. c. 1902, p. 221.
- lineatotessellatus* Wolf. Ins. Mader. 1854, p. 327; Cat. Col. Madeir. 1857, p. 106; Col. Atlant. 1865, p. 269. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 216. — Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. 1926, p. 390 (subg. *Hesperorhynchus*).
- lineatus* Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Cure. IV, 1, 1837, p. 509; I. c. VIII, 2, 1845, p. 147. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 289; I. c. 1899, p. 185; I. c. 1902, p. 214. — H. Wagn. Col. Centralbl. II, 1927, p. 206, 216, t. 2, f. 7a, b.
- albolineatus* Friv. Term. Füz. II, 1878, p. 112. — Csizki, Term. Füz. XXII, 1899, p. 250. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 214.
- litoralis* Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 236; I. c. 1902, p. 220.
- litura* F. Syst. Ent. 1775, p. 141 (*Curculio*); Spec. Ins. I, 1781, p. 178; Mant. Ins. I, 1787, p. 108; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 488 (*Curculio*); Syst. El. II, 1801, p. 484 (*Rhynchaenus*). — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 200 (*Curculio*); I. c. IV,

Andalousie

Texas

Espagne:  
La Granja;  
Bosnie,  
Caucase,  
Algérie

Egypte

Espagne:  
Andalousie;  
France mér.,  
Algérie

Asie mineure

Japon

Basse  
Autriche,  
Hongrie mér.,  
Caucase  
MadèreHongrie,  
Turquie,  
Crimée

Dalmatie

Europe,  
Sibérie

1789, p. 273. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1769. — Ol. Encycl. méthod. V, 1790, p. 514. — Payk. Monogr. Curc. Suec. 1792, p. 26; Fn. Suec. III, 1800, p. 210. — Herbst, Natursyst. Käf. VI, 1795, p. 472. — Panz. Ent. Germ. 1795, p. 315. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 145. — Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 515; I. c. VIII, 2, 1845, p. 150. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1835), p. 95 (*Rhynchaenus*). — Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 384; I. c. ed. 2, 1858, p. 803; I. c. ed. 3, 1874, II, p. 344. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 347. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 545. — J. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68, t. 26, f. 126. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 263; I. c. X, 1868, p. 200 (subg. *Hadropontus*). — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 175; (1887), p. 324 (subg. *Nedyus*). — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 315, 358. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 627; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 699. — Stierl. Fn. Col. Helvet. 1886—98 (1894), p. 378. — Lameere, Man. Fn. Belge II, 1900, p. 542, fig. 313, p. 546. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 214. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 689. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 992, fig. 300. — Wagner in Calwer, Käferb. ed. 6, 1907—16 (1916), p. 1132, t. 41, f. 9. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 158, t. 162, fig. 7 (subg. *Hadropontus*). — Hansen, Danmarks Fauna IV, 1918, p. 161, fig. 99. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 117, 165. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 119, 123.

*ovalis* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 179 (*Curculio*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 33; Man. Brit. Col. 1839, p. 221 (*Nedyus*). — Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 566 (*Ceuthorrhynchus*); I. c. VIII, 2, 1845, p. 150.

var. *Rollini* Pic, Echange XXIV, 1908, p. 34. Biologie: F. Spec. Ins. I, 1781, p. 178; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 438; Syst. El. II, 1801, p. 486. — Latr. I. c. p. 145. — Curtis, Brit. Ent. XIII, 1836, p. 670. — Mathieu, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 233. — Jacq. du Val, I. c. IV, 1868, p. 61. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 320; I. c. XIX, 1887, p. 19. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 264. — Hust. I. c. p. 123.

*longimanus* Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 311 (♂) (*Ceuthorhynchidius*); I. c. 1902, p. 222 (*Ceuthorrhynchus*).

*longipennis* Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 30 (♂); I. c. 1902, p. 224.

*longirostris* Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) I, 1881, p. 128. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 219. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 106, 236.

Angleterre

Kokan

Afrique centr.,  
Tangasi  
Pyrénées fr.

- longitarsis** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 43; l. c. 1902, p. 219.
- Lukesi** Tyl, Ent. Blätt. X, 1914, p. 3. — Formanek, Wien. Ent. Zeit. XLIV, 1927, p. 46.
- lycoctoni** Hust. Bull. Soc. Ent. Fr. 1917, p. 282; Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 224.
- macula-alba** Herbst, Natursyst. Käf. VI, 1795, p. 404, t. 1, f. 14 (*Curculio*). — Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 477; l. c. VIII, 2, 1845, p. 132. — Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 381; l. c. ed. 2, 1858, p. 799; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 341. — Bach, Käferf. II, 1852—54 (1854), p. 345, 352. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 541. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 170; (1887), p. 332. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 628; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 699. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1894), p. 379. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXIX, 1895, p. 106. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 544, 546. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 217. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 682 (subg. *Nedyus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 993. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 164, t. 162, f. 1 (subg. *Glocianus*). — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 107, 204. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 121, 125.
- cardui** Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 135, t. 29, f. 551 (*Rhynchaenus*). — Bedel, l. c. p. 333.
- seriatus** Bohem. in Schönh. Gen. Sp. Curc. VIII, 2, 1845, p. 132. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 217.
- volgensis** Faust, Stett. Ent. Zeit. XLV, 1884, p. 471 (♀); XLVI, 1885, p. 194 (♂). — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 258; 1902, p. 217.
- var. **turmenicus** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 217 (s. descr.).
- var. **gethsemensis** Pic, Echange XXIV, 1908, p. 35.
- Biologie:** Klingelhoeffer, Deutsche Ent. Zeitschr. IV, 1843, p. 85. — Chapuis et Candèze, Mém. Soc. Sc. Liége VIII, 1853, p. 562; Cat. Lary. Col. 1853, p. 222. — Mathieu, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 230. — Taschenberg, Naturg. Ins. 1865, p. 62, 63. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. 1854—68, p. 61. — Künstler, Schädl. Ins. 1871, p. 37. — Kaltenbach, Pflanzenf. 1874, p. 20. — Tomaschek, Verh. Nat. Ver. Brünn XIII, 1874 (1875), Sitzungsber. p. 46. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXIII, 1876 (1877), p. 207, 249; Larves Col. 1877, p. 409. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 320; XIX, 1887, p. 19. — Schreiner, Arbeit. Bur. Minist. Landwirtsch. St. Petersburg IV, nr. II, 1904, 46 pages; Trudy Ent. Mém. Kom. Gi. Upr. Zeml. IV, 6, 1909, p. 1, fig. 3. — Bourgeois, Mitteil. Nat. Ver. Colmar (n. s.)

Turkestan  
orient.  
Boheme

Alpes franç. 1916

Europe centr.  
et mérid.,  
Caucase,  
Algérie,  
Maroc

Russie mér.:  
Samara;  
Turkestan:  
Taschkent  
Turecménie

Jerusalem

IX, 1907—08 (1908), p. 171. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 244. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanzenkr. III, 1906—13 (1913), p. 563. — Hust. l. c. p. 206.

**macula-quadra** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 272; l. c. 1902, p. 218.

**makkabeus** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 305; l. c. 1902, p. 224.

**malachiticus** (Chevr.) Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 299 (♀); l. c. 1902, p. 226.

**marginatus** Payk. Monogr. Cucr. Suec. 1792, p. 27 (*Curculio*); Fn. Suec. III, 1800, p. 211. — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 224 (*Rhynchae-nus*); in Schönh. Gen. Sp. Cucr. IV, 1, 1837, p. 538; l. c. VIII, 2, 1846, p. 156. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 39 (subg. *Nedyus*); Man. Brit. Col. 1839, p. 223. — Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 383; l. c. ed. 2, 1858, p. 802; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 343. — Bach, Käferfn.-II, 1852—54 (1854), p. 347, 361. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 545. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1865, p. 266; l. c. X, 1868, p. 200. — Crotch, Entomol. II, 1864—65, nr. 18 (1865), p. 260. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 170; (1887), p. 331. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 344, 355. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891) p. 628; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 699. — Stierl. Fn. Col. Helvet. 1886—98 (1894), p. 379. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXIX, 1895, p. 105. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 434; l. c. 1898, p. 263; l. c. 1902, p. 218. — Gerhardt, Zeitschr. Ent. Breslau 1899, p. 12. — Lameere, Man. Fn. Belg. III, 1900, p. 545. — Everts, Col. Neerl. II, p. 682 (subg. *Nedyus*). — Edwards, Ent. Monthly Mag. XLVII, 1911, p. 209 [err.]. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1919, p. 993. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 164 (subg. *Glocianus*). — Blatchl. & Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 444. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 165. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 107, 207, 209. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 120, 124.

**Moelleri** Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 376 (non Thoms.). — Schultze, l. c. 1895, p. 131.

var. *simillimus* Edwards, Ent. Monthl. Mag. XLVII, 1911, p. 209.

**Physiologie:** Rye, Ent. Monthly Mag. VI, 1869—70 (1869), p. 58 [Monstr.].

**Biologie:** Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68, p. 61. — Kaltenbach, Pflanzenf. 1874, p. 215. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VI, 1876, p. 188. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 321; l. c. XIX, 1887, p. 19. — Gebhardt, Zeitschr. Ent. Breslau 1899, p. 12. — Bourgeois, Mitteil. Nat. Ges. Colmar

Espagne:

Asturias;

Syrie

Jerusalem

Algérie

Europe,

Caucase,

Corfou,

Etats-Unis

Angleterre,  
Hollande

- IX, 1908, p. 171. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 265. — Frost, Journ. New York Ent. Soc. XXIV, 1916, p. 243—252, 3 pl. — Hyslop, Journ. Econ. Ent. X, 1917, p. 278, fig. — Hust. l. c. p. 209.
- marginellus** Schultze, Horae Soc. Ent. Ross. XXXVI, 1902, p. 81; Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 275; l. c. 1902, p. 226.
- maroccanus** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 284, 291.
- marraquensis** Escalera, Trab. Mus. Madrid XI, 1914, p. 476.
- Maschelli** (Hochh.) Solsky, Bull. Soc. Nat. Moscou XLVI, 1873, p. 162. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 258 (subg. *Thamioculus*); l. c. 1902, p. 213.
- maurus** Schultze, Abeille XXIX, 1899, p. 262; Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 217. — Tyl, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 123. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 199.
- medialis** Lec. in Lec. et Horn, Rhynchoph. 1876, p. 279. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 450, t. 14, f. 29. — Blatchl. & Leng, Rhynchoph. N. E. Am. 1916, p. 452.
- melanarius** Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 31 (*Nedyus*); in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 502. — Bohem. in Schönh. Gen. Sp. Curc. VIII, 2, 1845, p. 134 (*Ceuthorrhynchus*). — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 176; (1887), p. 389 (*Ceuthorrhynchus*). — Seidlitz, Fn. Transsylv. 1891, p. 696. — Stierl. Fn. Col. Helvet. 1894, p. 373. — Lameere, Man. Fn. Belge II, 1900, p. 548. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 223 (*Ceuthorrhynchus*). — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 673. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 991. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) [Best.-Tab. 68], p. 70 (*Amalorrhynchus*); Fn. Germ. V, 1916, p. 149. — Hansen, Ent. Medd. XI, 1916—17 (1917), p. 357; Danmarks Fn. IV, 1918, p. 194 (*Amalorrhynchus*). — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. p. 221, 22, 23 (*Amalorrhynchus*).
- convexicollis** Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 495 (♂). — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 356. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 548. — Bedel, l. c. p. 389. — Schultze, l. c. 223.
- glauca** Bohem. in Schönh. Gen. Sp. Curc. VIII, 2, 1845, p. 144 (♀). — Bedel, l. c. p. 389. — Schultze, l. c. p. 223.
- camelinæ** Bohem. l. c. p. 170 (♀). — Bedel, l. c. p. 334. — Schultze, l. c. p. 223.
- Biologie**: Goureau, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 171. — Jacq. du Val, Col. d Eur. IV, 1854—68. — Bedel, l. c. VI bis, p. 100. — Hust. l. c. p. 24.
- melanostictus** Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 282 (*Curculio*). — Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV,
- Russie mérid.: Saratow, Turkestan: Aulie-Ata Maroc: Saffi
- Maroc
- Russie mér.: Kiew
- Corse, Algérie
- Etats-Unis
- Angleterre, Europe centr. et mérid.
- Europe, Algérie

1, 1837, p. 532; l. c. VIII, 2, 1845, p. 154. — Bach, Käferf. II, 1852—54 (1854), p. 348, 367. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 547. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 804; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 346. — Crotch, Entomol. II, 1864—65, nr. 18, 1865, p. 260. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 173; (1887), p. 326 (subg. *Nedyus*). — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1891, p. 629; Fn. Transsylv. 1891, p. 700. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1894), p. 380. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 267; l. c. 1902, p. 217. — Lameere, Man. Fn. Belge II, 1900, p. 544, 546. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 686 (subg. *Nedyus*). — Vitale, Nat. Sicil. XVII, 1904, p. 132. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 994. — Tyl, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 123, fig. 10. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 163, t. 161, f. 21 (subg. *Hadroplontus*). — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 169. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 113, 197, 198. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 120, 123.

*rugulosus* Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 35 (subg. *Nedyus*); Man. Brit. Col. 1839, p. 221.

*cincinnatus* Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 531; l. c. VIII, 2, 1845, p. 154. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 217.

*lycopenus* Gyll. l. c. IV, 1, 1837, p. 533; VIII, 2, p. 155. — Redt. Fn. Austr. 1872, p. 385; ed. 2, 1858, p. 804; ed. 3, II, 1874, p. 346. — Bach, Käferf. II, 1854, p. 348, 368. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 547. — Stierl. Fn. Col. Helvet. 1894, p. 380. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 217.

*Stenbergi* C. G. Thoms. Skand. Col. X, 1868, p. 344; Op. ent. IV, 1871, p. 392. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 357. — Schultze, l. c. 1902, p. 217. — Auriv. l. c. p. 123.

var. *obtusicollis* Gyll. l. c. IV, 1, 1837, p. 554; VIII, 2, p. 166. — Schultze, l. c. 1902, p. 217. — Hust. l. c. p. 198.

var. *perturbatus* Gyll. l. c. IV, 1, 1837, p. 534; VIII, 2, p. 155. — Schultze, l. c. 1902, p. 217. — Stierl. Fn. Col. Helv. 1894, p. 380. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 994. — Hust. l. c. p. 199.

var. *murinus* Gyll. l. c. IV, 1, 1837, p. 537. — Schultze, l. c. 1902, p. 217. — Hust. l. c. p. 191.

**Biology:** Mathieu, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 234. — Frauenfeld, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XVI, 1866, p. 973. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68, p. 61. — Perris, Abeille VII, 1870, p. 37; Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXIII, 1876 (1877), p. 248; Larves Col. 1877, p. 408. — Brisout, Ann. Soc. Ent. Fr.

Russie mérid.

- (5) III, 1873, Bull. p. CLXIV. — Kaltenb. Pflanzenf. 1874, p. 472, 477. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 321; XIX, 1887, p. 19. — Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. 1911, p. 305. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 275. — Hust. l. c. p. 199.
- melitensis** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 42 (♀); l. c. 1901, p. 60; l. c. 1902, p. 224.
- mendax** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 284; l. c. 1902, p. 214.
- micans** Ch. Bris. Abeille V, 1869, p. 436. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 223. — Tyl, Ent. Blätt. X, 1914, p. 6. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1923, p. 96, 136.
- var. *p y g m a e u s* Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 288; l. c. 1902, p. 223. — Hust. l. c. p. 137 nota.
- micros** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 284; l. c. 1902, p. 221. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 180.
- millefolii** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 269; l. c. 1902, p. 216. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 995. — Tyl, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 121, fig. 5. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 163 (subg. *Hadroplontus*). — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 171. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 119, 123.
- molitor* Seidl. Fn. Balt. 1891, p. 629; Fn. Transsylv. 1891, p. 701.
- molitor* Stierl. Fn. Col. Helvet. 1894, p. 381.
- mimulus** Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 439 (♂).
- minutus** Reich, Mant. Ins. 1797, p. 11, t. 1, f. 7 (*Curculio*). — Schönh. Gen. Sp. Cucr. IV, 1, 1837, p. 503; l. c. VIII, 2, 1845, p. 146.
- mixtus** Muls. et Rey, Ann. Soc. Agr. Lyon (3) II, 1858, p. 295; Opusc. Ent. IX, 1859, p. 37. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 178; (1887), p. 332. — Champ. Ent. Monthly Mag. XXXII, 1896, p. 30. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 222. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 672. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 149. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1923, p. 98, 122.
- Biologie**: J. Lichtenstein, Feuill. Jeun. Nat. XLIV, 1914, p. 66. — Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. 1915, p. 54. — Hust. l. c. p. 124.
- Moelleri** C. G. Thoms. Skand. Col. X, 1868, p. 347. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 435; l. c. 1902, p. 218. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 682 (subg. *Nedyus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 993. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 164 (subg. *Glocianus*). — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 166. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 121, 125. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 108, 208, 212.

Italie,  
Sicile,  
Malte  
Vallée de  
l'Arax  
France mér.,  
Algérie

Crimée

Allemagne  
centr. et  
septent.,  
Rhénanie,  
Belgique,  
Russie mérid.

Etats-Unis

Allemagne

Suède,  
Caucase,  
Russie sept.,  
Allemagne,  
Hongrie,  
Turquie

*var. rotundatus* Ch. Bris. Abeille V, 1869, p. 452. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 69 nota; (1887), p. 427. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 345, 353. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1894), p. 379. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 218. — Hust. l. c. p. 213.

**Biologie:** Hust l. c. p. 213.

**moguntiacus** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 418, 420, 422; l. c. 1902, p. 226. — Kolbe, Ent. Nachr. XXVI, 1900, p. 232. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 676 (subg. *Nedyus*). — Vorbringer, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, p. 303. — Champ. Ent. Monthly Mag. XLIV, 1908, p. 2. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 996. — Fowler, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 195. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 174 (subg. *Marklissus*). — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 184. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 103, 278.

**Biologie:** Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 263. — Hust. l. c. p. 279.

**molitor** Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 525; l. c. VIII, 2, 1845, p. 153. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 267; l. c. 1896, p. 270, nota; l. c. 1898, p. 165; l. c. 1902, p. 216; l. c. 1903, p. 288. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 688 (subg. *Nedyus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 995, fig. 303 b. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 163, t. 161, f. 19 (subg. *Hadropontus*). — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 116, 191.

**pratensis** Chevr. Revue Zool. 1860, p. 510. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 288.

*var. interruptus* Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 165; l. c. 1902, p. 216. — Tyl, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 121, fig. 6. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 163. — Hust. l. c. p. 191.

**Biologie:** Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. 1911, p. 305. — Hust. l. c. p. 192.

**morus** Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 451. — Blatchl. & Leng, Rhynchoph. 1916, p. 458.

**Moznettei** Fall, Canad. Ent. XLIX, 1917, p. 389.

**mus** Desbr. Frelon V, 1895—96, nr. 4, 1896, p. 56. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 223.

**mutabilis** Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 437, t. 14, f. 30, 31 b.

**nanus** Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 497; l. c. VIII, 2, 1845, p. 144. — Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 381; l. c. ed. 2, 1858, p. 800; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 342. — Bach, Käferf. II, 1854, p. 345. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 542. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 171; (1887), p. 389. — Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XLVIII, 1887, p. 302. — Seidlitz, Fn.

Angleterre,  
France,  
Suisse,  
Allemagne,  
Autriche,  
Caucase,  
Sibérie

Allemagne,  
France,  
Russie,  
Autriche,  
Dalmatie,  
Turquie,  
Caucase

France mér. et  
occid.,  
Croatie,  
Hongrie mér.,  
Balkans,  
Sicile,  
Algérie

Algérie

Sicile,  
Algérie,  
Serbie

Etats-Unis

Etats-Unis  
Algérie

Etats-Unis

Europe centr.  
et mér.,  
Russie,  
Turkestan

Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 631; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 702. — Stierl. Fn. Col. Helvet. 1886—91 (1894), p. 382. — Everts, Col. Neerl. II, 1908, p. 683. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 221. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 995. — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 167. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 110, 246.

**Biologie:** Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68, p. 61. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 342. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 322; XIX, 1887, p. 19. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 377. — Goury et Guignon, Feuill. Jeun. Natural. XXXVII, 1907, p. 210. — Hust. I. c. p. 247.

**napi** Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1897, p. 549; I. c. VIII, 2, 1845, p. 166. — Bach, Käferf. II, 1852—54 (1854), p. 348. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 348. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 805; I. c. ed. 3, II, 1874, p. 347. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 171; (1887), p. 389. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 630; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 702. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1894, p. 382. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 546. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 219. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gall. Rh. 1924, p. 110, 239.

**assimilis** Ol. Ent. V, 1807, 83, p. 136, t. 29, fig. 442.

**Biologie:** Chapuis et Candèze, Mém. Soc. Sc. Liège VIII, 1853, p. 562; Cat. Larves Col. 1858, p. 222. — Goureau, Ins. nuis. arbres fruit. 1862. — Taschenberg, Schädl. Ins. 1865, p. 61—62, t. 2, fig. 13. — Girard, Traité élém. Ent. 1873, p. 687. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXIII, 1876 (1877), p. 217, 248; Larves Col. 1877, p. 408. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 322; XIX, 1887, p. 20. — Murtfield in Riley, Rep. 1888—89, p. 136. — Houard, Zoocéd. Eur. I, 1908, p. 447 (Cécidie). — Bourgeois, Mitt. Nat. Ges. Colmar 1908, p. 172. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 262. — Reh in Sorauer, Pflanzenkrankh. III, 1910, p. 563. — Hust. I. c. p. 240.

**nebulosomaculatus** Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, 1866, I, p. 442.

**nebulosus** Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 417. — Mars. Abeille XII, 1875, p. 359. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 220.

**neglectus** Blatchl. & Leng, Rhynchoph. 1916, p. 447. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1881, p. 30 (*Nedyus*). — Redt. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 350. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 176; (1887), p. 382. — Seidl. Fn. Balt. 1872, p. 448; ed. 2, 1891, p. 624; Fn. Transsylv. 1891, p. 695. — Stierl. Fn.

France,  
Allemagne,  
Hongrie,  
Autriche,  
Algérie

France

Ceylan

Espagne,  
Algérie,  
Turkestan  
Etats Unis  
Europe,  
Turkestan,  
Caucase

Col. Helvet. 1894, p. 373. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 548. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 222. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 673. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 991. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 149. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 189. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1923, p. 98, 126. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 128.

*de pressicollis* Gyll. Ins. Suec. III, 1813, p. 147 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. Sp. Cure. IV, 1, 1837, p. 484 (*Ceuthorrhynchus*); l. c. VIII, 2, 1845, p. 136. — Germ. Ins. Sp. nov. I, 1824, p. 220; Stett. Ent. Zeit. III, 1842, p. 109. — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1835, p. 61 (*Rhynchaenus*). — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 355. — Redt. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 801. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 543. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 256; X, 1868, p. 144.

*optabilis* Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 197 (♂). — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 268; 1903, p. 289.

*foveolatus* Gerhardt, Deutsche Ent. Zeitschr. 1911, p. 337. — Kuhnt, l. c. p. 991.

**Biologie:** Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68, p. 61. — J. Lichtenstein, Feuill. Jeun. Nat. XLIV, 1914, p. 66. — Bedel, l. c. VI bis, p. 93. — Hust. l. c. p. 126. — H. Wagn. Col. Centralbl. III, 1928—29 (1928), p. 56.

**nigritarsis** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 286; l. c. 1902, p. 221.

**nigroterminatus** Woll. Ins. Mader. 1854, p. 327. — Champ. Ent. Monthly Mag. XXXI, 1895, p. 194. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 439; l. c. 1902, p. 222. — Peyerimhoff, Ann. Soc. Ent. Fr. 1926, p. 390.

*Crotchi* Bris. Abeille V, 1869, p. 437 [Madère, non Angleterre].

**nipponensis** Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV, 1916, p. 130, 141.

**nitidipennis** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 253 (♂); l. c. 1902, p. 219.

**nitidulus** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XXXI, 1887, p. 178 (subg. *Nedyus*). — Schultze, l. c. 1902, p. 225.

**niveosuturalis** Escalera, Trab. Mus. Madrid XI, 1914, p. 477.

**niveus** Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) XI, 1859, p. 304. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 213.

**Biologie:** Peyerimh., Ann. Soc. Ent. Fr. 1911, p. 55. *Salvia* *spicata*

**nodicollis** Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Cure. IV, 1, 1837, p. 485; l. c. VIII, 2, 1845, p. 137.

**nodipennis** Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 435.

**notatulus** Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 269.

**Caucase:**

Tiflis

Madère

Japon

**Caucase:**  
Araxesthal

**Amour:**  
Wladivostok

Maroc

Espagne mér.:  
Algésiras,  
Algérie

Cayenne

Etats Unis

Etats Unis

- notatus** Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. 1883, p. 114. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 216.  
**nubeculosus** Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Cerc. IV, 1, 1837, p. 576; l. c. VIII, 2, 1845, p. 172. — Gebler, Bull. Soc. Nat. Moscou XIV, 1841, p. 608. — Faust, Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XXXII, 1890, p. 102. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 257; l. c. 1898, p. 163; l. c. 1902, p. 213.  
 var. *Gyllenhalii* Faust, Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XXXII, 1890, p. 62. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 163; l. c. 1902, p. 213.
- numidicus** Ch. Bris. Abeille V, 1869, p. 439. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 223.
- obliquus** Lec. in Lec. et Horn, Rhynchoph. 1876, p. 278. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 427.
- obscurus** Ch. Bris. Abeille V, 1869, p. 494. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 60 (cité d'Avignon, erreur); l. c. 1902, p. 219. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 108, 234.
- obsoletus** Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 230. — Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Cerc. IV, 1, 1837, p. 544; l. c. VIII, 2, 1845, p. 162. — Bach, Käferf. II, 1854, p. 348, 370. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 808; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 347. — Guttl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 458. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—1891 (1891), p. 630; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 702. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 48; l. c. 1902, p. 219; l. c. 1903, p. 289. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 684 (subg. *Nedyus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 995. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 168, t. 162, f. 2 (*Ceuthorrhynchus*). — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 108, 230.
- dalmatinus** Stierl. Mitth. Schw. Ent. Ges. IX, 3, 1894, p. 120. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 48.
- var. *obscuripes* Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 292. — Kuhnt, l. c. 1912, p. 995. — Hust. l. c. p. 231.
- Biologie:** Penecke, Wien. Ent. Zeit. XLIII, 1926, p. 30.
- omissus** Fall, Canad. Ent. XLIX, 1917, p. 388.
- optator** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1889, p. 188 (♂). — Schultze, l. c. 1898, p. 268; 1902, p. 218 (err. de syn.).
- orbiculatus** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 108 (♀); l. c. 1902, p. 215.
- oregonensis** Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 445, t. 14, f. 31.
- orientalis** Hust. Bull. Soc. Ent. Fr. 1915, p. 94.
- ornatus** Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Cerc. IV, 1, 1837, p. 513; l. c. VIII, 2, 1845, p. 149. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 214. —

Sibérie occ.

Caucase,  
Turkestan,  
Samara,  
SibérieSamara,  
IrkutskAlgérie:  
Biskra,  
Constantine  
Etats-UnisEspagne,  
Dalmatie,  
Cattaro,  
AlgérieEurope mérid.  
et centr.,  
Algérie

Dalmatie

Roumanie,  
Algérie:  
OranEtats-Unis  
Alka-KùlAsie mineure:  
Angora  
Etats-UnisTurquie  
Munich,  
Allemagne,  
Hongrie

- Vitale, Natural. Sicil. XX, 1908, p. 73. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 991. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 158 (subg. *Hadropontus*).  
**Biologie:** Penecke, Wien. Ent. Zeit. XXXIX, 1922, p. 187.
- ovalis** Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 488, t. 13, f. 26, 26a, 26b. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. 1916, p. 448, fig. 603 A. Etats-Unis
- ovipennis** Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 428, t. 13, f. 24. „
- ovulum** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 312 ♂. Caucase
- pallidicornis** H. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. 1860, p. 337. France, Allemagne, Autriche, Hongrie, Caucase, Sibérie  
 — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 173; (1887), p. 326 (subg. *Nedyus*). — Jacq. du Val, Ann. Soc. Ent. Fr. 1885, Bull. p. CV.  
 — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 215; 1903, p. 288. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 113, 171.
- var. *Méguignoni* Pic, Echange XXX, 1914, p. 17. France
- Biologie:** Hust. l. c. p. 171. — Penecke, Wien. Ent. Zeit. XXXIX, 1922, p. 187.
- Pandellei** Ch. Bris. Abeille V, 1869, p. 446. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 322, 330. — Hartmann, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 203. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 269; 1902, p. 225. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 997. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 173 (subg. *Marklissus*). — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 104, 294. Pyrénés, Allemagne, Autriche, Hongrie
- var. *Breiti* Hust. l. c. p. 294. Styrie
- Biologie:** Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXIII, 1876 (1877), p. 248; Larves Col. 1877, p. 408. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 322; XIX, 1887, p. 20. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 263. — Hust. l. c. p. 294. Hongrie
- pannonicus** Hajoss, Ent. Mitteil. XVII, 1928, p. 145. Grèce: Parnasse
- parnassicus** Pic, Echange XXIV, 1908, p. 35. 441 Angleterre, France, Allemagne, Autriche, Caucase
- parvulus** Ch. Bris. Abeille V, 1868—69 (1869), p. 441. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 176; (1887), p. 337. — Seidlitz, Fn. Trans-sylv. 1888—91 (1891), p. 703. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1894), p. 383. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 261; 1902, p. 221; 1903, p. 289. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 691. — Newberry, Ent. Monthly Mag. XLIV, 1908, p. 195. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 996. — Fowler, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 196. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 167. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 119, 249. Biologie: Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 263. — J. Ste Claire Deville, Abeille XXXI, 1909, p. 144. — Hust. l. c. p. 250.

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| <b>Paszlavszyi</b>         | Kuthy, Termesz. Füzet. XIII, 1890, p. 7.<br>— Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902,<br>p. 216.   | Autriche,<br>Hongrie,<br>Russie mérid.<br>Roumélie or.                     |
| <b>var.</b>                | <i>p r a e c l a r u s</i> Schultze, Deutsche Ent.<br>Zeitschr. 1897, p. 321 ( $\varphi$ ); l. c. 1901, p. 60;<br>l. c. 1902, p. 216.  |  |
| <b>pauper</b>              | (Faust in litt.) Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr.<br><del>p. 77</del> 1896, p. 20. — Schultze, l. c. 1902, p. 220.   | Vallée de<br>l'Arax  |
| <b>pauxillus</b>           | Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896,<br>p. 442. — Blatchl. et Leng, Rhynchoph. 1916,<br>p. 449.  | Etats-Unis   |
| <b>pectoralis</b>          | Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 437.<br>— Schultze, l. c. 1895, p. 417, 422; 1902, p. 226.<br>— Vorbringer, Deutsche Ent. Zeitschr. 1905,<br>p. 303. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl.<br>1912, p. 997. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p.<br>173 (subg. <i>Marklissus</i> ). — Hansen, Danmarks<br>Fn. IV, 1918, p. 184. — Hust. Miscell. Rev.<br>Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 101, 275. | Allemagne,<br>France   |
| <b>c h a l y b a e u s</b> | Weise, Deutsche Ent. Zeitschr.<br>XXVII, 1883, p. 322, 326. — Schultze, l. c.<br>1902, p. 419; 1903, p. 290.   |  |
| <b>Bi ologie:</b>          | Houard, Zoocéc. Eur. I, 1908, p.<br>465, 466 (Cécidie); III, 1913, p. 1350. — Pe-<br>necke, Wien. Ent. Zeit. XXXIX, 1922, p. 187.<br>— Hust. l. c. p. 275.   |  |
| <b>Penekei</b>             | H. Wagn. Col. Centralbl. <del>I, 1926</del> , p. 286, fig.   | Espagne,<br>Portugal<br>Algérie  |
| <b>penicillus</b>          | Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p.<br>31; l. c. 1902, p. 222.  |  |
| <b>perasper</b>            | Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1924, p. 64.   | Algérie:<br>El Golea   |
| <b>peregrinus</b>          | Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Cire. IV, 1, 1837,<br>p. 504; l. c. VIII, 2, 1845, p. 149. — Schultze,<br>Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 214. — Vi-<br>tale, Natur. Sicil. XX, 1908, p. 174. — Reitt.<br>Fn. Germ. V, 1916, p. 158 (subg. <i>Hadroplon-<br/>tus</i> ). — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh.<br>1924, p. 112, 163.  | France,<br>Corse,<br>Sardaigne,<br>Sicile,<br>Algérie                      |
| <b>Bi ologie:</b>          | Peyerimhoff, Ann. Soc. Ent. Fr.<br>1911, p. 305.   |  |
| <b>perelegans</b>          | Fairm. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) VI, 1886, p.<br>455.   | Obock  |
| <b>Perrisi</b>             | Ch. Bris. Abeille V, 1869, p. 436. — Schultze,<br>Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 223. — Hust.<br>Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1923, p. 96,<br>137.   | Madrid,<br>France  |
| <b>persimilis</b>          | Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896,<br>p. 447, t. 14, f. 31a.   | Etats-Unis   |
| <b>perversus</b>           | Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p.<br>264 ( $\varphi$ ) et 291.  | Russie mér.  |
| <b>pervestitus</b>         | Fall, Pap. Calif. Ac. VIII, 1901, p. 267.  | Californie mér.  |
| <b>pervicax</b>            | Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883,<br>p. 322, 331; l. c. 1896, p. 183. — Schultze,<br>Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 289; l. c.<br>1898, p. 168; l. c. 1902, p. 225. — Everts, Col.<br>Neerl. II, 1903, p. 678. — Kuhnt, Ill. Best.-<br>Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 997. — Reitt.<br>Fn. Germ. V, 1916, p. 173 (subg. <i>Marklissus</i> ).   | Europe centr.,<br>Allemagne,<br>Hongrie,<br>Turquie,<br>Sibérie,<br>France |

- Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 103, 295.  
*suturrellus* Bedel et auct. nec Gyll.  
 var. *Delahoni* H. Wagn. Col. Centralbl. III, 1928—29 (1929), p. 240.
- Biologie:** Sainte-Claire Deville, Abeille XXXI, 1909, p. 143. — Hust. l. c. p. 296. — Penecke, Wien. Ent. Zeit. 1922, p. 187.
- Peyerimhoffi** Hust. Bull. Soc. Ent. Fr. 1916, p. 69. — Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. 1919, p. 242.
- phytobioides** Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 281; Col. Atlant. 1865, p. 268. — Mars. Abeille XII, 1875,, p. 356. — Peyerimhoff, Ann. Soc. Ent. Fr. 1926, p. 390 (subg. *Hesperorhynchus*).
- piceolatus** Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. 1883, p. 113. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 222.
- picipennis** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 253; l. c. 1902, p. 222. — Fuente, Bol. Soc. Espana Hist. Nat. IV, 1904, p. 387.
- var. *libanoticus* Schultze, l. c. 1901, p. 96; 1902, p. 222.
- Biologie:** Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. 1911, p. 306.
- picitarsis** Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 546; l. c. VIII, 2, 1845, p. 162. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 349. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 167; (1887), p. 334. — Seidl. Fn. Transsylyv. 1888—91 (1891), p. 703. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1894), p. 384. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 224; 1903, p. 289. — Everts, Col. Neerl. II, 1903,—p. 678 (subg. *Nedyus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 996. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 170 (subg. *Marklissus*). — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924,, p. 104, 269.
- tarsalis* Bohem. in Schönh. Gen. Sp. Curc. VIII, 2, 1845, p. 167. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 346. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 544. — Waterhouse, Trans. Ent. Soc. London (n. s.) V, 1858—65; Proc. p. CXXIV. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 807. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 321, 324. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 224.
- Biologie:** Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIII, 1876 (1877), p. 248; Larves Col. 1877, p. 408. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 322; XIX, 1887, p. 20. — Goury et Guignon, Feuill. Jeun. Natural. XXXVII, 1907, p. 29, 114. — Bourgeois, Mittheil. Nat. Ges. Colmar IX, 1907—08 (1908), p. 171. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 263. — Peyerimhoff, Ann. Soc. Ent. Fr. 1911, p. 305. — Hust. l. c. p. 269.
- pilosellus** Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 540; l. c. VII, 2, 1845, p. 157. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 343. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 166; (1887),
- Allemagne  
Algérie,  
Sicile  
Ténériffe  
Russie mér.  
Algérie,  
Espagne  
Liban  
Europe  
centr. et  
mérid.
- Angleterre,  
Belgique,  
France,  
Espagne,

- p. 391. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891,  
p. 343. — Stierl. Fn. Col. Helvet. 1886—98  
(1894), p. 378. — Schultze, Deutsche Ent.  
Zeitschr. 1902, p. 218; 1903, p. 289. — Everts,  
Col. Neerl. II, 1903, p. 677 (subg. *Nedyus*).  
— Tomlin, Ent. Monthly Mag. XLV, 1909,  
p. 15. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl.  
1912, p. 993. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p.  
164 (subg. *Glocianus*). — Hust. Miscell. Rev.  
Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 104, 264.  
*Gobanzi* Reitt. Wien. Ent. Zeit. X, 1891,  
p. 262.  
? *hispidulus* (Stev.) Crotch, Entomol. II, 1864  
—65 (1865), nr. 18, p. 260.
- piriformis** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p.  
277 (♀); l. c. 1902, p. 225. — Reitt. Fn.  
Germ. V, 1916, p. 173 (subg. *Marklissus*).  
Biologie: Penecke, Wien. Ent. Zeit. XXXIX,  
1922, p. 187.
- pistor** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 219;  
1903, p. 257; Horae Soc. Ent. Ross. XXXVI,  
1903, p. 73.
- planidorsum** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900,  
p. 27 (♀); l. c. 1902, p. 223.
- Biologie: Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr.  
1915, p. 56.
- plastus** Faust, Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 207. —  
Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 220.
- quadrangularis* Schultze, Deutsche Ent.  
Zeitschr. 1896, p. 285 (♀); 1898, p. 268.
- pleurostigma** Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 282 (*Cur-*  
*culio*). — C. G. Thoms. Skand. Col. X, 1868,  
p. 200, 202. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI,  
1882—88 (1885), p. 171; (1887), p. 333. —  
Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 344, 353.  
— Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891),  
p. 630; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 702.  
— Stierl. Fn. Col. Helvet. 1886—98 (1894),  
p. 382. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900,  
p. 545, 547. — Schultze, Deutsche Ent. Zei-  
tschr. 1902, p. 218. — Everts, Col. Neerl. II,  
1903, p. 689 (subg. *Nedyus*). — Kuhnt, Ill.  
Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 995. —  
Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 168. — Hansen,  
Danmarks Fn. IV, 1918, p. 173. — Hust. Mis-  
cell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 109, 221  
— Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 121, 125.  
*sulcicollis* C. G. Thoms. Skand. Col. VII,  
1866, p. 272; X, 1868, p. 200. — Kolbe, Ent.  
Nachr. XXVII, 1900, p. 229. — Auriv. l. c.  
p. 125.
- Biologie: Guérin, Ann. Soc. Ent. Fr. (2)  
III, 1845, Bull. p. XXXIII. — Chapuis, Mém.  
Soc. Sc. Liège VIII, 1853, p. 562. — Haim-  
hoffen, Verh. zool.-bot. Ver. Wien V, 1855,  
p. 525. — Curtis, Farm Ins. 1860, p. 132, fig.  
22, 23, f. 5. — Taschenberg, Schädl. Ins.  
1865, p. 57, fig. 11. — Kessler, Lebensg.  
Ceuth. *sulcicollis*, 1866, p. 3—25, fig. — No-  
wicki, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIV,

Hongrie,  
Turquie

Obir,  
Corinthie

Turkestan:  
Aulie-Ata

Algérie

Arax

Europe,  
Sibérie,  
Algérie

1874, p. 364. — Kaltenbach, Pflanzenf. 1874, p. 31. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 318, 322, 325. — Lampa, Ent. Tidskr. XV, 1894, p. 16—18, fig. — Kolbe, Ent. Nachr. 1900, p. 229, 320. — Goury et Guignon, Feuill. Jeun. Nat. XXXVII, 1907, p. 96, 97, 112, 116, 212 (cécidie). — Houard, Zoocécid. Eur. I, 1908, p. 442 à 477 (Cécidie); l. c. III, 1913, p. 1844, 1852 (Cécidies). — Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. 1911, p. 305; 1926, p. 975. — Kleine, Ent. Blätt. 1910, p. 261. — Schmidt, Ent. Rundschau XXVII, 1910, p. 137 (Cécidie). — Journ. Board. Agric. XXII, 1915, p. 884, 22 p., pl. — Isaac, Journ. Minat. Agric. XXVIII, p. 1130, fig. — Hust. l. c. p. 222, 223. <sup>1869</sup>

**plumbeus** Ch. Bris. Abeille V, <sup>1804</sup>, p. 450. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 220. — Neresh. u. Wagn. Ent. Mitt. X, 1921, p. 8, fig. 3.

**polliger** Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Cerc. IV, 1, 1837, p. 500; l. c. VIII, 2, 1845, p. 145.

**pollinarius** Forster, Novae Spec. Ins. 1771, p. 33 (*Curculio*). — Gmel. in Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1771. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 521. — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 226 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. Sp. Cerc. IV, 1, 1837, p. 548; VIII, 2, 1845, p. 161. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 280 (*Nedyus*); Man. Brit. Col. 1839, p. 221. — Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 385; ed. 2, 1858, p. 805; ed. 3, II, 1874, p. 346. — Bach, Käferf. II, 1852—54 (1854), p. 348, 368. — Gutfl. Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 547. — Woll. Cat. Col. Canar. 1864, p. 280; Col. Atlant. 1865, p. 267. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 262 (subg. *Hadropontus*); X, 1868, p. 199. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 168; (1887), p. 330. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 343, 351. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2. 1887—91 (1891), p. 627; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 699. — Stierlin, Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1894), p. 377. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 430; 1902, p. 218. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 544. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 679 (subg. *Nedyus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 991, fig. 295e. — Wagner in Calwer, Käferb. ed. VI, 1907—16 (1916), p. 1132, t. 41, f. 10. — Reitt, Fn. Germ. V, 1916, p. 163 (subg. *Ethelcus*). — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 156. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 99, 184. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 121, 125 (*Ethelcus*).

**dentatus** Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 280 (*Curculio*).

**caliginosus** Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 34 (subg. *Nedyus*); Man. Brit. Col. 1839, p. 221. — Schönh. Gen. Sp. Cerc. IV, 1, 1837, p. 566; VIII, 2, 1845, p. 161.

Allemagne

Cap de Bonne  
Espérance  
Europe

Angleterre

*nigrinus* Steph. Syst. Cat. Brit. Ins. 1829, p. 155 (*Nedyus*); Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 34; Man. Brit. Col. 1839, p. 221.

*glaucinus* Bohem. in Schönh. Gen. Sp. Curc. VIII, 2, 1845, p. 146. — Bach, Käferf. II, 1854, p. 346, 358. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 807; ed. 3, II, 1874, p. 348. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 544. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 430; 1902, p. 218.

**Biology:** Gmel. in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1771. — Mathieu, Cat. Col. Cure. Belg. in Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 236. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854 — 1868, p. 61. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIII, 1876 (1877), p. 249; Larves Col. 1877. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 322; XIX, 1887, p. 20. — Bourgeois, Mittheil. Nat. Ges. Colmar IX, 1907—08 (1908), p. 171. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 275. — Hust. l. c. p. 185.

*pollinosus* Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 496.

Etats-Unis

*polystriatus* Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 249; l. c. 1902, p. 218.

Caucase

*ponticus* Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 426 (♂); l. c. 1902, p. 215.

Asie mineure:

Amasie

*porcellus* Fährs. Öfvers. Vet. Akad. Förh. 1871, p. 277.

Caffrerie

*portulaceae* Marshall, Bull. Ent. Research VI, 1916, p. 368, fig.

Inde

*posthumus* Germ. Ins. Sp. nov. I, 1824, p. 237. — Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 493; l. c. VIII, 2, 1845, p. 141. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 357. — Redt. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 801; ed. 3, II, 1874, p. 350. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 543. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 176; (1887), p. 341. — Seidlitz, Fn. Transsyly. 1891, p. 696. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 548. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 223. — Kuhnt, Ill. Best. Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 991. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 150. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 192. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1923, p. 96, 134. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 128.

Europe

*humilio* Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 578 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 491; l. c. VIII, 2, 1845, p. 140. — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1835, p. 60 (*Rhynchaenus*). — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 356. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 267; X, 1868, p. 144. — Seidlitz, Fn. Balt. 1872, p. 448; ed. 2, 1891, p. 625. — Stierl. Fn. Col. Helvet. 1894, p. 374. — Schultze, l. c. p. 223. — Bedel, l. c. p. 341. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 673.

Suède

*asperulus* Bohem. in Schönh. Gen. Sp. Curc. VIII, 2, 1845, p. 140. — Bedel, l. c. p. 341. — Schultze, l. c. p. 223.

France

- Poweri* Rye, Ent. Monthly Mag. I, 1864—65 (1864), p. 137; II, 1865—66 (1865), p. 63. — Bedel, l. c. p. 341. — Schultze, l. c. p. 332.
- Biologie:** Perris, Larves 1877, p. 409. — Perris in Gobert, Cat. Col. Landes p. 276. — Bedel, l. c. p. 334 nota, 341. — H. Wagn. Col. Centralbl. III, 1928—29 (1929), p. 244.
- procerulus** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 310 (♂), l. c. 1902, p. 222.
- profanus** Fährs. Öfvers. Vet.-Akad. Förh. 1871, p. 276.
- protentus** Schultze, Horae Soc. Ent. Ross. XXXVI, 1902, p. 82 (♀); Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 222; 1903, p. 267.
- puberulus** Lec. in Lec. et Horn, Rhynchoph. 1876, p. 279. — Blatchl. et Leng, Rhynchoph. 1916, p. 453. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 452.
- pubicollis** Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Cerc. IV, 1, 1837, 524 p. 140, l. c. VIII, 2, 1845, p. 171. — Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 383; ed. 2, 1858, p. 798; ed. 3, II, 1874, p. 340. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 347, 367. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 540. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 174; (1887), p. 328 (subg. *Thamiocolus*). — Faust, Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XXXII, 1890, p. 102. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 625 (subg. *Thamiocolus*); Fn. Trans-sylv. 1888—91 (1891), p. 695. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1894), p. 375 (subg. *Thamiocolus*). — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 163; 1902, p. 213; 1903, p. 288. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 685 (subg. *Nedyus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 990; fig. 297 d, 298 a. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 159 (subg. *Thamiocolus*). — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 116, 143 (*Thamiocolus*).
- signatellus** Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Cerc. IV, 1, 1837, p. 575; l. c. VIII, 2, 1845, p. 171. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 163; 1902, p. 213.
- ♀ interstinctus** Gyll. l. c. p. 570; VIII, 2, p. 170. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 163; 1902, p. 213.
- Weisei** Reitt. Wien. Ent. Zeit. VII, 1885, p. 272 (*Allodactylus*); l. c. XX, 1901, p. 129 nota (*Thamiocolus*). — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 209 (err.); 1903, p. 287.
- Sequensi** Stierl. Mitt. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1897, p. 479. — Schultze, l. c. 1903, p. 287.
- var. **Bedeli** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 292; l. c. 1902, p. 213.
- var. **Planeti** Hust. Bull. Soc. Ent. Fr. 1916, p. 114; Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 144 nota.
- var. **continuus** Rey, Echange XI, 1895, p. 38. — Hust. l. c. p. 144.
- Biologie:** Hust. l. c. p. 144.
- Angleterre
- Mts. Alai
- Caffrerie
- Turkestan;
- Aulie-Ata
- Etats-Unis
- Allemagne,
- France,
- Belgique,
- Autriche,
- Hongrie,
- Italie,
- Balkans,
- Caucase,
- Hongrie mér.
- Caucase
- Croatie
- Espagne mér.
- Savoie

**pulvinatus** Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1831, p. 494; l. c. VIII, 2, 1845, p. 141. — Falderm. Faune Ent. Transc. II, 1837, p. 248; III, 1838, p. 205. — Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 382; ed. 2, 1858, p. 800; ed. 3, II, 1874, p. 350. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 355. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 543. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 176; (1887), p. 340. — Seidlitz, Fn. Balt. 1872, p. 448; ed. 2, 1891, p. 625; Fn. Transsylv. 1891, p. 696. — Stierl. Fn. Col. Helvet. 1894, p. 378. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 223. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 674. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 991. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 190. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 191. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1923, p. 97, 132. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 128.

**cochleariae** C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 255. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 128.

**Biologie:** Urban, Ent. Blätt. XIII, 1917, p. 315. — H. Scheuch, Col. Rundsch. VII, 1918, p. 17. — Hust. l. c. 132.

**puncticollis** Bohem. in Schönh. Gen. Sp. Curc. VIII, 2, 1845, p. 165. — Schultze, Fn. Germ. V, 1916, p. 168.

**Biologie:** Ganglb. Wien. Ent. Zeit. I, 1882, p. 119. — J. Bachinger, Col. Rundsch. VII, 1918—19, p. 16. — H. Scheuch, l. c. p. 16.

**punctiger** Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 538; l. c. VIII, 2, 1845, p. 156. — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1835), p. 97 (*Rhynchaenus*). — Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 388; ed. 2, 1858, p. 802; ed. 3, II, 1874, p. 343. — Bach, Käferf. II, 1852—54 (1854), p. 347, 361. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 545. — Crotch, Entomol. II, 1864—65, nr. 18, 1865, p. 260. — C. G. Thoms. Skand. Col. X, 1868, p. 346. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 170; (1887), p. 331. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 344, 354, tab. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 628; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 699. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 376. — Stierl. Fn. Col. Helvet. 1886—1898 (1894), p. 378. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross XXIX, 1895, p. 106. — Gerhardt, Zeitschr. Ent. (Breslau) 1899, p. 12. — Lamere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 545. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 218. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 682 (subg. *Nedyus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 993, fig. 302 b. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 164 (subg. *Glocianus*). — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 163, fig. 100. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 108, 208, 211. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 120, 124.

Europe,  
Transcauc.,  
Asie min.,  
Sibérie

Allemagne,  
Autriche,  
Hongrie,  
Russie,  
Caucase

Europe  
centr. et  
septentr.,  
Corfou

*ab. inaequalis* Edwards, Ent. Month. Mag. XLVII, 1911, p. 210. — Hust. l. c. p. 212.

*var. rufitarsis* Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Cire. IV, 1, 1837, p. 539; VIII, 2, p. 157. — Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXIX, 1895, p. 106. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 218. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 993. — Hust. l. c. p. 212.

**Biologie:** Kawall, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1867, p. 117 (Métamorphoses). —

Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIII, 1876 (1877), p. 217, 249; Larves Col. 1877, p. 406. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 321; XIX, 1887, p. 19. — Bourgeois, Mittheil. Nat. Ges. Colmar IX, 1907—08 (1908), p. 171. — Hust. l. c. p. 212. — F. Brocher, Bull. Soc. Ent. Fr. 1928, p. 238.

**punicus** Schultze, Abeille XXIX, 1899, p. 265; Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 223.

**pusillus** Lec. in Lec. et Horn, Rhynch. 1876, p. 276. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 443.

**pusio** Mannerh. (non Páñz.) Bull. Soc. Nat. Moscou XXV, 1852, p. 355. — Lec. in Lec. et Horn, Rhynch. 1876, p. 276. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 441. — Blatchl. et Leng, Rhynchoph. N. E. Am. 1916, p. 446.

**pyrenaeus** Ch. Bris. Abeille V, 1869, p. 439. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 218. — Hust. Miscell. Rev. Ceuthorh. Gallo-Rh. 1924, p. 118, 128.

**pyrrhorhynchus** Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 257 (*Curculio*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 31 (*Nedyus*). — Schönh. Gen. Sp. Cire. VIII, 2, 1845, p. 143. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 357. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 543. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 176; (1887), p. 340. — Seidlitz, Fn. Balt. 1872, p. 448; ed. 2, 1891, p. 625; Fn. Transsylv. 1891, p. 696. — Stierl. Fn. Col. Helvet. 1894, p. 374. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 223. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 673. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 991. — Reitt, Fn. Germ. V, 1916, p. 150, t. 161, f. 15. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 191. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1923, p. 97, 131. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 128.

**phaeorynchus** Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 258 (*Curculio*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 32 (*Nedyus*). — Schultze, l. c. 1902, p. 223.

**ruficrus** Marsh. l. c. p. 258.

**erythrorynchus** Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Cire. IV, 1, 1837, p. 496; l. c., VIII, 2, 1845, p. 143. — Bedel, l. c. p. 340. — Schultze, l. c. 1902, p. 223.

**achilleae** Gyll. l. c. 1837, p. 497; 1845, p. 144. — Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 382; ed. 2,

Russie mér.

Tunisie

Etats-Unis

Alaska,  
Californie,  
Michigan

Htes. Pyrénées

Europe,  
Algérie,  
Sibérie

1858, p. 801; ed. 3, II, 1874, p. 350. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 358. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 543. — Bedel, l. c. p. 340. — Schultze, l. c. 1902, p. 223.

*suturalis* Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 419 (*Nedyus*).

var. *linealbatus* Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 223; l. c. 1903, p. 294.

*Biologie*: Bedel, l. c. VI, p. 340, Suppl. VI bis, p. 102. — H. Scheuch, Münch. Kol. Zeitschr. IV, 1904, p. 155. — Hust. l. c. p. 132.

*quadridens* Panz. Deutschl. Ins.-Fn. 1795, p. 302 (*Curculio*); Fn. Ins. Germ. 36, 1796, t. 13. — Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 221. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1835), p. 98 (*Rhynchaenus*). — Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 534; l. c. VIII, 2, 1845, p. 155. — Bach, Käferf. II, 1852—54 (1854), p. 347, 363. — Woll. Ins. Mader. 1854, p. 326; Cat. Col. Mader. 1857, p. 105; Cat. Col. Canar. 1864, p. 280; Col. Atlant. 1865, p. 277. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 803; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 344. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 277; X, 1868, p. 201. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 321, 324. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 167; (1887), p. 334. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 243. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 628; Fn. Transsyly. 1888—91 (1891), p. 700. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1894), p. 380. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 543, 547. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 224; 1903, p. 289. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 677 (subg. *Nedyus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 994, fig. 302 d. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 170 (subg. *Marklissus*). — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. America, 1916, p. 443. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 162. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 120, 124, fig. 33. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 104, 267.

*borrhaginis* Gyll. Ins. Suec. I, 3., 1813, p. 227 (*Rhynchaenus*); l. c. I, 4, 1827, p. 594

— Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 312;

Ins. Lapp. I, 1838 (1840), p. 177. — Steph.

Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 35 (subg.

*Nedyus*); Man. Brit. Col. 1839, p. 221.

*calcicar* Panz. Fn. Ins. Germ. ed. 2, 1800?, 36, t. 13 (*Curculio*).

♂ *pallidactylus* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 259 (*Curculio*). — Steph. Ill. Brit. Ent.

Mandib. IV, 1831, p. 35 (*Nedyus*); Man. Brit.

Col. 1839, p. 221. — Gyll. in Schönh. Gen.

Cure. IV, 1, 1837, p. 536; VIII, 2, 1845, p. 155.

♀ *quercicola* Marsh. l. c. p. 280. — Steph.

Ent. IV, 1831, p. 35 (*Nedyus*); Man. Brit. Col.

1839, p. 221. — Crotch, Entomol. 35, 1864—65,

nr. 18, 1865, p. 260.

Damas

Europe,  
Madère,  
Algérie,  
Maroc,  
Tunisie,  
Caucase,  
Etats Unis

*series etosus* Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 421.

**Biologie:** Goureau, Ann. Soc. Ent. Fr. (4) VI, 1866, p. 171. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 344. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIII, 1876 (1877), p. 248; Larves Col. 1877, p. 408. — Rosenhauer, Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 140. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 323; XIX, 1887, p. 20. — Lampa, Ent. Tidskr. XV, 1894, p. 18. — Chittenden, Bull. Dept. Div. Ent. nr. 33, 1902, p. 79. — Goury et Guignon, Feuill. Jeun. Natur. XXXVII, 1907, p. 46, 113, 116 (Cécidie). — Houard, Zoocécid. Eur. I, 1908, p. 461 (Cécidie). — Bourgeois, Mittheil. Nat. Ges. Colmar IX, 1907—08 (1908), p. 170. — Reh in Sorauer, Pflanzenkr. III, 1906—13 (1913), p. 563. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 263. — Peyerimh., Ann. Soc. Ent. Fr. 1911, p. 307. — Speyer, Ent. Blätt. XVII, 1921, p. 118—124, tab. — Vogel, Canad. Ent. XLIII, 1921, p. 165—171. — Hust. l. c. p. 268.

**quadripunctatus** Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IX, 1893—97, (1894), p. 102, 121. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 269; l. c. 1902, p. 215; l. c. 1903, p. 288. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 161 (subg. *Hadropontus*).

var. *unionis* Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 161.

1813

**quercti** Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1817, p. 149; I. c. I, 4, 1827, p. 579 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. Sp. Curr. IV, 1, 1837, p. 489; I. c. VIII, 2, 1845, p. 140. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1884—89 (1885), p. 62 (*Rhynchaenus*). — Bach, Käferf. II, 1854, p. 345, 351. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 798; ed. 3, II, 1874, p. 341. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 540. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 270; X, 1868, p. 200. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1887), p. 331, nota. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. 1887, p. 418; 1896, p. 183. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 628; Fn. Transsylv. 1888—1891 (1891), p. 700. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1894), p. 379. — Champion, Ent. Monthly Mag. XXXV, 1899, p. 142. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 222. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 681 (subg. *Nedyus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 993. — Fowler, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 196. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 165 (subg. *Oprohinus*). — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 175. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 121, 125. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 106, 260.

**haemorrhoidalis** Motsch. Schrenck's Reis. Amurland II, 2, 1860, p. 156, t. 10, f. 5. — Mars. Abeille XVI, 1878, p. 117. — Faust,

Hongrie

Angleterre,  
Hollande,  
Allemagne,  
Borkum,  
Suède,  
Suisse:  
Genève,  
Sporades,  
Caucase,  
Corfou,  
France

Borkum,  
Finlande,  
Caucase,

- Deutsche Ent. Zeitschr.* 1882, p. 259; 1898, p. 270; *Berl. Ent. Zeitschr.* LI, 1890, p. 116. — *Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr.* 1898, p. 269; 1902, p. 222.
- Biologie:** Bargagli, *Bull. Soc. Ent. Ital.* XVII, 1885, p. 323; XIX, 1887, p. 20. — Newbery, *Ent. Monthly Mag.* XLIX, 1913, p. 213. — Hust. l. c. p. 261.
- quercicola** Payk. *Mon. Curc.* 1792, p. 70 (*Curculio*); *Fn. Suec.* III, 1800, p. 215. — F. *Ent. Syst.* I, 2, 1792, p. 408; *Syst. El.* II, 1801, p. 451 (*Rhynchaenus*). — Herbst, *Käf.* VI, 1795, p. 403, t. 91, f. 13 (*Curculio*). — Latr. *Hist. Nat. Ins.* XI, 1804, p. 134. — Ol. *Ent.* V, 1807, 83, p. 133, t. 33, f. 500 (*Rhynchaenus*). — Gyll. *Ins. Suec.* I, 2, 1810, p. 230 (*Rhynchaenus*); in Schönh. *Gen. et Sp. Curc.* IV, 1, 1837, p. 540 (*Ceuthorrhynchus*); l. c. VIII, 2, 1845, p. 157. — Sablb. *Ins. Fenn.* II, 1885, p. 100. — Redtenb. *Fn. Austr. ed.* 2, 1858, p. 802; ed. 3, II, 1874, p. 350. — Bach, *Käferfn.* II, 1854, p. 360. — C. G. Thoms. *Skand. Col.* VII, 1865, p. 258; X, 1868, p. 144. — Bedel, *Fn. Bass. Seine* VII, 1882—88 (1885), p. 178; (1887), p. 332. — Seidlitz, *Fn. Balt.* 1872, p. 448; ed. 2, 1891, p. 624; *Fn. Transsylv.* 1891, p. 695. — Stierl. *Fn. Col. Helvet.* 1894, p. 372. — Schultze, *Deutsche Ent. Zeitschr.* 1902, p. 222. — Everts, *Col. Neerl.* II, 1903, p. 672. — Kuhnt, *Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl.* 1913, p. 990. — Reitt. *Fn. Germ.* V, 1916, p. 149. — Hansen, *Danmarks Fn.* IV, 1918, p. 188. — Hust. *Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh.* 1924, p. 98, 124. — Auriv. *Svensk Insekt.* 9, 1924, p. 128.
- uniguttatus* Marsh. *Ent. Brit.* I, 1802, p. 283. — Bedel, l. c. p. 332.
- grrysus* Herbst, *Käf.* VI, 1795, p. 399, t. 91, f. 9. — Gutfl. & Bose, *Käf. Deutschl.* 1859, p. 543. — Bedel, l. c. p. 332. — Schultze. *Deutsche Ent. Zeitschr.* 1902, p. 222.
- versicolor* Ch. Bris. in Wencker et Silberm. *Cat. Col. Alsace* 1866, p. 131. — Mars. Abeille IV, 1867, p. LII. — Bedel, l. c. p. 332. — Schultze, l. c. p. 222.
- var. *maculicollis* Rey, *Echange* XI, 1895, p. 38. — Hust. l. c. p. 126.
- Biologie:** Falcoz, *Bull. Soc. Ent. Fr.* 1922, p. 225; *Ann. Epiph.* XI, 3, 1926, p. 125. — Hust. l. c. p. 126.
- radula** Germ. *Ins. Spec. nov.* I, 1824, p. 238. — Gyll. in Schönh. *Gen. Sp. Curc.* IV, 1, 1837, p. 505; l. c. VIII, 2, 1845, p. 147. — Redtenb. *Fn. Austr.* 1849, p. 388; ed. 2, 1858, p. 802; ed. 3, II, 1874, p. 344. — Bach, *Käferf.* II, 1854, p. 347, 362. — Seidlitz, *Fn. Transsylv.* 1888—91 (1891), p. 698. — Stierl. *Fn. Col. Helvet.* II, 1886—98 (1896), p. 377. — Schultze, *Deutsche Ent. Zeitschr.* 1902, p. 214. — Everts, *Col. Neerl.* II, 1903, p. 679 (subg.).

Amour,  
Sibérie or.

Europe

Angleterre

Allemagne,  
Autriche,  
Russie,  
Italie,  
Suisse

*Nedyus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 992. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 153 (subg. *Mogulones*); Wien. Ent. Zeitschr. XX, 1901, p. 86. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 105, 151. — H. Wagner, Col. Centralbl. II, 1927, p. 205, 213, t. 2, f. 5a, b.

Biologie: Hust. l. c. p. 153.

**Ragusea** Ch. Bris. Natur. Sicil. III, 1889, p. 61. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 218; 1903, p. 289; Abeille XXIX, 1898, p. 266 nota.

*puerulus* Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 320; l. c. 1902, p. 218; Wiss. Mittheil. Bosnien V, 1897, p. 498.

**rapae** Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Cura. IV, 1, 1837, p. 547; l. c. VIII, 2, 1845, p. 164. — Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 386; ed. 2, 1858, p. 805; ed. 3, II, 1874, p. 347. — Bach, Käferf. II, 1854, p. 348, 370. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 271; X, 1868, p. 200. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 171. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 344, 353. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 630; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 702. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1894), p. 382. — Schultze, Deutsehe Ent. Zeitschr. 1902, p. 219. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 684 (subg. *Nedyus*); Tijdschr. Ent. L, 1907, p. 1—3. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 995. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 167, t. 162, f. 3. — Blatchl. et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 441, fig. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 121, 125. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 110, 237.

*in affectatus* Crotch (nec Gyll), Entomol. II, 1864—65 (1865), p. 260.

*affluentus* Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 421. — Champ. Biol. Centr.-Amer. IV, 5, 1907, p. 152. — Chittenden, Bull. 23, U. S. Dep. Agr. Ent. 1900, p. 40.

Biologie: Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68, p. 61. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 323; XIX, 1887, p. 20. — Tullgren, Stud. Jaktag. Skadeins. 1905, p. 31—35, fig. 5—7. — Goury et Guignon, Feuill. Jeun. Nat. XXXVII, 1907, p. 210. — Bourgeois, Mittheil. Nat. Ges. Colmar IX, 1907—08 (1908), p. 172. — Reh in Sorauer, Pflanzenkrankh. III, 1906—13 (1913), p. 563. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 262. — Chittenden, Bull. 23, U. S. Dep. Agr. Ent. 1900, p. 39—50, fig. 11—12 (Métamorphoses); l. c. 33, 1902, p. 78. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 442, fig. 102 (larve, nymphe etc.). — Hust. l. c. 238.

**Reitteri** Tyl, Ent. Blätter X, 1914, p. 1, fig. 1—2.  
**resedae** Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 256 (*Curculio*). — Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Cura. IV, 1837,

Sicile,  
Italie,  
Bosnie,  
Trieste,  
Fiume

Europe centr.  
et mér.,  
Caucase,  
Turkestan,  
Etats-Unis

Espagne mér.  
Europe centr.  
et mér.,

p. 535; l. c. VIII, 2, 1845, p. 155. — Steph. Man. Brit. Col. Mandib. 1839, p. 223 (subg. *Nedyus*). — Bach, Käferf. II, 1852—54 (1854), p. 346, 359. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 807; ed. 3, II, 1874, p. 348. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 169: (1887), p. 333. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 344, 354, 314. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 218. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 681 (subg. *Nedyus*). — Vitale, Nat. Sic. XVII, 1905, p. 165. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 169. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 107, 217.

Algérie,  
Caucase

**Biologie:** Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 323; XIX, 1887, p. 20. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 263. — Hust. l. c. p. 219.

**rhenanus** Schultze Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 424; l. c. 1902, p. 223. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 991. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 150. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rhén. 1923, p. 97, 129.

France,  
Allemagne,  
Transsylv.,  
Russie

**Biologie:** Hust. l. c. p. 131. — H. Wagn. Col. Centralbl. III, 1928—29 (1929), p. 243.

**rhinoncoides** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XX, 1901, p. 86 (*Cidnorhinus*). — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 291.

Sibérie

**rhusii** Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 562; l. c. VIII, 2, 1845, p. 169.

Cafrerie

**rinicae** Gyll. l. c. IV, 1, 1837, p. 563; l. c. VIII, 2, 1845, p. 169.

"

**Roberti** Gyll. l. c. IV, 1, 1837, p. 548; l. c. VIII, 2, 1845, p. 165. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 347. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 630; Fn. Transsylv. 1888—1891 (1891), p. 770. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 165; 1902, p. 218. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 683 (subg. *Nedyus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 995. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 168. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 108, 110, 225.

Allemagne,  
Hollande,  
Belgique,  
France,  
Caucase

**var. *alliariae*** H. Bris. Rev. Mag. Zool. 1860, p. 538. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 171; (1887), p. 333. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 165; 1902, p. 218. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 344, 353; VI, 1913, p. 314. — Hust. l. c. p. 226.

France,  
Allemagne,  
Angleterre

**inornatus** G. R. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. 1861, Proc. p. XIII. — Crotch, Entom. II, 1864—65, nr. 12, p. 179, nr. 18, p. 260.

**Biologie:** Rupertsberg, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XX, 1870, p. 837. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIII, 1876 (1877), p. 248; Larves Col. 1877, p. 408. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 324; XIX, 1887, p. 20. — Focken, Revue biolog. II, 1890, p. 61. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 263. — Reh in Sorauer,

- Pflanzenkrankh.** III, 1906—1913 (1913), p. 563.  
 — Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. 1911, p. 306.  
 (alliariae): Perris, l. c. p. 248, 408. — Bargagli,  
 l. c. p. 316, 317. — Goury et Guignon, Feuill.  
 Jeun. Natural. XXXVII, 1907, p. 113. —  
 Kleine, l. c. p. 262. — Hust. l. c. p. 226.
- rubidus** Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curae. IV, 1, 1837,  
 p. 484; l. c. VIII, 2, 1845, p. 137.
- rubripes** Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV, 1916,  
 p. 131, 134.
- rudis** Lec. in Lec. et Horn, Rhynchoph. 1876, p. 275.  
 — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896,  
 p. 420, 423, t. 18, f. 21.
- rudissimus** nom. nov.  
*rudis* Pic (nec Lec. 1876), Miscell. Ent. IV,  
 1896, p. 95 (*Nedyus*).
- rufimanus** Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (6) III, 1883,  
 p. 118 (♀). — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr.  
 1902, p. 218.
- rufipes** Ch. Bris. Abeille V, 1868—69 (1869), p. 440.  
 — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902,  
 p. 221.  
 Biologie: Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr.  
 1911, p. 306.
- rugicollis** Ch. Bris. Abeille V, 1869, p. 444. —  
 Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 224.  
 — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 153, nota  
 (subg. *Dionoremus*).
- rugulosus** Herbst, Natursyst. Käf. VI, 1795, p. 406,  
 t. 41, f. 16 (*Curculio*). — Gyll. Ins. Suec. I,  
 8, 1817, p. 231; l. c. I, 4, 1827, p. 596 (*Rhyn-  
 chaenus*); in Schönh. Gen. Sp. Curae. IV, 1,  
 1837, p. 527; l. c. VIII, 2, 1845, p. 153. — C.  
 R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1835), p.  
 100 (*Rhynchaenus*). — Bach, Käferf. II, 1854,  
 p. 347, 365. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl.  
 1859, p. 546. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 2,  
 1858, p. 808; ed. 3, II, 1874, p. 345. — C. G.  
 Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 265; X, 1868,  
 p. 200 (subg. *Hadropontus*). — Bedel, Fn.  
 Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 173;  
 (1887), p. 327 (subg. *Nedyus*). — Fowler, Col.  
 Brit. Isl. V, 1891, p. 344, 356. — Seidlitz, Fn.  
 Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 629; Fn. Trans-  
 sylv. 1888—91 (1891), p. 700. — Stierl. Fn.  
 Col. Helvet. II, 1886—98 (1894), p. 381. —  
 Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 267;  
 1902, p. 217. — Lameere, Man. Fn. Belg. II,  
 1900, p. 545. — Everts, Col. Neerl. II, 1903,  
 p. 687 (subg. *Nedyus*). — Kuhnt, Ill. Best.-  
 Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 995. — Reitt. Fn.  
 Germ. V, 1916, p. 162, t. 161, f. 20 (subg.  
*Hadropontus*). — Hansen, Danmarks Fn. IV,  
 1918, p. 170. — Auriv. Svensk Insekt. 9,  
 1924, p. 119, 123. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth.  
 Gallo-Rh. 1924, p. 114, 194.
- quercicola** var. β Payk. Fn. Suec. III, 1800,  
 p. 216 (*Curculio*).
- cinerreus** Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 283  
 (*Curculio*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib.
- Mississippi
- Japon
- Nevada,  
Kansas
- Sud-Oranais
- Bosnie,  
Caucase
- Espagne mér.:  
Andalousie;  
Maroc,  
Algérie
- Andalousie,  
Algérie
- Europe centr.  
et mérid.

IV, 1831, p. 36 (subg. *Nedyus*); Man. Brit. Col. 1839, p. 222. — Schönh. Gen. Sp. Curr. IV, 1, 1837, p. 567; VIII, 2, 1845, p. 154. — *melenostigma* Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 256 (*Curculio*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 36 (subg. *Nedyus*); Man. Brit. Col. 1839, p. 222. — Schönh. Gen. Sp. Curr. IV, 1, 1837, p. 567; VIII, 2, p. 154. — Crotch, Entomol. II, 1864—65 (1865), p. 260. — *subrufus* var. Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 256 (*Curculio*).

*gallicus* Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curr. IV, 1, 1837, p. 528; VIII, 2, 1845, p. 154. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 217, 289.

*scutellatus* Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 37 (*Nedyus*); Man. Brit. Col. 1839, p. 222. — Schönh. Gen. Sp. Curr. IV, 1, 1837, p. 567; VIII, 2, 1845, p. 156.

var. *immaculatus* Delahon, Deutsche Ent. Zeitschr. 1914, p. 622.

Luckenwalde

Biologie: Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 71; Ann. Soc. Linn. Lyon XXIII, 1876 (1877), p. 248; Larves Col. 1877, p. 409. — Brisout, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, Bull. p. CLXIV. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 21; XIX, 1887, p. 21. — Kleine, Ent. Blätter VI, 1910, p. 265. — Hust. l. c. p. 195.

**rusticus** Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curr. IV, 1, 1837, p. 542; l. c. VIII, 2, 1845, p. 161. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 167; (1887), p. 380. — Schultz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 267; 1902, p. 216. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 679. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 168. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 105, 182.

Europe mér.

*vocifer* Rottenb. Berl. Ent. Zeitschr. XV, 1871, p. 238. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 267; 1902, p. 216.

Italie sept., Sicile

Biologie: Hust. l. c. p. 184.

**Sahlbergi** (Schönh.) Sahlb. in Schönh. Gen. Sp. Curr. VIII, 2, 1845, p. 152. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 626 (subg. *Thamiocolus*); Fn. Transsylyv. 1888—91 (1891), p. 695. — Schultz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 213 (subg. *Thamiocolus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 990 (subg. *Thamiocolus*). — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 159 (subg. *Thamiocolus*). — Hansen, Danmarks Fauna IV, 1918, p. 156. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 116, 145.

Finlande,  
Allemagne  
sept.,  
Danmark,  
Hongrie,  
Autriche,  
Turquie,  
Caucase

*lamii* C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1884—89 (1885), p. 96 (*Rhynchaenus*).

Hongrie,  
Autriche

Biologie: Mathieu, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 234. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 325; XIX, 1887, p. 21. — Varienius, Ent. Tidsschr. XXVII, 1906, p. 230. — Kleine, Ent. Blät. VI, 1910, p. 265. — Hansen, l. c. p. 156.

- Sainte-Clairei** Wagner, Col. Centralbl. II, 1927, p. 206, 209, t. 2, f. 3a, b. Corse
- sareptanus** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 324 (♀); l. c. 1902, p. 225. Russie mérid.: Sarepta
- scabrirostris** Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 1847, II, p. 575. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 214. Arménie russe
- scapularis** Cyl. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 555; l. c. VIII, 2, 1845, p. 166. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 340. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 175; (1887), p. 336. — Seidmitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—1891 (1891), p. 632; Fn. Transsylv. 1888—1891 (1891), p. 704. — Stierl. Fn. Col. Helvet. 1886—98 (1894), p. 384. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 168; 1902, p. 225, 290. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 690. — J. Sahlb. Medd. Soc. Fn. Fl. Fenn. XXI, 1905, p. 105. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 997. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 171, t. 162, f. 9 (subg. *Marklissus*). — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 179. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 118, 286. Fininde, Allemagne, France, Transbaikal
- ♀ *obscurecyaneus* Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 556; VIII, 2, p. 166, — Redtenb. Fn. Austr. 1858, p. 380; 1874, p. 798. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 540. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 322, 328. — Schultze, l. c. 1898, p. 168; 1902, p. 225.
- Biologie:** Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 325; XIX, 1887, p. 21. — Goury et Guignon, Feuill. Jeun. Nat. XXXVII, 1907, p. 44. — Kleine, Ent. Blätt. V, 1910, p. 262. — Hust. l. c. p. 287. — Penecke, Wien. Ent. Zeit. XLIII, 1922, p. 187.
- Schneideri** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 296 (♀); l. c. 1902, p. 213. Buchara
- Schönherri** Ch. Bris. Abeille V, 1869, p. 451. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 171; (1887), p. 338. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 221; 1903, p. 289. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 684. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 110, 253. Allemagne, Hongrie, France, Balkans, Caucase, Algérie
- nigritulus* Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 286; 1898, p. 268; 1902, p. 221.
- Biologie:** Bedel, l. c. p. 338; Bull. Soc. Ent. Fr. 1905, p. 176. — Peyerimhoff, Ann. Soc. Ent. Fr. 1911, p. 306. — Hust. l. c. p. 253.
- Schultzeanus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 81 (subg. *Thamiocolus*). — Schultze, l. c. 1902, p. 213 (*Ceuthorrhynchus*). Buchara
- Schusteri** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 39 (♂); l. c. 1902, p. 225. Autriche: Vienne
- scobinatus** Schultze, Abeille XXIX, 1899, p. 267; Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 215. Tunisie

|                        |  |  |
|------------------------|--|--|
| <i>baborensis</i>      | Pic, Echange XX, 1904, p. 93.<br>— Peyerimhoff, Ann. Soc. Ent. Fr. 1919, p. 242.   | Algérie  |
| <i>Biologie</i> :      | Peyerimhoff. l. c. 1915, p. 55; 1919, p. 242.  |  |
| <i>scolopax</i>        | Schultze, Abeille XXIX, 1899, p. 258;<br>Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 220.   | Algérie,<br>Maroc                                    |
| <i>Biologie</i> :      | Peyerimhoff. Ann. Soc. Ent. Fr. 1926, p. 375.  |  |
| <i>scrobicollis</i>    | Neresh. & Wagn. Deutsche Ent. Zeitschr. 1924, p. 159, fig.   | Allemagne  |
| <i>scutellaris</i>     | Brullé, Exp. scient. Moreé, Col. III, 1832, p. 249, t. 42, f. 7.   | Grèce  |
| <i>sellatus</i>        | Bohem. Eugenies Resa, Col. 1859, p. 146.   | Buenos Aires   |
| <i>semirufus</i>       | Lec. in Lec. et Horn, Rhynchoph. 1876, p. 278. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 449, t. 14, f. 28. — Blatchl. et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 451, fig. 108 B.   | Etats-Unis   |
| <i>seniculus</i>       | Ch. Bris. Ann. Soc. Ent. Fr. (8) III, 1883, p. 117 (♂). — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 221; l. c. 1903, p. 289.  | Daurie   |
| <i>senilis</i>         | Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 281 (♂), 291.   | Trans-<br>caspienne,<br>Arménie<br>russe             |
| <i>septentrionalis</i> | Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Cura. IV, 1, 1837, p. 492; l. c. VIII, 2, 1845, p. 141. — Lec. et Horn, Rhynchoph. 1876, p. 279. — Provancher, Petite Fn. Canada I, 1877, p. 532. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 452. — Blatchl. et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 452.  | Etats-Unis,<br>Canada                                |
| <i>sericans</i>        | Lec. in Lec. et Horn, Rhynchoph. 1876, p. 275. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 424.  | Etats-Unis   |
| <i>sericellus</i>      | Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 229; l. c. 1902, p. 218.  | Syrie:<br>Jérusalem                                  |
| <i>setifer</i>         | Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Cura. IV, 1, 1837, p. 560; l. c. VIII, 2, 1845, p. 169.  | Cap de Bonne<br>Espérance                            |
| <i>sexnotatus</i>      | Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 190 (♀).  | Indes:<br>Khasia Hills                               |
| <i>sibiricus</i>       | Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXIX, 1895, p. 106. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 291.   | Sibérie:<br>Irkutsk                                  |
| <i>siculus</i>         | Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 421, t. 14, f. 17. — Blatchl. et Leng, Rhynchoph. 1916, p. 448.  | Etats-Unis   |
| <i>signatus</i>        | Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Cura. IV, 1, 1837, p. 522; l. c. VIII, 2, 1845, p. 152. — Bach, Käferf. II, 1852—54 (1854), p. 347, 363. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 174; (1887), p. 329 (subg. <i>Thamiocolus</i> ). — Faust, Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XXXII, 1890, p. 101. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1891, p. 626; Fn. Transsylv. 1891, p. 695. — Stierl. Fn. Col. Helvetic. 1894, p. 375 ( <i>Thamiocolus</i> ). — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 213, p. 168, nota. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 990, fig. 297, e. — | Europe centr.<br>et mérid.,<br>Sibérie,<br>Turkestan |

|  |   |
|--|---|
| Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 159 (subg. <i>Thamnioculus</i> ). — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 117, 140.   |   |
| <b>Biologie:</b> Kittel, Corresp. Zool. Ver. Regensburg XXXVI, 1882, p. 32—56. — Bedel, l. c. p. 329. — Hust. l. c. p. 142.  |   |
| <b>similis</b> Ch. Bris. Abeille V, 1869, p. 441. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, 261; l. c. 1902, p. 221; l. c. 1903, p. 289. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 167. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 119, 250.   | Allemagne,<br>France,<br>Russie,<br>Transsylvanie                                       |
| <b>plumbellus</b> Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 243; l. c. 1902, p. 220.  |   |
| <b>Biologie:</b> J. Ste Claire Deville, Abeille XXX, 1900—06 (1904), p. 201. — Hust. l. c. p. 251.   |   |
| <b>smyrnensis</b> Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 248 (♂); l. c. 1902, p. 217.  | Smyrne,<br>Akbes  |
| <b>solitarius</b> Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 269.   | Colorado  |
| <b>sophiae</b> Stev. Mus. Mosqu. II, 1829, p. 100 ( <i>Falciger</i> ). — Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 551; l. c. VIII, 2, 1845, p. 166. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 221. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 684 (subg. <i>Nedyus</i> ). — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 169. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 232. | France,<br>Allemagne,<br>Autriche,<br>Balkans,<br>Russie mér.,<br>Caucase,<br>Aulie-Ata |
| <b>neutralis</b> Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 552; VIII, 2, p. 166. — Bach, Käfern. II, 1854, p. 348, 370. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 458. — Redt. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 808; ed. 3, II, 1874, p. 349. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 221. — Sahlb. Medd. Soc. Fn. Fl. Fenn. XXI, 1905, p. 1.                    |   |
| <b>missettus</b> Gyll. l. c. IV, 1, p. 553; VIII, 2, p. 166. — Schultze, l. c. 1902, p. 221.   | Finlande  |
| <b>menicus</b> (Faust in litt.) Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 46. — Schultze, l. c. 1902, p. 221.  | Araxesthal:<br>Ordubad  |
| <b>sordidus</b> Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XLVI, 1885, p. 198 (♂). — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 221.   | Turkestan,<br>Taschkent   |
| <b>soricinus</b> Ch. Bris. Abeille V, 1869, p. 454. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 219.  | Algérie   |
| <b>Biologie:</b> Peyerimhoff, Ann. Soc. Ent. Fr. 1915, p. 56.  |   |
| <b>spiniferus</b> Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 108 (♂); l. c. 1902, p. 224.  | Bosnie  |
| <b>Splichali</b> Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 102 (♀); l. c. 1902, p. 217. — Tyl, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 123. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 163 (subg. <i>Hadropontus</i> ).   | Turkestan   |
| <b>squamatus</b> Lec. in Lec. et Horn, Rhynchoph. 1876, p. 277. — Blatchl. et Leng, Rhynchoph. 1916, p. 447. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 445.  | Etats-Unis  |

|                       |  |  |
|-----------------------|--|--|
| <b>squamifer</b>      | Schultze, Abeille XXIX, 1899, p. 256; Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 220.  | Algérie:<br>Biskra<br>Caffrerie                                      |
| <b>squamiger</b>      | Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Cerc. IV, 1, 1887, p. 561; l. c. VIII, 2, p. 169.  | Espagne:<br>Reynosa  |
| <b>squamulosus</b>    | Ch. Bris. Abeille V, 1869, p. 456. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 224. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 153, nota (subg. <i>Dionoremus</i> ).  | Taurie,<br>Russie mér.,<br>Caucase,<br>Turquie,<br>Roumanie          |
| <b>Steveni</b>        | Bohem. in Schönh. Gen. Sp. Cerc. VIII, 2, 1845, p. 138. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 257; l. c. 1899, p. 186; 1902, p. 218.  | Hongrie  |
| <i>pictus</i>         | Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. X, 5, 1899, p. 204; Bull. Soc. Sc. Bucarest VIII, 1899, p. 369. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 186; 1902, p. 218.   | Inde   |
| <b>striatellus</b>    | Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 36 ( $\sigma$ ); l. c. 1902, p. 221.  | Corse,<br>Italie,<br>Algérie,<br>France                              |
| <b>subcostulatus</b>  | Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXVIII, 1919 (1920), p. 332.  |  |
| <b>subfasciatus</b>   | Chevr. Rev. Mag. Zool. (2) XII, 1860, p. 453. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 217. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 162 (subg. <i>Hadropontus</i> ). — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 113, 196.<br>var. <i>nigro-vittatus</i> Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 95. — Tyl, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 120, fig. 2. |  |
| Biologie:             | Ste Claire Deville, Abeille XXX, 1901, p. 71.  |  |
| <b>sublineellus</b>   | Ch. Bris. Abeille V, 1869, p. 457. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 1851; l. c. 1902, p. 214. — H. Wagner, Col. Centralbl. II, 1927, p. 206, 215, t. 2, f. 6a, b.  | Turquie,<br>Grèce,<br>Smyrne   |
| <b>submuricatus</b>   | Hochh. Bull. Soc. Nat. Moscou XXIV, 1854, I, p. 97. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 291.  | Russie mérid.  |
| <b>subpilosus</b>     | Ch. Bris. Abeille V, 1869, p. 451. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 220. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 104, 263.   | Espagne,<br>Balkans,<br>Caucase,<br>France                           |
| <b>subpubescens</b>   | Lec. in Lec. et Horn, Rhynchoph. 1876, p. 273.   | Etats Unis   |
| <b>subsultans</b>     | Bohem. in Schönh. Gen. Sp. Cerc. VIII, 2, 1845, p. 137.  | Colombie   |
| <b>subtilirostris</b> | Schultze, Horae Soc. Ent. Ross. XXXVI, 1902, p. 70; Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 219; 1903, p. 255. <i>des besse</i> .   | Rusie mérid.:<br>Kiew;<br>Turkestan,<br>Buchara                      |
| <b>sulcatus</b>       | Ch. Bris. Abeille V, 1869, p. 448. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 59; 1902, p. 226; 1903, p. 290. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 171 (subg. <i>Marklissus</i> ).   | Crimée,<br>Russie mér.,<br>Dalmatie,<br>Grèce,<br>Autriche,<br>Syrie |
| <b>sulcicollis</b>    | Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 217 ( <i>Curculio</i> ). — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 280, observ. — ? G. R. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. (3) I, 1862—64, Proc. p. XII. — Weise,  | Europe sept.<br>et moyenne,<br>Caucase,<br>Sibérie,                  |

Algérie,  
Hollande

Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 321.  
— Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885),  
p. 166; (1887), p. 335. — Seidlitz, Fn. Balt.  
1891, p. 631; Fn. Transsyly. 1891, p. 703. —  
Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1894, p. 384. —  
Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 546. —  
Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 224.  
— Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 676 (subg.  
*Nedyus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf.  
Deutschl. 1913, p. 996. — Reitter, Fn. Germ.  
V, 1916, p. 171, t. 162, f. 6 (subg. *Marklissus*).  
— Hansen, Danmarks Fn. IV, 1916, p. 192.  
— Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 122, 126.  
— Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924,  
p. 101, 270.

*affinis* Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831,  
p. 26. — Schönh. Gen. Sp. Cerc. IV, 1, 1837,  
p. 307 (*Coeliodes*).

*cyanipennis* Germ. Ins. Sp. nov. I, 1824,  
p. 285. — Gyll. Ins. Suec. I, 1827, p. 594  
(*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. Sp. Cure.  
IV, 1, 1837, p. 558; VIII, 2, 1845, p. 167. — C. R.  
Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1835), p. 99  
(*Rhynchaenus*). — Redtb. Fn. Austr. 1849,  
p. 379; 1858, p. 797; 1874, p. 339. — Bach,  
Käferf. II, 1852—54 (1854), p. 344, 349. —  
C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 274;  
X, 1868, p. 201. — Fowler, Col. Brit. Isl. V,  
1891, p. 342, 348. — Kolbe, Ent. Nachr. XXVI,  
1900, p. 227. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr.  
1902, p. 224. — Dietz, Trans. Amer. Ent.  
Soc. XXIII, 1896, p. 431. — Blatchley & Leng,  
Rhynchoph. N. E. America 1916, p. 443.

var. *aeneipennis* Ch. Bris. Ann. Soc. Ent.  
Fr. (6) III, 1883, p. 115. — Schultze, Deutsche  
Ent. Zeitschr. 1902, p. 225; 1903, p. 290.

Biologie: Guérin, Ann. Soc. Ent. Fr. (2)  
III, 1845, Bull. p. 33. — Chapuis et Candèze,  
Cat. Larv. Col. 1858, p. 222. — Westwood,  
Gard. Chronicle 1853, nr. 5, p. 68, fig. —  
Giraud, Verh. zool-bot. Ver. Wien V, 1855,  
p. 128. — Taschenb. Nat. wirb. Thiere. 1865,  
p. 57, t. 2, f. 10—12. — Kessler, Lebensg.  
Ceuthor. sulcicollis etc. 1866, 65 p. — Müller,  
Ent. Monthly Mag. VII, 1870—71 (1870), p.  
96. — Künstler, Verh. zool-bot. Ges. Wien  
XXI, 1871, p. 39. — Perris, Ann. Soc. Linn.  
Lyon (n. s.) 1876 (1877), p. 217, 249; Larves  
Col. 1877, p. 409. — Ormerod, Entom. X, 1877,  
p. 246, fig.; Rep. inj. Ins. 1878 (1879), p. 21  
— 22, figs.; 1895, p. 57. — Frank, Pflanzenkr.  
1896, p. 288, fig. 71. — Wradzilo, 22.—23.  
Ber. Ver. Nat. Offenbach 1882, p. 61 (galle).  
— Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885,  
p. 325; XIX, 1887, p. 21. — Hieronymus, Zoo-  
cécid. 1890, p. 215, 220. — Focken, Revue  
biol. II, 1890, p. 61. — Kieffer, Feuille Jeun.  
Natur. XXII, 1891—92, nr. 255, p. 56, 59, fig.  
1. — Lampa, Ent. Tidskr. XV, 1894, p. 15, fig.  
5—6 (métamorphoses). — Carpenter, Rep. inj.

Russie mér.

Ins. 1906, p. 425, fig. 3. — Théobald, Rep. inj. Ins. 1906—07 (1907), p. 96, fig. 21—22. — Goury et Guignon, Feuill. Jeun. Nat. XXXVII, 1907, p. 15, 29, 112, 114, 116, 179, 184, 212. — Houard, Zoocécid. Eur. I, 1908, p. 467. — Schmidt, Jahresh. Ver. Schles. Ins. XXXIII, 1908, p. XXVIII; Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. V, 1909, p. 43. — Bourgeois, Mittheil. Nat. Ges. Colmar IX, 1907—08, p. 172. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 263. — Reh in Sorauer, Handb. Pflanz. III, 1906—13, p. 562. — Lassmann, Mittb. Ent. Ges. Halle III—IV, 1912, p. 58. — Hust. l. c. p. 271. — L. Falcoz, Ann. Epiphyt. XI, 3, 1926, p. 124, fig.

**sulcipennis** Lec. in Lec. et Horn, Rhynchoph. 1876, p. 274. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 429. — Blatchl. et Leng, Rhynchoph. 1916, p. 444.

Etats-Unis

**sulcithorax** Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV, 1916, p. 181, 185.

Japon

**sulphureus** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XLVI, 1885, p. 196 (♀). — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 220.

Turkestan,  
Taschkent

**sutura** *alba* Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 265 (♀); l. c. 1903, p. 291. *Type de Schultze*

Hongrie:  
Buda-Pest  
Europe centr.  
et mérid.,  
Asie mineure

**suturalis** F. Syst. Ent. 1775, p. 133 (*Curculio*); Spec. Ins. I, 1871, p. 170; Mant. Ins. I, 1787, p. 102; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 412; Syst. El. II, 1801, p. 455 (*Rhynchaenus*). — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, p. 1749 (*Curculio*). — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 188; l. c. IV, 1789, p. 268. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 486. — Herbst, Natursyst. Käf. VI, 1795, p. 453. — Panz. Deutschl. Ins.-Fn. 1795, p. 306. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1802, p. 137. — Ahrens, Fn. Ins. Eur. IV, 1821, t. 9. — Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Cure. IV, 1, 1837, p. 478; VIII, 2, p. 132. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1840, p. 124. — Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 381; 1858, p. 799; 1874, p. 341. — Bach, Käferf. II, 1852—54 (1854), p. 345, 353. — Power, Entomol. II, 1866—67 nr. 24, 1866, p. 13—14. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 174; (1887), p. 331. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 191, p. 342, 347. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, p. 628; Fn. Transylv. 1891, p. 700. — Stierl. Fn. Col. Helv. 1894, p. 379. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 543, 547. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 216. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 689. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 993. — Reitt. Fn. Germ., V, 1916, p. 164 (subg. *Oprohinus*). — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 117, 215.

**Biologie:** Mathieu, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 230. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 325; XIX, 1887, p. 21. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 265. — Hust.

l. c. p. 216. — H. Wagn. Col. Centralbl. III, 1928—29 (1929), p. 245.

**suturellus** Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 558; l. c. VIII, 2, 1845, p. 168. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 289; l. c. 1898, p. 168; l. c. 1902, p. 225.

**Biologie**: J. J. Walker, Ent. Monthly Mag. XXX, 1894, p. 133 (*suturellus?* *pervicax*). — Tylden, Ent. Monthly Mag. VI, 1869—70 (1869), p. 33 (id.).

**sympyti** Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 168; (1887), p. 329. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 216; 1903, p. 288. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 680 (subg. *Nedyus*). — Rambousek, Časopis Spol. Ent. IV, 1907, p. 93. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 155 (subg. *Hadroplontus*). — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 160. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 106, 179.

**r a p h a n i** auct. (nec F., Herbst, Panzer, Latr., Germ., Gyll., Redt., Bach, Thoms., Seidl., Stierl., Lameere, Kuhnt). — Auriv. Svensk. Insekt. 9, 1924, p. 120, 124.

**Biologie**: Cussac, Ann. Soc. Ent. Fr. (3) III, 1855, p. 241, t. 3, f. 1—10. — Kaltenbach, Pflanzenf. 1874, p. 447. — Bedel, l. c. p. 329. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 323; XIX, 1887, p. 20. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 261. — Mathieu, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 233. — Girard, Traité élém. Entomol. I, 1873, p. 688. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIII, 1877, p. 217, 248; Larves Col. 1877, p. 408. — Hust. l. c. p. 180.

**syriacus** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 289.

**c a r i n i f r o n s** Schultze (nec Bohem.), l. c. 1900, p. 33; l. c. 1902, p. 224.

**syrites** Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 232. — Gyll. Gyll. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 577 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 480; VIII, 2, 1845, p. 134. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1835), p. 56—58 (*Rhynchaenus*). — Falderm. Fn. Ent. Transcauc. II, in Nouv. Mém. Soc. Ent. Nat. Moscou V, 1837, p. 205. — Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 382; 1858, p. 800; 1874, p. 342. — Bach, Käferf. II, 1852—54 (1854), p. 346, 354. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 542. — G. R. Waterh. Trans. Ent. Soc. Lond. V, 1858—61, Proc. p. CXXIV. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 268; X, 1868, p. 200. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 171; (1887), p. 338. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 342, 345. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1891, p. 680; Fn. Transsyrv. 1891, p. 702. — Stierl. Fn. Col. Helvet. 1894, p. 382. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 431; 1902, p. 219. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 684 (subg. *Nedyus*). — Kuhnt, Ill. Best.

Taurie

Europe

Syrie

Europe,  
Turkestan  
russe,  
Aulie-Ata

Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 996 (*syritmes*). — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 166. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 174. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 122, 126. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 110, 244.

*obstrictus* Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 28; Man. Brit. Col. 1839, p. 219 (subg. *Nedyus*).

**Biology:** Mathieu, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 231. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 325; XIX, 1887, p. 21. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 275.

? *alauda* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 411 (*Curculio*); Syst. El. II, 1801, p. 454 (*Rhynchaenus*). — Panz. Käferfn. 1795, p. 305 (*Curculio*). — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 137 (*Curculio*). — Ill. Mag. Ins. IV, 1805, p. 142 (*Rhynchaenus*).

*affinis* Panz. Fn. Ins. Germ. V, 1798, p. 57 (*Curculio*).

**T-album** Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 512; l. c. VIII, 2, 1845, p. 149. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 214. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 156 (subg. *Hadropontus*).

*tangerianus* Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 47; l. c. 1902, p. 221.

*tarsatus* Schultze, Abeille XXIX, 1899, p. 264; Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 224.

*tataricus* Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 44 (♀); l. c. 1902, p. 219.

*tau* Lec. in Lec. et Horn, Rhynchoph. 1876, p. 278. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 428.

*tenietensis* Desbr. Frelon V, 1895—96, nr. 4, 1896, p. 48. — Schultze, Abeille XXIX, 1899, p. 261; Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 219.

*tenuirostris* Rosenh. Thiere Andalus. 1856, p. 292, nota. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 224.

*terminatus* Herbst, Käfer VI, 1795, p. 401, t. 91, f. 11. — Bach, Käferf. II, 1854, p. 351. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 177; (1887), p. 340. — Seidlitz, Fn. Balt. 1872, p. 448; ed. 2, 1891, p. 624; Fn. Trans-sylv. 1891, p. 695. — Stierl, Fn. Col. Helvetic. 1894, p. 372. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 222. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 674. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 991. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 148, t. 161, f. 18. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 188. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1923, p. 98, 120. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 128.

*haemorrhoidalis* Panz. Fn. Ins. Germ. 99, 1809, t. 11.

Crimée,  
Hongrie,  
Autriche,  
Sicile

Maroc:  
Tanger  
Algérie:  
Ouarsenis  
Turkestan  
orient.

Algérie:  
Teniet-el-  
Haad,  
Ft. de Cèdres

Espagne:  
Carthagène

|   |  |
|---|--|
| <i>s i i</i> Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 490. — Guér. Iconogr. Règne anim. 1829—1844, t. 39, f. 5.  | France   |
| <i>Waltoni</i> Bohem. in Schönh. Gen. Sp. Curc. VIII, 2, 1845, p. 164.  | Angleterre   |
| <i>apicalis</i> Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 798; ed. 3, II, 1874, p. 350. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 258.   |  |
| var. <i>doctoris</i> Pic, Echange XXIX, 1913, p. 97. — Hust. l. c. p. 121.  |  |
| <b>Biologie:</b> Mathieu, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 232. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68, p. 61. — Girard, Traité élém. Ent. 1873, I, p. 689. — Dongé, Bull. Soc. Ent. Fr. 1896, p. 402. — Xambeu, Rev. d'Ent. XVII, 1898, p. 31. — Bedel, l. c. VI bis, 1924, p. 103. — Börner, Berl. Arch. Biol. Anst. V, p. 288—292. — Hust. l. c. p. 120.  |  |
| <b>tescorum</b> Fall, Trans. Amer. Ent. Soc. XXXIII, 1907, p. 270.  | Etats-Unis,<br>Californie  |
| <b>tessellatus</b> Schultze, Abeille XIX, 1899, p. 259; Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 215.   | Algérie  |
| <b>testatus</b> Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XXIV, 1890, p. 472. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 221.  | Sibérie:<br>Amdo   |
| <b>testudinella</b> Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 279 (♀).   | Arménie<br>russe:<br>Kasikoporan<br>Bukowine                                       |
| <b>thlasiphilus</b> Penecke, Col. Centralbl. III, 1928, p. 143. <i>Smecynus</i> l. l. 1927: <i>Syn. zu Robert Gyll.</i>   |  |
| <b>thlaspis</b> Ch. Bris. Abeille V, 1869, p. 440. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 175 nota; (1887), p. 337. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 221. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 167. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 119, 251.  | France   |
| <b>Biologie:</b> Goury et Guignon, Feuille Jeun. Nat. XXXVII, 1907, p. 184. — Hust. l. c. p. 252.   |  |
| <b>tibialis</b> Bohem. in Schönh. Gen. Sp. Curc. VIII, 2, 1845, p. 162. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 540. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 805; ed. 3, II, 1874, p. 347. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 322, 328. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1894), p. 384. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1892, p. 224. — Kuhnt, Ill. Best. Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 996. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 168 (subg. <i>Ceuthorrhynchus</i> ). — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 108, 283. | France mérid.,<br>Allemagne<br>mér.,<br>Hongrie,<br>Espagne,<br>Sicile,<br>Algérie |
| var. <i>nigripes</i> Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 294; l. c. 1902, p. 224. — Hust. l. c. p. 283.  | Algérie  |
| var. <i>caesiuss</i> Schultze, l. c. p. 294; 1902, p. 224. — Hust. l. c. p. 283.  | Espagne:<br>Ronda  |
| <b>Biologie:</b> Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. 1915, p. 56. — Hust. l. c. p. 284.  |  |

- tibiellus** Schultze, Horae Soc. Ent. Ross. XXXVI, 1902, p. 69; Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 222; 1903, p. 250. Samara
- timidus** Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 321, 325. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 631; Fn. Transsyly. 1888—91 (1891), p. 703. — Desbr. Frelon I, 1891, p. 38. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 418, 422; l. c. 1902, p. 226. — Kolbe, Ent. Nachr. XXVI, 1900, p. 232. — Champ. Ent. Monthly Mag. XLIV, 1908, p. 2. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 996. — Fowler, Col. Brit. Isl. VI, 1913, p. 195. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 174 (subg. *Marklissus*). — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 184. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 102, 276. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 126. Dalmatie, Hongrie, Italie, Turquie, France mér., Espagne, Algérie
- Poncysi** Stierl, Bull. Soc. Sc. Bucarest VIII, 1899, p. 369; Mitth. Schweiz. Ent. Ges. X, 6, 1900, p. 235; 1903, p. 56.
- var. metalleicensis** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 226 [s. descr.].
- Biologie:** Hust. l. c. p. 277.
- tolerans** Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVIII, 1887, p. 300 (subg. *Nedyus*). — Schultze, l. c. 1902, p. 220. Turkestan
- transcaspicus** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 240 (♀); l. c. 1902, p. 220, 289. Merv
- transversus** Blatchl. et Leng, Rhynchoph. 1916, p. 450. Etats-Unis
- transylvanicus** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 322; l. c. 1902, p. 215. Transsylv.
- triangulum** Bohem. in Schönh. Gen. Sp. Curc. VIII, 2, 1845, p. 154. — Bach, Käferf. II, 1852—54 (1854), p. 347, 365. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 808; l. c. ed. 3, II, 1874, p. 349. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 546. — Bedel, Fn. Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 174; (1887), p. 328. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 345, 348. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 267; 1896, p. 271, nota; 1902, p. 217. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 688 (subg. *Nedyus*). — Lgocki, Sprawozd. Kom. Fizyogr. XLI, 1907, p. 121. — Tyl, Wien. Ent. Zeit. XXXIII, 1914, p. 122, fig. 7. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 163 (subg. *Hadropontus*). — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 169. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 115, 192. — Penecke, Wien. Ent. Zeit. XLIII, 1926, p. 29. Europe centr. et mérid., Sibérie
- viciinus** Kraatz, Berl. Ent. Zeitschr. 1868, p. 300. — Crotch, Entom. II, 1865, p. 260. — Rye, Ent. Monthly Mag. VII, 1870—71 (1870), p. 36. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 217.
- Biologie:** Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 265. — Penecke, Wien. Ent. Zeit. XLIII, 1922, p. 187.

**trimaculatus** F. Syst. Ent. 1775, p. 141 (*Curculio*); Spec. Ins. I, 1781, p. 178; Mant. Ins. I, 1787, p. 108; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 438; Syst. El. II, 1801, p. 484 (*Rhynchaenus*). — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1769 (*Curculio*). — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 200; l. c. IV, 1789, p. 273. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 514; Ent. V, 1807, nr. 83, p. 24, t. 28, f. 320 (*Rhynchaenus*). — Herbst, Natursyst. Käf. VI, 1795, p. 471 (*Curculio*). — Panz. Deutschl. Ins.-Fn. 1795, p. 315. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 145. — Ill. Mag. Ins. VI, 1807, p. 311 (*Rhynchaenus*). — Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 516; VIII, 2, 1845, p. 150. — Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 384; 1858, p. 803; 1874, p. 344. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 347, 363. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 546. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—1888 (1885), p. 175; (1887), p. 324 (subg. *Nedyus*). — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 624; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 699. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 512, 546. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1894), p. 378. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 214; 1903, p. 288. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 689. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 992. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 158 (subg. *Hadroplontus*). — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 117, 167.

*litura* var. Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 223.  
var. *hybridus* Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 168; 1902, p. 214.

*litura* Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 34 (subg. *Nedyus*); Man. Brit. Col. 1839, p. 221.

**Biologie:** Mathieu, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 233. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68, p. 61. — Frauenfeld, Verh. zool.-bot. Ges. Wien. XVIII, 1868, p. 161. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon XXII, 1877, p. 217, 248; Larves Col. 1877, p. 408. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 326; XIX, 1807, p. 21. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 264. — Peyerimhoff, Ann. Soc. Ent. Fr. 1911, p. 310.

**trisignatus** Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 516; l. c. VIII, 2, 1845, p. 150. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p. 346. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 214. — Reitter, Fn. Germ. V, 1916, p. 157 (subg. *Hadroplontus*). — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 114, 159.

**cynoglossi** Frauenf. Verh. zool.-bot. Ges. Wien XVI, 1866, p. 970. — Mars. Abeille VI, p. 100. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 214.

**Biologie:** Frauenfeld, l. c. (*cynoglossi*). — Kaltenb. Pflanzenf. 1874, p. 266. — Perris,

Europe centr.  
et mérid.,  
Caucase,  
Asie mineure,  
Algérie

Hongrie mér.

Autriche,  
Hongrie,  
Russie mér.:  
Samara

|   |   |
|---|---|
| <i>Ann. Soc. Linn. Lyon</i> XXIII, 1876 (1877), p. 217, 248; <i>Larves Col.</i> 1877, p. 408. — <i>Bargagli</i> , <i>Bull. Soc. Ent. Ital.</i> XVII, 1885, p. 319; XIX, 1887, p. 19 ( <i>cynoglossi</i> ). — <i>Kleine</i> , <i>Ent. Blätter</i> VI, 1910, p. 261.  |   |
| <i>trivialis</i> <i>Faust</i> , <i>Stett. Ent. Zeit.</i> XLV, 1884, p. 456. — <i>Schultze</i> , <i>Deutsche Ent. Zeitschr.</i> 1902, p. 221. <i>Type fehlt in coll. Faust</i>   | Caucase,<br>Derbent   |
| <i>Truquii</i> <i>Champ. Biol. Centr.-Amer. Col.</i> IV, 5, 1906—1909 (1907), p. 153, t. 9, f. 6.   | Mexico,<br>Guatemala  |
| <i>tuber</i> <i>Reich. Mant. Ins.</i> 1797, p. 7, t. 1, f. 3 ( <i>Curculio</i> ). — <i>Schönh.</i> <i>Gen. Sp. Curc.</i> VIII, 2, 1845, p. 146 ( <i>Ceuthorrhynchus</i> ).  | Allemagne   |
| <i>tubulatus</i> <i>Schultze</i> , <i>Deutsche Ent. Zeitschr.</i> 1896, p. 273; l. c. 1902, p. 220.<br>var. <i>semirufus</i> <i>Pic</i> , <i>Echange</i> XXX, 1914, p. 17.  | Algérie:<br>Boghari<br>Algérie  |
| <i>turbatus</i> <i>Schultze</i> , <i>Deutsche Ent. Zeitschr.</i> 1903, p. 284, 291. — <i>Rambousek</i> , <i>Časopis Spol. Ent.</i> IV, 1907, p. 93. — <i>Reitt. Fn. Germ.</i> V, 1916, p. 168.<br><i>Biologie</i> : <i>H. Wagn. Col. Centralblatt</i> III, 1928—29 (1928), p. 57.   | Allemagne,<br>Autriche,<br>Hongrie,<br>France,<br>Balkans,<br>Turquie,<br>Bohème,<br>Asie mineure   |
| <i>umbrinus</i> <i>Hust. Ann. Soc. Ent. Fr.</i> LXXXV, 1916, p. 129, 131.   | Japon   |
| <i>unguicularis</i> C. G. Thoms, <i>Opusc. ent.</i> IV, 1871, p. 391 <del>371</del> . — <i>Fauvel, Rev. d'Ent.</i> VII, 1888, p. 248. — <i>Ch. Auriv. Svensk Insekt.</i> 9, 1924, p. 125.   | Oeland  |
| <i>uniformis</i> <i>Gyll.</i> in <i>Schönh. Gen. Sp. Curc.</i> IV, 1, 1837, p. 571; l. c. VIII, 2, 1845, p. 170. — <i>Weise</i> in <i>Cat. Col. Eur.</i> ed. 2, 1906, p. 673 (subg. <i>Thamiocolus</i> ). — <i>Schultze</i> , <i>Deutsche Ent. Zeitschr.</i> 1902, p. 213.<br>var. <i>subulatus</i> Ch. Bris. <i>Abeille</i> V, 1869, p. 453. — <i>Schultze</i> , <i>Deutsche Ent. Zeitschr.</i> 1898, p. 268; 1902, p. 213. — <i>Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh.</i> 1924, p. 98, 139.<br><i>Biologie</i> : <i>Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr.</i> 1911, p. 304; 1915, p. 55. — <i>Lichtenstein</i> , <i>Bull. Soc. Ent. Fr.</i> 1913, p. 428.   | Caucase,<br>Syrie   |
| <i>urticae</i> <i>Bohem. in Schönh. Gen. Sp. Curc.</i> VIII, 2, 1845, p. 151. — <i>Champ. Ent. Monthly Mag.</i> V, 1868—69 (1868), p. 45. — <i>Redtenb. Fn. Austr. ed. 3, II</i> , 1874, p. 347. — <i>Bedel, Fn. Bass. Seine</i> VI, 1882—88 (1885), p. 172, nota. — <i>Schultze</i> , <i>Deutsche Ent. Zeitschr.</i> 1898, p. 163; 1902, p. 215. — <i>Fowler, Col. Brit. Isl.</i> V, 1891, p. 345, 355. — <i>Everts, Col. Neerl.</i> II, 1903, p. 686. — <i>Reitt. Fn. Germ.</i> V, 1916, p. 160 (subg. <i>Hadropontus</i> ). — <i>Hansen, Danmarks Fn.</i> IV, 1918, p. 168. — <i>Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh.</i> 1924, p. 111, 176; <i>Bull. Soc. Ent. Fr.</i> 1914, p. 114.<br>var. <i>stachydialis</i> <i>Faust</i> , <i>Horac Soc. Ent. Ross.</i> XXII, 1888, p. 171; <i>Stett. Ent. Zeit.</i> L, 1889, p. 231. — <i>Schultze</i> , <i>Deutsche Ent. Zeitschr.</i> 1898, p. 164; 1902, p. 215. | Angleterre,<br>France sept.,<br>Danmark,<br>Allemagne:<br>Mark,<br>Silesie;<br>Dalmatie,<br>Italie,<br>Turquie,<br>Russie mér.,<br>Caucase,<br>Belgique |

*var. jacquetti* Faust, Stett. Ent. Zeit. L, 1889, p. 231.

*stachydis* Jacq. Ann. Soc. Ent. Fr. 1888, Bull. p. CV.

*var. Karamani* Reitt. in litt. Schultze, l. c. 1902, p. 215 (s. descr.).

**Biologie:** Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 262 (inexacte). — Ste Claire Deville, Fn. Bass. Seine VI bis, 1924, p. 90. — Guillaume, Bull. Soc. Ent. Belg. 1928, p. 113. — H. Wagn. Col. Centralbl. III, 1928—29 (1928), p. 57.

**Vaulogeri** Schultze, Abeille XXIX, 1899, p. 258; Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 216.

Algérie

**Biologie:** Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. 1915, p. 55.

**venedicus** Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 153. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 59; 1902, p. 215; 1903, p. 288. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 992. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 160 (subg. *Hadropontus*). — H. Wagn. Ent. Mitt. IX, 1920, p. 178.

Allemagne:  
Mark;  
Croatie,  
Russie:  
Jaroslaw

**venustus** Schultze, Horae Soc. Ent. Ross. XXXVI, 1902, p. 65; Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 213; 1903, p. 247. — H. Wagner, Col. Centralblatt III, 1928—29, 1929, p. 245.

Russie mér.

**verrucatus** Gyll. in Schönh. Gen. et Sp. Cire. IV, 1, 1837, p. 541; l. c. VIII, 2, 1845, p. 158. — Lucas, Ann. Soc. Ent. Fr. 1860, Bull. p. LXVI. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 169. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 344, 354. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 57; 1902, p. 217. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 163 (subg. *Ethelcus*). — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1924, p. 107, 201. — Edwards, Ent. Monthly Mag. L, 1914, p. 30—33 nota.

Angleterre,  
France,  
Caucase

*biguttatus* Bohem. in Schönh. Gen. Sp. Cire. VIII, 2, 1845, p. 158. — Crotch, Entomol. II, 1864—65, nr. 18, 1865, p. 260. — Brewer, Trans. Ent. Soc. Lond. (3) II, 1864—1865, Proc. p. LXXXI. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 217.

Russie mérid.

*raphaelensis* Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. 1859, Bull. p. XVIII. — Schultze, l. c. 1902, p. 217.

**Biologie:** Chevr. Ann. Soc. Ent. Fr. 1859, Bull. p. XVIII. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIII, 1876 (1877), p. 249; Larves Col. 1877, p. 409. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 326; XIX, 1887, p. 21. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 244. — Hust. l. c. p. 262.

**viator** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. XLVI, 1885, p. 196. — Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 45. — Schultze, l. c. 1902, p. 221.

Taschkent,  
Algérie;  
Mechevir;  
Arax

*substellaris* Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 46. — Schultze, l. c. 1902, p. 221.

var. *Debskii* Pic, Bull. Soc. Ent. Egypte 1919, p. 51.

**viduatus** Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 220 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 507; VIII, 2, 1845, p. 147. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1894—99 (1895), p. 95 (*Rhynchaenus*). — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 347, 366. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 806; ed. 3, II, 1874, p. 347. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 262; X, 1868, p. 199 (subg. *Thamiocolus*). — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 168; (1887), p. 329 (subg. *Thamiocolus*). — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 343, 351. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 625 (subg. *Thamiocolus*); Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 695. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1894), p. 375 (subg. *Thamiocolus*). — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 213. — Everts, Col. Neerl. II, 1908, p. 680 (subg. *Nedyus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 990, fig. 295, c, 297, a—c (subg. *Thamiocolus*). — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 157 (subg. *Hadropontus*). — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 155. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 119, 122, fig. 32 b (*Thamiocolus*). — Hust. Miscell. Rev. Ceuthor. Gallo-Rh. 1924, p. 106, 138 (*Thamiocolus*).

**Biologie:** Hislop, Ent. Monthly Mag. VI, 1865—70 (1869), p. 33. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 326; XIX, 1887, p. 21. — Bedel, l. c. p. 329. — Kleine, Ent. Blätter. VI, 1910, p. 275. — Hust. l. c. p. 139. — H. Wagn. Col. Centralbl. III, 1928—29 (1929), p. 265.

**vilis** Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 572; l. c. VIII, 2, 1845, p. 170. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 238; 1902, p. 213.

Carniole,  
Crimée

**villosipes** Schultze, Horae Soc. Ent. Ross. XXXVI, 1902, p. 67; Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 223; 1908, p. 249.

Russie or.

**virgatus** Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 568; l. c. VIII, 2, 1845, p. 170. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 258 (subg. *Thamiocolus*); 1898, p. 163; 1902, p. 213. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV, 1916, p. 131, 133.

Russie mér.,  
Caucase,  
Sibérie,  
Japon,  
Crimée,  
Turkestan

**signatellus** Faust, Öfv. Finska Vet. Soc. Förh. XXXII, 1840, p. 100. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 163; 1902, p. 213.

**♀ dubitabilis** Bohem. in Schönh. Gen. Sp. Curc. VIII, 2, 1845, p. 171. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 163; 1902, p. 213.

Caucase

var. **♂ nubilosus** Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 570; l. c. VIII, 2, 1845, p. 170. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, p. 256; 1898, p. 163; 1902, p. 213.

|   |  |
|---|--|
| <b>Biologie:</b> Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 326; XIX, 1887, p. 21.  |  |
| <b>viridanus</b> Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Cire. IV, 1, 1837, p. 557; l. c. VIII, 2, 1845, p. 167. — Gebler, Bull. Soc. Nat. Moscou XIV, 1841, p. 609; Notae et Add. Catal. Sibir. 1841, p. 32. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 167; 1902, p. 226. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 997. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 172 (subg. <i>Marklissus</i> ). — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 182. | Europe centr.<br>et mérid.,<br>Caucase,<br>Sibérie,<br>Algérie                       |
| <b>Biologie:</b> Penecke, Wien. Ent. Zeit. XLIII, 1922, p. 187.   |  |
| <b>viridipennis</b> Ch. Bris. Abeille V, 1869, p. 446. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 225. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 173 (subg. <i>Marklissus</i> ). — Hust. Miscell. Rev. Geuth. Gallo-Rh. 1924, p. 101, 291.   | France mér.,<br>Piémont,<br>Italie mér.,<br>Sicile,<br>Turquie,<br>Grèce,<br>Balkans |
| <b>granipennis</b> Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 322, 326. — Schultze, l. c. 1896, p. 258; 1902, p. 225.   |  |
| var. <i>Julianus</i> Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 172, nota.  | Grèce  |
| <b>Biologie:</b> J. Ste Claire Deville, Hust. l. c. p. 292. — Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. 1915, p. 56.   |  |
| <b>Waltheri</b> Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 289.   | Algérie,<br>Tunisie  |
| <b>Horni</b> Schultze, l. c. 1898, p. 235; 1902, p. 220.  |  |
| <b>Weisei</b> Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 250; l. c. 1902, p. 225.   | Caucase  |
| <b>Wickhami</b> Champ. Biol. Centr.-Amer. IV, 5, p. 153, t. 9, f. 7 ( <i>Ceuthorhynchidius</i> ).   | Mexico   |
| <b>Zimmermanni</b> Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Cire. IV, 1, 1837, p. 492; l. c. VIII, 2, 1845, p. 141. — Lec. in Lec. et Horn, Rhynchoph. 1876, p. 279. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 453. — Blatchl. et Leng, Rhynchoph. 1916, p. 451.   | Etats-Unis,<br>Canada  |
| <b>zurlo</b> Ch. Bris. Abeille V, 1869, p. 443. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 221; 1903, p. 289. — Peyerimh. Bull. Soc. Ent. Fr. 1927, p. 262 (subg. <i>Eremonyx</i> ).  | Algérie:<br>Biskra   |
| var. <i>subboscricolor</i> Pie, Echange XXVI, 1910, p. 34.  | Biskra   |
| <b>Biologie:</b> Peyerimh. l. c. p. 262.  |  |

### Species incertae sedis.

|  |        |
|--|--------|
| <b>pultiaris</b> Geoffr. in Fourcroy, Ent. Paris. I, 1785, p. 123 ( <i>Curculio</i> ). — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 190; IV, 1789, p. 271. | France |
| <b>pygmaeus</b> Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 497 ( <i>Curculio</i> ). — Walck. Fn. Paris. I, 1802, p. 247.                                  |        |
| <b>pultiarius</b> [err.] Schönh. Gen. Sp. Cire. IV, 1, 1837, p. 503 ( <i>Ceuthorhynchus</i> ); l. c. VIII, 2, 1845, p. 146.                  |        |
| <b>aculeatus</b> Gmel. in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1804 ( <i>Curculio</i> ).   |        |

- quinquemaculatus* Geoffr. in Fourer. Ent. Paris. I, 1785, p. 122. France  
*striatodenticulatus* Goeze, Ent. Beitr. I, 1777, p. 412 (Curculio). — Fourer. Ins. Paris. I, 1785, p. 290. France  
*armatus* Gmel. in Linné, Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1805 (Curculio).  
 498

### Ectamnogaster Schultze.

- Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1908, p. 287.  
*Coeliodes* subg. *Coelogaster* Schultze, l. c. 1896, p. 262 [nec Bohem.].  
*Coelogaster* Schultze, l. c. 1902, p. 208. — Reitt. Verh. Nat. Brünn LI, 1912—13 [Best.-Tab. 68], p. 68 nota.  
*caviventris* Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1896, Andalousie, p. 262; l. c. 1902, p. 208; l. c. 1903, p. 287. Algérie,  
 Biologie: Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. Tunisie LXXXVIII, 1919, p. 289.  
 1

### Bohemanius Schultze.

- Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 265. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912—13 [Best.-Tab. 68], p. 68 nota.  
*uroleucus* Bohem. in Schönh. Gen. Sp. Curr. VIII, 2, Sardaigne 1845, p. 149 (*Ceuthorhynchus*). — Schultze, l. c. p. 265 (♀) (*Bohemanius*); l. c. 1902, p. 208.

1

### Rileyonymus Dietz.

- Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 453.  
*relictus* Dietz, l. c. p. 454, t. 14, f. 32 a, b. Amérique sept.

1

### Mecysmoderes Schönh.

- Schönh. Gen. Sp. Curr. IV, 1, 1837, p. 596; VIII, 2, 1845, p. 177. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 201. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV, 1916, p. 108, 123.  
*Coeliosomus* Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 70; Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, 1866, p. 442. — Faust, Steit. Ent. Zeit. LIII, 1882, p. 47.  
*Belonnotus* Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 187.  
*albocapillus* Motsch. Et. Ent. VII, 1858, p. 73 (*Coeliosomus*). Indes orient.  
 ater Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV, 1916, p. 124. Japon  
*brevicarinatus* Hust. l. c. p. 124.  
*brevicornis* Hust. Bull. Soc. Ent. Fr. 1924, p. 58. Sikkim  
*carinatus* Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 324. Indes orient.  
*carinicollis* Hust. Philipp. Journ. Sc. XXVI, 1925, p. 396. Borneo  
 Clermonti Hust. Bull. Soc. Ent. Fr. 1923, p. 113. Tonkin  
*consularis* Pasc. Journ. Linn. Soc. Lond. X, 1870, p. 482. Formose  
*crassirostris* Hust. Bull. Soc. Ent. Fr. 1924, p. 59. Sikkim  
*euglyptus* Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curr. IV, 1837, p. 597. Java

|   |              |
|---|--------------|
| <i>carinifer</i> Kirsch, Mitth. Zool. Mus. Dresden I, 1875—78, p. 44. — Faust, Stett. Ent. Zeit. LIV, 1883, p. 148. |              |
| <i>fulvus</i> Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1874, p. 179.  | Japon        |
| <i>gibbicollis</i> Hust. Philipp. Journ. Sc. XXVI, 1925, p. 338.  | Bornéo       |
| <i>grisescens</i> Motsch. Bull. Soc. Nat. Mosc. XXXIX, 1866, II, p. 441 ( <i>Coeliosomus</i> ).                     | Ceylan       |
| <i>humeralis</i> Hust. Bull. Soc. Ent. Fr. 1924, p. 57.   | Sikkim       |
| <i>impressus</i> Hust. Philipp. Journ. Sc. XXVI, 1925, p. 335.  | Bornéo       |
| <i>japonicus</i> Pic, Mélang. exot.-ent. XIX, 1916, p. 13.  | Japon        |
| Lesnei Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV, 1916, p. 124.  | "            |
| <i>lineolatus</i> Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXVIII, 1919, p. 329.  | Inde         |
| <i>longirostris</i> Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXVIII, 1919, p. 330.  | Chine        |
| <i>luzonicus</i> Hust. Philipp. Journ. Sc. XXVII, 1925, p. 395.   | Luzon        |
| <i>memecylonis</i> Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XIX, 1917, p. 395.  | Indes, Burma |
| <i>metasternalis</i> Mshl. l. c. p. 398.  | Burma        |
| <i>minutus</i> Hust. Bull. Soc. Ent. Fr. 1924, p. 61.   | Sikkim       |
| <i>nigrorufus</i> Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 70, f. 20 ( <i>Coeliosomus</i> ).                                | Indes or.    |
| <i>obscurus</i> Hust. Philipp. Journ. Sc. XXVI, 1925, p. 337.   | Singapore    |
| <i>ochraceus</i> Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 70 ( <i>Coeliosomus</i> ).  | Indes or.    |
| <i>pectinipes</i> Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XIX, 1917, p. 402.   | Madras       |
| <i>pictus</i> Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 72.  | Ceylan       |
| <i>pusio</i> Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XIX, 1917, p. 401.  | Burma        |
| <i>rhomboidalis</i> Auriv. Nouv. Arch. Mus. Paris (3) III, 1867, p. 221.  | Cambodge     |
| <i>rubellus</i> Motsch. Etud. Ent. VII, 1858, p. 71.  | Indes or.    |
| <i>rufinasus</i> Motsch. l. c. p. 72.   | "            |
| <i>rugosus</i> Hust. Philipp. Journ. Sc. XXVI, 1925, p. 334.  | Singapore    |
| <i>semialbidus</i> Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, 1866, II, p. 442 ( <i>Coeliosomus</i> ).                   | Indes or.    |
| <i>stigma</i> Faust, Ann. Soc. Ent. Fr. LXIII, 1893, p. 519.  | Indo-Chine   |
| <i>stramineus</i> Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXIX, 1866, II, p. 441.   | Ceylan       |
| <i>subhumeralis</i> Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XIX, 1917, p. 400.   | Assam        |
| <i>suturalis</i> Hust. Bull. Soc. Ent. Fr. 1924, p. 60.   | Sikkim       |
| <i>tenuirostris</i> Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XIX, 1917, p. 403.   | Madras       |
| <i>tonkianus</i> Hust. Bull. Soc. Ent. Fr. 1923, p. 115.  | Tonkin       |
| <i>tricarinatus</i> Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 187 ( <i>Belonnotus</i> ).                           | Indes        |
| <i>umbrinus</i> Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou 1866, II, p. 441.  | Ceylan       |
| <i>undulatus</i> Motsch. Etudes Ent. VII, 1858, p. 74.  | "            |
| <i>verrucosus</i> Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (8) XIX, 1917, p. 397.   | Assam        |
| <i>viduatus</i> Hust. Bull. Soc. Ent. Fr. 1923, p. 114.   | Tonkin       |

**Cyphosemus** Schultze.

Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1899, p. 188. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV, 1916, p. 108, 120.

**Bouvieri** Hust. l. c. p. 120.  
**Grouvellei** Hust. l. c. p. 122.  
**paradoxus** Schultze, l. c. p. 188.  
 3

Japon  
”  
Indes

**6. Tribus Phytobiini.**

*Phytobioides* C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 138.

*Phytobides* Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 193, 204.

*Phytobii* J. L. Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1876; p. 267, 280 [J. Lec. et Horn, Rhynchoph. N. E. Amer.]. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 389, 455. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, 1906—09 (1907), p. 151. — Blatchley et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 426, 454.

*Rhinoncides* C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 231; X, 1868, p. 195.

*Rhinoncidiae* Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 210.

*Rhinoncina* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) [Best.-Tab. 68], p. 65, 69; Fn. Germ. V, 1916, p. 141, 174. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1919, p. 9.

*Rhinoncini* Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 115.

**Rhinoncus** Steph.

Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 40. — Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 577. — Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 378; ed. 2, 1858, p. 808; ed. 3, III, 1874, p. 355. — Bach, Käferfn. III, 1854, p. 371. — Gutfl.-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 548. — C. G. Thoms. Skand. Col. VIII, 1865, p. 231. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 207. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 180; (1887), p. 343 (*Amalus* subg. *Rhinoncus*). — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1891, p. 633; Fn. Transsylv. 1891, p. 705. — Stierl. Fn. Col. Helvet. 1894, p. 367. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 210 [Synopsis]; Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) [Best.-Tab. 68], p. 69; Fn. Germ. V, 1916, p. 175. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 541. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 210 [Catalogue]. — Everts, Col. Neerl. III, 1903, p. 692. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 919, 985. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 201. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1920, p. 20, 24. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 115, 129. — Smirnow, Revue Russe d'Ent. IX, 1909, p. 100—108 (Biologie).

**albicinctus** Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, p. 586; l. c. VIII, 2, 1845, p. 175. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 809; ed. 3, II, 1874, p. 356. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 372. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1891, p. 633; Fn. Transsylv. 1891, p. 705. — VI, 1882—88 (1885), p. 180; (1887), p. 343. — Seidlitz, Fn. Balt. 1872, p. 446; ed. 2, 1891, p. 633; Fn. Transsylv. 1891, p. 705. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1894, p. 369. — Schultze, l. c. p. 211. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 694. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 986. — Reitt. Fn. Germ.

Europe centr.  
et mérid.

V, 1916, p. 176. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1920, p. 25, 31.

**Biologie:** Bedel, l. c. VI bis, 1924, p. 104.  
— Hust. l. c. p. 32.

**bosnicus** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1900, p. 20; l. c. 1901, p. 208; l. c. 1902, p. 210.

**bruchoides** Herbst in Füessly, Arch. Insectengesch. V, 1784, p. 85 (*Curculio*); Natursyst. Käf. VI, 1795, p. 416, t. 92, f. 12 (*Curculio*). — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 572 (*Curculio*). — Gmel. in Linn. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1800. — Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 581; l. c. VIII, 2, 1845, p. 174. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 372. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 809; ed. 3, II, 1874, p. 356. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 548. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 241; X, 1868, p. 143. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 180; (1887), p. 344. — Seidlitz, Fn. Balt. 1872, p. 448; ed. 2, 1891, p. 633; Fn. Transsylv. 1891, p. 705. — Stierl. Fn. Col. Helvet. 1894, p. 367. — Lamere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 551. — Schultze, l. c. p. 210. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 693. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 986. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 175. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 202. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1920, p. 27. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 130. — Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, p. 180 (Japon).

**crassus** Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 264 (*Curculio*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 42 (*Rhinoncus*).

**leucogaster** Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 161 (*Rhynchaenus*).

**asperatus** Gyll. Ins. Suec. IV, 1827, p. 583 (*Rhynchaenus*). — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1835, p. 68.

**spurius** Rey, Echange XI, 1895, p. 25. — Hust. l. c. p. 27.

**var. rufescens** Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 50. — Reitt. l. c. p. 179. — Hust. l. c. p. 17.

**var. chinensis** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 94; 1903, p. 288.

**Biologie:** Bedel, l. c. p. 344; VI bis, 1924, p. 104.

**castaneus** Hust. Bull. Soc. Ent. Fr. 1916, p. 168.

**castor** F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 408 (*Curculio*); Syst. El. II, 1801, p. 451 (*Rhynchaenus*). — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 159 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 578 (*Rhinoncus*); l. c. VIII, 2, 1845, p. 172. — Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 132, t. 33, f. 499. — Zetterstedt, Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 326. — Sahlb. Ins. Fenn. II, 1835, p. 67. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 183 (*Curculio*). — Herbst, Käf. VI, 1795,

Bosnie,  
Hongrie,  
Autriche  
Europe,  
Siberie

Tientsin

Afrique trop.  
Europe,  
Asie min.

p. 403. — Panz. Deutschl. Insectenfauna 1795,  
p. 303. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV,  
1831, p. 41 (*Rhinoncus*). — Redtenb. Fn.  
Austr. 1849, p. 318; ed. 2, 1858, p. 809; ed.  
3, II, 1874, p. 355. — Bach, Käferfn. II, 1854,  
p. 371. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl.  
1859, p. 548. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII,  
1865, p. 242; X, 1868, p. 143. — Bedel, Fn.  
Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 180;  
(1887), p. 344. — Seidlitz, Faun. Balt. 1872,  
p. 445; ed. 2, 1891, p. 633; Fn. Transsylyv. 1891,  
p. 705. — Stierl. Fn. Col. Helvet. 1894, p.  
367. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900,  
p. 551. — Schultze, l. c. p. 210. — Everts,  
Col. Neerl. II, 1903, p. 693. — Kuhnt, Ill.  
Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 985. —  
Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 175, t. 161, fig.  
4. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 202.  
— Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1920,  
p. 25, fig. 11. — Auriv. Svensk Insekt. 9,  
1924, p. 129.

*pericarpius* var. L. Fn. Suec. ed. 2, 1761,  
p. 178; Syst. Nat. ed. 12, I, 2, 1767, p. 609;  
ed. XIII, I, 4, 1790 (Gmelin), p. 1750. —  
Payk. Monogr. Curc. 1792, p. 67; Fn. Suec.  
I, 3, 1800, p. 25. — Walek. Fn. Par. I, 1802,  
p. 246. — Villers, Ent. Linn. I, 1789, p. 182.  
*fruticulosus* Herbst, Käf. VI, 1795, p. 400,  
t. 91, f. 10.

*seniculus* Grav. Vergl. Ueb. Zool. Syst.  
1807, p. 206.

var. *flavipes* Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib.  
IV, 1831, p. 41.

*rufipes* Steph. l. c. p. 42.

*granulipennis* Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Paris  
Curc. IV, 1, p. 580; VIII, 2, 173.

*interstitialis* Reich, Mant. Ins. 1797, p. 6,  
t. 1, f. 2. — Steph. l. c. p. 42.

*leucostigma* Marsh. Ent. Brit. I, 1802,  
p. 255.

*scabratuſ* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 411;  
Syst. El. II, 1801, p. 454.

Biology: Buddeb. Jahrb. Nassau. Ver. f.  
Nat. XLI, 1888, p. 28. — Bedel, l. c. VI bis,  
1924, p. 104.

*cribicollis* Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV, 1916,  
p. 111.

*hovanus* Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXVIII, 1919,  
p. 343.

*inconspicuus* Herbst, Käf. VI, 1795, p. 405, t. 91, f.  
15 (*Curculio*). — Gyll. Ins. Suec. III, 1827,  
p. 158 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. Sp.  
Curc. IV, 1, 1837, p. 581 (*Rhinoncus*); l. c.  
VIII, 2, 1845, p. 174. — Sahlb. Ins. Fenn. II,  
1835, p. 67. — Redtb. Fn. Austr. 1849,  
p. 379; ed. 2, 1858, p. 809; ed. 3, II, 1874,  
p. 356. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 372. —  
Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 549. —  
C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 243;  
X, 1868, p. 143. — Seidlitz, Fn. Balt. 1872,

Japon

Madagascar

Europe

- p. 445; ed. 2, 1891, p. 633; Fn. Transsylv. 1891, p. 705. — Stierl. Fn. Col. Helvet. 1894, p. 367. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 551. — Schultze, l. c. 1902, p. 210. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 694. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 176. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 208, fig. 107 b. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1920, p. 29. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 130.
- graminous* F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 465. — Panz. Deutschl. Insectenfaune 1795, p. 325. — Bedel, Fn. Bassin Seine VI, 1882—1888 (1885), p. 180; (1887), p. 344. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 210.
- accipitrinus* Reich, Mant. Ins. 1797, p. 5, t. 1, f. 1.
- canaliculatus* Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1837, p. 43.
- suturalis* Ol. Ent. V, 1807, 83, p. 131, t. 33, f. 498. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1903, p. 986.
- Biologie*: Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68, p. 62. — Mathieu, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 236. — Kaltenb. Pflanzenf. 1872, p. 511. — Bedel, l. c. p. 344; Suppl. VI bis, 1924, p. 104. — Hust. l. c. p. 30.
- Jakovlevi** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1893, p. 205. — Schultze, l. c. 1902, p. 210. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV, 1916, p. 110—111.
- longulus** Lee. Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 284. — Hamilton, Canadian Ent. XVII, 1885, p. 104. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 473. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 462.
- luzonicus** Hust. Philipp. Journ. Sc. XXVI, 1925, p. 333.
- mongolicus** Reitt. Wien. Ent. Zeit. XIV, 1895, p. 211. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 210.
- nigriventris** Pascoe, Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XI, 1873, p. 199.
- oblongus** Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XC, 1921, p. 132.
- occidentalis** Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 471. — Blatchl. & Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 460.
- paganus** Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Cure. IV, 1, 1837, p. 586. — Bohem. l. c. VIII, 2, 1845, p. 175. — Fähr. Öfv. Vet. Förh. 1871, p. 277.
- pericarpius** L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 380. — F. Syst. Ent. 1775, p. 132 (*Curculio*); Spec. Ins. I, 1781, p. 167; Mant. Ins. I, 1787, p. 101; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 101; Syst. El. II, 1801, p. 451 (*Rhynchaenus*). — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 483 (*Curculio*); Ent. V, 1807, nr. 83, p. 131, t. 33, f. 497 (*Rhynchaenus*). — Herbst, Käf. VI, 1795, p. 401, t. 91, f. 12 (*Curculio*); in Füssly, Arch. Insekten-gesch. V, 1784, p. 70, t. 24, f. 4. — Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 255 (♀); Mon. Cure. 1792,
- Allemagne
- Angleterre
- France
- Sibérie,  
Japon
- Etats-Unis
- Luzon
- Mongolie sept
- Queensland
- Brésil  
Etats-Unis,  
Canada
- Calcutta
- Europe,  
Japon,  
Etats-Unis

p. 67 (♀). — Latreille, Hist. Nat. Crust. et Ins. XI, 1804, p. 134. — Panz. Deutschl. Insectenfaune 1795, p. 303. — Gyll. Fn. Suec. III, 1827, p. 157 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 582 (*Rhinoncus*); l. c. VIII, 2, 1845, p. 175. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 41. — Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 318; ed. 2, 1858, p. 809; ed. 3, II, 1874, p. 356. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 372. — Gutfl. & Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 549. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 243; X, 1868, p. 148. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 180; (1887), p. 344. — Seidlitz, Fn. Balt. 1872, p. 446; ed. 2, 1891, p. 633; Fn. Transsylv. 1891, p. 705. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1894, p. 367. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 551. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 210. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 694. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 986. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 176. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 203. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1920, p. 28. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 130. — Roeloffs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, p. 80. — Leng in Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 461.

var. *luteola* (Rey), Hust. l. c. p. 29.

*gramineus* Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 582. — Schönh. l. c. VIII, 2, p. 175.

Sibérie

*conjectus* Gyll. l. c. p. 582.

France

*partii* Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 41.

Angleterre

**B i o l o g i e :** Curtis, Brit. Ent. XIII, 1836, p. 670. — Mathieu, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 287. — Kaltenb. Pflanzenf. 1872, p. 511. — Buddeb. Jahrb. Nassau. Ver. Nat. XXXVII, 1884, p. 77. — Bedel, l. c. p. 344; Suppl. VI bis, 1924, p. 104. — Hust. l. c. p. 30.

Europe,  
Sibérie

*perpendicularis* Reich, Mant. Ins. 1797, p. 10, t. 1, f. 6 (*Curculio*). — Bedel, Fn. Bassin Seine VI, 1882—88 (1885), p. 180; (1887), p. 343. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 986. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 176, t. 161, f. 6. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 203, fig. 107 a. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1920, p. 30.

*guttalis* Grav. Vergl. Üb. zool. Syst. 1807, p. 206 (*Ceuthorhynchus*). — Germ. Ins. Sp. nov. I, 1824, p. 222 (*Ceuthorhynchus*). — Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 583 (*Rhinoncus*); l. c. VIII, 2, 1845, p. 175. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 372. — Redtenb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 809; ed. 3, II, 1874, p. 356. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 549. — Seidlitz, Fn. Balt.

1872, p. 446; ed. 2, 1891, p. 633; Fn. Trans-sylv. 1891, p. 705. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1894, p. 368. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 551. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 211. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 694. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 129.

*subfasciatus* Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 253 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. et Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 583 (*Rhinoncus*); l. c. VIII, 2, 1845, 175. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 372. — Gutfl. & Bose, Käfer, Deutschl. 1859, p. 549. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 241; X, 1868, p. 143. — Stierl. Fn. Col. Helvet. 1894, p. 368.

*erythrocneme* Beck, Beitr. bayer. Ins. 1817, p. 22, t. 6, f. 33.

*tibialis* Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 41. — Schönh. Gen. Sp. Curc. VIII, 2, 1845, p. 175.

var. *rubricus* Pic, Miscell. Ent. IV, 1896, p. 95; VII, 1899, p. 116. — Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. 1919, p. 242.

var. *rufofemoratus* Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 94.

var. *Lysholmii* Pic, l. c. 1896, p. 95.

var. *picipennis* (Rey) Hust. l. c. p. 31.

Biologie: Buddeb. Jahrb. Nassau. Ver. f. Nat. XXXVII, 1884, p. 74. — Bedel, l. c. p. 343; Suppl. VI bis, 1924, p. 104. — Hust. l. c. p. 31.

**pyrrhopus** Bohem. in Schönh. Gen. Sp. Curc. VIII, 2, 1845, p. 172. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 472. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 461.

Biologie: Balduf, Trans. Illinois St. Ac. Sc. XVIII, 1925, p. 178.

**sanguinipes** Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 176.

**sibiricus** Faust, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 203 — Schultze, l. c. 1902, p. 210.

**sparsesetosus** Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 585; l. c. VIII, 2, 1845, p. 175.

**sulcicollis** Bohem. in Schönh. Gen. Sp. Curc. VIII, 2, 1845, p. 173. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 210.

Biologie: Smirnov, Rev. Russe d'Ent. IX, 1909, p. 100.

**sulcipennis** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 233; l. c. 1902, p. 211. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV, 1916, p. 110—111.

**stigma** Auriv. Ark. Zool. 18A, nr. 23, 1926, p. 8.

25

Suède

Allemagne

Angleterre

Sicile

Caucase

Le Caire-Sicile

Etats-Unis,  
Canada

Hanovre

Amour

Cap de B.  
Espérance

Daurie,  
Irkutsk

Japon

Afr. centr.

### Litodactylus Redtb.

Redtb. Gatt. Deutsch. Käferfn. 1845, p. 43; Fn. Austr. 1849, p. 43, 399; ed. 2, 1858, p. CXXIII, 777; ed. 3, II, 1874, p. CXCVIII, 353. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 319. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 138; VIII, 1865, p. 233; X, 1868, p. 195. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1866, p. 205. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885),

p. 179. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1891, p. 634; Fn. Transsylv. 1891, p. 706. — Stierlin, Fn. Col. Helvet. II, 1894, p. 363, 369. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 211. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) [Best.-Tab. 68], p. 69; Fn. Germ. V, 1916, p. 174, 176. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 986. — Wagner in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 1120, 1126. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1922, p. 20, 46.

**leucogaster** Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 253 (*Curculio*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 50 (*Pachyrhinus*); Man. Brit. Col. 1839, p. 227. — Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. III, 1, 1836, p. 460 (*Phytobius*); l. c. VII, 2, 1843, p. 344. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 256. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 399; ed. 2, 1858, p. 777; ed. 3, II, 1874, p. 353. — Bach, l. c. p. 320. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 526. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. II, 1854—68, t. 23, f. 108. — C. G. Thoms. l. c. VII, p. 233; X, 1868, p. 195. — Bedel, l. c. p. 186, 346 (*Amalus* subg. *Pachyrrhinus*). — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891. — Seidlitz, Fn. Balt. 1891, p. 635 (subg. *Pachyrrhinus*); Fn. Transsylv. 1891, p. 707. — Laerneere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 553. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 211. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 697. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 987, fig. 290 a, 292. — Reitt. Fn. Germ. 1916, p. 177, t. 161, f. 10. — Wagner in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 1126, t. 41, f. 4. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 198. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1922, p. 47, fig. 13. — Auriv. Svensk Ins. 9, 1924, p. 131.

**myriophylli** Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 152 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. Sp. Curc. III, 2, 1836, p. 459 (*Phytobius*); l. c. VII, 1, 1843, p. 344. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1835), p. 65 (*Rhynchaenus*). — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 211.

var. *semiruber* Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 177, nota. Corfou

**Biologie:** Curtis, Brit. Ent. XII, 1836, p. 558. — Mathieu, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 221. — Dufour, Compt. rend. Acad. Sc. Paris XXIX, 1849, p. 763. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXIII, (1876) 1877, p. 250; Larves Col. 1877, p. 410. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 330; XIX, 1887, p. 23. — Fowler, Ent. Monthly Mag. XXII, 1885—86 (1886), p. 186. — Bourgeois, Mitteil. Nat. Ges. Colmar IX, 1907—08 (1908), p. 166. — Kleine, Ent. Blätter. VI, 1910, p. 242. — Brocher, Ann. Biol. lac. V, 1912, p. 180. — R. Jeannel, Bull. Soc. Ent. Fr. 1916, p. 218. — Hust. l. c. p. 48.

**testaceus** Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou 1866, p. 434 Ceylan  
(*Litodactylus*).

### Eubrychius C. G. Thoms.

C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 138; VII, 1865, p. 231; X, 1868, p. 194. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 205. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 179. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1891, p. 634; Fn. Transsylv. 1891, p. 706. — Stierl. Fn. Col. Helvet. III, 1894, p. 363, 369. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 211. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 177. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 987. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1922, p. 20, 48.  
**velatus** Beck, Beitr. bayer. Ins.-Fn. 1817, p. 20, t. 6, f. 29 (*Rhynchaenus velutus* [corr.]). — Germ. Mag. Ent. III, 1818, p. 369. — Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. III, 1, 1836, p. 459; VII, 2, 1848, p. 344. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 526. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 399; 1858, p. 777; 1874, p. 353. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 522. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 232; X, 1868, p. 195. — Leconte, Proc. Am. Phil. Soc. XV, 1876, p. 267. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 181; (1887), p. 346 (*Amalus* subg. *Phytobius*). — Seidlitz, Fn. Balt. 1891, p. 635; Fn. Transsylv. 1891, p. 707. — Schwarz, Proc. Ent. Soc. Washington II, 1890—1892 (1892), p. 165. — Stierlin, Fn. Col. Helvet. 1894, p. 369. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 552. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1895, p. 397; 1902, p. 211; 1903, p. 288. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 697 (*Phytobius*). — Heyden, Wien. Ent. Zeit. XXVII, 1908, p. 47 (*velutus*). — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 487, fig. 290 b, d. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 177. — Blatch. & Leng, Rhynchoph. N. E. Amer., 1916, p. 463 (*Phytobius*). — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1922, p. 49, fig. 14. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 19, 24, p. 131.  
**myriophylli** Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 52 (*Pachyrhinus*); Man. Brit. Col. 1839, p. 227.  
**aquatius** C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 138. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 211.  
**Lecontei** Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 475 (♂) (subg. *Eurhychiopsis*). — Blatchl. & Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 464.  
**Biologie:** Mathieu, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 221. — Perris, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) III, 1873, p. 88; Ann. Soc. Linn. Lyon XXIII, 1876 (1877), p. 249; Larves Col. 1877, p. 409. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 330; XIX, 1887, p. 23. — Lauterborn, Biol. Centralbl. XIII, 1893, p. 93; Ent. Nachr. XIX, 1893, p. 205. — Rousseau, Ann. Soc. Ent. Belg. LI, 1907, p. 243. — Bourgeois, Mitteil. Nat. Ges. Colmar IX, 1907—08 (1908), p. 166. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 242. — Brocher, Ann. biol. lac. V, 1912, p. 180, fig. 1—2. — Hust. l. c. p. 50.

**Phytobius** Schönh.

Schönh. Gen. Sp. Cerc. III, 1, 1836, p. 458; VII, 2, 1843, p. 343. — Blanch. Hist. Nat. Ins. II, 1845, p. 109, 123. — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 40, 398; 1858, p. CXXIII et 777; 1874, p. CXXXVIII et 354. — Bach, Käferfn. III, 1852—54 (1854), p. 158, 319. — Gutfl.-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 452, 525. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 138; VII, 1865, p. 286; X, 1868, p. 195. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1866, p. 206, nota 1. — Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. XIX, 1875, p. 398. — Leconte, Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 280. — Lec. & Horn, Class. Col. N. Amer. ed. 2, in Smiths. Misc. Coll. XVI, nr. 507, 1883, p. 493. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 167; Fn. Transsylv. 1891, p. 167. — Stierl. Fn. Col. Helyet. II, 1886—98 (1894), p. 363, 369. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 542, 552. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 211 (Liste). — Everts, Col. Neerl. III, 1903, p. 557, 695. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) [Best.-Tab. 68], p. 70; Fn. Germ. V, 1916, p. 174, 177. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 919, 986. — Wagner in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 1120, 1127. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1916, p. 195. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 115, 130. — Hust. MisCELL. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1920, p. 20, 32.

*Hydaticus* Schönh. Cerc. Disp. meth. 1926, p. 242 [nec Leach]. — Lacord. l. c.

*Pachyrhinus* Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 50; Man. Brit. Col. 1839, p. 211. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1866, p. 206. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 179; (1887), p. 345 (*Amalus* subg. *Pachyrhinus*). — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1891, p. 634 (*Phytobius* subg. *Pachyrhinus*); Fn. Transsylv. 1891, p. 706.

*Pelenomus* C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 138; l. c. VII, 1865, p. 284 (*Phytobius* subg. *Pelenomus*); l. c. X, 1868, p. 195. — J. Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, nr. 96, 1876 [Rhynchoph. N. Amer. by Lec. et Horn], p. 281. — J. Lec. et Horn, Class. Col. North Amer. ed. 2 in Smiths. Mus. Coll. XXVII, nr. 507, 1883, p. 493. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVIII, 1883, p. 255. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 179. — Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. V, 2, p. 151, nota.

*Euhrychiopsis* (subg.) Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 475.

*Biologie*: Perris, Mém. Ac. Sc. Lyon (2) I, 1851, p. 93—106, figs.; Ann. Soc. Linn. Lyon (n. s.) XXIII, 1876 (1877), p. 217—249; Larves Col. 1877, p. 409. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 330. — Schwarz, Proc. Soc. Ent. Washington I, 1884—89 (1890), p. 75. — Bourgeois, Mittheil. Nat. Ges. Colmar (n. s.) IX, 1907—08 (1908), p. 165, nota; Cat. Col. Vosges VI, 1908, p. 479 nota.

*asperulus* Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, Etats-Unis p. 462, 464 (*Pelenomus*). — Blatchl. & Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 458 (*Pelenomus*).

*canaliculatus* Fährs. in Schönh. Gen. Spec. Cerc. 1843 VII, 2, 1833, p. 347 (*Phytobius*). — Bach. Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 321. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 526. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 779; ed. 3, II, 1874, p. 355. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—1888 (1885), p. 182; (1887), p. 346 (*Amalus* subg. *Pachyrhinus*). — Seidlitz, Fn. Balt.

Europe centr.  
et septentr.,  
Japon

ed. 2, 1887—91 (1891), p. 634; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 706. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1894), p. 370. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 211. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 695. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 178, t. 161, f. 7. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 987, fig. 291 b. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 199. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 132. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1920, p. 33, 37; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV, 1916, p. 113.

*notula* C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 235 (*Rhinoncus* subg. *Phytobius*) [nec Germ. 1824, non Gyll. 1827]; l. c. X, 1868, p. 195. — Ch. Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 132.

var. *tibialis* Rey, Echange XI, 1895, p. 37. Biologie: Bourgeois, Mittheil. Nat. Ges. Colmar IX, 1907—08, p. 165.

**cavifrons** Leconte in Lec. et Horn, Rhynchoph. N. E. Amer. 1876, p. 282 (*Pelenomus*). — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 462, t. 14, f. 37 (*Pelenomus*).

var. *torvipes* Dietz, l. c. p. 462.

**Chaffanjoni** Hust. Bull. Soc. Ent. Fr. 1916, p. 70.

**comari** Herbst, Natursyst. Käfer VI, 1795, p. 411, t. 92, f. 6 (*Curculio*). — Panz. Deutschl. Ins. Fn. 1795, p. 303. — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 156 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. Sp. Cure. III, 1, 1836, p. 462; l. c. VII, 2, 1843, p. 347. — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 327 (*Rhynchaenus*); Ins. Lapp. I, 1838, (1840), p. 183. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 51 (*Pachyrhinus*); Man. Brit. Col. 1839, p. 227. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1835), p. 66 (*Rhynchaenus*). — Redtb. l. c. 1849, p. 398; 1858, p. 778; 1874, p. 354. — Bach, l. c. p. 320. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854 bis, t. 22, f. 103. — Gutfleisch & Bose, Käfer Deutschl. 1859, p. 526. — C. G. Thoms. l. c. I, p. 138 (*Pelenomus*); VII, p. 234; X, p. 195. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXII, 1859, p. 360. — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 255 (*Pelenomus*). — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 181; (1887), p. 345 (*Amalus* subg. *Pachyrhinus*). — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 634; Fn. Transsylv. 1891, p. 706. — Stierlin, Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1894), p. 370. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 211. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 695. — Lokay, Časopis Spol. Ent. IV, 1907, p. 22 [Bohème]. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 987. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 177, t. 161, f. 8. — Wagner in Calwer, Käferb. ed. 6, 1907—16 (1916), p. 1128, t. 41, f. 5. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 198, fig. 106. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 132. —

Californie

Washington  
Mandschourie  
Europe centr.  
et septentr.

- Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1920,  
p. 33, 34.
- var. astracanicus* Schultze, Deutsche Ent.  
Zeitschr. 1903, p. 292; l. c. 1902, p. 211.
- Biologie:** Zetterstedt, Fn. Ins. Lapp. I, 1828,  
p. 327. — Mathieu, Ann. Soc. Ent. Belg. II,  
1858, p. 221. — Rouget, Cat. Col. Côte-d'Or  
(2) IV, 1855, p. 194. — Girard, Traité élém.  
d'Ent. 1873, p. 682. — Carpentier, Bull. Soc.  
Linn. Nord France IV, 1878, p. 45. — Bargagli,  
Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 330;  
XIX, 1887, p. 23. — Bourgeois, Mittheil. Nat.  
Ges. Colmar IX, 1907—08, p. 165. — Kleine,  
Ent. Blät. VI, 1910, p. 242. — Hust. l. c. p.  
34. — Bedel, l. c., Suppl. VI bis, 1924, p. 106.
- confusus** Desbr. Frelon VI, 1897—98 (1897), nr. 1,  
p. 8.
- cuprifer** Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XVIII, 1845,  
I, p. 100. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr.  
1902, p. 211.
- fuscus** Kolen. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXII, 1859,  
p. 359. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr.  
1902, p. 211.
- gracilipes** Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896,  
p. 463, t. 14, f. 39 (*Pelenomus*).
- granatus** Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Cure. III, 1, 1836,  
p. 460; l. c. VII, 2, 1843, p. 344. — Redtb.  
l. c. 1849, p. 398; 1858, p. 778; 1874, p. 354.  
— Bach, l. c. p. 321. — Gutfl. & Bose, Käf.  
Deutschl. 1859, p. 526. — Weise, Deutsche  
Ent. Zeitschr. 1883, p. 255 (*Pachyrhinus*). —  
Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885),  
p. 181; (1887), p. 427 (*Amalus* subg. *Pachyrhinus*). —  
Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891),  
p. 635; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891),  
p. 707. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1891,  
p. 370. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr.  
1902, p. 211; 1903, p. 288. — Everts, Col.  
Neerl. II, 1903, p. 696. — Kuhnt, Ill. Best.-  
Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 987, fig. 291 c. —  
Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 178. — Hansen,  
Danmarks Fn. IV, 1918, p. 200. — Hust. Mis-  
cell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1920, p. 33, 42. —  
Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 132.
- granatus* C. G. Thoms. Skand. Col. VII,  
1865, p. 239; X, 1868, p. 196. — Ch. Auriv.  
Svensk Insekt. 9, 1924, p. 132, nota.
- Brisouti** Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91  
(1891), p. 635 (*Phytobius* subg. *Pachyrhinus*);  
Fn. Transsylv. 1891, p. 707. — Schultze, Deut-  
sche Ent. Zeitschr. 1902, p. 211.
- Biologie:** Redtb. Fn. Austr. ed. 3, II, 1874, p.  
354. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII,  
1885, p. 331; XIX, 1887, p. 24. — Bourgeois,  
Mittheil. Nat. Ges. Colmar IX, 1907—08, p.  
165. — Reitt. Fn. Deutschl. IV, 1909, p. 210.  
— Bedel, l. c. Suppl. VI bis, 1924, p. 105.
- griseomicans** Schwarz, Proc. Ent. Soc. Washingt.  
II, 1892, p. 165. — Dietz, Trans. Amer. Ent.  
Soc. XXIII, 1896, p. 474, t. 14, f. 40

Russie mér.:  
Astrachan

Algérie

Kamtschatka

Perse

Nebraska,  
Colorado  
Allemagne,  
Suède,  
Hongrie,  
France,  
Italie,  
Algérie

Etats-Unis

|   |   |  |
|---|---|--|
| <i>(Phytobius).</i> — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 463.  |   |  |
| <b>griseus</b> Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 458 ( <i>Pelonomus</i> ).  | Etats-Unis  |  |
| <b>Hartmanni</b> Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1901, p. 97 (♀); l. c. 1902, p. 211.   | Tientsin  |  |
| <b>hygrophilus</b> Hust. Bull. Soc. Ent. Fr. 1923, p. 248.  | Basses Pyr.   |  |
| <b>impressiventris</b> Blatchl. & Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 459 ( <i>Pelonomus</i> ).   | Etats-Unis  |  |
| <b>japonicus</b> Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, p. 180. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 211. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV, 1916, p. 112, 113.  | Japon   |  |
| <b>mixtus</b> Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. XC, 1921, p. 130.  | Brésil  |  |
| <b>muricatus</b> Ch. Bris. in Grenier, Mat. Col. France II, 1867, p. 187. — Bedel, Fn. Col. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 182; (1887), p. 345 ( <i>Amalus</i> subg. <i>Pachyrhinus</i> ). — Bedel, Bull. Soc. Ent. Fr. 1900, p. 295; Fn. Bass. Seine VI bis, 1924, p. 196. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 211; 1903, p. 288. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891. — Champ. Ent. Monthly Mag. XXXV, 1899, p. 143. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1920, p. 33, 40.   | France,<br>Danmark,<br>Allemagne,<br>Croatie,<br>Angleterre |  |
| <b>omissus</b> Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVIII, 1887, p. 298. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 211.   | Sibérie orient.,<br>Turkestan                               |  |
| <b>pusillus</b> Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXII, 1896, p. 466, t. 14, f. 37 b ( <i>Pelonomus</i> ). — Blatchl. & Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 459.  | Etats-Unis  |  |
| <b>quadricornis</b> Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 154 ( <i>Rhynchaenus</i> ); in Schönh. Gen. Sp. Cerc. III, 1, 1886, p. 462; l. c. VII, 2, 1843, p. 348. — Steph. III. Brit. Ent. Mandib. IV, 1881, p. 43 ( <i>Rhinoncus</i> ); Man. Brit. Col. 1889, p. 226. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1835), p. 6 ( <i>Rhynchaenus</i> ). — Redtb. l. c. 1849, p. 398; 1858, p. 779; 1874, p. 355. — Bach, l. c. p. 322. — Gutfl.-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 527. — C. G. Thoms. l. c. VII, 1865, p. 240 ( <i>Rhinoncus</i> subg. <i>Pachyrhinus</i> ); VIII, 1868, p. 196. — Roelofs, Ann. Soc. Ent. Belg. XVIII, 1875, p. 180 (Japon). — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 255 ( <i>Pachyrhinus</i> ). — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 181; l. c. (1887), p. 345 ( <i>Amalus</i> subg. <i>Pachyrhinus</i> ). — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1891, p. 645 ( <i>Pachyrhinus</i> ); Fn. Transsylv. 1891, p. 707. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1894, p. 371. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 552 (subg. <i>Pachyrhinus</i> ). — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 211. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 696. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 987 (subg. <i>Pachyrhinus</i> ). — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 179. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 200. — Hust. Misc. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1920, p. 34, 45. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 182. | Europe centr.<br>et septentr.                               |  |

*quadrituberculatus* var. Herbst, Natursyst. Käf. VI, 1795, p. 409 (*Curculio*).

var. *Roelofsi* Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV, 1916, p. 113.

Biologie: Urban, Ent. Blätt. X, 1914, p. 176, fig. — Bedel, l. c. VI bis, 1924, p. 105.

**quadrinodosus** Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 155 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. Sp. Curc. III, 1, 1836, p. 461; VII, 2, 1843, p. 346. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 51 (*Pachyrhinus*); Man. Brit. Col. 1839, p. 227. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. III, 1835, p. 65 (*Rhynchaenus*). — Bach, l. c. 1854, p. 321. — Redtb. l. c. 1858, p. 779; 1874, p. 355. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 527. — C. G. Thoms. l. c. VII, 1865, p. 240 (*Rhinoncus* subg. *Pachyrhinus*); X, 1868, p. 196. — Power, Entomolog. III, 1866—67, nr. 29, 1866, p. 80 (Angleterre). — Weise, Deutsche Ent. Zeitschr. XXVII, 1883, p. 255 (*Pachyrhinus*). — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 181; (1887), p. 345 (*Amalus* subg. *Pachyrhinus*). — Seidlitz, Fn. Balt. 1891, p. 635 (*Pachyrhinus*); Fn. Transsyrv. 1891, p. 707. — Stierlin, Fn. Col. Helvet. II, 1894, p. 371. — Champ. Ent. Monthly Mag. XXXV, 1899, p. 144. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 552. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 211; 1903, p. 288. — Everts, Col. Neerl. III, 1903, p. 696. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 987 (*Pachyrhinus*). — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 177. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 201. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1920, p. 33, 43. — Aariv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 132.

*mucronulatus* Germ. Ins. Sp. nov. I, 1824, p. 239. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 211.

*denticollis* Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 584 (*Rhinoncus*); l. c. VIII, 2, 1845, p. 175. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 180; (1887), p. 345 (*Amalus* subg. *Rhinoncus*); Suppl. VI bis, 1924, p. 105. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1894, p. 368 (*Rhinoncus*). — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 162 (*Phytobius*); l. c. 1902, p. 211; 1903, p. 288.

Biologie: Mathieu, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 221. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 331; XIX, 1887, p. 24. — Bourgeois, Mittheil. Nat. Ges. Colmar IX, 1908, p. 165. — Bedel, l. c. 345; Suppl. VI bis, 1924, p. 105.

**quadrituberculatus** F. Mant. Ins. I, 1787, p. 100 (*Curculio*); Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 406; Syst. El. II, 1801, p. 448 (*Phytobius*). — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1744 (*Curculio*). — Vill. Ent. Linn. IV, 1789, p. 285. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p. 482. — Herbst, Natursyst. Käfer VI, 1795, p. 409, t.

Japon

Europe,  
TurkestanEurope,  
Sibérie,  
Japon

92, f. 3. — Panz. Deutschl. Ins. Fn. 1795, p. 302. — Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 258. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. XII, 1804, p. 130. — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 153 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. Sp. Curec. III, 1, 1836, p. 462; VII, 2, 1843, p. 347. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 43 (*Rhinoncus*); Man. Brit. Col. 1839, p. 225. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1835, p. 64 (*Rhynchaenus*). — Zetterst. Ins. Lapp. I, 1838 (1840), Col. 183. — Gebler, Bull. Soc. Nat. Moscou XXI, 1848, p. 375. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 321. — Redtb. Fn. Austr. 1858, p. 778; 1874, p. 354. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 526. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 188; VIII, 1865, p. 237 (*Rhinoncus* subg. *Phytobius*); X, 1868, p. 195. — Kolen. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXII, 1859, p. 361. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 182; (1887), p. 346 (*Amalus* subg. *Pachyrhinus*). — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1891, p. 634; Fn. Transsylv. 1891, p. 706. — Stierlin, Fn. Col. Helvet. II, 1894, p. 370. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 552 (subg. *Pachyrhinus*). — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 211. — Everts, Col. Neerl. III, 1903, p. 696. — Kuhnt, Ill. Best. Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 987. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 178. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 200. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1920, p. 33, 39, Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV, 1916, p. 113. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 133.

*quadricornis* Payk. Monogr. Curec. 1792, p. 71 (*Curculio*).

*notula* Germ. Ins. Sp. nov. I, 1824, p. 240 (*Ceuthorhynchus*). — Kirsch, Deutsche Ent. Zeitschr. 1875, p. 398. — Bedel, l. c. p. 346.

*quadridentatus* Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 51 (*Pachyrhinus*); Man. Brit. Col. 1839, p. 227. — Schönh. Gen. Sp. Curec. III, 1, 1836, p. 464.

*ribis* Stroem, Skr. Köbenh. Selsk. II, 1783, p. 58 (*Curculio*).

*Biologie*: Zetterst. Ins. Lapp. I, 1838 (1840), col. 183. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. It. XVII, 1885, p. 381; 1887, p. 24. — Bourgeois, Mittheil. Nat. Ges. Colmar IX, 1908, p. 165. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 242. — Bedel, l. c. et Suppl. VI bis, 1924, p. 106.

*squamosus* Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, nr. 96, p. 281; in Lec. and Horn, Rhynchoph. N. Amer. (s. *Pelenomus*). — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 465, t. 14, f. 37 a. — Blatchl. & Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 458.

*sulcicollis* Fähr. in Schönh. Gen. Sp. Curec. VII, 2, 1843, p. 346. — J. Lec. Rhynchoph. N. Amer. 1876, p. 281 (*Pelenomus*). — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 468, t. 14, f.

Etats-Unis

"

38 (*Pelenomus*). — Blatchl. & Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 457 (*Pelenomus*).  
**taschkenticus** Faust, Stett. Ent. Zeit. XLVI, 1885, p. 194. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 211.

**variegatus** Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXVIII, 1919 (1920), p. 333.

**velaris** Gyll. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 581 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. Sp. Curc. III, 1, 1836, p. 344 (*Phytobius*); l. c. VII, 2, 1843, p. 344. — Redt. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 778; ed. 3, II, 1874, p. 354. — Gutfl.-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 526. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 238; X, 1868, p. 195. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1891, p. 634; Fn. Transsylv. 1891, p. 706. — Stierlin, Fn. Col. Helvet. II, 1894, p. 370. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 211. — Everts, Col. Neerl. II, 1908, p. 696. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 987. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 178. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1920, p. 33, 36. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 133.

**Biologie:** Bourgeois, Mittheil. Nat. Ges. Colmar IX, 1908, p. 165. — J. Ste Claire Deville, Abeille XXX, p. 202; Fn. Bass. Seine VI bis, 1924, p. 106.

**Waltoni** Bohem. in Schönh. Gen. Sp. Curc. VII, 2, 1843, p. 345. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 236; X, 1868, p. 195. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 182; (1887), p. 346 (*Amalus* subg. *Pachyrrhinus*). — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1891, p. 634; Fn. Transsylv. 1891, p. 706. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 211. — Everts, Col. Neerl. II, 1908, p. 695. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 987, fig. 291 a. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 178. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 198. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1920, p. 33, 38; Ann. Soc. Ent. Fr. LXXXV, 1916, p. 113. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 132.

**notula** Gyll. Ins. Suec. I, 4, 1827, p. 582 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. Sp. Curc. III, 1, 1836, p. 461; l. c. VIII, 2, 1843, p. 346. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 346, nota. — Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XX, 1847, II, p. 553. — Redtb. Fn. Austr. ed. 2, 1858, p. 778; ed. 3, II, 1874, p. 354. — Gutfl. & Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 526. — Kolen. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXII, 1859, p. 360. — Stierl. Fn. Helvet. II, 1894, p. 370. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 211.

**Biologie:** Perris, Mém. Ac. Sc. Lyon (2) I, 1851, p. 102—106, figs. (*notula*); Ann. Soc. Linn. Lyon XXII, 1875, p. 250; Larves Col. 1877, p. 410. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVIII, 1885, p. 330. — Bourgeois, Mittheil. Nat. Ges. Colmar IX, 1908, p. 165. — Bedel, l. c. VI bis, 1924, p. 106.

Turkestan:  
Taschkent

Yunnan

Allemagne,  
Suède,  
France

Europe centr.  
et septentr.,  
Japon

**Mecopeltus Dietz.**

- Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 466. — Blatchley & Leng, Rhynchophora N. E. Amer. 1916, p. 454, 459.  
**aeneosquamatus** Dietz, l. c. p. 469. Etats-Unis  
**congenitalis** Dietz, l. c. p. 469.  
**fuliginosus** Dietz, l. c. p. 467. — Blatchley & Leng, " l. c. p. 460.  
**obscurefasciatus** Dietz, l. c. p. 468. "  
**scandens** Dietz, l. c. p. 467 (♀). — Blatchley & Leng, " l. c. p. 460.  
**scoliasus** Dietz, l. c. p. 470 (♂). "
- 6

**Perenthis Dietz.**

- Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 458, 460. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 454, 462.  
**vestitus** Dietz, l. c. p. 461 (♂), t. 14, f. 35, 35a. — Etats-Unis Blatchley & Leng, l. c. p. 462.
- 1

**Amalus Schönh.**

- Schönh. Cerc. Disp. Meth. 1826, p. 240; Gen. sp. Cerc. III, 1836, p. 225. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 53. — Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 403; ed. 2, 1858, p. 772; ed. 3, II, 1874, p. 356. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 312. — Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 245. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1866, p. 209. — Seidlitz, Fn. Balt. 1872, p. 447; ed. 2, 1891, p. 635; Fn. Transsylv. 1891, p. 707. — Stierl. Fn. Col. Helv. 1894, p. 371. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 542. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 210. — Everts, Col. Neerl. III, 1903, p. 694. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 985. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn II, 1912 (1913) [Best.-Tab. 68], p. 70; Fn. Germ. V, 1916, p. 179. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 194. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1920, p. 20. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 115, 133.

- haemorrhous** Herbst, Käf. VI, 1795, p. 399, t. 91, f. 8 (*Curculio*). — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 181; (1887), p. 345. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 210. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 694. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 95. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 179, t. 161, f. 3. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1918, p. 195. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1928, p. 22. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 116, 134.

- scortillum** Herbst, Käfer VI, 1795, p. 418, t. 92, f. 13 (*Curculio*). — Gyll. Ins. Suec. III, 1818, p. 135 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. Sp. Cerc. III, 1834, p. 396 (*Amalus*); VII, 1843, p. 298. — Germ. Ins. Sp. nov. I, 1824, p. 221 (*Ceuthorhynchus*). — Zetterst. Fn. Ins. Lapp. I, 1828, p. 323 (*Rhynchaenus*). — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 53 (*Amalus*). — Redtenb. Fn. Austr. 1849, p. 403; ed. 2, 1858, p. 772; ed. 3, II, 1874, p. 356. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 313. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. 1854—68, t. 21, f. 99. —

|   |              |
|---|--------------|
| C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 246;<br>X, 1868, p. 143. — Seidlitz, Fn. Balt. 1872,<br>p. 447; ed. 2, 1891, p. 635; Fn. Transsylyv. 1891,<br>p. 707. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1894, p.<br>371. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900,<br>p. 553. |              |
| <i>agricola</i> Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 260<br>( <i>Curculio</i> ).   | Suède        |
| <i>brunnneus</i> Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 284.<br>— Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831,<br>p. 72.   | Angleterre   |
| <i>castaneus</i> Steph. l. c. p. 54 ( <i>Amalus</i> ).  |              |
| <i>inflexus</i> Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 253<br>( <i>Curculio</i> ).   | "            |
| <i>rubicundus</i> Panz. Fn. Ins. Germ. 99, 1809,<br>p. 99 ( <i>dumetorum</i> l. c. texte, <i>Rhynchaenus</i> ).<br>Biologie: Penecke, Wien. Ent. Zeit. XXXIX,<br>1922, p. 187. — Hust. l. c. 22.  | Allemagne    |
| <b>latibasis</b> Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 179, nota.<br>2   | Caucase occ. |

### Drusenatus Reitt.

Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 175, 180.

*Drupenatus* Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913)  
(Best.-Tab. 68), p. 71.

|   |  |
|---|--|
| <b>nasturtii</b> Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 233<br>( <i>Ceuthorhynchus</i> ). — Steph. Ill. Brit. Ent.<br>Mandib. IV, 1831, p. 4, t. 16, f. 1 ( <i>Miarus</i> );<br>p. 16, t. 20, f. 1 ( <i>Miarus</i> ); Man. Brit. Col. 1839,<br>p. 223 ( <i>Poophagus</i> ). — Gyll. in Schönh. Gen.<br>Sp. Cure. IV, 1, 1837, p. 592; l. c. VIII, 2,<br>1845, p. 176 ( <i>Poophagus</i> ). — Bach, Käferfn.<br>II, 1852—54 (1854), p. 373. — Redtb. Fn.<br>Austr. ed. 2, 1858, p. 810; ed. 3, II, 1874, p.<br>352. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88<br>(1885), p. 175; (1887), p. 337. — Fowler, Col.<br>Brit. Isl. VI, 1891. — Reitt. Wien. Ent. Zeit.<br>VIII, 1889, p. 70; Fn. Germ. V, 1916, p. 180<br>( <i>Drusenatus</i> ). — Stierl. Fn. Col. Helvet. II,<br>1886—98 (1894), p. 385. — Lameere, Man. Fn.<br>Belg. II, 1900, p. 542 ( <i>Poophagus</i> ). — Schultze,<br>Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 226. — Hust.<br>Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1922, p. 51,<br>53 ( <i>Poophagus</i> ).<br><i>olivaceus</i> Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Cure.<br>IV, 1, 1837, p. 592; l. c. VIII, 2, 1845, p. 176.<br>— Bedel, l. c. p. 337. | Angleterre,<br>Hollande,<br>Allemagne,<br>Hongrie mér.,<br>France,<br>Italie,<br>Corse |
| Biologie: Curtis, Ent. Brit. XIII, 1836, t.<br>670. — Suffrian, Stett. Ent. Zeit. I, 1840, p.<br>60. — Mathieu, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858,<br>p. 25—27. — Goureau, Ins. nuis. aux arb.<br>fruit. 2e suppl. in Bull. Soc. Sc. Hist. Nat.<br>Yonne 1865, p. 67. — Tylden, Ent. Monthly<br>Mag. VII, 1869, p. 32. — Kaltenbach, Pflanzenf.<br>1874, p. 25—27. — Perris, Ann. Soc.<br>Linn. (n. s.) XXIII, 1876 (1877), p. 217; Lar-<br>ves Col. 1877, p. 409. — Bargagli, Bull. Soc.<br>Ent. Ital. XVII, 1885, p. 329; XIX, 1887, p. 23.<br>— Goury et Guignon, Feuille Jeun. Nat.   |  |

XXXVIII, 1907, p. 45, 117. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 263. — Peyerimh. Ann. Soc. Ent. Fr. 1911, p. 57.

1

### Tapinotus Schönh.

Schönh. Disp. meth. Curc. 1826, p. 292; Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 593; VIII, 2, 1845, p. 176 [*Tapinolus* (err.)]. — Redtb. Gatt. deutsch. Käferfn. 1845, p. 42; Fn. Austr. 1849, p. 42, 377; ed. 2, 1858, p. CXXIV, 810; ed. 3, I, 1874, p. CXXXVIII, III, 1874, p. 352. — Bach, Käferf. III, 1852—54 (1854), p. 159, 373. — Gutfl.-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 550. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 260; X, 1868, p. 199. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1866, p. 203. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 161; (1887), p. 343. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1891, p. 166; Fn. Transsylv. 1891, p. 166. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1894, p. 385. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 226. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 557, 691. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) [Best.-Tab. 68], p. 70; Fn. Germ. V, 1916, p. 175, 179. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 918, 998. — Wagner in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 1120, 1136.

**sellatus** F. Ent. Syst. IV, 1794, p. 454 (*Curculio*); Syst. El. II, 1801, p. 423 (*Attelabus*). — Herbst, Natursyst. Käf. VI, 1795, p. 217, t. 75, f. 6 (*Curculio*). — Panz. Deutschl. Ins.-Fn. 1795, p. 296. — Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 221 (*Cryptorhynchus*). — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1835, p. 87 (*Rhynchaenus*). — Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 594 (*Tapinotus*); VIII, 2, 1845, p. 176. — Gutfl.-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 550. — Redtb. l. c. p. 377; p. 810; p. 352. — Bach, l. c. p. 374. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—1868, t. 26, f. 130. — C. G. Thoms. l. c. VII, p. 260; X, 1868, p. 199. — Bedel, l. c. (1885), p. 176; (1887), p. 343 (*Ceuthorhynchus* subg. *Tapinotus*). — Seidlitz, Fn. Balt. 1891, p. 633; Fn. Transsylv. 1891, p. 705. — Stierl. l. c. p. 385. — Everts, l. c. p. 692. — Fiori, Riv. Col. Ital. V, 1907, p. 292. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 998, fig. 305. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 179, pl. 162, fig. 12. — Wagn. l. c. t. 41, f. 12. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1916, p. 192. — Hust. Miscell. Rev. Geuth. Gallo-Rh. 1922, p. 55, fig. 16. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 133.

*lysimachiae* Ol. Ent. V, 1807, nr. 83, p. 215, t. 23, f. 328 (*Rhynchaenus*). — Bedel, l. c. p. 343.

*e p h i p p i g e r* Schönh. Disp. meth. Curc. 1826, p. 293 (*Tapinotus*).

**B i o l o g i e :** Mathieu, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 238. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, III, 1874, p. 352. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIII, 1876 (1877), p. 249. — Rosenhauer, Stett. Ent. Zeit. XLIII, 1882, p. 131—132 (Mé-tamorphoses). — Buddeberg, Jahrb. Nassau. Ver. Nat. XXXVII, 1884, p. 82—84. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 329; XIX, 1887, p. 23. — Bedel, l. c. p. 343. — Bour-

Europe centr.  
et mérid.,  
Amour

*geois*, Mitth. Nat. Ges. Colmar IX, 1908, p. 175. — *Kleine*, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 277. — *Urban*, Ent. Blätt. IX, 1913, p. 139, fig. 1. — *Hust.* l. c. p. 56.

1

### Poophagus Schönh.

Schönh., Gen. Spec. Curc. IV, 1, 1887, p. 590; VIII, 2, 1845, p. 167. — Redtb. Gatt. Deutschl. Käferfn. 1845, p. 42; Fn. Austr. 1849, p. 42, 378; ed. 2, 1858, p. CXXIV, 810; ed. 3, I, 1874, p. CXXXVII, II, p. 352. — Bach, Käferfn. III, 1854, p. 159, 373. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1850, p. 140; VII, 1865, p. 261; X, 1868, p. 199. — Lacord. Gen. Col. VIII, 1866, p. 202. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 161; (1887), p. 348. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 166; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 166. — Stierl. Fn. Col. Helvet. III, 1886—98 (1894), p. 385. — Lameere, Man. Fn. Belg. III, 1900, p. 541. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 226; 1903, p. 290. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 557, 691. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) [Best.-Tab. 68], p. 71; Fn. Germ. V, 1916, p. 140, 175, 180. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 918, 997. — Wagner in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 1120, 1135.

*Acnemiscelis* Desbr. Frelon V, 1896, p. 104. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1903, p. 290.

**Hopffgarteni** Tourn. Mitth. Schweiz. Ent. Ges. IV, 1872—76 (1874), nr. 4, p. 189. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 70; Fn. Germ. V, 1916, p. 180. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1897, p. 199; 1898, p. 270; 1902, p. 226.

*araneipes* Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XVI, 1882, p. 323. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 70. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1898, p. 270; 1902, p. 226; 1903, p. 290.

*araneipes* Desbr. Frelon V, 1896, p. 104 (*Acnemiscelis*). — Meier, Ent. Nachr. XXVI, 1900, p. 219. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 290. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 554, nota.

**Biologie:** Meier, Ent. Nachr. XXVI, 1900, p. 219.

**robustus** Faust, Horae Soc. Ent. Ross. XVI, 1882, p. 322. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 70. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 226.

**sisymbrii** F. Gen. Ins. 1776, p. 224; Spec. Ins. I, 1781, p. 168; Mant. Ins. I, 1787, p. 101; Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 409 (*Curculio*); Syst. El. II, 1801, p. 452 (*Rhynchaenus*). — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 187; IV, 1789, p. 268 (*Curculio*). — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1750. — Ol. Encycl. méthod. V, 1790, p. 484 (*Curculio*); Entomol. V, nr. 83, 1807, p. 154, t. 29, f. 433 (*Rhynchaenus*). — Herbst, Natursyst. Käf. VI, 1795, p. 159, t. 70, f. 12. — Panz. Deutschl. Ins.-Fn. 1795, p. 303. — Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 247. — Marsh. Ent. Brit. I, 1802, p. 253. — Walck. Fn. Paris. I, 1902, p. 245. — Latr. Hist. Nat. Crust.

Hongrie,  
Bosnie,  
Allemagne,  
Russie mér.

Russie mérid.:  
Taganrog

Europe centr.  
et septentr.

et Ins. XI, 1804, p. 124. — Gyll. Ins. Suec. I, 3, 1813, p. 90 (*Rhynchaenus*); in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, p. 591; VIII, 2, 1845, p. 176 (*Poophagus*). — Schönh. Disp. meth. Curc. 1826, p. 298. — Steph. III. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 271, t. 20, f. 6 (*Nedyus*); Man. Brit. Col. 1839, p. 219. — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1835), p. 36 (*Rhynchaenus*). — Redtb. Fn. Austr. 1849, p. 378; 1858, p. 810; 1874, p. 352. — Bach, Käferfn. II, 1854, p. 373. — Gutfl.-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 455. 549. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68, t. 27, f. 129. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 261; X, 1868, p. 199. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 165; (1887), p. 348. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 70; Fn. Germ. V, 1916, p. 180, t. 162, f. 11. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1891, p. 632; Fn. Transsylyv. 1891, p. 704. — Stierl. Fn. Col. Helvet. 1894, p. 385. — Lameere, Man. Fn. Belg. II, 1900, p. 542, fig. 541. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 226. — Everts, Col. Neerl. II, 1903, p. 691. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 997. — Wagner in Calwer Käferb. ed. 6, 1916, p. 1185, t. 41, f. 11. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1916, p. 193. — Hust. Missell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1922, p. 52, fig. 15. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 133.  
**Biologie:** Gmel. in Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1750. — F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 409. — Panzer, Fn. Ins. Germ. 17, 1794, t. 6. — Ol. Ent. V, 1807, p. 154. — Mathieu, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 237. — Kalttenb. Pflanzenf. 1874, p. 25. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIII, 1876 (1877), p. 249; Larves Col. 1877, p. 409. — Letzner, Jahresb. Ges. vaterl. Cult. LX, 1882 (1883), p. 301—302. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 329; XIX, 1887, p. 23. — Meier, Ent. Nachr. XXVI, 1900, p. 219. — Goury et Guignon, Feuill. Jeun. Natur. XXXVII, 1907, p. 44, 115. — Bourgeois, Mittheil. Nat. Ges. Colmar IX, 1908, p. 175. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 277. — L. Falcoz. Bull. Soc. Ent. Fr. 1927, p. 229.

**subnudus** Reitt. Wien. Ent. Zeit. VIII, 1889, p. 69.  
— Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902,  
p. 226.

Caucase,  
Circassie

### Perigaster Dietz.

Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 458. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 454, 455.  
**cretura** Herbst, Natursyst. Käf. VII, 1797, p. 70, t. 100, f. 5 (*Curculio*). — Say, Descr. N. Am. Curc. in Journ. Acad. Sc. Philad. 1831, p. 20. — Lec. Rhynch. N. Amer. 1876, p. 285. — Etats-Unis

Dietz, l. c. p. 459. — Blatchley & Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 456.  
*quaedrispinosus* Say, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. III, 1823, p. 310 (*Falciger*); ed. Leconte II, 1859, p. 173 (*Phytobius*); Descr. Curc. North Amer. 1831, p. 20 (*Ceuthorrhynchus*); ed. Leconte I, 1859, p. 285 (*Phytobius*). — Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. III, 1, 1837, p. 463 (*Phytobius*); l. c. VII, 2, 1843, p. 349. — Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876 [Rhynchoph. N. E. Amer. Leconte et Horn], p. 283.

**Biologie:** Pierre, Proc. Ent. Soc. Wash. XVIII, 1916, p. 9.

**obscura** Lec. Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 283 (*Coelogaster*). — Dietz, l. c. 1896, p. 459, t. 14, f. 36. — Blatchl. et Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 456.

**tetracantha** Champ. Biol. Centr.-Amer. Col. IV, 5, p. 152, t. 9, f. 5.

3

### Coelogaster Schönh.

Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1, 1837, p. 588. — Dietz, Trans. Amer. Ent. Soc. XXIII, 1896, p. 455. — Blatchl. & Leng, Rhynchoph. N. E. Amer. 1916, p. 454, 455.

**lituratus** Dietz, l. c. p. 456, 457, t. 14, f. 34, 34a, 34b. Etats-Unis — Leng, l. c. p. 455.

**Zimmermanni** Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 1837, p. 589. — Lec. Proc. Am. Phil. Soc. XV, 1876, p. 283. — Dietz, l. c. p. 456, t. 14, f. 38, 38a, 38b. — Leng, l. c. p. 455, fig. 103, C.

2

### Dietzella Champ.

Champ. Biol. Centr.-Amer. IV, 5, 1907, p. 151.

**sextuberculata** Bohem. in Schönh. Gen. Sp. Curc. Mexico VIII, 2, 1845, p. 131 (*Ceuthorrhynchus*). — Champ. l. c. p. 151, t. 9, f. 4.

1

## 7. Tribus Orobitalini.

Bedel, Ann. Soc. Ent. Fr. (6) II, 1882, Bull. p. CLVI—CLVII; Faune Bass. Seine VI, 1882—88, p. 66, 186.

**Orobitalidae** Pierce, Proc. Ent. Soc. Washington XXI, 1919, p. 715—33.

**Orobitalisidae** Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 226.

**Orobitalina** Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 115.

### Orobites Germar. *Mag. Ent. II, 1820*, p. 340

Germ. Ins. Spec. nov. I, 1824, p. 242. — Schönh. Disp. meth. Curc. 1826, p. 314; Gen. Sp. Curc. IV, 2, 1838, p. 694; VIII, 2, 1845, p. 121. — Latr. Hist. Nat. Crust. et Ins. II, 1829, p. 86. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 20; Man. Brit. Col. 1839, p. 210. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. III, 1840, p. 361. — Blanch. Hist. Nat. Ins. III, 1845,

p. 42. — Redtb. Gatt. deutsch. Käferfn. 1845, p. 42; Fn. Austr. 1849, p. 42; ed. 2, 1858, p. CXXIV; ed. 3, I, 1874, p. CXXXVII. — Bach, Käferfn. III, 1852—54 (1854), p. 159. — Gutfl.-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 538. — C. G. Thoms. Skand. Col. I, 1859, p. 138; VIII, 1865, p. 230; X, 1868, p. 194. — Lacord. Gen. Col. VII, 1866, p. 71. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1885), p. 186; (1887), p. 350. — Fowler, Col. Brit. Isl. VI, 1891, p. 327. — Seidlitz, Fn. Balt. ed. 2, 1891, p. 166; Fn. Transsylv. 1891, p. 166. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1894), p. 36. — Lameere, Man. Fn. Belg. III, 1900, p. 553. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 226. — Everts, Col. Neerl. II, 1908, p. 557. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käf. Deutschl. 1912, p. 1119. — Reitt. Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) [Best.-Tab. 68], p. 71; Fn. Germ. V, 1916, p. 181. — Wagner in Calwer, Käferb. ed. 6, 1916, p. 1119.

**cyanus** L. Syst. Nat. ed. X, 1758, p. 378 (*Curculio*);

l. c. ed. XII, 1767, I, 2, p. 606; Fn. Suec. ed. 2, 1761, p. 174. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1743. — Vill. Ent. Linn. I, 1789, p. 174. — Steph. Ill. Brit. Ent. Mandib. IV, 1831, p. 21 (*Orobitis*); Man. Brit. Col. 1839, p. 219. — Gyll. in Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 2, p. 695. — Redtb. l. c. 1849, p. 376; 1858, p. 796; 1874, p. 321. — Bach, l. c. p. 344. — Gutfl.-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 539. — Bedel, l. c. p. 186, 350. — Fowler, l. c. p. 327. — Seidlitz, Fn. Balt. 1891, p. 624; Fn. Transsylv. 1891, p. 695. — Stierl. l. c. p. 371. — Lameere, l. c. p. 553, fig. — Schultze, l. c. p. 226. — Everts, l. c. p. 547, fig. 122 V; p. 700. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 182, t. 162, f. 3. — Wagn. l. c. t. 41, f. 13. — Hansen, Danmarks Fn. IV, 1916, p. 203. — Auriv. Svensk Insekt. 9, 1924, p. 115. — Hust. Miscell. Rev. Ceuth. Gallo-Rh. 1925, p. 301.

**craccae** F. Spec. Ins. I, 1781, p. 168 (*Curculio*); Mant. Ins. I, 1787, p. 101. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. XIII, I, 4, 1790, p. 1743.

**globosus** F. Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 39; Syst. El. II, 1801, p. 426 (*Attelabus*). — Cast. Hist. Nat. Ins. II, 1840, p. 361, t. 21, fig. 8. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68, t. 26, f. 123.

**hypoleucus** Quens. Diss. ign. Ins. 1790, p. 16 (*Curculio*). — Payk., Mon. Curc. 1792, p. 75.

**Biologie:** Schönh. Gen. Sp. Curc. IV, 2, 1838, p. 695. — Mathieu, Ann. Soc. Ent. Belg. II, 1858, p. 229. — Redtb. Fn. Austr. ed. 3, 1874, p. 331. — Perris, Ann. Soc. Linn. Lyon XXIII, 1876 (1877), p. 246; Larves Col. 1877, p. 406. — Puton, Ann. Soc. Ent. Fr. (5) VII, 1877, Bull. p. CXXXI. — Schlechtendal, Jahressb. Ver. Nat. Zwickau 1878 (1879), p. 29. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVII, 1885, p. 305; XIX, 1887, p. 13. — Bedel, Fn. Bass. Seine VI, 1882—88 (1887), p. 186. — Bourgeois, Mittheil. Nat. Ges. Colmar IX, 1908, p. 175. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 277.

Europe  
moyenne

**nigrinus** Reitt. Deutsche Ent. Zeitschr. XXIX, 1885, p. 213; Fn. Germ. V, 1916, p. 182. — Schultze, Deutsche Ent. Zeitschr. 1902, p. 226. — Ganglbauer, Münch. Kol. Zeitschr. I, 1903, p. 255.

Biologie: Penecke, Wien. Ent. Zeit. XXXIX, 1922, p. 188.

2

---

891

# Index.

## Tribus, Genera, Subgenera.

- Acalloides* Lec. 19  
*Acanthocephelidius* Hust. 19  
*Acanthoscelis* Dietz 19  
*Acnemiscelis* Desbr. 133  
*Aegrius* Pasc. 22  
*Allodactylus* Weise 24  
*Amalus* Schönh. 130  
*Auleutes* Dietz 20
- Belonnotus* Schultze 113  
*Bohemanius* Schultze 113  
*Brachiodontus* Schultze 9  
~~*Boteletia* Pencké, 1935~~ 35  
*Calonsirus* C. G. Thoms. 35  
*Ceuthorrhynchidius* Jacq. du Val 31  
**Ceuthorhynchini** 22  
*Ceuthorhynchus* Germ. 35  
*Cidnorhinus* C. G. Thoms. 28  
*Cnemogonus* Lee. 19  
*Coeliastes* Weise 27  
*Coeliodes* Schönh. 11  
**Coeliodini** 11  
*Coeliosomus* Motsch. 113  
*Coelogaster* Schönh. 135  
*Coelogaster* Schultze 113  
*Craponius* Lee. 19  
*Cyphosemus* Schultze 115
- Dietzella* Champ. 135  
*Dionoremus* Reitt. 36  
*Drupenatus* Reitt. 131  
*Drusenatus* Reitt. 131
- Ectamnogaster* Schultze 113  
*Eremonyx* Peyerimh. 86  
*Ethelcus* Reitt. 36  
*Eubrychius* C. G. Thoms. 122  
*Euhrychiopsis* Dietz 123
- Glocianus* Reitt. 36
- Hadroplontus* C. G. Thoms. 35  
*Homoeosoma* Schultze 9
- Hisperorhynchus* Peyerimh. 86  
*Homorosoma* Friv. 9  
*Hydaticus* Schönh. 123  
*Hypocoeliodes* Faust 21  
*Hypohipurus* Hust. 11  
**Hypurini** 10  
*Hypurus* Rey 10
- Litodactylus* Redt. 120
- Marklissus* Reitt. 36  
*Marmaropus* Schönh. 22  
*Mecopeltus* Dietz 130  
*Mecysmoderes* Schönh. 113  
*Megacetes* C. G. Thoms. 11  
*Micrelus* C. G. Thoms. 26  
*Mogulones* Reitt. 36  
**Mononychini** 4  
*Mononychus* Germ. 4
- Nedyus* Steph. 35  
*Neoxyonyx* Hoffm. 17
- Oprohinus* Reitt. 36  
*Orchestomerus* Dietz 21  
*Oreorhynchus* Otto 9  
*Orethelcus* Reitt. 36  
**Orobitini** 135  
*Orobitis* Germ. 135  
*Oxyonyx* Faust 17
- Pachyrhinus* Steph. 123  
*Pelenomus* C. G. Thoms. 123  
*Pelenosomus* Dietz 21  
*Perenthis* Dietz 130  
*Perigaster* Dietz 134  
*Phrydiuchus* Gozis 30  
**Phytobiini** 115  
*Phytobius* Schönh. 123  
*Platygaster* Faust 18  
*Platygasteronyx* Reitt. 18  
*Poophagus* Schönh. 133  
*Prenesdus* Reitt. 36

*Prisistus* Reitt. 36  
*Pseudophytobius* Desbr. 10  
*Rhinoncus* Steph. 115  
*Rhytidosomus* Schönh. 7  
*Rileyonymus* Dietz 113  
*Rutidosoma* Steph. 8

**Scleropterini 7**

*Scleropteridius* Otto 8  
*Scleropterus* Schönh. 7  
*Sirocalus* Heyd. 35  
*Stenocarus* C. G. Thoms. 23  
*Tapinotus* Schönh. 132  
*Thamiocolus* C. G. Thoms. 35

*Zacladus* Reitt. 24

**Species, Varietates.**

*abbreviatulus* F. 36  
*abbreviatus* Redt. 36  
*abchasicus* Faust 37  
*Abeillei* Schultze 37  
*abruptestriatus* Gyll. 28  
*acalloides* Frm. 10  
*accipitrinus* Reich 118  
*acephalus* Say 19  
*achilleae* Gyll. 90  
*aculeatus* Gmel. 112  
*aculeatus* Pen. (Ceuth.) 37  
*acutangulus* Schultze 17  
*adjunctus* Dietz 37  
*adspersulus* Dietz 37  
*adversus* Desbr. 37  
*aegrotus* Gyll. 53  
*aeneicollis* Germ. 37  
*aeneipennis* Bris. 102  
*aeneomicans* Pic 49  
*aeneosquamulosus* Dietz 130  
*aenescens* Schultze 37  
*aeneus* Hust. 13  
*aequabilis* Schultze 11  
*aeratus* Dietz 37  
*affinis* Bris. (Ceuth.) 37  
*affinis* Hust. (Hypocoel.) 21  
*affinis* Panz. (Ceuth.) 105  
*affinis* Payk. (Zacl.) 24  
*affinis* Steph. (Ceuth.) 102  
*affluentus* Dietz 94  
*africanus* Schultze 37  
*agricola* Payk. 131  
*Ahngeri* Schultze 38  
*akbesianus* Pic 38  
*alauda* F. 43, 105  
*albicinctus* Gyll. 115  
*albiplumis* Peyerh. 17  
*albocapillus* Motsch. 113  
*albohispidus* Frm. 35  
*albolimbatus* Pic 38  
*abolineatus* Friv. 71  
*abonebulosus* Hans. 61  
*albopilosulus* Dietz 38  
*albopunctatus* Goeze 29  
*alboscutellatus* Gyll. 53  
*albosetosus* Gyll. 27  
*albosignatus* Gyll. 38  
*albosuturalis* Roel. 38

*albovarius* Bohem. 11  
*albovittatus* Germ. 38  
*algerinus* Gand. 6  
*algiricus* Bris. 39  
*alliariae* Bris. 95  
*Alluaudi* Hust. 26  
*alpicola* Otto 9  
*alpinus* Hampe 9  
*altaicus* Schultze 39  
*alternans* Bris. 39  
*alyssi* Peyerh. 39  
*ambiguus* Schultze 39  
*amplipennis* Schultze 39  
*amurensis* Schultze 4  
*analis* Panz. 40  
*anatolicus* Schultze 39  
*ancora* Roel. 39  
*andalusicus* Schultze 12  
*Andreae* Bed. 70  
*angulatus* Lee. (Ceuth.) 89  
*angulatus* Champ. (Hypocoel.) 21  
*angulicollis* Schultze 39  
*angulosus* Boh. 39  
*angustifauces* Desbr. 42  
*angustulus* Gyll. 40  
*angustus* Schultze (Monon.) 4  
*Annibal* Desbr. 40  
*antennalis* Bris. 46  
*anthonomoides* Dietz 40  
*Antoinei* Hust. 10  
*aper* Bed. 40  
*Apfelbecki* Schultze 40  
*apicalis* Dietz (Coeliodes) 13  
*apicalis* Gyll. (Ceuth.) 40  
*apicalis* Redt. (Ceuth.) 106  
*aquaticus* Thoms. 122  
*araneipes* Fst. 133  
*araneipes* Desbr. 133  
*arator* Auct. 41  
*arator* Bed. 68  
*arator* Gyll. 41  
*aratridens* Schultze 41  
*Arcasi* Bris. 41  
*arcuatus* Fähr. 41  
*arduus* Schultze 41  
*argentinensis* Hust. 41  
*armatus* Dietz 41  
*armus* Gmel. 113

*arquatus* Hbst. 41  
*asper* Roel. (Ceuth.) 42  
*asper* Lec. (Auleutes) 20  
*asperatus* Gyll. (*Rhinoncus*) 115  
*asperatus* Gyll. (*Zacladus*) 25  
*asperifoliarum* Gyll. 42  
*asperipennis* Champ. 20  
*asperulus* Boh. (Ceuth.) 87  
*asperulus* Dietz (Phytob.) 123  
*asperulus* Fst. (Ceuth.) 43  
*asperulus* Fst. (*Zacladus*) 25  
*assimilis* Payk. 43  
*assimilis* Ol. 79  
*astracanicus* Schultze 125  
*ater* Dietz (Auleutes) 20  
*ater* Hust. (Mecysmod.) 113  
*aterrimus* Hust. 44  
*atomus* Boh. 44  
*atomus* Dietz 55  
*atratulus* Gyll. 52  
*atriculus* Dietz 45  
*atticus* Schultze 45  
*Aubei* Boh. 45  
*auritus* Kirsch 17  
*austerus* Gyll. 52  
*austriacus* Bris. (Ceuth.) 45  
*austriacus* Otto (Rhytid.) 8  
*axillaris* Boh. 45  
*aztecus* Champ. 45  
  
*baborensis* Pic 99  
*baldensis* Schultze 31  
*balsaminae* Guill. 40  
*barbareae* Suff. 45  
*Barnevillei* Gren. 31  
*basicornis* Schultze 10  
*Beckeri* Schultze 46  
*Bedeli* Schultze (Ceuthorhynchidius) 31  
*Bedeli* Schultze (Ceuth.) 88  
*bellus* Reitt. 31  
*berteroae* Penecke 46  
*Bertrandi* Perris 10  
*beryticus* Schultze 17  
*Besseri* Gyll. 22  
*bicollaris* Schultze 46  
*bicoloratus* Desbr. 11  
*bigibbosus* Hust. 19  
*biguttatus* Boh. 110  
*biguttatus* Redt. 57  
*biimpressus* Bris. 10  
*Bolleyi* Champ. 20  
*biplagiatus* Schultze 46  
*bipustulatus* Schultze 26  
*biscrensis* Schultze 46  
*biscutellatus* Chevr. 46  
*biseriatus* Faust 46  
*biskrensis* Desbr. (*Hypurus*) 10  
*biskrensis* Pic (Ceuth.) 43

*bisquamatus* Hust. 26  
*bituberculatus* Fst. 46  
*Bolteri* Dietz 46  
*borraginis* F. 46  
*borraginis* Gyll. 91  
*bosnicus* Schultze (Ceuth.) 70  
*bosnicus* Schultze (*Rhinoncus*) 116  
*Bouvieri* Hust. 115  
*Boviei* Hust. 11  
*brassicace* Foc. 43  
*Breiti* Hust. 82  
*brevicarinatus* Hust. 113  
*brevicollis* Schultze 47  
*brevicornis* Schultze (Ceuth.) 47  
*brevicornis* Hust. (Mecysmod.) 113  
*brevirostris* Schultze (Ceuth.) 47  
*brevirostris* Schultze (*Coeliodes*) 12  
*breviusculus* Schultze 47  
*Brisouti* Friv. (Ceuth.) 62  
*Brisouti* Fst. (Ceuth.) 47  
*Brisouti* Fst. (*Oxyonyx*) 17  
*Brisouti* Seidl. (Phytob.) 125  
*Bruchi* Hust. 12  
*bruchoides* Herbst 116  
*brunneus* Hust. (*Coeliodes*) 12  
*brunneus* Marsh. (*Amalus*) 131  
*bucharensis* Schultze 47  
*bufo* F. 4  
*buniadis* Pen. 47  
*Burgeoni* Hust. 17  
  
*caesius* Schultze 106  
*Cailloli* Peyerimh. 17  
*cakilis* Hans. 47  
*calcar* Panz. 91  
*calcaratus* Schultze 47  
*californicus* Dietz 19  
*caliginosus* Steph. 86  
*cameliniae* Boh. 75  
*camelus* Pasc. 22  
*camerunensis* Hust. 47  
*campanellae* Schultze 32  
*campestris* Gyll. 47  
*canaliculatus* Bris. (Ceuth.) 48  
*canaliculatus* Steph. (*Rhinoncus*) 118  
*canaliculatus* Fähr. (Phyton.) 123  
*canaliculatus* Gyll. (*Stenocarus*) 24  
*canescens* Schultze 48  
*capillatus* Schultze 48  
*capucinus* Schultze 48  
*cardui* Hbst. (*Stenocarus*) 23  
*cardui* Ol. (Ceuth.) 73  
*carinatus* Gyll. (Ceuth.) 48  
*carinatus* Fst. (Mecysmoderes) 113  
*carinicollis* Bris. (Ceuth.) 49  
*carinicollis* Hust. (Mecysmoderes) 113  
*carinifer* Kirsch 114  
*carinifrons* Gyll. 49

- carinifrons* Schultze 104  
*carinirostris* Hust. 19  
*carinulatus* Fst. 49  
*carneus* Perris 10  
*carnolicus* Schultze 49  
*Caroli* Desbr. 49  
*carpathicola* Redt. 46  
*carpathicus* Brancs. 7  
*castaneus* Hust. (*Rhinoneus*) 116  
*castaneus* Steph. (*Amalus*) 131  
*castor* F. 116  
*caucasicus* Kirsch (Ceuth.) 49  
*caucasicus* Kol. (*Monon.*) 6  
*cavifrons* Lec. 124  
*cavisternum* Champ. 20  
*caviventris* Schultze 113  
*celastri* Rosensch. 12  
*centrimacula* Schultze 32  
*Chaffanjoni* Hust. 124  
*chalybaeus* Germ. 49  
*chalybaeus* Weise 88  
*changaicus* Schultze 50  
*Chevrolati* Tylden 31  
*chinensis* Schultze 116  
*chiriquensis* Champ. 21  
*chlorophanus* Rouget 50  
*chloropterus* Steph. 60  
*Chobauti* Schultze 50  
*chrysanthemi* Germ. 50  
*cinapis* Desbr. 51  
*cinctus* Chevr. (*Oxyonyx*) 17  
*cinctus* Geoff. (*Coeliodes*) 12  
*cinereus* Marsh. 96  
*cineritius* Hochh. 51  
*cingulatus* Schultze 51  
*cinnamomeus* Schultze 51  
*circassicus* Schultze 51  
*Clermonti* Hust. 113  
*clunicularis* Schultze 51  
*coaretatus* Gyll. 51  
*coarctatus* Jacq. du Val (Phryd.) 30  
*cochleariae* Gyll. 51  
*cochleariae* Thoms. 89  
*coelioides* Reitt. 52  
*coerulescens* Gyll. 52  
*cognatus* Schultze 53  
*comari* Hbst. 124  
*concinnus* Gyll. 76  
*concolor* Schultze (Ceuth.) 69  
*concolor* Hust. (*Coeliodes*) 13  
*conformis* Grilat 12  
*confusus* Schultze (Ceuth.) 53  
*confusus* Desbr. (*Phytobius*) 125  
*congener* Germ. (Ceuth.) 42  
*congener* Först. (*Coeliastes*) 28  
*congenitalis* Dietz 130  
*conicollis* Schultze 17  
*conicus* Hust. 21  
*contensis* Schultze (Ceuth.) 59  
*conjectus* Gyll. 119  
*consanguineus* Dietz 53  
*consputus* Germ. 53  
*constrictus* Marsh. 53  
*consularis* Pasc. 113  
*continuatus* Desbr. 10  
*continuus* Rey 88  
*contractus* Marsh. 54  
*contusus* Perris 57  
*convexicollis* Gyll. 75  
*convexicollis* Lec. 55  
*Coquereli* Hust. 55  
*coronatus* Fst. 21  
*costatus* Hust. 55  
*craccae* F. 136  
*crassidentatus* Marsh. 55  
*crassipes* Schultze 17  
*crassirostris* Hust. 113  
*crassus* Marsh. 116  
*cretura* Hbst. 134  
*cribicollis* Schultze (Ceuth.) 55  
*cribicollis* Hust. (*Rhinoneus*) 117  
*cristatus* Dietz (Pelen.) 21  
*cristatus* Gyll. (*Coeliodes*) 12  
*cristulatus* Hust. 19  
*Crotchi* Bris. 80  
*cruciatus* Schultze 26  
*crucifer* Ol. 55  
*cruciger* Hbst. (*Ceuthorhynchus*) 56  
*cruciger* Duf. (*Ceuthorhynchidius*) 33  
*eruralis* Lec. 20  
*crux* Walt. 61  
*cunicularis* Heyd. 51  
*cupidus* Fst. 56  
*cuprifer* Motsch. 125  
*curticornis* Schultze 56  
*curtulus* Schultze 56  
*curtus* Say 20  
*curvipes* Dietz 20  
*curvirostris* Schultze 56  
*curvistriatus* Schultze 56  
*cyanescens* Schultze 56  
*eyaneus* L. (*Orobitis*) 136  
*cyaneus* Weise (Ceuth.) 60  
*cyanipennis* Germ. 102  
*cyanopterus* Redt. 45  
*cynoglossi* Frauenf. 108  
  
*dalmaticus* Stierl. 81  
*damascenus* Schultze 56  
*Dawsoni* Bris. 32  
*debilis* Motsch. 56  
*Debskii* Pic 111  
*decipiens* Lec. 56  
*decoratus* Gyll. 56  
*Decorsei* Hust. (Ceuth.) 57  
*Decorsei* Hust. (*Coeliodes*) 12  
*defensibilis* Pic 51

*Delahoni* Wagn. 84  
*delphinensis* Hust. 56  
*dentatoserratus* Reitt. 57  
*dentatus* Marsh. (Ceuth.) 86  
*dentatus* Panz. (Ceuth.) 57  
*dentatus* Pic (Coeliodes) 12  
*denticollis* Gyll. 127  
*denticulatus* Schrank 57  
*dentimanus* Reitt. 12  
*dentipes* Schultze (Coeliodes) 12  
*dentipes* Reitt. (Rhytid.) 8  
*deplanatus* Schultze 57  
*depressirostris* Gyll. 80  
*Desbrochersi* Schultze 12  
*Deubeli* Ganglb. 9  
*Devillei* Hust. 57  
*Diecki* Bris. 57  
*Dietzi* Hust. (Ceuth.) 57  
*Dietzi* Champ. (Hypocoel.) 21  
*didymus* F. 29  
*difficilis* Schultze 58  
*difficilis* Hust. 58  
*diffusus* Hust. 58  
*dilatatus* Schultze 65  
*dimidiatus* Friv. 58  
*dispersus* Champ. 20  
*distans* Hust. 58  
*distinctipubens* Pic 58  
*distinctus* Bris. 58  
*disturbatus* Dietz 58  
*doctoris* Pic 106  
*Doderoi* Hust. 58  
*Dohrni* Fst. 58  
*drabae* Laboulb. 67  
*dryados* Gmel. 14  
*dubitabilis* Boh. 111  
*dubius* Bris. 58  
*Duvali* Bris. 58

*echii* F. 64  
*echinatus* Fall. (Ceuth.) 58  
*echinatus* Gyll. (Coeliodes) 13  
*edentulus* Schultze 58  
*edoughensis* Desbr. 13  
*effrons* Fst. 58  
*elegantulus* Fst. 59  
*emeritus* Fst. 47  
*ephippiger* Schönh. 182  
*epilobii* Payk. 20  
*ericae* Gyll. 26  
*ericae* var. Gyll. 27  
*erivanus* Schultze 59  
*erysimi* F. 59  
*erysimi* Ol. 53  
*erythrocneme* Beck 120  
*erythroleucus* Gmel. 12  
*erythropterus* Stierl. 58  
*erythropus* Dietz 60  
*erythrorhynchus* Gyll. 90  
*Escherichi* Schultze 50

*euglyptus* Gyll. 113  
*euphorbiae* Bris. 60  
*euphraticus* Schultze 4  
*excavatus* Hust. 27  
*exiguus* Ol. 25

*fabrilis* Fst. 61  
*faeculentus* Gyll. 61  
*faedus* Fst. 24  
*Fairmairei* Bris. 61  
*Falcozi* Hust. 61  
*fallaciosus* Desbr. 17  
*fallax* Boh. (Zacladus) 26  
*fallax* Boh. (Ceuth.) 43  
*fallax* Otto (Rhytid.) 8  
*fallax* Schultze 43  
*farsetiarum* Peyerh. 61  
*fatidicus* Gyll. 61  
*Fausti* Bris. (Ceuth.) 61  
*Fausti* Hartm. (Cidorrh.) 29  
*Faustinus* Desbr. 17  
*Favarequi* Pic 41  
*fennicus* Fst. 61  
*Ferrarii* Bris. 61  
*ferrugatus* Perris 27  
*ferrugineus* Hust. 19  
*figuratus* Gyll. 61  
*filirostris* Reitt. 52  
*firmicornis* Schultze 18  
*flavicaudis* Boh. 13  
*flavicornis* Fst. (Hypurus) 10  
*flavicornis* Hust. (Ceuth.) 62  
*flavipes* (Steph.) 117  
*flavitarsis* Reitt. 59  
*flavomarginatus* Luc. 62  
*flexirostris* Schultze 62  
*floralis* Payk. 62  
*floralis* Ol. 52  
*floridanus* Leng 62  
*floriger* Geoff. 52  
*formosus* Fst. 62  
*formosus* Rybinski 48  
*forticornis* Schultze 62  
*foveolatus* Gerh. 80  
*frater* Schultze (Ceuth.) 62  
*frater* Faust (Stenocarus) 23  
*Frivaldszkyi* Schultze 62  
*frontalis* Bris. (Ceuth.) 33  
*frontalis* Dietz (Acanthoscelis) 20  
*fruticulosus* Hbst. 117  
*Fuentei* Desbr. 10  
*fuliginosus* Dietz (Mecopeltus) 130  
*fuliginosus* Marsh. (Stenocarus) 24  
*fulvipes* Schultze 62  
*fulvitarsis* Bris. 62  
*fulvotertius* Fall 63  
*fulvus* Roel. 114  
*funicularis* Bris. 63  
*fuseus* Kol. 125

- galiciensis* Ryb. 63  
*gallicus* Gyll. 97  
*Galloisi* Hust. 13  
*Ganglbaueri* Schultze 9  
*ganglionus* Boh. 13  
*geographicus* Goeze 63  
*geranii* Payk. 25  
*Gerhardtii* Schultze 64  
*gethsemaniensis* Pic 73  
*gibbicollis* Champ. (*Hypocoel.*) 21  
*gibbicollis* Hust. (*Mecysmod.*) 114  
*gibbicollis* Schultze (*Ceuth.*) 64  
*gibbipennis* Germ. 29  
*gibbosus* Hust. 21  
*gilvicornis* Schultze 65  
*gilvirostris* Dan. 65  
*glabrirostris* Fähr. 13  
*glabrirostris* Gyll. 68  
*glaucii* Chevr. 11  
*glaucinus* Boh. 87  
*glaucus* Boh. 75  
*globicollis* Schultze 65  
*globosus* F. 136  
*globulus* Hbst. 8  
*glypticus* Schall. 64  
*Gobanzi* Reitt. 85  
*Gougeleti* Bris. 65  
*gracilicornis* Schultze 65  
*gracilis* Schultze 59  
*gracilipes* Dietz 125  
*gramineus* F. 118  
*gramineus* Gyll. 119  
*granatus* Gyll. 125  
*granatus* Thoms. 125  
*granifer* Schultze 65  
*granipennis* Weise 112  
*granulatus* Champ. 21  
*granulicollis* Schönh. 43  
*granulicollis* Thoms. 51  
*granulipennis* Gyll. 117  
*granulithorax* Schultze 65  
*gratiosus* Bris. 65  
*Grenieri* Bris. 65  
*griseomicans* Schwarz 125  
*grisescens* Motsch. 114  
*griseus* Bris. 65  
*griseus* Dietz (*Acanthoscelis*) 20  
*griseus* Hust. (*Hypocoel.*) 22  
*griseus* Blatch. (*Pelenomus*) 126  
*Grouvellei* Hust. 115  
*grypus* Herbst 93  
*guttalis* Grav. 119  
*guttatus* Dietz 20  
*guttula* F. 23  
*guttula* Gyll. var. 24  
*guyanensis* Hust. 22  
*Gyllenhali* Fst. 81  
*Gyllenhali* Fst. 61  
*haemorrhoidalis* Motsch. 92  
*haemorrhoidalis* Panz. 105  
*haemorrhous* Hbst. 130  
*Hamiltoni* Dietz 65  
*Hampei* Bris. 65  
*Hannibal* Weise 40  
*Harmandi* Hust. 66  
*Hartmanni* Schultze 126  
*hassicus* Schultze 32  
*Hedenbergi* Boh. 23  
*Henschi* Schultze 66  
*hepaticus* Gyll. 66  
*Herbsti* Fst. 66  
*hesperus* Woll. 66  
*hexatomus* Penecke 66  
*hirsutulus* Schultze 66  
*hirticollis* Dietz 66  
*hirtulus* Germ. 66  
*hispanicus* Hust. 17  
*hispidulus* Stev. 85  
*Hoffmanni* Weise 16  
*Hopffgarteni* Tourn. 133  
*Horni* Dietz 67  
*Horni* Schultze 112  
*horridus* Panz. 32  
*hovanus* Hust. (*Ceuth.*) 67  
*hovanus* Hust. (*Rhinoncus*) 117  
*humeralis* Gyll. (*Ceuth.*) 67  
*humeralis* Hust. 114  
*humilis* Hust. 27  
*hungaricus* Bris. 67  
*hybridus* Schultze 108  
*hygrophilus* Hust. 126  
*hypocritus* Hust. 33  
*hypoleucus* Quens. 136  
*hystrix* Perris 33  
*ibukianus* Hust. 67  
*iconiensis* Schultze 67  
*ignicollis* Schultze 67  
*ignitus* Germ. 67  
*ilex* Dietz 20  
*ilicis* Bedel 13  
*imbricatus* Schultze 68  
*imitator* Wagn. 13  
*immaculatus* Gyll. (*Cidnorh.*) 30  
*immaculatus* Delah. (*Ceuth.*) 97  
*imperialis* Schultze 68  
*impressicollis* Crotch 40  
*impressiventris* Blatchl. 126  
*impressus* Hust. (*Mecysmod.*) 114  
*impressus* Rosenh. (*Stenocarus*) 24  
*inaequalis* Champ. (*Hypocoel.*) 22  
*inaequalis* Edw. (*Ceuth.*) 90  
*inaequalis* Say (*Crapon.*) 19  
*inaffectatus* Gyll. 68  
*inaffectatus* Crotch 94  
*incertus* Schultze 68  
*incisus* Schultze 68  
*inclemens* Fst. 61

- inconspectus Hbst. 117  
 indicus Hust. 68  
 inermis Champ. 21  
 infernalis Schultze 68  
*infexus* Marsh. 131  
 inhumeralis Schultze 68  
 inornatus Schultze (*Oxyonyx*) 17  
*inornatus* Waterh. (*Ceuth.*) 95  
 insidiator Desbr. 68  
 insidiosus Bris. 69  
 inspersus Champ. 21  
 instabilis Champ. 21  
 interjectus Schultze 69  
 intermedius Bris. 69  
*intermedius* Dietz 57  
*interponens* Schultze 6  
*interruptus* Schultze (*Ceuth.*) 78  
*interruptus* Schultze (*Monon.*) 5  
*intersectus* Germ. 42  
 intersetosus Weise 69  
*interstinctus* Gyll. 88  
*interstitialis* Reich 117  
*invensor* Herbst 37  
 invisus Fall 69  
 ireos Pall. 4  
 isolatus Dietz 69  
 italicus Bris. 69  
  
*Jacqueti* Fst. 110  
 Jakovlevi Schultze 69  
 Jakovlevi Fst. 118  
*japhoensis* Schultze 17  
*japonicus* Pic (*Mecysmod.*) 114  
*japonicus* Roel. (*Phytobius*) 126  
 Javeti Bris. 69  
 Jeanneli Hust. 27  
 judaeus Bris. 69  
*Julianus* Reitt. 112  
  
 Karamani Müll. 69  
*Karamani* Reitt. 110 → *S. k. r.*  
*Kaufmanni* Reitt. (*Ceuth.*) 88  
*Kaufmanni* Reitt. (*Homorosoma*) 9  
 Koenigi Schultze 69  
 Kolenati Kolen. (*Coeliodes*) 13  
*Kolenati* Kolen. (*Monon.*) 5  
 Korbi Schultze 69  
 Kraatzi Bris. 69  
 Kraussi Ganglb. 9  
*Kuthyi* Friv. 48  
  
 laetus Rosenh. 70  
 lamii F. (*Coeliastes*) 28  
*lamii* Sahlb. (*Ceuth.*) 97  
 languidus Schultze 70  
 larvatus Schultze 70  
 latibasis Reitt. 131  
 latipennis Pic 17  
 latrunculatus Motch. 70  
*Lecontei* Dietz (*Eubrych.*) 122  
  
 Lecontei Dietz (*Cnemog.*) 19  
 Lederi Schultze 70  
*lepidus* Gyll. 48  
 Leprieuri Bris. 70  
*leprosus* Boh. 19  
 Lesnei Hust. 114  
 Lesquerellae Pierce 71  
 Lethierryi Bris. 71  
 Letourneuxi Desbr. 71  
 leucogaster Marsh. (*Litodactylus*)  
     121  
*leucogaster* Gyll. (*Rhinoncus*) 116  
 leucorhamma Rosenh. 71  
*leucostigma* Marsh. 117  
 levantinus Schultze 71  
 Lewisi Hust. 71  
*libanoticus* Schultze 84  
 liliputanus Schultze 71  
*linealbatus* Schultze 91  
 lineatotessellatus Woll. 71  
 lineatus Gyll. 71  
 lineolatus Hust. 114  
 littoralis Schultze 71  
 litura F. 71  
*litura* Steph. 108  
*litura* Gyll. var. 108  
 litura-alba Desbr. 24  
*lituratus* Schultze (*Ceuth.*) 43  
 lituratus Dietz (*Coelogaster*) 135  
 lividus Schultze 24  
 longimanus Schultze 72  
 longipennis Schultze 72  
 longirostris Bris. 72  
 longirostris Dietz (*Auleutes*) 21  
 longirostris Hust. (*Mecysmod.*) 114  
 longitarsis Schultze 73  
 longulus Lec. 118  
 luctuosus Desbr. 10  
 Lukesi Tyl 73  
*lunariae* Hust. 54  
 lunatus Reitt. 17  
*luteola* Hust. 119  
 luzonicus Hust. (*Rhinoncus*) 118  
 luzonicus Hust. (*Mecysmod.*) 114  
 lycoctoni Hust. 73  
*lycopi* Gyll. 76  
*Lysholmi* Pic 120  
*lysimachiae* Fall (*Acalloides*) 19  
*lysimachiae* Ol. (*Drusenatus*) 182  
  
 maceratus Peyerimh. 18  
*macrasper* Reitt. 25  
 macula-alba Hbst. 73  
 macula-quadra Schultze 74  
 maculata Hust. 22  
*maculicollis* Rey 93  
 madagascariensis Hust. 11  
 madecassus Hust. 11  
 magnicollis Schultze 33  
*major* Escal. 43

*makkabeus* Schultze 74  
*malachiticus* Schultze 74  
*Mannerheimi* Gyll. 14  
*marginatus* Payk. 74  
*marginellus* Schultze 75  
*marionis* Fall 21  
*maroccanus* Schultze 75  
*marraquensis* Escal. 75  
*Maschelli* Solsky 75  
*massageta* Kirsch 18  
*Mathieui* Hust. 13  
*Maynei* Hust. 13  
*maurus* Schultze 75  
*medialis* Lec. 75  
*megalops* Champ. 21  
*melanarius* Steph. 75  
*melancholicus* Gyll. 30  
*melanocephalus* Hust. (Hypocoel.) 22  
*melanocephalus* Steph. (Coeliodes) 15  
*melanocyanus* Boh. 48  
*melanorhynchus* Marsh. 14  
*melanostictus* Marsh. 75  
*melanostigma* Marsh. 97  
*melitensis* Schultze 77  
*memecylonis* Marsh. 114  
*mendax* Schultze 77  
*mendicus* Dietz (Acanthoscelis) 20  
*mendicus* Reitt. (Ceuth.) 100  
*mendosus* Gyll. 28  
*Méquignoni* Pic 82  
*metallescens* Schultze 107  
*metallinus* Frm. 37  
*metasternalis* Marsh. 114  
*mexicanus* Champ. 21  
*micans* Bria. 77  
*micros* Schultze 77  
*millefolii* Schultze 77  
*mimulus* Dietz 77  
*mininues* Rye 28  
*minutissimus* Hust. 27  
*minutus* Reich (Ceuth.) 77  
*minutus* Hust. (*Mecysmoderes*) 114  
*mirabilis* Villa 16  
*misellus* Gyll. 100  
*miser* Hust. 45  
*mixtus* Muls. 77  
*mixtus* Hust. 126  
*Moelleri* Thoms. 77  
*Moelleri* Weise 74  
*moguntiacus* Schultze 78  
*molitor* Gyll. 78  
*molitor* Seidl., Stierl. 77  
*mongolicus* Reitt. 118  
*monostigma* Hust. (Hypocoel.) 22  
*monostigma* Marsh. (Ceuth.) 63  
*monticola* Desbr. (*Oxyonyx*) 18  
*monticola* Otto (Rhytid.) 8  
*monticola* Schultze (Ceuth.) 52

*morosus* Dietz 78  
*Mozuettei* Fall 78  
*mucronulatus* Germ. 127  
*multidentatus* Pic 18  
*muricatus* Bris. (*Phytobius*) 126  
*muricatus* Hust. (*Hypocoel.*) 22  
*murinus* Gyll. (Ceuth.) 76  
*murinus* Schultze (Coeliodes) 16  
*mus* Desbr. 78  
*mutabilis* Dietz 78  
*myriophylli* Gyll. (Litodact.) 121  
*myriophylli* Steph. (Eubrych.) 122  
*mysticus* Kol. 13  
  
*nakanoensis* Hust. 13  
*nanus* Gyll. 78  
*napi* Gyll. 79  
*nasalis* Lec. 21  
*nasturtii* Germ. 181  
*nebulosomaculatus* Motsch. 79  
*nebulosus* Hust. (Hypocoel.) 22  
*nebulosus* Bris. (Ceuth.) 79  
*nebulosus* Lec. (Auleutes) 21  
*neglectus* Blatchl. 79  
*neophytus* Fst. 41  
*neutralis* Gyll. 100  
*nigricollis* Gerh. 46  
*nigrinus* Marsh. (Ceuth.) 79  
*nigrinus* Reitt. (*Orobites*) 137  
*nigripes* Schultze 106  
*nigrostris* Boh. 29  
*nigritarsis* Hartm. (Coeliodes) 15  
*nigritarsis* Schultze (Ceuth.) 80  
*nigritulus* Schultze (Ceuth.) 98  
*nigritulus* Vitale (*Hypurus*) 10  
*nigritus* Steph. 87  
*nigriventris* Pasc. 118  
*nigrorufus* Motsch. 114  
*nigroterminatus* Woll. 80  
*nigrotibialis* Schultze 30  
*nigrovittatus* Schultze 101  
*oppensis* Hust. 80  
*nitidipennis* Schultze 80  
*nitidulus* Fst. 80  
*niveosuturalis* Esc. 80  
*niveus* Chevr. 80  
*nodicollis* Gyll. 80  
*nodipennis* Dietz 80  
*notatus* Fall 80  
*notatus* Bris. 81  
*notula* Thoms. 124  
*notula* Germ. 128  
*notula* Gyll. 129  
*nubeculosus* Gyll. 81  
*nubilosus* Gyll. 111  
*numidicus* Bris. 81  
  
*obesulus* Weise 71  
*obliquus* Lec. (Ceuth.) 81  
*obliquus* Champ. (Hypocoel.) 22

- oblitus* Rey 41  
*oblongus* Hust. 118  
*obscura* Lec. 135  
*obscurecyaneus* Gyll. 98  
*obscurefasciatus* Dietz 130  
*obscuripes* Schultze 81  
*obscurus* Bris. (Ceuth.) 81  
*obscurus* Hust. (Mecysmoderes) 114  
*obsoletus* Germ. 81  
*obstrictus* Steph. 105  
*obstrictus* Marsh. 44  
*obtusicollis* Gyll. 76  
*occidentalis* Dietz 118  
*occultus* Gyll. 41  
*ochraceotinctus* Wagn. 66  
*ochraceus* Motsch. 114  
*octotuberculatus* Hust. 18  
*offensus* Boh. 7  
*Olcesei* Pic 27  
*oleraceus* Scop. 29  
*olivaceus* Gyll. (Drusenatus) 131  
*olivaceus* Scop. (Ceuth.) 42  
*omissus* Fall (Ceuth.) 81  
*omissus* Fst. (Phytobius) 126  
*optabilis* Fst. 80  
*optator* Fst. 81  
*optimemaculatus* Pic 10  
*orbiculatus* Schultze 81  
*oregonensis* Dietz 81  
*orientalis* Hust. 81  
*ornatus* Gyll. 81  
*ornatus* Hans. 70  
*orobinus* Schiödte 8  
*ovalis* Dietz 82  
*ovalis* Marsh. 72  
*ovipennis* Dietz 82  
*ovulum* Schultze 82  
  
*Paganettii* Schultze 57  
*paganus* Gyll. 118  
*pallens* Marsh. 14  
*pallidactylus* Marsh. 91  
*pallidicornis* Bris. 82  
*pallidicornis* Pic 5  
*pallidulus* Schultze 13  
*pallipes* Crotch 54  
*Pandellei* Bris. 82  
*pannonicus* Hajoss 82  
*paradoxus* Schultze 115  
*parcesquamosus* Hust. 13  
*pardalis* Schultze 40  
*parnassicus* Pic 82  
*parvulus* Bris. 82  
*Paszlawszkyi* Kuthy 83  
*pauper* Reitt. 83  
*pauxillus* Dietz 83  
*pectinipes* Marsh. 114  
*pectoralis* Weise 83  
*Peneckei* Wagn. 83  
*penicillus* Schultze 83  
  
*perasper* Peyerimh. 83  
*peregrinus* Gyll. 83  
*perelegans* Frm. 83  
*pericarpium* L. 118  
*pericarpium* L. var. 117  
*perpendicularis* Reich 119  
*perplexus* Dietz 20  
*Perrieri* Hust. 11  
*Perrisi* Bris. 83  
*persimilis* Dietz 83  
*perturbatus* Gyll. 76  
*perversus* Schultze 83  
*pervestitus* Fall 83  
*pervicax* Weise 83  
*Peyerimhoffi* Hust. 84  
*phaeorrhynchus* Marsh. 90  
*phytobioides* Hust. (Ceuth.) 67  
*phytobioides* Woll. (Ceuth.) 84  
*phytobioides* Woll. (Hyp.) 22  
*piceolatus* Bris. 84  
*piceonotatus* Pic 17  
*Pici* Schultze (Rhytid.) 8  
*Pici* Schultze (Oxyonyx) 18  
*picipennis* Schultze 84  
*picipennis* Hust. 120  
*picitarsis* Gyll. 84  
*picitarsis* Schultze 59  
*pictus* Stierl. (Ceuth.) 101  
*pictus* Motsch. (Mecysmoderes) 114  
*pilosellus* Gyll. 84  
*pilosus* Matsum. 13  
*piriformis* Schultze 85  
*pistor* Schultze 85  
*plagiatus* Desbr. 13  
*Planeti* Hust. 88  
*planicollis* Schultze 37  
*planidorsum* Schultze 85  
*plastus* Fst. 85  
*pleurostigma* Marsh. (Ceuth.) 85  
*pleurostigma* Fst. (Hypocoel.) 22  
*plumbellus* Schultze 100  
*plumbeus* Bris. 86  
*plurituberculatus* Hust. 13  
*podagrarius* Schultze 11  
*pollicarius* Schultze 56  
*polliger* Gyll. 86  
*pollinosus* Dietz 87  
*pollinarius* Forst. 86  
*polystriatus* Schultze 87  
*Poncyi* Stierl. 107  
*ponticus* Schultze 87  
*porcellus* Fähr. 87  
*portulaceae* Hust. (Hypurus) 10  
*portulaceae* Marsh. (Ceuth.) 87  
*posthumus* Germ. 87  
*Poweri* Rye 88  
*praeclarus* Schultze 83  
*praeustus* Bris. 40  
*pratensis* Chevr. 78  
*procerulus* Schultze 88

- profames Fähr. 88  
 protentus Schultze 88  
 proximus Schultze 13  
*pruni* Boh. 24  
*pseudacori* F. 5  
 puberulus Lec. 88  
 pubicollis Gyll. 88  
*pudicus* Rott. 16  
*Pueli* Hust. 64  
*puerulus* Schultze 94  
*pulchellus* Schultze 68  
*pultiaris* Geoff. 112  
*pultiarius* Schönh. 112  
*pulvereus* Champ. 22  
*pulvillus* Schultze 25  
*pulvinatus* Gyll. 89  
*pumilio* Gyll. 87  
 puncticollis Boh. 89  
*punctiger* Gyll. 89  
*punctulum* Herbst 28  
*punctum-album* Hbst. 5  
 punicus Schultze 90  
*Purkynei* Tyl 23  
*pusillus* Dietz (Acanthoscelis) 20  
*pusillus* Dietz (Phytob.) 126  
*pusillus* Lec. (Ceuth.) 90  
*pusio* Mannerh. (Ceuth.) 90  
*pusio* Marsh. (Mecysm.) 114  
*pusio* Panz. (Ceuthorhynchidius)  
     33  
*pygmaeus* Schultze 77  
*pygmaeus* Ol. 112  
*pyrenaeus* Bris. 90  
*pyrrhopus* Boh. 120  
*pyrrhorhynchus* Marsh. 90  
*quadrangularis* Schultze 85  
*quadricornis* Gyll. 126  
*quadricornis* Payk. 128  
*quadridens* Panz. 91  
*quadridentatus* Steph. 128  
*quadrifossulatus* Chevr. 6  
*quadrimaculata* Germ. 56  
*quadrimaculatus* L. 29  
*quadrimaculatus* Marsh. 42  
*quadrinodosus* Gyll. 127  
*quadripunctatus* Stierl. 92  
*quadrispinosus* Say 135  
*quadrituberculatus* F. 127  
*quadrituberculatus* Hbst. var. 127  
*querctei* Gyll. 92  
*quercticola* Payk. 93  
*quercticola* Marsh. 91  
*quercticola* Payk. var. 96  
*quercus* F. 13  
*quercus* var. Payk. 15  
*quinquemaculatus* Geoff. 113  
*quinquetuberculatus* Rosensch. 14  
*radula* Germ. 93  
 radula Hochh. (Zacladus) 26  
*Ragusae* Bris. 94  
*rana* F. 14  
*rapae* Gyll. 94  
*raphaelensis* Chevr. 110  
*raphani* Auct. 104  
*Reitteri* Schultze (Stenocarus) 24  
*Reitteri* Weise (Brachiodontus) 9  
*Reitteri* Tyl (Ceuth.) 94  
*relictus* Dietz 113  
*resedae* Marsh. 94  
*resplendens* Schultze 60  
*rectectus* Peyerimh. 18  
*rhenanus* Schultze 95  
*rhinoncoides* Reitt. 95  
*rhomboidalis* Auriv. 114  
*rhusii* Gyll. 95  
*ribis* Stroem 128  
*riguus* Boh. 14  
*rimulosus* Germ. 30  
*rinderae* Beck. 59  
*rinicae* Gyll. 95  
*Roberti* Gyll. 95  
*robustus* Fst. 133  
*Roelofsi* Hust. 127  
*Rollini* Pic 72  
*Rondoui* Vuill. 6  
*rotundatus* Bris. 78  
*rubellus* Motsch. 114  
*ruber* Marsh. 14  
*rubescens* Boh. 53  
*rubicundulus* Boh. 16  
*rubicundus* Panz. (Amalus) 181  
*rubicundus* Hbst. (Coeliodes) 15  
*rubidus* Gyll. 96  
*rubiginosus* Schultze 51  
*rubricollis* Schultze 15  
*rubricus* Gyll. (Coeliodes) 15  
*rubricus* Pic (Rhinoncus) 120  
*rubripes* Hust. 96  
*rudis* Lec. 96  
*rudis* Pic 96  
*rudissimus* Hust. 96  
*Ruebsaameni* Kolbe 71  
*rufescens* Schultze (Micrelus) 27  
*rufeescens* Steph. (Rhinoneus) 116  
*ruficornis* Steph. 24  
*ruficrus* Marsh. 90  
*rufimanus* Bris. 96  
*rufinasus* Motsch. 114  
*rufipes* Bris. (Ceuth.) 96  
*rufipes* Jacobs. (Cidorrh.) 30  
*rufipes* Steph. (Rhinoncus) 117  
*rufirostris* Steph. 15  
*rufitarsis* Gyll. 90  
*rufotemoratus* Schultze 120  
*rufulus* Duf. 33  
*rugicollis* Bris. 96  
*rugosus* Hust. 114  
*rugulosus* Hbst. 96

*rugulosus* var. Gyll. 50  
*rugulosus* Steph. 76  
*rumicum* Peyerh. 11  
*rusticus* Gyll. 97  
  
*Sahlbergi* Schönh. 97  
*Salente-Clairei* Wagn. 98  
*salicorniae* Hust. 11  
*saltator* Desbr. 11  
*saltoides* Dietz 19  
*salviae* Germ. 5  
*sanguinipes* Reitt. 120  
*sareptanus* Schultze 43  
*sareptanus* Schultze 98  
*sartus* Fst. 62  
*sartus* Fst. 51  
*scabratus* F. 117  
*scabrirostris* Hochh. 98  
*scandens* Dietz 130  
*scapularis* Gyll. 98  
*Schneideri* Schultze 98  
*Schönherri* Bris. (Ceuth.) 98  
*Schönherri* Kol. (Monon.) 5  
*Schultzeanus* Reitt. 98  
*Schultzei* Ganglb. 9  
*Schüppeli* Boh. 16  
*Schusteri* Schultze 98  
*scobinatus* Schultze 98  
*scoliasus* Dietz 130  
*scolopax* Schultze 99  
*scortillum* Hbst. 130  
*serobicollis* Neresh. 99  
*scutellaris* Brullé 99  
*scutellatus* Steph. 97  
*sellatus* Boh. (Ceuth.) 99  
*sellatus* F. (*Tapinotus*) 132  
*semialbidus* Motsch. 114  
*semiruber* Reitt. 121  
*semirufus* Lec. 99  
*semirufus* Pic 109  
*seniculus* Bris. (Ceuth.) 99  
*seniculus* Grav. (*Rhinoneus*) 117  
*senilis* Schultze 99  
*septentrionalis* Gyll. 99  
*Sequensi* Stierl. 88  
*seriatus* Boh. 73  
*sericans* Lec. 99  
*sericellus* Schultze 99  
*seriesetosus* Dietz 92  
*serietuberculatus* Gyll. 16  
*serratus* Germ. 7  
*setifer* Gyll. (Centh.) 99  
*setifer* Schultze (*Coeliodes*) 16  
*setosus* Boh. (Ceuth.) 44  
*setosus* Fähr. (*Coeliodes*) 16  
*setulosus* Hust. 13  
*sexnodosus* Champ. (*Hypocoel.*) 22  
*sexnotatus* Schultze (Ceuth.) 99  
*sextuberculata* Boh. 135  
*sibiricus* Fst. (Ceuth.) 99

*sibiricus* Fst. (*Coeliodes*) 120  
*sibiricus* Reitt. (*Coeliodes*) 15  
*siculus* Dietz (Ceuth.) 99  
*siculus* Schultze (*Coeliodes*) 16  
*Sieversi* Schultze 68  
*signatellus* Gyll. 88  
*signatellus* Fst. 111  
*signatus* Gyll. 99  
*sü* Gyll. 106  
*similis* Bris. (Ceuth.) 100  
*similis* Champ. (*Auleutes*) 21  
*simillimus* Edw. 74  
*simplicicollis* Reitt. 26  
*simulans* Faust 16  
*sisymbrii* F. 133  
*smaragdinus* Bris. 70  
*smyrnensis* Schultze 100  
*solitarius* Fall 100  
*Solskyi* Fst. 18  
*sophiae* Stev. 100  
*sordidus* Fst. 100  
*sorcinus* Bris. 100  
*sparsesetosus* Gyll. 120  
*sparsutus* Schultze 61  
*spartii* Steph. 119  
*Speiseri* Schultze (*Phryd.*) 30  
*Speiseri* Friv. (*Homorosoma*) 9  
*spermaticus* Beck. 6  
*sphaerion* Boh. 11  
*sphaeroides* Pic 11  
*spinicus* Schultze 100  
*spiniger* Herbst 34  
*spinalitus* Reitt. 18  
*spinosus* Gemm. & Har. 32  
*splendidus* Bris. 18  
*Splichali* Schultze 100  
*spurius* Rey 116  
*Spurnyi* Schultze 33  
*squamatus* Lec. 100  
*squamatus* Schultze 101  
*squamiger* Gyll. 101  
*squamosus* Lec. 128  
*squamulosus* Bris. 101  
*stachydis* Fst. 109  
*stachydis* Jacq. 110  
*Stenbergi* Thoms. 76  
*Steveni* Boh. 101  
*Stierlini* Schultze 26  
*stigma* Fst. (*Mecysmod.*) 114  
*stigma* Aur. (*Rhinoneus*) 120  
*stigma* Fähr. (*Coeliodes*) 16  
*Stilleri* Reitt. 16  
*stramineus* Motsch. 114  
*striatellus* Schultze 101  
*striatodenticulatus* Gemm. & Har.  
56  
*striatodenticulatus* Goese 113  
*strigatirostris* Hochh. 18  
*strigirostris* Schultze 16  
*subcostulatus* Hust. 101

- subfarinosus* Schultze 16  
*subfasciatus* Chevr. (Ceuth.) 101  
*subfasciatus* Dietz (Auleutes) 21  
*subfasciatus* Gyll. (Rhinoncus) 120  
*subglobosus* Bris. 11  
*subglobosus* Gmel. 52  
*subhumeralis* Marsh. 114  
*sublineellus* Bris. 101  
*submuricatus* Hochh. 101  
*subniger* Gerh. 60  
*subnudus* Reitt. 134  
*subobscuricolor* Pic 112  
*subpilosus* Bris. 101  
*subplagiatus* Desbr. 16  
*subpubescens* Lec. 102  
*subrubicundus* Reitt. 15  
*subrufus* Hbst. 12  
*subrufus* Marsh. 44  
*rubrufus* Marsh. 97  
*subrufus* Seidl. 16  
*substellaris* Reitt. 110  
*subsultans* Boh. 101  
*subtilirostris* Schultze 101  
*subtriangularis* Hust. 18  
*subulatus* Bris. 109  
*sulcatacarinulatus* Schultze 6  
*sulcatus* Bris. 101  
*sulcicollis* Payk. (Ceuth.) 101  
*sulcicollis* Boh. (Rhinoncus) 120  
*sulcicollis* Fähr. (Phytob.) 128  
*sulcicollis* Thoms. (Ceuth.) 85  
*sulcifrons* Champ. 21  
*sulcipennis* Lec. (Ceuth.) 103  
*sulcipennis* Schultze (Ceuth.) 68  
*sulcipennis* Schultze (Rhinoncus)  
 120  
*sulcithorax* Hust. 103  
*sulculus* Marsh. 68  
*sulphureus* Fst. 103  
*superciliaris* Boh. 6  
*sutura-alba* Schultze 108  
*suturalis* F. 103  
*suturalis* Hust. (Mecysmoderes)  
 114  
*suturalis* Ol. (Rhinonecus) 118  
*suturalis* Steph. (Ceuth.) 91  
*suturellus* Gyll. 104  
*suturellus* Auct. 84  
*svaneticus* Schultze 52  
*symphti* Bed. 104  
*syriacus* Redt. (Mon.) 5  
*syriacus* Schultze (Ceuth.) 104  
*syriacus* Schultze (Oxonyx) 18  
*syrites* Germ. 104
- tachygonoides* Dietz 21  
*T-album* Gyll. 105  
*tangerianus* Schultze 105  
*tangerianus* Chevr. (Monon.) 6

- tangerianus* Pic (Hypurus) 10  
*tarsalis* Boh. (Ceuth.) 84  
*tarsalis* Dietz (Acanthoscelis) 20  
*tarsatus* Schultze 105  
*taschkenticus* Faust 129  
*tataricus* Schultze 105  
*tau* Lec. 105  
*tenebrosus* Dietz 19  
*tener* Reitt. 30  
*tenietensis* Desbr. 105  
*tenuipes* Lec. 21  
*tenuirostris* Rosenh. (Ceuth.) 105  
*tenuirostris* Marsh. (Mecysm.) 114  
*terminatus* Hbst. 105  
*tescorum* Fall 106  
*tessellatus* Schultze (Ceuth.) 106  
*tessellatus* Hust. (Hypocoel.) 22  
*testaceirostris* Hust. 11  
*testaceitarsis* Pic 23  
*testaceus* Motsch. 121  
*testatus* Fst. 106  
*testudinella* Schultze 106  
*tetraantha* Champ. 135  
*Thalhammeri* Schultze 33  
*thlasiphilus* Pen. 106  
*thlaspis* Bris. 106  
*Thomsoni* Kolbe (Ceuth.) 49  
*Thomsoni* Schultze (Zacladus) 26  
*tibialis* Boh. (Ceuth.) 106  
*tibialis* Rey (Phytobius) 124  
*tibialis* Steph. (Rhinoncus) 120  
*tibiellus* Schultze 107  
*timidus* Weise 107  
*tolerans* Faust 107  
*tonkianus* Hust. 114  
*topiarius* Germ. 30  
*torvipes* Dietz 124  
*Tournieri* Tourn. 18  
*transcaspicus* Schultze 107  
*transversicollis* Fst. 26  
*transversus* Fst. 10  
*transversus* Blatchl. 107  
*transylvanicus* Schultze 107  
*triangulum* Boh. 107  
*tricarinatus* Schultze 114  
*tricinctus* Ol. 12  
*trifasciatus* Bach 16  
*trimaculatus* F. 108  
*trimaculatus* Payk. 56  
*tripunctatus* Fourer. 29  
*trisignatus* Gyll. 108  
*trivialis* Fst. 109  
*troglodytes* F. 33  
*troglodytes* Gyll. var. 31  
*Truquii* Champ. 109  
*tuber* Reich 109  
*tuberculatus* Dietz 21  
*tubulatus* Schultze 109  
*turbatus* Schultze 109  
*turkestanicus* Hust. 26

- turmenicus* Schultze 73  
*typhae* Hbst. 63
- uliginosus* Boh. 41  
 Ulkei Dietz 22  
*umbraculatus* F. 16  
*umbrinus* Gyll. (Stenocarus) 24  
*umbrinus* Hust. (Ceuth.) 109  
*umbrinus* Motsch. (Mecysmod.) 114  
*undulatus* Motsch. (Mecysmod.) 114  
*undulatus* Schultze (Ceuth.) 57  
*unguicularis* Thoms. 109  
*unguiculatus* Champ. 22  
*uniformis* Gyll. 109  
*uniguttatus* Marsh. 93  
*unionis* Reitt. 92  
*urens* Gyll. 34  
*uroleucus* Boh. 113  
*urticae* Boh. 109  
*urticae* Scop. 29  
*urticae* Marsh. 30  
*urticarius* Clairv. 29  
*usambicus* Schultze 27
- validirostris* Gyll. 9  
*variegatus* Bed. (Ceuth.) 48  
*variegatus* Brullé (Monon.) 6  
*variegatus* Grav. (Ceuth.) 37  
*variegatus* Hust. (Phytobius) 129  
*variegatus* Ol. (Ceuth.) 48  
*varius* Rey 67  
*Väulogeri* Schultze 110  
*velaris* Gyll. 129  
*velatus* Beck (Eubrychius) 122  
*venedieus* Weise 110  
*ventricosus* Lec. 19  
*venustus* Schultze (Ceuth.) 110  
*venustus* Faust (Platygaster) 18
- verecundus* Faust 7  
*veronicae* Friv. 11  
*verrucatus* Gyll. 110  
*verrucosa* Marsh. 114  
*versicolor* Bris. 93  
*vestitus* Dietz 130  
*viator* Fst. 110  
*vicinus* Hust. (Hypocoelodes) 22  
*vicinus* Kraatz (Ceuth.) 107  
*vidua* Hust.  
*viduatus* Gyll. (Ceuth.) 111  
*viduatus* Hust. (Mecysm.) 114  
*viduus* Panz. 29  
*vilis* Gyll. 111  
*vilosipes* Schultze 111  
*virgatus* Gyll. 111  
*viridanus* Gyll. 112  
*viridicollis* Schultze 60  
*viridipennis* Bris. 112  
*vitiosus* Dietz 16  
*vittatus* Fal. 6  
*vocifer* Rott. 97  
*volgensis* Fst. 73  
*vulpeculus* F. 6
- Waltheri* Schultze 112  
*Waltoni* Boh. (Ceuth.) 106  
*Waltoni* Boh. (Phytobius) 129  
*Weisei* Schultze (Ceuth.) 112  
*Weisei* Reitt. (Ceuth.) 88  
*Weisei* Fst. (Rhytid.) 9  
*Wickhami* Champ. (Ceuth.) 112  
*Wickhami* Dietz (Hypocoel.) 22
- Zimmermanni Gyll. (Coelogaster) 135  
*Zimmermanni* Gyll. (Ceuth.) 112  
*zonatus* Germ. 16  
*zurlo* Bris. 112