Coleopterorum Catalogus

auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Pars 154:

S. Schenkling et G. A. K. Marshall

Curculionidae:
Rhadinosominae, Trachodinae,
Raymondionyminae.



Dr. W. Junk
Verlag für Naturwissenschaften
's-Gravenhage
27. IV. 1937.

Subfam. Trachodinae.

Auct. S. Schenkling auxilio G. A. K. Marshall.

Winkler, Cat. Col. reg. palaearct. 1930, p. 1565.

Synaptonychides (pars) Lacordaire, Gen. Col. VI, 1863,

p. 374. Trachodini J. L. Leconte, Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1883—88 (1884), p. 135, (1887), p. 303. — Everts, Col. Neerland. II, 1901, p. 551. — Reitter, Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913) (Best.-Tab. 68), p. 55; Fn. Germ. V, 1916, p. 118, 134. — Hustache, Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 179.

Trachodina Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 215, 254.

Trachodes Germ.

Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 325. — Schönh. Curc. Disp. meth. 1826, p. 260; Gen. Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 513; VII, 2, 1843, p. 408. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 349. — Blanch. Hist. Ins. II, 1845, p. 110. — Walton, Brit. Ins. Fn. Curc. 1844—48, p. 118; Ann. Mag. Nat. Hist. (2) IX, 1852, p. 204. — Redt. Fn. Austr. 1849, p. 41, 394; ed. 2, 1858, p. OXXXIII, 783; ed. 3, 1874, I, p. OXXXIV; II, p. 248. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 327. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68, p. 53, 92. — Gutfl.-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 452, 529. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 374. — C. G. Thoms. Skand. Col. VII, 1865, p. 218; X, 1868, p. 191. — Seidl. Fn. Balt. 1872, Gatt. p. 161, Arten p. 420; ed. 2, 1887—91, Gatt. (1890), p. 161, Arten p. 672. — Heyd. Deutsche Ent. Zschr. 1879, p. 167. — J. L. Lec. (1890), p. 504; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), Gatt. p. 161, Arten p. 672. — Heyd. Deutsche Ent. Zschr. 1879, p. 167. — J. L. Lec. and Horn, Classif.: Col. N. Amer. ed. 2, 1883, p. 478. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 135, (1887), p. 303. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 267 (Caucasus); Verh. Nat. Ver. Brünn LI, 1912 (1913), p. 62; Fn. Germ. V, 1916, p. 134. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 254. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 294, 296. — Everts, Col. Neerland. II, 1901, p. 651. — Kuhnt, Ill. Best. Tab. Käf. Deutschl. 1913, p. 913, 961. — Wegener in Colymposium (1913) Wagner in Calwer-Schauf. Käferbuch, ed. 6, 1905—16 (1913),
 p. 1090. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 179.

> Stereus Bed. Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882-88 (1884), p. 92 nota.

> Sthereus Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XVIII, 1845, IV, p. 373. — Mannerh. Bull. Soc. Nat. Moscou XXV, 1852, p. 355. — Lacord. Gen. Col. VI, 1863, p. 374, nota 1.

acutangulus Hell. Stett. Ent. Zeit. LXIX, 1908, Madres p. 133.

aegypticus Tourn. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. IV, Aegypten 1873, p. 373,

asiaticus Desbr. Frelon IV, 1895, p. 98. borealis Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XVIII, 1845, IV, p. 374 (Sthereus).

elongatus Reitt. Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 266, 267.

Heydeni Stierl. Mittheil. Schweiz. Ent. Ges. VI, 1880-84 (1881), p. 254. Morphologie: Kleine, Ent. Mitteil. X, 1921, Siebenbürgen

p. 134, fig. 39 (Stridulation).

hispidus L. Syst. Nat. ed. 10, I, 2, 1758, p. 383 Europa (Curculio); ed. 12, I, 2, 1767, p. 614. — Villers, Ent. Car. Linn. I, 1789, p. 199. — Gmel. in L. Syst. Nat. ed. 13, I, 4, 1790, p. 1769. — Ol. Encycl. méth. V, 1790, p.

521. — Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 326 (Trachodes). — C. R. Sahlb. Ins. Fenn. II, 1834—39 (1835), p. 87 (Rhynchaenus). — Schönh. Curc. Disp. meth. 1826, p. 260 (Trachodes). — Gyll. in Schönh. Gen. Spec.

Curc. III, 1836, II, p. 514; VII, 2, 1843, p. 410. — Cast. Hist. Nat. Ins. Col. II, 1840, p. 349. — Redt. Fn. Austr. 1849,

p. 394; ed. 2, 1858, p. 783; ed. 3, 1874, II, p. 248. — Walton, Ann. Mag. Nat. Hist. (2) IX, 1852, p. 204. — Bach, Käferfn. II,

(2) IX, 1852, p. 204. — Bach, Käferfn. II, 1852—54 (1854), p. 327. — Jacq. du Val, Gen. Col. d'Eur. IV, 1854—68, p. 53, t. 22, f. 107, 107a. — Gutfl.-Bose, Käf. Deutschl. 1859, p. 530. — Bedel, Fn. Col. Bassin Seine VI, 1882—88 (1884), p. 135, (1887), p. 303. — Seidl. Fn. Balt. ed. 2, 1887—91 (1891), p. 604; Fn. Transsylv. 1888—91 (1891), p. 672. — Fowler, Col. Brit. Isl. V, 1891, p. 254; VI, 1901, p. 309. — Stierl. Fn. Col. Helvet. II, 1886—98 (1893), p. 296. — Everts, Col. Neerland. II, 1901, p. 651. — Kuhnt, Ill. Best.-Tab. Käfer Deutschl. 1913, p. 961, fig. 218, 219. — Wagner in Calwer-Schauf. Käferb. ed. 6; 1905—16 (1913), p. 1091, t. 39, f. 11. — Reitt. Fn. Germ. V, 1916, p. 134, t. 158, f. 5. — Hust. Ann. Soc. Ent. Fr. C, 1931, p. 179.

1931, p. 179. acanthion Beck, Beitr. baier. Ins.-Fauna 1817, p. 22, t. 6, f. 32 (Rhynchaenus).

squamifer Payk. Fn. Suec. III, 1800, p. 200 (Curculio). — Gyll. Ins. Suec. III, 1810, p. 200 (Rhynchaenus).

Morphologie: Kleine, Ent. Mitteil. X, 1921, p. 133, fig. 38 (Stridulation).

Biologie: Holyoak, Ent. Month. Mag. II, 1865, p. 87. — Bargagli, Bull. Soc. Ent. Ital. XVI, 1884, p. 164; XVIII, 1886, p. 296. — Kleine, Ent. Blätt. VI, 1910, p. 195.

horridus Mannerh. Bull. Soc. Nat. Moscou XXV, 1862, II, p. 354. — J. L. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876, p. 191. — Heyden, Deutsche Ent. Zeitschr. XXIII, 1879, p. 167 (Aparopion).

N. Syrien Kamtschatka

Talysch

Croatien.

Sitkha. Vancouver

Unalaschka. Vancouver

Sitkha

hystrix Gyll. in Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 513; VII, 2, 1843, p. 410. — Kol. Bull. Soc. Nat. Moscou XXXII, 1, 1859, p. 365. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 267. S. Rußland. Turain. Caucasus. Kaspiiseegebiet Caucasus

oblongus Reitt. Wien. Ent. Zeit. VII, 1888, p. 266,

Weise, Verh. zool.-bot. Ges. Wien XXIX, 1879, p. 482. — Reitt. Wien. Ent. Zeit. VII., 1888, p. 267. evatus

ptinoides Germ. Ins. spec. nov. 1824, p. 327. — Schönh. Gen. Spec. Curc. III, 2, 1836, p. 513. — Fåhr. in Schönh. Gen. Spec. Curc. VII, 2, 1843, p. 408. — J. Lec. (Proc. Amer. Phil. Soc. XV, 1876, p. 190. fasciculatus Motsch. Bull. Soc. Nat.

quadrituberculatus Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XVIII, 1845, IV, p. 374 (Sthereus). quadrituberculatus Motsch. Bull. Soc. Nat. Moscou XVIII, 1845, IV, p. 375, t. 7, f. 4 I—V (Sthereus). — Mannerh. Bull. Soc. Nat. Moscou XXV, 1852, II, p. 355 (Trachades). — J. Lec. Proc. Amer. Philos. Soc. XV, 1876 1876, p. 190. 13

Ancylocnemis Mshl.

Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) VI, 1920, p. 387. — Heller, Ent. Blätt. XXVI, 1930, p. 5.

Epimerogryphus Heller, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, math -nat. Kl. II C, 1922, p. 193; Ent Blätt. XXVI, 1930, p. 5.

ta Mshl. Ann. Mag. Nat. Hist. (9) VI, 1920, p. 390, t. 13, f. 8; p. 389, fig. 4—5. — Heller, Ent. Blätt. XXVI, 1930, p. 5. fasciculata S. Africa bis Tanganjika Peverimhoffi Heller, l. c. p. 6. Sahara Sudan

Werneri Heller, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, math.nat. Kl. II C, 1922, p. 194 (Epimerogry-phus); Ent. Blätt. XXVI, 1930, p. 5 (Ancylocnemis).

3 16

Index Trachodinarum.

Genera.

Ancylocnemis Mshl. 3 Epimerogryphus Hell. 3 Stereus Bed. 1 Sthereus Motsch. 1 Trachodes Germ. 1

Species.

acanthion Beck 2 acutangulus Er. 1 aegypticus Tourn. 1 asiaticus Desbr. 2 borealis Motsch. 2 elongatus Reitt. 2 fasciculata Mshl. 3 fasciculatus Motsch. 3 Heydeni Stierl. 2 hispidus L. 2 horridus Mannh. 2 hystrix Gyll. 3 oblongus Reitt. 3 ovatus Ws. 3 Peyerimhoffi Hell. 3 ptinoides Germ. 3 quadrituberculatus Motsch. 3 squamifer Payk. 2 Werneri Hell. 3