附录三 《中国居民膳食营养素参考摄入量(2023 版)》分类总表 1

附表 3-1 膳食能量需要量(EER) 2

3

年龄/阶段	男性						女性					
	PAL Ⅰ[a]		PAL Ⅱ[b]		PAL Ⅲ[c]		PAL Ⅰ[a]		PAL Ⅱ[b]		PAL Ⅲ[c]	
	MJ/d	kcal/d	MJ/d	kcal/d	MJ/d	kcal/d	MJ/d	kcal/d	MJ/d	kcal/d	MJ/d	kcal/d
0 岁~	—		0.38MJ/(kg·d)	90kcal/(kg·d)	—		—		0.38MJ/(kg·d)	90kcal/(kg·d)	—	
0.5 岁~	—		0.31MJ/(kg·d)	75kcal/(kg·d)	—		—		0.31MJ/(kg·d)	75kcal/(kg·d)	—	
1 岁~	—		3.77	900	—		—		3.35	800	—	
2 岁~	—		4.60	1 100	—		—		4.18	1 000	—	
3 岁~	—		5.23	1 250	—		—		4.81	1 150	—	
4 岁~	—		5.44	1 300	—		—		5.23	1 250	—	
5 岁~	—		5.86	1 400	—		—		5.44	1 300	—	
6 岁~	5.86	1 400	6.69	1 600	7.53	1 800	5.44	1 300	6.07	1 450	6.90	1 650
7 岁~	6.28	1 500	7.11	1 700	7.95	1 900	5.65	1 350	6.49	1 550	7.32	1 750
8 岁~	6.69	1 600	7.74	1 850	8.79	2 100	6.07	1 450	7.11	1 700	7.95	1 900
9 岁~	7.11	1 700	8.16	1 950	9.20	2 200	6.49	1 550	7.53	1 800	8.37	2 000
10 岁~	7.53	1 800	8.58	2 050	9.62	2 300	6.90	1 650	7.95	1 900	8.79	2 100

续表

年龄/阶段	男性						女性					
	PAL Ⅰ[a]		PAL Ⅱ[b]		PAL Ⅲ[c]		PAL Ⅰ[a]		PAL Ⅱ[b]		PAL Ⅲ[c]	
	MJ/d	kcal/d	MJ/d	kcal/d	MJ/d	kcal/d	MJ/d	kcal/d	MJ/d	kcal/d	MJ/d	kcal/d
11 岁~	7.95	1 900	9.20	2 200	10.25	2 450	7.32	1 750	8.37	2 000	9.41	2 250
12 岁~	9.62	2 300	10.88	2 600	12.13	2 900	8.16	1 950	9.20	2 200	10.25	2 450
15 岁~	10.88	2 600	12.34	2 950	13.81	3 300	8.79	2 100	9.83	2 350	11.09	2 650
18 岁~	9.00	2 150	10.67	2 550	12.55	3 000	7.11	1 700	8.79	2 100	10.25	2 450
30 岁~	8.58	2 050	10.46	2 500	12.34	2 950	7.11	1 700	8.58	2 050	10.04	2 400
50 岁~	8.16	1 950	10.04	2 400	11.72	2 800	6.69	1 600	8.16	1 950	9.62	2 300
65 岁~	7.95	1 900	9.62	2 300	—	—	6.49	1 550	7.74	1 850	—	—
75 岁~	7.53	1 800	9.20	2 200	—	—	6.28	1 500	7.32	1 750	—	—
孕早期	—	—	—	—	—	—	+0	+0	+0	+0	+0	+0
孕中期	—	—	—	—	—	—	+1.05	+250	+1.05	+250	+1.05	+250
孕晚期	—	—	—	—	—	—	+1.67	+400	+1.67	+400	+1.67	+400
乳母	—	—	—	—	—	—	+1.67	+400	+1.67	+400	+1.67	+400

注:PAL Ⅰ[a]、PAL Ⅱ[b]和 PAL Ⅲ[c]分别代表低强度身体活动水平、中等强度身体活动水平和高强度身体活动水平。

"—"表示未制定或未涉及;"+"表示在相应年龄阶段的成年女性需要量基础上增加的需要量。

附表 3-2 膳食蛋白质参考摄入量 1

年龄/阶段	EAR/(g·d⁻¹)		RNI/(g·d⁻¹)		AMDR/%E
	男性	女性	男性	女性	
0 岁~	—	—	9(AI)	9(AI)	—
0.5 岁~	—	—	17(AI)	17(AI)	—
1 岁~	20	20	25	25	—
2 岁~	20	20	25	25	—
3 岁~	25	25	30	30	—
4 岁~	25	25	30	30	8~20
5 岁~	25	25	30	30	8~20
6 岁~	30	30	35	35	10~20
7 岁~	30	30	40	40	10~20
8 岁~	35	35	40	40	10~20
9 岁~	40	40	45	45	10~20
10 岁~	40	40	50	50	10~20
11 岁~	45	45	55	55	10~20
12 岁~	55	50	70	60	10~20
15 岁~	60	50	75	60	10~20
18 岁~	60	50	65	55	10~20
30 岁~	60	50	65	55	10~20
50 岁~	60	50	65	55	10~20
65 岁~	60	50	72	62	15~20
75 岁~	60	50	72	62	15~20
孕早期	—	+0	—	+0	10~20
孕中期	—	+10	—	+15	10~20
孕晚期	—	+25	—	+30	10~20
乳母	—	+20	—	+25	10~20

注："—"表示未制定或未涉及；"+"表示在相应年龄阶段的成年女性需要量基础上增加的需要量。3

附表 3-3 膳食脂肪及脂肪酸参考摄入量 1

2

年龄/阶段	总脂肪	饱和脂肪酸	n-6 多不饱和脂肪酸	n-3 多不饱和脂肪酸	亚油酸	亚麻酸	EPA+DHA
	AMDR/%E	AMDR/%E	AMDR/%E	AMDR/%E	AI/%E	AI/%E	AMDR/AI/(g·d^{-1})
0 岁~	48(AI)	—	—	—	8.0(0.15g[a])	0.90	0.1[b]
0.5 岁~	40(AI)	—	—	—	6.0	0.67	0.1[b]
1 岁~	35(AI)	—	—	—	4.0	0.60	0.1[b]
3 岁~	35(AI)	—	—	—	4.0	0.60	0.2
4 岁~	20~30	<8	—	—	4.0	0.60	0.2
6 岁~	20~30	<8	—	—	4.0	0.60	0.2
7 岁~	20~30	<8	—	—	4.0	0.60	0.2
9 岁~	20~30	<8	—	—	4.0	0.60	0.2
11 岁~	20~30	<8	—	—	4.0	0.60	0.2
12 岁~	20~30	<8	—	—	4.0	0.60	0.25
15 岁~	20~30	<8	—	—	4.0	0.60	0.25
18 岁~	20~30	<10	2.5~9.0	0.5~2.0	4.0	0.60	0.25~2.00(AMDR)
30 岁~	20~30	<10	2.5~9.0	0.5~2.0	4.0	0.60	0.25~2.00(AMDR)
50 岁~	20~30	<10	2.5~9.0	0.5~2.0	4.0	0.60	0.25~2.00(AMDR)
65 岁~	20~30	<10	2.5~9.0	0.5~2.0	4.0	0.60	0.25~2.00(AMDR)
75 岁~	20~30	<10	2.5~9.0	0.5~2.0	4.0	0.60	0.25~2.00(AMDR)
孕早期	20~30	<10	2.5~9.0	0.5~2.0	+0	+0	0.25(0.2[b])
孕中期	20~30	<10	2.5~9.0	0.5~2.0	+0	+0	0.25(0.2[b])
孕晚期	20~30	<10	2.5~9.0	0.5~2.0	+0	+0	0.25(0.2[b])
乳母	20~30	<10	2.5~9.0	0.5~2.0	+0	+0	0.25(0.2[b])

注:[a]花生四烯酸;[b]DHA。3

"—"表示未制定;"+"表示在相应年龄阶段的成年女性需要量基础上增加的需要量。4

附表 3-4 膳食碳水化合物参考摄入量 1

年龄/阶段	总碳水化合物		膳食纤维	添加糖[a] 2
	EAR/(g·d^{-1})	AMDR/%E	AI/(g·d^{-1})	AMDR/%E
0 岁~	60(AI)	—	—	—
0.5 岁~	80(AI)	—	—	—
1 岁~	120	50~65	5~10	—
4 岁~	120	50~65	10~15	<10
7 岁~	120	50~65	15~20	<10
9 岁~	120	50~65	15~20	<10
12 岁~	150	50~65	20~25	<10
15 岁~	150	50~65	25~30	<10
18 岁~	120	50~65	25~30	<10
30 岁~	120	50~65	25~30	<10
50 岁~	120	50~65	25~30	<10
65 岁~	120	50~65	25~30	<10
75 岁~	120	50~65	25~30	<10
孕早期	+10	50~65	+0	<10
孕中期	+20	50~65	+4	<10
孕晚期	+35	50~65	+4	<10
乳母	+50	50~65	+4	<10

注:[a] 添加糖每天不超过 50g/d,最好低于 25g/d。3

"—"表示未制定;"+"表示在相应年龄阶段的成年女性需要量基础上增加的需要量。4

附表 3-5 膳食宏量营养素可接受范围(AMDR) 1

单位:%E 2

3

年龄/阶段	碳水化合物	总脂肪	蛋白质
0 岁~	—	48(AI)	—
0.5 岁~	—	40(AI)	—
1 岁~	50~65	35(AI)	—
4 岁~	50~65	20~30	8~20
6 岁~	50~65	20~30	10~20
7 岁~	50~65	20~30	10~20
11 岁~	50~65	20~30	10~20
12 岁~	50~65	20~30	10~20
15 岁~	50~65	20~30	10~20
18 岁~	50~65	20~30	10~20
30 岁~	50~65	20~30	10~20
50 岁~	50~65	20~30	10~20
65 岁~	50~65	20~30	15~20
75 岁~	50~65	20~30	15~20
孕早期	50~65	20~30	10~20
孕中期	50~65	20~30	10~20
孕晚期	50~65	20~30	10~20
乳母	50~65	20~30	10~20

注:"—"表示未制定。4

附表 3-6 膳食微量营养素平均需要量（EAR）1

年龄/阶段	钙/（mg·d^{-1}）	磷/（mg·d^{-1}）	镁/（mg/d）	铁/（mg·d^{-1}）		碘/（μg·d^{-1}）	锌/（mg·d^{-1}）		硒/（μg·d^{-1}）	铜/（mg·d^{-1}）	钼/（μg·d^{-1}）	维生素 A/（μgRAE·d^{-1}）		维生素 D/（μg·d^{-1}）	维生素 B_1/（mg·d^{-1}）		维生素 B_2/（mg·d^{-1}）		烟酸/（mg NE·d^{-1}）		维生素 B_6/（mg·d^{-1}）	叶酸/（μg DFE·d^{-1}）	维生素 B_{12}/（μg·d^{-1}）	维生素 C/（mg·d^{-1}）
				男	女		男	女				男	女		男	女	男	女	男	女				
0 岁~	—	—	—	—		—	—		—	—	—	—	—	—	—		—		—	—	—	—	—	—
0.5 岁~	—	—	—	7		—	—		—	—	—	—	—	—	—		—		—	—	—	—	—	—
1 岁~	400	250	110	7		65	3.2		20	0.26	8	250	240	8	0.5		0.6	0.5	5	4	0.5	130	0.8	35
4 岁~	500	290	130	7		65	4.6		25	0.30	10	280	270	8	0.7		0.7	0.6	6	5	0.6	160	1.0	40
7 岁~	650	370	170	9		65	5.9		30	0.38	12	300	280	8	0.8	0.7	0.8	0.7	7	6	0.7	200	1.2	50
9 岁~	800	460	210	12		65	5.9		40	0.47	15	400	380	8	0.9	0.8	0.9	0.8	9	8	0.8	240	1.5	65
12 岁~	850	580	260	12	14	80	7.0	6.3	50	0.56	20	560	520	8	1.2	1.0	1.2	1.0	11	10	1.1	310	1.7	80
15 岁~	800	600	270	12	14	85	9.7	6.5	50	0.59	20	580	480	8	1.4	1.1	1.3	1.0	13	10	1.2	320	2.1	85
18 岁~	650	600	270	9	12	85	10.1	6.9	50	0.62	20	550	470	8	1.2	1.0	1.2	1.0	12	10	1.2	320	2.0	85
30 岁~	650	590	270	9	12	85	10.1	6.9	50	0.60	20	550	470	8	1.2	1.0	1.2	1.0	12	10	1.2	320	2.0	85
50 岁~	650	590	270	9	8[a] 12[b]	85	10.1	6.9	50	0.60	20	540	470	8	1.2	1.0	1.2	1.0	12	10	1.3	320	2.0	85
65 岁~	650	570	260	9	8	85	10.1	6.9	50	0.58	20	520	460	8	1.2	1.0	1.2	1.0	12	10	1.3	320	2.0	85
75 岁~	650	570	250	9	8	85	10.1	6.9	50	0.57	20	500	430	8	1.2	1.0	1.2	1.0	12	10	1.3	320	2.0	85
孕早期	+0	+0	+30	—	+0	+75	—	+1.7	+4	+0.10	+0	—	+0	+0	—	+0	—	+0	—	+0	+0.7	+200	+0.4	+0
孕中期	+0	+0	+30	—	+7	+75	—	+1.7	+4	+0.10	+0	—	+50	+0	—	+0.1	—	+0.1	—	+0	+0.7	+200	+0.4	+10
孕晚期	+0	+0	+30	—	+10	+75	—	+1.7	+4	+0.10	+0	—	+50	+0	—	+0.2	—	+0.2	—	+0	+0.7	+200	+0.4	+10
乳母	+0	+0	+0	—	+6	+85	—	+4.1	+15	+0.50	+4	—	+400	+0	—	+0.2	—	+0.4	—	+3	+0.2	+130	+0.6	+40

注：[a] 无月经；[b] 有月经。3

“—”表示未制定或未涉及；“+”表示在相应年龄阶段的成年女性需要量基础上增加的需要量。4

附表 3-7 膳食矿物质推荐摄入量（RNI）或适宜摄入量（AI）1

年龄/阶段	钙/（mg·d⁻¹）	磷/（mg·d⁻¹）	钾/（mg·d⁻¹）	钠/（mg·d⁻¹）	镁/（mg·d⁻¹）	氯/（mg·d⁻¹）	铁/（mg·d⁻¹）		碘/（μg·d⁻¹）	锌/（mg·d⁻¹）		硒/（μg·d⁻¹）	铜/（mg·d⁻¹）	氟/（mg·d⁻¹）	铬/（μg·d⁻¹）		锰/（mg·d⁻¹）		钼/（μg·d⁻¹）
	RNI	RNI	AI	AI	RNI	AI	RNI 男	RNI 女	RNI	RNI 男	RNI 女	RNI	RNI	AI	AI 男	AI 女	AI 男	AI 女	RNI
0 岁~	200（AI）	105（AI）	400	80	20（AI）	120	0.3（AI）		85（AI）	1.5（AI）		15（AI）	0.3（AI）	0.01	0.2		0.01		3（AI）
0.5 岁~	350（AI）	180（AI）	600	180	65（AI）	450	10		115（AI）	3.2（AI）		20（AI）	0.3（AI）	0.23	5		0.7		6（AI）
1 岁~	500	300	900	500~700[a]	140	800~1 100[b]	10		90	4.0		25	0.3	0.6	15		2.0	1.5	10
4 岁~	600	350	1 100	800	160	1 200	10		90	5.5		30	0.4	0.7	15		2.0	2.0	12
7 岁~	800	440	1 300	900	200	1 400	12		90	7.0		40	0.5	0.9	20		2.5	2.5	15
9 岁~	1 000	550	1 600	1 100	250	1 700	16		90	7.0		45	0.6	1.1	25		3.5	3.0	20
12 岁~	1 000	700	1 800	1 400	320	2 200	16	18	110	8.5	7.5	60	0.7	1.4	33	30	4.5	4.0	25
15 岁~	1 000	720	2 000	1 600	330	2 500	16	18	120	11.5	8.0	60	0.8	1.5	35	30	5.0	4.0	25
18 岁~	800	720	2 000	1 500	330	2 300	12	18	120	12.0	8.5	60	0.8	1.5	35	30	4.5	4.0	25
30 岁~	800	710	2 000	1 500	320	2 300	12	18	120	12.0	8.5	60	0.8	1.5	35	30	4.5	4.0	25
50 岁~	800	710	2 000	1 500	320	2 300	12	10[c] 18[d]	120	12.0	8.5	60	0.8	1.5	30	25	4.5	4.0	25
65 岁~	800	680	2 000	1 400	310	2 200	12	10	120	12.0	8.5	60	0.8	1.5	30	25	4.5	4.0	25
75 岁~	800	680	2 000	1 400	300	2 200	12	10	120	12.0	8.5	60	0.7	1.5	30	25	4.5	4.0	25
孕早期	+0	+0	+0	+0	+40	+0	—	+0	+110	—	+2.0	+5	+0.1	+0	—	+0	—	+0	+0
孕中期	+0	+0	+0	+0	+40	+0	—	+7	+110	—	+2.0	+5	+0.1	+0	—	+3	—	+0	+0
孕晚期	+0	+0	+0	+0	+40	+0	—	+11	+110	—	+2.0	+5	+0.1	+0	—	+5	—	+0	+0
乳母	+0	+0	+400	+0	+0	+0	—	+6	+120	—	+4.5	+18	+0.7	+0	—	+5	—	+0.2	+5

2

注：[a] 1 岁~为 500mg/d，2 岁~为 600mg/d，3 岁~为 700mg/d。3

[b] 1 岁~为 800mg/d，2 岁~为 900mg/d，3 岁~为 1 100mg/d。4

[c] 无月经。5

[d] 有月经。6

“—”表示未涉及；“+”表示在相应年龄阶段的成年女性需要量基础上增加的需要量。7

附表 3-8 膳食维生素推荐摄入量(RNI)或适宜摄入量(AI)1

年龄/阶段	维生素 A/(μgRAE·d⁻¹)		维生素 D/(μg·d⁻¹)	维生素 E/(mg α-TE·d⁻¹)	维生素 K/(μg·d⁻¹)	维生素 B_1/(mg·d⁻¹)		维生素 B_2/(mg·d⁻¹)		烟酸/(mg NE·d⁻¹)		维生素 B_6/(mg·d⁻¹)	叶酸/(μg DFE·d⁻¹)	维生素 B_{12}/(μg·d⁻¹)	泛酸/(mg·d⁻¹)	生物素/(μg·d⁻¹)	胆碱/(mg·d⁻¹)		维生素 C/(mg·d⁻¹)
	RNI		RNI	AI	AI	RNI		RNI		RNI		RNI	RNI	RNI	AI	AI	AI		RNI
	男	女				男	女	男	女	男	女						男	女	
0 岁~	300(AI)		10(AI)	3	2	0.1(AI)		0.4(AI)		1(AI)		0.1(AI)	65(AI)	0.3(AI)	1.7	5	120		40(AI)
0.5 岁~	350(AI)		10(AI)	4	10	0.3(AI)		0.6(AI)		2(AI)		0.3(AI)	100(AI)	0.6(AI)	1.9	10	140		40(AI)
1 岁~	340	330	10	6	30	0.6		0.7	0.6	6	5	0.6	160	1.0	2.1	17	170		40
4 岁~	390	380	10	7	40	0.9		0.9	0.8	7	6	0.7	190	1.2	2.5	20	200		50
7 岁~	430	390	10	9	50	1.0	0.9	1.0	0.9	9	8	0.8	240	1.4	3.1	25	250		60
9 岁~	560	540	10	11	60	1.1	1.0	1.1	1.0	10	10	1.0	290	1.8	3.8	30	300		75
12 岁~	780	730	10	13	70	1.4	1.2	1.4	1.2	13	12	1.3	370	2.0	4.9	35	380		95
15 岁~	810	670	10	14	75	1.6	1.3	1.6	1.2	15	12	1.4	400	2.5	5.0	40	450	380	100
18 岁~	770	660	10	14	80	1.4	1.2	1.4	1.2	15	12	1.4	400	2.4	5.0	40	450	380	100
30 岁~	770	660	10	14	80	1.4	1.2	1.4	1.2	15	12	1.4	400	2.4	5.0	40	450	380	100
50 岁~	750	660	10	14	80	1.4	1.2	1.4	1.2	15	12	1.6	400	2.4	5.0	40	450	380	100
65 岁~	730	640	15	14	80	1.4	1.2	1.4	1.2	15	12	1.6	400	2.4	5.0	40	450	380	100
75 岁~	710	600	15	14	80	1.4	1.2	1.4	1.2	15	12	1.6	400	2.4	5.0	40	450	380	100
孕早期	—	+0	+0	+0	+0	—	+0	—	+0	—	+0	+0.8	+200	+0.5	+1.0	+10	—	+80	+0
孕中期	—	+70	+0	+0	+0	—	+0.2	—	+0.1	—	+0	+0.8	+200	+0.5	+1.0	+10	—	+80	+15
孕晚期	—	+70	+0	+0	+0	—	+0.3	—	+0.2	—	+0	+0.8	+200	+0.5	+1.0	+10	—	+80	+15
乳母	—	+600	+0	+3	+5	—	+0.3	—	+0.5	—	+4	+0.3	+150	+0.8	+2.0	+10	—	+120	+50

注:"—"表示未涉及;"+"表示在相应年龄阶段的成年女性需要量基础上增加的需要量。3

附表 3-9 膳食营养素降低膳食相关非传染性疾病风险的建议摄入量(PI-NCD) 1

单位:mg/d 2

3

年龄/阶段	钾	钠	维生素 C
0 岁~	—	—	—
0.5 岁~	—	—	—
1 岁~	—	—	—
4 岁~	1 800	≤1 000	—
7 岁~	2 200	≤1 200	—
9 岁~	2 800	≤1 500	—
12 岁~	3 200	≤1 900	—
15 岁~	3 600	≤2 100	—
18 岁~	3 600	≤2 000	200
30 岁~	3 600	≤2 000	200
50 岁~	3 600	≤2 000	200
65 岁~	3 600	≤1 900	200
75 岁~	3 600	≤1 800	200
孕早期	+0	+0	+0
孕中期	+0	+0	+0
孕晚期	+0	+0	+0
乳母	+0	+0	+0

注:孕期、哺乳期女性的 PI-NCD 与同年龄女性相同。4

"—"表示未制定;"+"表示在相应年龄阶段的成年女性需要量基础上增加的需要量。5

附表 3-10 膳食微量营养素可耐受最高摄入量（UL）1

年龄/阶段	钙/（mg·d⁻¹）	磷/（mg·d⁻¹）	铁/（mg·d⁻¹）	碘/（μg·d⁻¹）	锌/（mg·d⁻¹）	硒/（μg·d⁻¹）	铜/（mg·d⁻¹）	氟/（mg·d⁻¹）	锰/（mg·d⁻¹）	钼/（μg·d⁻¹）	维生素 A/（μg·d⁻¹）	维生素 D/（μg·d⁻¹）	维生素 E/（mg·d⁻¹）	烟酸/（mg NE·d⁻¹）	烟酰胺/（mg·d⁻¹）	维生素 B_6/（mg·d⁻¹）	叶酸/（μg·d⁻¹）	胆碱/（mg·d⁻¹）	维生素 C/（mg·d⁻¹）
0 岁~	1 000	—	—	—	—	55	—	—	—	—	600	20	—	—	—	—	—	—	—
0.5 岁~	1 500	—	—	—	—	80	—	—	—	—	600	20	—	—	—	—	—	—	—
1 岁~	1 500	—	25	—	9	80	2.0	0.8	—	200	700	20	150	11	100	20	300	1 000	400
4 岁~	2 000	—	30	200	13	120	3.0	1.1	3.5	300	1 000	30	200	15	130	25	400	1 000	600
7 岁~	2 000	—	35	250	21	150	3.0	1.5	5.0	400	1 300	45	300	19	160	32	500	2 000	800
9 岁~	2 000	—	35	250	24	200	5.0	2.0	6.5	500	1 800	45	400	23	200	40	650	2 000	1 100
12 岁~	2 000	—	40	300	32	300	6.0	2.4	9.0	700	2 400	50	500	30	260	50	800	2 000	1 600
15 岁~	2 000	—	40	500	37	350	7.0	3.5	10	800	2 800	50	600	33	290	55	900	2 500	1 800
18 岁~	2 000	3 500	42	600	40	400	8.0	3.5	11	900	3 000	50	700	35	310	60	1 000	3 000	2 000
30 岁~	2 000	3 500	42	600	40	400	8.0	3.5	11	900	3 000	50	700	35	310	60	1 000	3 000	2 000
50 岁~	2 000	3 500	42	600	40	400	8.0	3.5	11	900	3 000	50	700	35	310	55	1 000	3 000	2 000
65 岁~	2 000	3 000	42	600	40	400	8.0	3.5	11	900	3 000	50	700	35	300	55	1 000	3 000	2 000
75 岁~	2 000	3 000	42	600	40	400	8.0	3.5	11	900	3 000	50	700	35	290	55	1 000	3 000	2 000
孕早期	2 000	3 500	42	500	40	400	8.0	3.5	11	900	3 000	50	700	35	310	60	1 000	3 000	2 000
孕中期	2 000	3 500	42	500	40	400	8.0	3.5	11	900	3 000	50	700	35	310	60	1 000	3 000	2 000
孕晚期	2 000	3 500	42	500	40	400	8.0	3.5	11	900	3 000	50	700	35	310	60	1 000	3 000	2 000
乳母	2 000	3 500	42	500	40	400	8.0	3.5	11	900	3 000	50	700	35	310	60	1 000	3 000	2 000

注："—"表示未制定。3

附表 3-11 水的适宜摄入量[a] 1

单位:mL/d 2

年龄/阶段	饮水量		总摄入量[b]	
	男性	女性	男性	女性
0 岁~	—		700[c]	
0.5 岁~	—		900	
1 岁~	—		1 300	
4 岁~	800		1 600	
7 岁~	1 000		1 800	
12 岁~	1 300	1 100	2 300	2 000
15 岁~	1 400	1 200	2 500	2 200
18 岁~	1 700	1 500	3 000	2 700
65 岁~	1 700	1 500	3 000	2 700
孕早期	—	+0	—	+0
孕中期	—	+200	—	+300
孕晚期	—	+200	—	+300
乳母	—	+600	—	+1 100

3

注:[a] 温和气候条件下,低强度身体活动水平时的摄入量。在不同温湿度和/或不同强度身体活动水平时,应进行相应调整。4

[b] 包括食物中的水和饮水中的水。5

[c] 纯母乳喂养婴儿无需额外补充水分。6

"—"表示未涉及;"+"表示在相应年龄阶段的成年女性需要量基础上增加的需要量。7

附表 3-12 其他膳食成分成年人特定建议值(SPL)和可耐受最高摄入量(UL)8

其他膳食成分	SPL	UL
原花青素/($mg \cdot d^{-1}$)	200	—
花色苷/($mg \cdot d^{-1}$)	50	—
大豆异黄酮/($mg \cdot d^{-1}$)	55[a] 75[b]	120[c]
绿原酸/($mg \cdot d^{-1}$)	200	—
番茄红素/($mg \cdot d^{-1}$)	15	70
叶黄素/($mg \cdot d^{-1}$)	10	60
植物甾醇/($g \cdot d^{-1}$)	0.8	2.4
植物甾醇酯/($g \cdot d^{-1}$)	1.3	3.9
异硫氰酸酯/($mg \cdot d^{-1}$)	30	—
辅酶 Q_{10}/($mg \cdot d^{-1}$)	100	—
甜菜碱/($g \cdot d^{-1}$)	1.5	4.0
菊粉或低聚果糖/($g \cdot d^{-1}$)	10	—
β-葡聚糖(谷物来源)/($g \cdot d^{-1}$)	3.0	—
硫酸/盐酸氨基葡萄糖/($mg \cdot d^{-1}$)	1 500	—
氨基葡萄糖/($mg \cdot d^{-1}$)	1 000	—

9

注:[a] 绝经前女性的 SPL;[b] 围绝经期和绝经后女性的 SPL;[c] 绝经后女性的 SPL。10

"—"表示未制定。11