



中华人民共和国国家标准

GB 1886.347—2021

食品安全国家标准

食品添加剂 4-氨基-5,6-二甲基噻吩并 [2,3-d]嘧啶-2(1H)-酮盐酸盐

2021-02-22 发布

2021-08-22 实施

中华人民共和国国家卫生健康委员会
国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 发 布

食品安全国家标准

食品添加剂 4-氨基-5,6-二甲基噻吩并 [2,3-d]嘧啶-2(1H)-酮盐酸盐

1 范围

本标准适用于以丙二腈、3-巯基-2-丁酮和尿素等为原料经化学反应制得的食品添加剂 4-氨基-5,6-二甲基噻吩并[2,3-d]嘧啶-2(1H)-酮盐酸盐。

2 化学名称、分子式、结构式和相对分子质量


2.1 化学名称

4-氨基-5,6-二甲基噻吩并[2,3-d]嘧啶-2(1H)-酮盐酸盐

2.2 分子式

C₈H₉N₃OS • HCl

2.3 结构式



2.4 相对分子质量

231.7(按 2018 年国际相对原子质量)

3 技术要求

3.1 感官要求

感官要求应符合表 1 的规定。

表 1 感官要求

项 目	要 求	检 验 方 法
色 泽	白色至米白色	将试样置于一洁净白纸上,用目测法观察
状 态	粉 末	
香 气	甜 香	GB/T 14454.2

3.2 理化指标

理化指标应符合表 2 的规定。

表 2 理化指标

项 目	指 标	检验方法
4-氨基-5,6-二甲基噻吩并[2,3-d]嘧啶-2(1H)-酮盐酸盐含量,w/%	≥ 99.0	附录 A

附录 A
34-氨基-5,6-二甲基噻吩并[2,3-d]嘧啶-2(1H)-酮盐酸盐含量的测定

A.1 试剂和材料

A.1.1 三氟乙酸:纯度 $\geqslant 98\%$ 。

A.1.1.1 0.1%三氟乙酸溶液:吸取 1.00 mL 三氟乙酸(A.1.1),加入 1 000 mL 容量瓶中,加水(A.1.3)稀释定容,摇匀。

A.1.1.2 0.05%三氟乙酸溶液:吸取 0.50 mL 三氟乙酸(A.1.1),加入 1 000 mL 容量瓶中,加水(A.1.3)稀释定容,摇匀。

A.1.2 乙腈:色谱纯。

A.1.3 水:GB/T 6682 规定的一级水。

A.1.4 4-氨基-5,6-二甲基噻吩并[2,3-d]嘧啶-2(1H)-酮盐酸盐对照品:纯度 $\geqslant 99.0\%$ 。

A.2 仪器和设备

超高效液相色谱仪:配备二极管阵列检测器。

A.3 参考色谱条件

A.3.1 色谱柱: C_{18} 液相色谱柱,长 100 mm,内径 4.6 mm,粒度 $3.5 \mu\text{m}$;或其他等效的色谱柱。

A.3.2 流动相:0.1%三氟乙酸溶液(A.1.1.1)和乙腈(A.1.2)按体积比 95 : 5 组成。

A.3.3 柱温:30 °C。

A.3.4 流速:1.0 mL/min。

A.3.5 进样量:1 μL 。

A.3.6 检测波长:245 nm。

A.4 分析步骤

A.4.1 对照品溶液的制备

准确称取 0.02 g 4-氨基-5,6-二甲基噻吩并[2,3-d]嘧啶-2(1H)-酮盐酸盐对照品,精确至 0.001 g,用由 0.05 %三氟乙酸溶液(A.1.1.2)和乙腈(A.1.2)按体积比 9 : 1 组成的溶液溶解并定容至 100 mL。所得溶液用 $0.45 \mu\text{m}$ 滤膜过滤,滤液备用。

A.4.2 试样溶液的制备

准确称取 0.02 g 试样,精确至 0.001 g,用由 0.05 %三氟乙酸溶液(A.1.1.2)和乙腈(A.1.2)按体积比 9 : 1 组成的溶液溶解并定容至 100 mL。所得溶液用 $0.45 \mu\text{m}$ 滤膜过滤,滤液备用。

A.4.3 测定

在 A.3 参考色谱条件下,分别对对照品溶液和试样溶液进行测定,记录其保留时间一致的主峰

面积。

A.5 结果计算

4-氨基-5,6-二甲基嘌呤并[2,3-d]嘧啶-2(1H)-酮盐酸盐含量的质量分数 w_1 按式(A.1)计算。

式中：

A_1 ——试样溶液色谱图中主峰的峰面积值；

m_2 ——对照品的质量,单位为克(g);

w_2 ——对照品中 4-氨基-5,6-二甲基噻吩并[2,3-d]嘧啶-2(1H)-酮盐酸盐含量的质量分数；

A_2 ——对照品溶液色谱图中主峰的峰面积值；

m_1 ——试样的质量,单位为克(g)。

计算结果保留到小数点后两位。