

## Resumo de Curvas e Superfícies

### Sumário

Curvas, Reta tangente e Comprimento de arco (Week 1)

Difeomorfismo e Reparametrização (Week 2)

Ângulo e curvatura (Week 3)

Ângulo (Week 4)

## Curvas, Reta tangente e Comprimento de arco (Week 1)

**Definição 1** Uma **curva parametrizada** em  $\mathbb{R}^n$  é uma aplicação  $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^n$  sendo  $I \subset \mathbb{R}$  aberto.

**Definição 2** O conjunto imagem de  $\gamma$ ,  $\gamma(I) \subset \mathbb{R}^n$  é dito o **traço** de  $\gamma$ .

**Definição 3 (Vetor tangente)** Seja  $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^n$  com  $\gamma(t) = (\gamma_1(t), \dots, \gamma_n(t))$  com  $\gamma_i(y)$  diferenciáveis  $\forall i, i = 1 \dots n$ , o vetor

$$\gamma'(t) = (\gamma'_1(t), \dots, \gamma'_n(t))$$

é chamado **vetor tangente** de  $\gamma$  em  $t$

**Definição 4 (Curvas regulares)** Seja  $\gamma(t) : I \rightarrow \mathbb{R}^n$  uma curva parametrizada diferenciável. Diz-se que  $\gamma$  é **regular**, quando  $\gamma'(t) \neq 0$ ,  $\forall t \in I$ .

**Definição 5 (Reta tangente)** Seja  $\gamma$  uma curva regular, então a **reta tangente** de  $\gamma$  no ponto  $t_0 \in I$  é aquela que contém o ponto  $\gamma(t_0)$  e é paralela ao vetor  $\gamma'(t_0)$ , ou seja

$$r(\lambda) = \gamma(t_0) + \lambda \gamma'(t_0)$$

**Definição 6 (Comprimento de arco)** O **comprimento de arco** de  $\alpha$ , de  $\alpha(a)$  até  $\alpha(b)$  definido por  $L_a^b(\alpha)$  é

$$L_a^b(\alpha) = \int_a^b \|\alpha'(t)\| dt$$

**Definição 7** Se  $\gamma : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$  é uma c.p.<sup>1</sup>, sua **velocidade no ponto**  $\gamma(t)$  é  $\|\gamma'(t)\|$ , e a curva é dita com **velocidade unitária** se  $\|\gamma'(t)\| = 1$ ,  $\forall t \in (a, b)$  e é parametrizada por comprimento de arco.

**Teorema 1** Toda curva regular pode ser reparametrizada por comprimento de arco.

## Difeomorfismo e Reparametrização (Week 2)

**Definição 8 (Difeomorfismo)** Dado os conjuntos abertos  $U \subset \mathbb{R}^n$  e  $V \subset \mathbb{R}^n$ . Uma bijeção  $f : U \rightarrow V$  é dita **difeomorfismo** quando  $f$  e  $f^{-1}$  são diferenciáveis.

**Definição 9 (Reparametrização)** A curva  $\beta(s)$  é dita uma **reparametrização** de  $\alpha(t) : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$  regular quando dados  $I_0 \subset \mathbb{R}$  e  $\phi : I_0 \rightarrow I$  difeomorfismo. Temos  $\beta(S) = \alpha(\phi(S))$ .

**Definição 10** Seja  $\alpha(t) : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^2$  e  $\beta(S) : (c, d) \rightarrow \mathbb{R}^2$ . Então

- $\beta(S)$  é uma reparametrização positiva de  $\alpha$  se  $\phi'(S) > 0$ ,  $\forall S$
- $\beta(S)$  é uma reparametrização negativa de  $\alpha$  se  $\phi'(S) < 0$ ,  $\forall S$

**Definição 11** Qualquer reparametrização de uma c.p. regular é regular (i.e. difeomorfismos preservam regularidade).

**Proposition 1** A função  $L$  (comprimento de arco) é um difeomorfismo.

**Definição 12** Toda curva regular  $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$  admite reparametrização por comprimento de arco.

---

<sup>1</sup>curva parametrizada

## Ângulo e curvatura (Week 3)

**Definição 13 (Função Ângulo)** Dada uma curva diferenciável  $\gamma : I \rightarrow S^1$ , onde  $S^1$  é o círculo de  $\mathbb{R}^2$  com centro na origem e raio 1, diz-se que  $\theta : I \rightarrow \mathbb{R}$  é uma **função-ângulo** de  $\gamma$ , quando

$$\gamma(s) = (\cos(\theta(s)), \sin(\theta(s))), \quad \forall s \in I$$

**Definição 14 (Curvatura)** Seja  $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}$  unit-speed. Designando-se o vetor tangente de  $\alpha$  em  $s \in I$  por  $T(s)$ , podemos afirmar que a curva  $T(s) = I \rightarrow S^1$  admite função ângulo

$$T(s) = (\cos(\theta(s)), \sin(\theta(s))), \quad \forall s \in I$$

Daí a curvatura de  $\alpha$  em  $s \in I$  é definida por

$$K(s) = \theta'(s) = \det(\alpha'(s), \alpha''(s))$$

## Ângulo (Week 4)

**Teorema 2 (Função-ângulo diferenciável)** Seja  $\gamma : I \rightarrow S^1$  uma curva diferenciável. Então,  $\gamma$  admite uma função ângulo  $\theta : I \rightarrow \mathbb{R}$ , a qual é diferenciável. Além disso, toda função-ângulo de  $\gamma$ , a qual é diferenciável, difere de  $\theta$  por uma constante.

**Corolário 2.1** Seja  $\alpha : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  e seja  $\beta(s) = \alpha(\theta(s))$  a parametrização por comprimento de arco de  $\alpha$ , a curvatura de  $\alpha$  em  $t \in I$  é  $K_\alpha(t)$ , e, por definição é a curvatura de  $\beta$  em  $\theta^{-1}(t)$ , isto é

$$K_\alpha := K_\beta(\theta^{-1}(t))$$