

**Fundação Getulio Vargas  
Escola de Matemática Aplicada**

**Wellington José**

**Resumo de EDO**

Rio de Janeiro  
2021

## 22/02 - Equações Diferenciais de Primeira Ordem

Vamos considerar a equação diferencial linear de Primeira ordem com  $p(x)$  e  $g(x)$  funções contínuas em  $I \subset \mathbb{R}$ :

$$y' + p(x)y = g(x)$$

Se  $g(x) = 0$ , temos uma equação homogênea, de solução:

$$y(x) = e^{-\int p(x)dx} \cdot e^c$$

Para o caso geral a ideia é multiplicar a equação por um fator integrante transformando-a numa forma imediatamente integrável. Seja  $u(x)$  este fator integrante, então

$$u(x)y' + u(x)p(x)y = u(x)g(x)$$

Chegamos que:

$$y(x) = \frac{1}{u(x)} \int u(x)g(x)dx + c$$

e

$$u(x) = e^{\int p(x)dx}$$

## 24/02 - Equação de Bernoulli e Equações separáveis

Um exemplo de equação de Primeira ordem que não é linear é a **equação de Bernoulli**:

$$y' + p(x)y = q(x)y^\alpha, \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

### Equações separáveis

São equações diferenciais do tipo

$$M(x) + N(x) \frac{dy}{dx} = 0$$

ou

$$M(x)dx + N(y)dy = 0 \quad (*)$$

Suponhamos  $H_1 = \int M(x)dx$  e  $H_2 = \int N(y)dy$ , então  $(*)$  tem como solução

$$H_1(x) + H_2(y) = c$$

que geralmente está na forma implícita.

## 01/03 - Equações Diferenciais Exatas e Equações Diferenciais Não Exatas

### Equações Diferenciais Exatas

Considere a equação diferencial

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$$

E suponha que existe uma função  $f(x, y)$  tal que

$$\frac{\partial f}{\partial x} = M(x, y), \quad \frac{\partial f}{\partial y} = N(x, y), \text{ e } f(x, y) = c$$

Então  $f(x, y) = M(x, y)dx + N(x, y)dy$ , e a equação diferencial é **exata**.

**Teorema 0.1** *Suponha que as funções  $M, N, M_y$  e  $N_x$  são contínuas na região  $R : a < x < b, c < y < d$ . Então a equação  $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$  é uma equação diferencial exata em  $R$  se e somente se:*

$$M_y(x, y) = N_x(x, y) \text{ em } R$$

*Isto é, existe uma função  $f(x, y) = c$ , tal que*

$$\frac{\partial f}{\partial x} = M(x, y) \text{ e } \frac{\partial f}{\partial y} = N(x, y)$$

*se e somente se  $M_y = N_x$*

## Equações Diferenciais Não Exatas

Em geral a equação  $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$  não é exata, mas eventualmente é possível transformá-la numa equação diferencial exata multiplicando por um fator integrante.

Se  $\frac{M_x - N_y}{N}$  for uma função só de  $x$  então podemos encontrar  $u(x) = e^{\int \frac{M_x - N_y}{N} dx}$  como fator integrante. Se  $\frac{N_x - M_y}{M}$  for uma função só de  $y$  então podemos encontrar  $u(y) = e^{\int \frac{N_x - M_y}{M} dy}$  como fator integrante.

**Exemplo:**  $ydx - xdy = 0$

Como

$$\frac{\partial M}{\partial y} = 1 \text{ e } \frac{\partial N}{\partial x} = -1 \text{ não é exata}$$

Note que,  $\frac{N_x - M_y}{N} = \frac{2}{x}$  depende apenas de  $x$ , e

$$u(x) = e^{-\int \frac{2}{x} dx} = \frac{1}{x^2}$$

Logo, a nova equação

$$\frac{y}{x^2} dx - \frac{1}{x} dy = 0 \text{ é exata}$$

## 03/03 - Problemas de diluição, Resfriamento de um corpo e Juros compostos

### Problemas de diluição

Considere um tanque contendo no estado inicial  $V_0$  litros de salmoura com  $\alpha$  **kg** de sal (pode ser  $\alpha = 0$ ). Uma outra solução de salmoura contendo **c kg** quilos de sal por litro é derramada nesse tanque a uma taxa **a l/min**, enquanto simultaneamente a mistura bem agitada deixa o tanque a uma taxa de **b l/min**. Queremos determinar  $(Q(t))$  a quantidade de sal (em quilos) no tempo  $t$  dentro do tanque. Temos que

$$\frac{dQ}{dt} + \frac{b}{V_0 + at - bt} Q = ac$$

## Resfriamento de um corpo

Sendo  $T$  a temperatura do corpo,  $T_a$  a temperatura no ambiente, a taxa de variação da temperatura do corpo é de  $\frac{dT}{dt}$  e assim chegamos que a variação da temperatura do corpo é (se a temperatura do ambiente não muda):

$$T = (T_0 - T_a)e^{-kt} + T_a$$

Agora e se a  $T_a$  varia com o tempo (perdendo ou ganhando calor):

$$\frac{dT}{dt} + k(1 + A)T = k(T_{a,0} + AT_0)$$

onde

$$A = \frac{m_c}{m_a c_a}$$

com solução:

$$T(t) = \left( \frac{T_0 - T_{a,0}}{1 + A} \right) e^{k(1+A)t} + \frac{T_{a,0} + AT_0}{1 + A}$$

## Juros Compostos

(Análogo aos casos anteriores), com solução

$$S(t) = S_0 e^{rt} + \frac{k}{r}(e^{rt} - 1)$$

## 08/03 - Equações autônomas

Uma classe de EDO importante são as quais não aparece a variável independente explicitamente. São as **equações autônomas**:

$$\frac{dy}{dt} = f(y)$$

Tais equações tem solução análoga as que já vimos.

## 10/03 - Existência e Unicidade

Uma EDO sempre possui solução e ela é única (não é necessário provar aqui).

[Video explicativo](#)