

# 2021 秋高等代数习题课

## 2021-12-10 第六次习题课

习题 5.1 第 4 题. 设  $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$  是数域  $\mathbb{F}$  上的多项式,  $c \in \mathbb{F}$ . 求证:  $x - c$  除  $f(x)$  的商  $q(x) = b_{n-1} x^{n-1} + \cdots + b_1 x + b_0$  和余式  $r$  可以用如下的算法得出

$$\begin{array}{r|rrrrrrrr} c & & a_n & a_{n-1} & \cdots & a_i & \cdots & a_1 & a_0 \\ & +) & & cb_{n-1} & \cdots & cb_i & \cdots & cb_1 & cb_0 \\ \hline & & b_{n-1} & b_{n-1} & \cdots & b_{i-1} & \cdots & b_0 & r \end{array}$$

其中  $b_{n-1} = a_n$ ,  $b_{i-1} = a_i + cb_i$  ( $\forall 1 \leq i \leq n$ ),  $r = a_0 + cb_0$ .

证明: 考虑  $f(x) = (x - c)g(x) + r$ , 即

$$\begin{aligned} a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 &= (x - c)(b_{n-1} x^{n-1} + \cdots + b_1 x + b_0) + r \\ &= b_{n-1} x^n + \cdots + b_1 x^2 + b_0 x + r \\ &\quad - cb_{n-1} x^{n-1} - \cdots - cb_1 x - cb_0 \end{aligned}$$

移项之后即有

$$a_n x^n + (a_{n-1} + cb_{n-1})x^{n-1} + \cdots + (a_1 + cb_1)x + (a_0 + cb_0) = b_{n-1} x^n + \cdots + b_1 x^2 + b_0 x + r,$$

对应次项的系数相等, 从而有  $b_{n-1} = a_n$ ,  $b_{n-2} = a_{n-1} + cb_{n-1}$ ,  $\dots$ ,  $b_0 = a_1 + cb_1$ ,  $r = a_0 + cb_0$ .

习题 5.1 第 8 题. 给定正整数  $k \geq 2$ , 求非零实系数多项式  $f(x)$  满足条件  $f(x^k) = (f(x))^k$ .

解: 设非零实系数多项式  $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ ,  $a_n \neq 0$ ,  $n \geq 0$ , 满足  $f(x^k) = (f(x))^k$ . 考察最高次项, 有  $a_n^k = a_n$ . 因为  $f(x)$  是实系数多项式,  $k \geq 2$ , 于是有

$$a_n = \begin{cases} \pm 1 & k \text{ 为奇数,} \\ 1 & k \text{ 为偶数.} \end{cases}$$

假设除  $a_n$  外还有系数非零, 最高次项为  $a_m x^m$ ,  $0 \leq m \leq n-1$ , 那么  $f(x) = a_n x^n + a_m x^m + g(x)$ , 其中  $\deg g < m$ . 那么

$$\begin{aligned} (f(x))^k &= a_n^k x^{kn} + k a_m x^{(k-1)n+m} + h(x) \\ f(x^k) &= a_n x^{kn} + a_m x^{km} + g(x^k) \end{aligned}$$

其中  $\deg h < (k-1)n + m$ . 因为  $0 \leq m \leq n-1$  且  $k \geq 2$ , 所以  $(k-1)n + m \neq km$ . 所以要使  $f(x^k) = (f(x))^k$ , 必须有  $k a_m = 0$ , 即  $a_m = 0$ . 这与假设矛盾. 所以除最高次项外,  $f(x)$  没有其他非零项. 所以

$$f(x) = \begin{cases} \pm x^n & k \text{ 为奇数,} \\ x^n & k \text{ 为偶数.} \end{cases} \quad n = 0, 1, \dots$$

**习题 5.2 第 3 题.** 对如下多项式  $f(x), g(x)$ , 求次数最低的多项式  $u(x), v(x)$ , 使  $u(x)f(x) + v(x)g(x) = 1$ .

(1).  $f(x) = x^3, g(x) = (x - 3)^2$

**解:** 辗转相除有

$$\begin{aligned} x^3 &= (x + 6) \cdot (x - 3)^2 + 27(x - 2) \\ (x - 3)^2 &= \frac{x - 4}{27} \cdot 27(x - 2) + 1 \end{aligned}$$

进行回代, 有

$$1 = \left(1 + \frac{(x - 4)(x + 6)}{27}\right) \cdot (x - 3)^2 + \frac{-x + 4}{27} \cdot x^3$$

于是  $u(x) = \frac{-x+4}{27}, v(x) = \frac{x^2+2x+3}{27}$ .

**习题 5.2 第 4 题.** 如果两个整系数三次方程有公共的无理根, 那么它们还有另一个公共根。

**证明:** 设整系数三次方程  $f(x) = 0, g(x) = 0$  有公共无理根  $\alpha \in \mathbb{R}$ . 令  $h(x) \in \mathbb{Q}[x]$  为  $\alpha$  在  $\mathbb{Q}$  上的极小多项式, 即满足  $h(\alpha) = 0$  的首一的有理系数多项式中次数最低的。首先,  $\deg h \leq \deg f$ . 其次, 必须有  $h(x) | f(x)$ , 否则可以在  $\mathbb{Q}[x]$  上做带余除法  $f(x) = h(x) \cdot s(x) + r(x)$ , 其中  $\deg r < \deg h$ , 这与  $h(x)$  的定义矛盾。基于同样的原因, 有  $h(x) | g(x)$ .

由于  $\alpha$  是无理数, 所以  $\deg h \geq 2$ , 而且  $h(x)$  没有有理根, 否则  $h(x) = h'(x)(x - \beta), \beta \in \mathbb{Q}, h'(x) \in \mathbb{Q}[x], \deg h' < \deg h, h'(\alpha) = 0$ .

综上所述,  $f(x)$  与  $g(x)$  除了  $\alpha$  外, 还至少有另一个公共无理根, 为  $h(x)$  的根。

**习题 5.2 第 8 题.** 已知多项式  $r_1(x) = x^2 + 2x + 3, r_2(x) = 3x - 7$ . 矩阵  $A = \begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} B_1 & 0 \\ 0 & B_2 \end{pmatrix}$ , 其中

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ & 0 & 1 \\ & & 0 \end{pmatrix}, A_2 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, B_1 = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, B_2 = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

试验证  $r_1(A_1) = B_1, r_2(A_2) = B_2$ . 并求一个最低次数的多项式  $f(x)$  使  $f(A) = B$ .

**解:** 容易算得  $A_1^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ & 0 & 0 \\ & & 0 \end{pmatrix}$ , 所以

$$r_1(A_1) = A_1^2 + 2A_1 + 3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ & 0 & 0 \\ & & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ & 0 & 2 \\ & & 0 \end{pmatrix} + 3 = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ & 3 & 2 \\ & & 3 \end{pmatrix} = B_1.$$

$r_2(A_2)$  可以直接计算

$$r_2(A_2) = 3 \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} - 7 = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = B_2.$$

易知  $f(A) = f\left(\begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} f(A_1) & 0 \\ 0 & f(A_2) \end{pmatrix}$ . 那么要使  $f(A) = B$ , 只要使  $f(A_1) = B_1, f(A_2) = B_2$  即可。易知  $A_1$  的极小多项式为  $g_1(x) = x^3, A_2$  的极小多项式为  $g_2(x) = (x - 3)^2$ , 所以

多项式  $f(x)$  就是满足

$$f(x) \equiv r_1(x) \pmod{g_1(x)}, \quad f(x) \equiv r_2(x) \pmod{g_2(x)}$$

的次数最低的多项式。这一问便化为了习题 5.2 第 7 题。

根据习题 5.2 第 3 题第 (1) 问, 有  $u(x) = \frac{-x+4}{27}$ ,  $v(x) = \frac{x^2+2x+3}{27}$ , 使得  $g_1(x)u(x) + g_2(x)v(x) = 1$ , 那么

$$\begin{aligned} f_0(x) &:= g_1(x)u(x)r_2(x) + g_2(x)v(x)r_1(x) \\ &= x^3 \cdot \frac{-x+4}{27} \cdot (3x-7) + (x-3)^2 \cdot \frac{x^2+2x+3}{27} \cdot (x^2+2x+3) \end{aligned}$$

即满足

$$f_0(x) \equiv r_1(x) \pmod{g_1(x)}, \quad f_0(x) \equiv r_2(x) \pmod{g_2(x)}$$

由于任意两个满足上式的多项式  $f(x), f'(x)$ , 都必须有  $g_1(x)g_2(x) | (f(x) - f'(x))$ , 所以次数最低的  $f(x)$  即为  $f_0(x)$  除以  $g_1(x)g_2(x)$  的余式:

$$\begin{aligned} f(x) &= f_0(x) \pmod{g_1(x)g_2(x)} = (g_1(x)u(x)r_2(x) + g_2(x)v(x)r_1(x)) \pmod{g_1(x)g_2(x)} \\ &= g_1(x) \cdot (u(x)r_2(x) \pmod{g_2(x)}) + g_2(x) \cdot (v(x)r_1(x) \pmod{g_1(x)}) \\ &= \frac{x^3}{27}((-x+4) \cdot (3x-7) \pmod{(x-3)^2}) + \frac{(x-3)^2}{27}((x^2+2x+3) \cdot (x^2+2x+3) \pmod{x^3}) \\ &= \frac{x^3}{27}(x-1) + \frac{(x-3)^2}{27}(10x^2+12x+9) \\ &= \frac{1}{27}(11x^4 - 49x^3 + 27x^2 + 54x + 81) \end{aligned}$$

第 6 题. 设  $V = \mathbb{F}[x]$  是  $\mathbb{F}$  上全体一元多项式关于多项式加法和数乘多项式运算构成的  $\mathbb{F}$  上线性空间, 用  $V_n = \mathbb{F}_n[x]$  表示  $V$  中全体次数  $\leq n$  的多项式集合, 则  $V_n$  构成  $V$  的一个子空间,

(1). 证明  $1, x-1, \dots, (x-1)^n$  构成  $V_n$  的一组基

(2). 对于  $f(x) = x^n + \dots + x + 1 \in V_n$ , 求  $f(x)$  在上述基下的坐标。

解: 这题基本与习题 2.7 第 7 题类似。在哪里我们考察的是  $x-c, c \in \mathbb{F}$ , 是比  $x-1$  更一般的情况。以下我们都考察  $x-c$  的情形。

(1). 只要证明  $1, (x-c), (x-c)^2, \dots, (x-c)^n$  线性无关即可。假设存在不全为 0 的实数  $\lambda_0, \dots, \lambda_n$  使得

$$f_0(x) = \lambda_0 + \lambda_1(x-c) + \dots + \lambda_n(x-c)^n = 0$$

那么  $f_0(x)$  的  $n$  阶导函数  $f_0^{(n)}(x) = n!\lambda_n = 0$ , 从而有  $\lambda_n = 0$ 。逐步反推可以导出  $\lambda_{n-1} = \dots = \lambda_0 = 0$ , 矛盾。

(2). 我们考虑一个更一般的  $n$  次多项式  $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n = \lambda_0 + \lambda_1(x-c) + \dots + \lambda_n(x-c)^n$ , 那么  $f_0^{(n)}(x) = n!a_n = n!\lambda_n$ , 故  $\lambda_n = a_n$ 。将所得的  $\lambda_n, \dots, \lambda_{n-k}$  回代, 并考察  $f_0^{(n-k-1)}(c)$ , 则有

$$f_0^{(n-k-1)}(c) = (n-k-1)!\lambda_{n-k-1} = (n-k-1)!a_{n-k-1} + \frac{(n-k)!}{1!}ca_{n-k} + \dots + \frac{n!}{(k+1)!}c^{k+1}a_n$$

得  $\lambda_{n-k-1} = a_{n-k-1} + C_{n-k}^1 c a_{n-k} + \cdots + C_n^{k+1} c^{k+1} a_n$  所以有

$$\begin{pmatrix} \lambda_n \\ \vdots \\ \lambda_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ C_n^1 c & 1 & & \\ C_n^2 c^2 & C_{n-1}^1 c & 1 & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \\ C_n^1 c^n & C_{n-1}^{n-1} c^{n-1} & C_{n-2}^{n-2} c^{n-2} & \cdots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_n \\ \vdots \\ a_0 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} a_n \\ \vdots \\ a_0 \end{pmatrix}.$$

故  $f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$  在这组基下的坐标为

$$\begin{pmatrix} \lambda_n \\ \vdots \\ \lambda_0 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} a_n \\ \vdots \\ a_0 \end{pmatrix}.$$

若考察  $f_0^{(n-k-1)}(0)$ , 则有

$$f_0^{(n-k-1)}(0) = (n-k-1)! a_{n-k-1} = (n-k-1)! \lambda_{n-k-1} + \frac{(n-k)!}{1!} (0-c) \lambda_{n-k} + \cdots + \frac{n!}{(k+1)!} (0-c)^{k+1} \lambda_n$$

得  $a_{n-k-1} = \lambda_{n-k-1} + C_{n-k}^1 (-c) \lambda_{n-k} + \cdots + C_n^{k+1} (-c)^{k+1} \lambda_n$  所以有

$$\begin{pmatrix} a_n \\ \vdots \\ a_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ C_n^1 (-c) & 1 & & \\ C_n^2 (-c)^2 & C_{n-1}^1 (-c) & 1 & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \\ C_n^1 (-c)^n & C_{n-1}^{n-1} (-c)^{n-1} & C_{n-2}^{n-2} (-c)^{n-2} & \cdots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_n \\ \vdots \\ \lambda_0 \end{pmatrix} = B \begin{pmatrix} \lambda_n \\ \vdots \\ \lambda_0 \end{pmatrix}$$

则  $f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$  在这组基下的坐标为

$$\begin{pmatrix} \lambda_n \\ \vdots \\ \lambda_0 \end{pmatrix} = B^{-1} \begin{pmatrix} a_n \\ \vdots \\ a_0 \end{pmatrix}.$$