

# 2021 秋高等代数课后习题

## 第六次作业

### 习题 2.8 第 1 题

利用过  $A, B$  点的一般的圆方程

$$\lambda(x^2 + y^2 - x + 2y - 10) + (x^2 + y^2 + 3x - 4y - 1) = 0$$

令其过点  $C = (2, 0)$ , 解出  $\lambda = 9/8$ 。再代入上述方程得

$$x^2 + y^2 + \frac{15}{17}x - \frac{14}{17}y - \frac{98}{17} = 0$$

### 习题 2.8 第 2 题

由  $x^2 = 5x - 6$  解得  $x = 2, 3$ 。于是,  $a_n = \alpha 2^n + \beta 3^n$ 。利用  $a_1 = a_2 = 1$  的条件解得  $\alpha = 1, \beta = -1/3$ 。所以有

$$a_n = 2^n - 3^{n-1}$$

### 习题 2.8 第 3 题

一般给定  $n$  个点  $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ ,  $x_1, \dots, x_n$  互不相同, 则有拉格朗日插值多项式

$$L(x) = \sum_{i=1}^n y_i \ell_i(x)$$

$$\text{其中, } \ell_i(x) = \prod_{\substack{1 \leq m \leq n \\ m \neq i}} \frac{x - x_m}{x_i - x_m} = \frac{(x - x_0)}{(x_i - x_0)} \cdots \frac{(x - x_{i-1})}{(x_i - x_{i-1})} \frac{(x - x_{i+1})}{(x_i - x_{i+1})} \cdots \frac{(x - x_n)}{(x_i - x_n)},$$

满足  $L(x_i) = y_i, i = 1, \dots, n$ 。本题对应的拉格朗日插值多项式为  $f(x) = L(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x + 1$ 。当然也存在更高次多项式满足题目条件。

任取满足题设条件的多项式  $f(x)$ , 考察  $g(x) = f(x) - L(x)$ 。1, 2, 3 是  $g(x)$  的根, 于是存在  $h(x)$  使得

$$g(x) = f(x) - L(x) = (x - 1)(x - 2)(x - 3)h(x)$$

于是在  $\mathbb{R}[X]$  中有

$$f(x) \equiv L(x) \pmod{(x - 1)(x - 2)(x - 3)}$$

由于  $f(X)$  在  $\mathbb{R}[x]$  中利用辗转相除法除以  $(x - 1)(x - 2)(x - 3)$  所得的商多项式与余多项式都是整系数的, 所以上式不可能成立。

习题 3.1 第 2 题 (1)

$$\tau(n(n-1)\cdots 21) = (n-1) + \cdots + 1 = \frac{n(n-1)}{2}$$

于是  $n(n-1)\cdots 21$  是偶排列, 当且仅当  $n(n-1) \equiv 0 \pmod{4}$ , 即  $n \equiv 0, 1 \pmod{4}$

习题 3.1 第 3 题

令  $A$  为每个位置元素值都为 1 的  $n$  阶方阵, 那么

$$0 = \det(A) = \text{偶排列个数} - \text{奇排列个数}$$

$$\text{所以 偶排列个数} = \text{奇排列个数} = \frac{\text{全体排列个数}}{2} = \frac{n!}{2}$$

习题 3.1 第 5 题

$x^4$  的项: 由于后 3 列只有一个  $x$ , 于是必须选择  $(2, 2), (3, 3), (4, 4)$  位的  $x$ , 剩余只能选择  $(1, 1)$  位的  $x$ 。于是  $x^4$  的项为  $x^4$ 。

$x^3$  的项: 由于后 3 列只有一个  $x$ , 如果都选择相应位置的  $x$ , 剩余只能选择  $(1, 1)$  位的  $x$ , 那么会得到  $x^4$ 。于是后 3 列只能选取 2 个  $x$ , 以下是可行的组合:

- $(2, 2), (3, 3), (4, 1)$  选取  $x$ , 相应的项为  $(-1)^{\tau(4231)} 3x^3$ .
- $(3, 3), (4, 4), (2, 1)$  选取  $x$ , 相应的项为  $(-1)^{\tau(2134)} x^3$ .

于是  $x^3$  的项为  $-3x^3 - x^3 = -4x^3$ 。