

Mass-action model
Szyszkowski–Langmuir isotherm
Surface-tension data range
a
PFOA, 10 mM NaCl
$k_{aw,MA} = 1.70 \times 10^{-4}$ m
$k_{aw,SL} = 1.86 \times 10^{-5}$ m
b
PFOA, 50 mM NaCl
$k_{aw,MA} = 1.87 \times 10^{-4}$ m
$k_{aw,SL} = 6.06 \times 10^{-5}$ m
c
PFHxA, 100 mM NaCl
$k_{aw,MA} = 5.50 \times 10^{-6}$ m
$k_{aw,SL} = 2.04 \times 10^{-6}$ m
d
PFHxA, 200 mM NaCl
$k_{aw,MA} = 6.68 \times 10^{-6}$ m
$k_{aw,SL} = 3.61 \times 10^{-6}$ m
e
PFOS, 1 mM NaCl
$k_{aw,MA} = 4.78 \times 10^{-3}$ m
$k_{aw,SL} = 4.56 \times 10^{-5}$ m
f
PFOS, 10 mM NaCl
$k_{aw,MA} = 4.89 \times 10^{-3}$ m
$k_{aw,SL} = 3.09 \times 10^{-4}$ m
$d\Gamma/dc_{1,0}$ (m)
PFAS concentration (mg L^{-1})