

# Exercicio Aula 11 e 12 Delineamento

Davi Wentrick Feijó

2023-05-06

## Exercicio 1:

Uma quimica deseja testar o efeito de quatro agentes na resistencia de um determinado tipo de tecido. Porque pode haver variabilidade de um rolo de tecido para outro, a quimica decide usar um delineamento de blocos casualizados. Sendo que, os rolos de tecido serao considerados como blocos. Ela seleciona cinco rolos e aplica todos os quatro produtos quimicos em ordem aleatoria para cada rolo. Na Tabela 1 estao os resultados das resistencias resultante.

```
produtos = c(1,2,3,4)
rolo_1 = c(73,73,75,73)
rolo_2 = c(68,67,68,71)
rolo_3 = c(74,75,78,75)
rolo_4 = c(71,72,73,75)
rolo_5 = c(67,70,68,69)

dados = data.frame(produtos,rolo_1,rolo_2,rolo_3,rolo_4,rolo_5)
kable(dados)
```

produtos	rolo_1	rolo_2	rolo_3	rolo_4	rolo_5
1	73	68	74	71	67
2	73	67	75	72	70
3	75	68	78	73	68
4	73	71	75	75	69

Para trabalhar com os dados precisamos formatar eles de forma que fiquem na forma long por meio da funcao `pivot_longer()`

```
#padronizando o data frame para analise
```

```
dados_long = dados %>%  
  pivot_longer(cols = c(rola_1,rolo_2,rolo_3,rolo_4,rolo_5), values_to = "values", names_to = "blocos")  
  mutate(produtos = as.factor(produtos))  
  
kable(dados_long)
```

produtos	blocos	values
1	rolo_1	73
1	rolo_2	68
1	rolo_3	74
1	rolo_4	71
1	rolo_5	67
2	rolo_1	73
2	rolo_2	67
2	rolo_3	75
2	rolo_4	72
2	rolo_5	70
3	rolo_1	75
3	rolo_2	68
3	rolo_3	78
3	rolo_4	73
3	rolo_5	68
4	rolo_1	73
4	rolo_2	71
4	rolo_3	75
4	rolo_4	75
4	rolo_5	69

### 1.1) O modelo considerado e as hipoteses de interesse

**1.2) A tabela de análise de variancia e suas conclusões** Para realizar a tabela da ANOVA é necessário calcular a soma de quadrados, graus de liberdade, quadrados medios para o tratamento, bloco e residuo. Alem do valor F e p-valor do teste anova e do teste para blocos.

A soma de quadrados do modelo que iremos utilizar (com blocos) pode ser escrito como:

$$SQ_{Total} = SQ_{Tratamento} + SQ_{Bloco} + SQ_{Residuo}$$

$$\sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b (Y_{ij} - \bar{Y}_{..})^2 = b \sum_{i=1}^a (Y_{i.} - \bar{Y}_{..})^2 + a \sum_{j=1}^b (Y_{.j} - \bar{Y}_{..})^2 + \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b (Y_{ij} - Y_{.j} - Y_{i.} + \bar{Y}_{..})^2$$

$$SQ_{Total} = \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b (Y_{ij} - \bar{Y}_{..})^2$$

$$SQ_{Tratamento} = b \sum_{i=1}^a (Y_{i.} - \bar{Y}_{..})^2$$

$$SQ_{Bloco} = a \sum_{j=1}^b (Y_{.j} - \bar{Y}_{..})^2$$

$$SQ_{Residuo} = \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b (Y_{ij} - Y_{.j} - Y_{i.} + \bar{Y}_{..})^2$$

Aqui vamos definir nosso  $a$  e  $b$  que sao a quantiade de tratamentos e de blocos respectivamente

```
# quantidade de blocos e tratamentos
t = length(unique(dados_long$produtos)) #tratamentos
b = length(unique(dados_long$blocos)) #blocos
```

Em seguida podemos calcular a media geral e as somas de quadrados

```
#soma de quadrados
media_total <- mean(dados_long$values)

ssqtot = sum((dados_long$values - media_total)^2)
ssqtrat = sum((tapply(dados_long$values,dados_long$produtos,mean) - media_total)^2) * b
ssqblocos = sum((tapply(dados_long$values,dados_long$blocos,mean) - media_total)^2) * t
ssqres = ssqtot-ssqtrat-ssqblocos
```

Para calcular os quadrados médios do total, tratamento e resíduos podemos seguir as seguinte formulas:

$$QM_{Tratamento} = \frac{SQ_{Tratamento}}{a - 1} = \frac{b \sum_{i=1}^a (Y_{i.} - \bar{Y}_{..})^2}{a - 1} = \frac{b \sum_{i=1}^a \tau^2}{a - 1}$$

$$QMBloco = \frac{SQ_{Bloco}}{b - 1} = \frac{a \sum_{j=1}^b (Y_{.j} - \bar{Y}_{..})^2}{b - 1} = \frac{b \sum_{i=1}^a \beta^2}{a - 1}$$

$$QMR_{Residuo} = \frac{SQ_{Residuo}}{(a - 1)(b - 1)} = \frac{\sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b (Y_{ij} - Y_{.j} - Y_{i.} + \bar{Y}_{..})^2}{(a - 1)(b - 1)} = \frac{b \sum_{i=1}^a \epsilon^2}{(a - 1)(b - 1)}$$

Calculando os graus de liberdade dos blocos, tratamentos, e o total!

```
#graus de liberdade
glb = (b-1)
glt = (t-1)
glr = glb*glt
gltot = (b*t)-1
```

Agora podemos encontrar os quadrados médios

```
#quadrados medios
qmtrat = ssqtrat/glt
qmbloco = ssqblocos/glb
qmres = ssqres/glr
```

Sendo assim, para testar a igualdade das medias de tratamento, a estatística de teste é definida por:

$$F_0 = \frac{QMTratamento}{QMResiduo} \sim F_{a-1,(a-1)(b-1)}$$

É possível seguir a mesma ideia da estatística de teste para efeito de bloco. Então, tem-se que:

$$F_0 = \frac{QMBloco}{QMResiduo} \sim F_{b-1,(a-1)(b-1)}$$

```
# valor F observado
f_obs = qmtrat/qmres
f_obs_blocos = qmbloco/qmres
```

```
#valor critico de 5%
alfa = 0.05
f_crit = qf(alfa,glr,glr)
f_crit_bloco = qf(alfa,glb,glr)
```

```
#p-valor observado
f_value = round(pf(f_obs,glr,glr,lower.tail = FALSE),3)
f_value_blocos = round(pf(f_obs_blocos,glb,glr,lower.tail = FALSE),7)
```

```

# Tabela da ANOVA
anova_table <- data.frame(Fonte_de_variacao = c("Produto", "Rolo de tecido", "Residuos", "Total"),
                           GL = c(glt, glb, glr, gltot),
                           SS = c(ssqtrat, ssqblocos, ssqres, ssqtot),
                           MQ = c(round(qmtrat,2), round(qmbloco,2), round(qmres,2), ''),
                           F = c(round(f_obs,3),round(f_obs_blocos,3),'', ''),
                           Pf = c(f_value, f_value_blocos, "", ''),
                           stringsAsFactors = FALSE)

rownames(anova_table) <- NULL

anova_table

```

```

##  Fonte_de_variacao GL    SS    MQ    F      Pf
## 1      Produto   3  12.95  4.32  2.376   0.121
## 2   Rolo de tecido  4 157.00 39.25 21.606 2.06e-05
## 3     Residuos  12  21.80  1.82
## 4          Total  19 191.75

```

### 1.3) Os pressupostos necesarios foram atendidos ?

Para verificar os pressupostos temos que calcular os residuos e testar normalidade deles. Vamos aproveitar e calcular nossos estimadores para  $\mu$ ,  $\tau_i$  e  $\beta_j$ . E isso poder ser feito por meio das seguintes formulas deduzidas por meio dos quadrados médios:

$$\hat{\mu} = \bar{Y}_{..} \quad \hat{\tau} = \bar{Y}_{i.} - \bar{Y}_{..} \quad \hat{\beta} = \bar{Y}_{.j} - \bar{Y}_{..}$$

```
#nossos estimadores
media_total = mean(dados_long$values)

trat_media = tapply(dados_long$values,dados_long$produtos,mean) - media_total

blocos_media = tapply(dados_long$values,dados_long$blocos,mean) - media_total
```

Aqui temos a tabela com os valores observados, valores esperados e os residuos por meio do modelo! e sabendo que os residuos sao definidos por:

$$e_{ij} = Y_{ij} - \hat{Y}_{ij}$$

```
#calculando os residuos
dados_long = dados_long %>%
  mutate(media_trat = ave(values, produtos, FUN = mean) - mean(values),
         media_bloco = ave(values, blocos, FUN = mean) - mean(values),
         y_obs = mean(values) + media_trat + media_bloco,
         residuo = values - y_obs,
         residuo_normalizado = residuo/qmres)

kable(dados_long)
```

produtos	blocos	values	media_trat	media_bloco	y_obs	residuo	residuo_normalizado
1	rolo_1	73	-1.15	1.75	72.35	0.65	0.3577982
1	rolo_2	68	-1.15	-3.25	67.35	0.65	0.3577982
1	rolo_3	74	-1.15	3.75	74.35	-0.35	-0.1926606
1	rolo_4	71	-1.15	1.00	71.60	-0.60	-0.3302752
1	rolo_5	67	-1.15	-3.25	67.35	-0.35	-0.1926606
2	rolo_1	73	-0.35	1.75	73.15	-0.15	-0.0825688
2	rolo_2	67	-0.35	-3.25	68.15	-1.15	-0.6330275
2	rolo_3	75	-0.35	3.75	75.15	-0.15	-0.0825688
2	rolo_4	72	-0.35	1.00	72.40	-0.40	-0.2201835
2	rolo_5	70	-0.35	-3.25	68.15	1.85	1.0183486
3	rolo_1	75	0.65	1.75	74.15	0.85	0.4678899
3	rolo_2	68	0.65	-3.25	69.15	-1.15	-0.6330275
3	rolo_3	78	0.65	3.75	76.15	1.85	1.0183486
3	rolo_4	73	0.65	1.00	73.40	-0.40	-0.2201835
3	rolo_5	68	0.65	-3.25	69.15	-1.15	-0.6330275
4	rolo_1	73	0.85	1.75	74.35	-1.35	-0.7431193
4	rolo_2	71	0.85	-3.25	69.35	1.65	0.9082569
4	rolo_3	75	0.85	3.75	76.35	-1.35	-0.7431193
4	rolo_4	75	0.85	1.00	73.60	1.40	0.7706422
4	rolo_5	69	0.85	-3.25	69.35	-0.35	-0.1926606

Agora podemos realizar nossos testes de normalidade e de igualdade de variancias

```
shapiro.test(dados_long$residuo)
```

```
##  
## Shapiro-Wilk normality test  
##  
## data: dados_long$residuo  
## W = 0.8996, p-value = 0.04054
```

```
leveneTest(residuo ~ produtos, dados_long)
```

```
## Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)  
##      Df F value Pr(>F)  
## group 3  0.8895 0.4677  
##      16
```

```
#pressuposto de modelo aditivo
```



1.4) Qual a proporção da variacao total explicada pelo modelo ajustado no item 1.2?

```
var_exp = 1 - (ssqres/ssqtot)
cat("A variancia explicada pelo modelo é", var_exp)
```

```
## A variancia explicada pelo modelo é 0.8863103
```

1.5) Considerando que o objetivo do experimento é maximizar a variável resposta, qual é o elemento químico que deve ser recomendado? Use teste de Tukey para subsidiar sua resposta.

1.6) Refaca as contas necessarias para responder os itens (1.2), (1.3) e (1.6) utilizando as funcoes aov e TukeyHSD e confira com os resultados obtidos.

```
# anova no r para compara os valores
```

```
aov_res = aov(dados_long$values ~ dados_long$produtos+dados_long$blocos)
```

```
aov_res %>% summary()
```

```
##              Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
## dados_long$produtos  3  12.95    4.32    2.376    0.121
## dados_long$blocos    4 157.00   39.25   21.606 2.06e-05 ***
## Residuals           12  21.80    1.82
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

```
#teste de tukey no R
```

```
TukeyHSD(aov_res)
```

```
##      Tukey multiple comparisons of means
##      95% family-wise confidence level
##
## Fit: aov(formula = dados_long$values ~ dados_long$produtos + dados_long$blocos)
##
## $'dados_long$produtos'
##      diff      lwr      upr      p adj
## 2-1  0.8 -1.7308322  3.330832 0.7852734
## 3-1  1.8 -0.7308322  4.330832 0.2042593
## 4-1  2.0 -0.5308322  4.530832 0.1417326
## 3-2  1.0 -1.5308322  3.530832 0.6540138
## 4-2  1.2 -1.3308322  3.730832 0.5182726
## 4-3  0.2 -2.3308322  2.730832 0.9952030
##
## $'dados_long$blocos'
##      diff      lwr      upr      p adj
## rolo_2-rolo_1 -5.00 -8.037831 -1.9621691 0.0015656
## rolo_3-rolo_1  2.00 -1.037831  5.0378309 0.2814173
## rolo_4-rolo_1 -0.75 -3.787831  2.2878309 0.9295872
## rolo_5-rolo_1 -5.00 -8.037831 -1.9621691 0.0015656
## rolo_3-rolo_2  7.00  3.962169 10.0378309 0.0000717
## rolo_4-rolo_2  4.25  1.212169  7.2878309 0.0056966
## rolo_5-rolo_2  0.00 -3.037831  3.0378309 1.0000000
## rolo_4-rolo_3 -2.75 -5.787831  0.2878309 0.0830636
## rolo_5-rolo_3 -7.00 -10.037831 -3.9621691 0.0000717
## rolo_5-rolo_4 -4.25 -7.287831 -1.2121691 0.0056966
```

```
#teste de kruskall-wallis
```

```
kruskal.test(dados_long$values ~ dados_long$produtos)
```

```
##
## Kruskal-Wallis rank sum test
##
## data:  dados_long$values by dados_long$produtos
## Kruskal-Wallis chi-squared = 1.5008, df = 3, p-value = 0.6821

# 1.7) Determine a probabilidade do erro tipo 2 para o caso de: (t1 = -1.5, t2 = 0, t3 = 0, t4 = 1.5).
alpha = 0.05
taui = c(-1.5,0,0,1.5)

sigma2 = qmres

delta = b*sum(taui^2/sigma2)

fcrit = qf(1-alpha,t-1,(t-1)*(b-1))

beta = pf(q = fcrit,df1 = t-1,df2 = (t-1)*(b-1), ncp = delta)

poder = 1 - beta
poder

## [1] 0.7077324
```

1.8) Para os valores de  $\tau$  considerados no item anterior, determine qual deve ser o número de blocos para que o erro tipo 2 seja inferior a 10%?

*#vamos aumentando o número de blocos (b) até mudar a porcentagem*