



DOCUMENTO DE ORIENTAÇÃO

Guia ao Usuário PrEP — leia com atenção e guarde para consulta futura

PACIENTE

João da Silva Teste

CPF 123.456.789-09

DOCUMENTOS QUE VOCÊ RECEBEU

Junto deste guia você recebeu os seguintes documentos digitais, todos assinados com certificado ICP-Brasil (validade jurídica nacional — Resolução CFM 2.299/2021 e Medida Provisória 2.200-2/2001):

- Receita PrEP**
Apresente em qualquer farmácia ou na UDM do SUS para retirar o medicamento.
- Cadastro de Usuário SUS PrEP**
Necessário apenas na primeira retirada na UDM do SUS.
- Ficha de Atendimento PrEP**
Registra esta consulta — leve a cada retirada na UDM.
- Pedido de Exames Completo**
Exames laboratoriais para avaliação clínica geral.
- Pedido de Anti-HIV**
Use a cada 3 meses para acompanhamento (obrigatório antes da próxima retirada).
- Pedido de Sorológicos IST**
Sífilis, Hepatites, Clamídia, Gonorréia — repetir a cada 3 a 6 meses conforme exposição.
- Pedido de Densitometria Óssea**
Uso contínuo de Tenofovir (TDF) — repetir anualmente.

COMO RETIRAR SUA MEDICAÇÃO

Opção 1 — Farmácia particular

Apresente a Receita PrEP em qualquer farmácia ou drogaria do Brasil. A assinatura ICP-Brasil tem validade nacional — você pode comprar onde for mais conveniente.

Opção 2 — Rede pública (SUS) — gratuito

Compareça à Unidade Dispensadora de Medicamentos (UDM) levando os documentos abaixo. Encontre a UDM mais próxima em: azt.aids.gov.br

Primeira retirada:

- Cadastro de Usuário SUS PrEP (gerado pelo Facilita PrEP)
- Receita PrEP (gerada pelo Facilita PrEP)
- Ficha de Atendimento PrEP (gerada pelo Facilita PrEP)
- Resultado do exame Anti-HIV recente (até 7 dias)
- Documento oficial com foto

Próximas retiradas:

- Receita PrEP
- Ficha de Atendimento PrEP da consulta atual
- Resultado do exame Anti-HIV recente (até 7 dias)
- Documento oficial com foto



CRONOGRAMA DE EXAMES

Anti-HIV (4ª geração)	A cada 3 meses (obrigatório antes de cada retirada)
Sorológicos IST	A cada 3 a 6 meses, conforme exposição
Função renal (creatinina, ureia, EAS)	A cada 6 meses durante uso de TDF
Função hepática (TGO, TGP, gama GT)	A cada 6 meses
Densitometria óssea	A cada 12 meses durante uso de TDF
Hepatite B (HBsAg, Anti-HBs)	No início — verificar imunidade/vacinação

! **IMPORTANTE:** o resultado Anti-HIV recente (até 7 dias) é obrigatório para a próxima retirada na UDM.

COMO TOMAR A PrEP

Sua modalidade: PrEP diária

- 1 comprimido todos os dias, em horário fixo
- Proteção máxima após 7 dias (sexo anal) ou 20 dias (sexo vaginal)
- Não interrompa sem orientação médica
- Se esquecer uma dose: tome assim que lembrar (até 12h depois). Pulou mais de um dia? Procure orientação

SINAIS DE ALERTA — PROCURE ATENDIMENTO

- Sintomas gripais (febre, gânglios, garganta) nas primeiras 4 semanas — pode indicar infecção pelo HIV
- Dor abdominal forte, urina escura ou olhos amarelados — possível alteração hepática
- Vômito persistente ou diarreia por mais de 7 dias
- Esquecer doses por mais de 3 dias seguidos
- Reação alérgica (urticária, inchaço, falta de ar)
- Sintomas urinários ou corrimento — pode ser IST

CONTATO DA CLÍNICA

Iaso Saúde Hospital Dia

SHLS Quadra 716, Conjunto A, Consultórios 607 e 609, Parte B, S/N — 6º Andar

Asa Sul — Brasília/DF · CEP 70390-700

Telefone: (61) 4042-7188

E-mail: contato@atossaudeintegrada.com.br

Médico responsável técnico: Dr. Werciley Saraiva Vieira Júnior — CRM/DF 16381

