

Schrödingergleichung

Suchen Bewegungsgleichung für $\psi(\vec{r}, t)$. Forderungen:

1. DGL 1. Ordnung in der Zeit, damit $\psi(\vec{r}, t)$ durch die Anfangsverteilung $\psi(\vec{r}, t=0)$ bestimmt ist.
2. Sie muss linear in ψ sein, damit Superpositionsprinzip gilt (d.h. Linearkombination von Lösungen stellen wieder Lösungen dar \rightarrow deshalb treten Interferenzeffekte auf wie in der Optik. (Optik: Diese folgen aus der Linearität der Maxwellgleichungen))
3. Sie muss homogen sein, damit $\int_{-\infty}^{\infty} d^3r |\psi(\vec{r}, t)|^2 = 1$ für alle Zeiten erfüllt bleibt.
4. Die ebenen Wellen $\psi(\vec{r}, t) = c \cdot e^{\frac{i}{\hbar}(\vec{p} \cdot \vec{r} - \frac{p^2}{2m}t)}$ sollen Lösungen der Gleichung sein.
Für diese ebenen Wellen gilt:

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial t} \psi(\vec{r}, t) &= -\frac{i}{\hbar} \cdot \frac{p^2}{2m} \psi(\vec{r}, t) \\ &= -\frac{i}{\hbar} \cdot \frac{p^2}{2m} \psi(\vec{r}, t) \cdot \frac{\hbar^2}{\hbar^2} \\ &= \frac{i\hbar}{2m} \cdot \underbrace{\frac{(ip)^2}{\hbar^2}}_{\nabla^2 \psi(\vec{r}, t)} \psi(\vec{r}, t) \\ &= \frac{i\hbar}{2m} \nabla^2 \psi(\vec{r}, t)\end{aligned}$$

Aus 1.-4. erhalten wir die zeitabhängige Schrödingergleichung für ein freies Teilchen:

$$\boxed{i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\vec{r}, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi(\vec{r}, t)} \quad (1)$$

Annahme: Teilchen der Masse m unterliegt einem Potential $V(\vec{r}, t)$

$$\begin{aligned}i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(\vec{r}, t) &= -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \Psi(\vec{r}, t) + V(\vec{r}, t) \Psi(\vec{r}, t) \\ &= \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\vec{r}, t) \right] \Psi(\vec{r}, t)\end{aligned}$$