

Zustandsdichte für freie Teilchen mit $\epsilon(\vec{k}) = \frac{\hbar^2 \vec{k}^2}{2m}$

$$\mathcal{N}(\epsilon) = \frac{1}{V} \sum_{\vec{k}} \delta(\epsilon - \epsilon(\vec{k})) \text{ mit } \frac{1}{L^d} \sum_{\vec{k}} \xrightarrow{L \rightarrow \infty} \int \frac{d^d k}{(2\pi)^d}$$

$$\mathcal{N}(\epsilon) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d^d k}{(2\pi)^d} \delta(\epsilon - \epsilon(\vec{k}))$$

$d = 1 :$	$\mathcal{N}(\epsilon) = 2 \frac{\sqrt{2m}}{2\pi\hbar} \epsilon^{-\frac{1}{2}}(\vec{k}) \sim \frac{1}{\sqrt{\epsilon}}$
$d = 2 :$	$\mathcal{N}(\epsilon) = \frac{m}{\pi\hbar^2} = \text{const}$
$d = 3 :$	$\mathcal{N}(\epsilon) = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} \sqrt{\epsilon(\vec{k})} \sim \sqrt{\epsilon}$