

Bosonen $\epsilon(\vec{k}) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$, $\{\alpha\} = \{n_{\vec{k}_1}, n_{\vec{k}_2} \dots\}$, $n_{\vec{k}_1}, n_{\vec{k}_2} \dots \in \mathbb{N} \cup \{0\}$

Mit Teilchenzahl $N_\alpha = \sum_{\vec{k}} n_{\vec{k}}$ und Energie $E_\alpha = \sum_{\vec{k}} \epsilon(\vec{k}) n_{\vec{k}}$

$$Z_G = \sum_{\alpha} e^{-\beta(E_\alpha - \mu N_\alpha)} = \prod_{\vec{k}} \sum_{n_{\vec{k}=0}}^{\infty} e^{-\beta(\epsilon(\vec{k}) - \mu)n_{\vec{k}}} = \prod_{\vec{k}} \frac{1}{1 - e^{-\beta(\epsilon(\vec{k}) - \mu)}}$$

$$U = - \left(\frac{\partial}{\partial \beta} \ln(Z_G) \right)_{\beta\mu} = \sum_{\vec{k}} \epsilon(\vec{k}) \frac{1}{e^{\beta(\epsilon(\vec{k}) - \mu)} - 1} = \sum_{\vec{k}} \epsilon(\vec{k}) \underbrace{g(\epsilon(\vec{k}) - \mu)}_{BE-Vert.fn}$$

