

Короткие ответы к задачам М1–М5

М1. Разностные ЛОС с постоянными коэффициентами

Задача 1

$$y_{t+4} - 2y_{t+3} - y_{t+2} + 2y_{t+1} = 3 \cdot 2^t + (t^2 - 1)(-1)^t + 5.$$

Характеристический многочлен: $(r - 2)(r - 1)(r + 1)r$.

$$y_t = C_0 0^t + C_1 1^t + C_2 (-1)^t + C_3 2^t + \frac{1}{4} t 2^t + (-1)^t \left(\frac{1}{18} t^3 - \frac{7}{18} t^2 + \frac{35}{54} t \right) - \frac{5}{2} t.$$

Задача 2

$$y_{t+5} + y_{t+4} - 6y_{t+3} - 6y_{t+2} + 8y_{t+1} + 8y_t = 2^t \cos \frac{\pi t}{2} + t 3^t.$$

Корни ЛОС: $r \in \{2, -1, -2, \sqrt{2}, -\sqrt{2}\}$.

$$y_t = C_1 2^t + C_2 (-1)^t + C_3 (-2)^t + C_4 (\sqrt{2})^t + C_5 (-\sqrt{2})^t + 2^t \left(\frac{1}{240} \cos \frac{\pi t}{2} + \frac{1}{120} \sin \frac{\pi t}{2} \right) + 3^t \left(\frac{1}{140} t - \frac{969}{19600} \right).$$

Примечание. Для однозначности решения нужна ещё одна нач. величина (порядок 5).

Задача 3

$$y_{t+3} - 3y_{t+2} + 3y_{t+1} - y_t = (t^2 + 4) \cdot 1^t + t(-2)^t.$$

Левая часть $(E - 1)^3$. Общее решение:

$$y_t = A + Bt + Ct^2 + \left(\frac{1}{60} t^5 - \frac{1}{8} t^4 + t^3 \right) + (-2)^t \left(-\frac{1}{27} t + \frac{2}{27} \right).$$

М2. Синтез разностного уравнения

Задача 1

Частные решения: 2^t , $t2^t$, $(-2)^t \sin \frac{\pi t}{3}$.

Ответ: характеристический многочлен

$$(r - 2)^2 (r^2 + 2r + 4),$$

уравнение минимального порядка 4:

$$y_{t+4} - 2y_{t+3} - 8y_{t+1} + 16y_t = 0.$$

Задача 2

Решения: 3^t , $t3^t$, $2^t \cos \frac{\pi t}{4}$, $2^t \sin \frac{\pi t}{4}$.

Ответ: многочлен

$$(r-3)^2(r^2 - 2\sqrt{2}r + 4),$$

порядок 4 (коэффициенты допускают $\sqrt{2}$).

Задача 3

Решения: $(-1)^t$, $t(-1)^t$, $t^2(-1)^t$, 5^t .

Ответ: многочлен

$$(r+1)^3(r-5) = r^4 - 2r^3 - 12r^2 - 14r - 5,$$

соответствующее ЛОС:

$$y_{t+4} - 2y_{t+3} - 12y_{t+2} - 14y_{t+1} - 5y_t = 0.$$

М3. Нелинейные 2D: равновесия и типы (гиперболика)

Задача 1

$$\dot{x} = y - x + x^2 + xy, \quad \dot{y} = -x + 2y - xy.$$

Равновесия:

$$(0, 0), \quad (2 - \sqrt{3}, 2/\sqrt{3} - 1), \quad (2 + \sqrt{3}, -1 - 2/\sqrt{3}).$$

Типы:

$$(0, 0) — \text{седло}; \quad (2 - \sqrt{3}, 2/\sqrt{3} - 1) — \text{неустойчивый фокус}; \\ (2 + \sqrt{3}, -1 - 2/\sqrt{3}) — \text{седло}.$$

Задача 2

$$\dot{x} = ay + x(r^2 - 1), \quad \dot{y} = -ax + y(r^2 - 1), \quad r^2 = x^2 + y^2.$$

В начале координат: $J = \begin{pmatrix} -1 & a \\ -a & -1 \end{pmatrix}$, $\text{tr} = -2$, $\det = 1 + a^2 > 0$, $D < 0 \Rightarrow$ **устойчивый фокус** при любом a .

Задача 3

$$\dot{x} = 2y - x - 2, \quad \dot{y} = -2x + y - 2.$$

Единственное равновесие $(-\frac{2}{3}, \frac{2}{3})$. Линеаризация: $J = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$, $\text{tr} = 0$, $\det = 3 > 0$, $D < 0 \Rightarrow$ **центр**.

М4. Линейные ОДУ-2: снятие y' , вронскиан, нули

Задача 1

$$y'' + \frac{2}{x}y' - \left(\frac{5}{x^2} + 1\right)y = 0, \quad x > 0.$$

$$\phi = x^{-1}, \quad z = y/\phi, \quad z'' + Qz = 0 \text{ с } Q = -\frac{5}{x^2} - 1 \leq 0.$$

$W(x) = W(1)x^{-2}$. Любое нетривиальное решение имеет ≤ 1 нуль на $(0, \infty)$.

Задача 2

$$y'' + 4y' + (3 + e^{-x})y = 0.$$

$$\phi = e^{-2x}, \quad Q = e^{-x} - 1 \leq 0.$$

$W(x) = W(0)e^{-4x}$. \Rightarrow у решения ≤ 1 нуль на \mathbb{R} .

Задача 3

$$x^2y'' + \alpha xy' + \beta y = 0, \quad x > 0.$$

$$\phi = x^{-\alpha/2}, \quad Q = \frac{4\beta + 2\alpha - \alpha^2}{4x^2}.$$

$W(x) = W(x_0)(x_0/x)^\alpha$. Условие « ≤ 1 нуль»: $4\beta + 2\alpha - \alpha^2 \leq 0$.

М5. ПЧП первого порядка: $u = F(I_1, I_2)$

Задача 1

$$(x + y)u_x + (2y - x)u_y = 0.$$

Инварианты: из $\frac{dy}{dx} = \frac{2y - x}{x + y}$ при $v = y/x$ получаем

$$\int \frac{1 + v}{v^2 - v + 1} dv = -\ln|x| + C \quad \Rightarrow \quad I_1 = x \exp\left(\frac{1}{2} \ln(v^2 - v + 1) + \sqrt{3} \arctan \frac{2v-1}{\sqrt{3}}\right).$$

Второй инвариант $I_2 = z$. Итог: $u = F(I_1, I_2)$.

Задача 2

$$x u_x + y u_y + (x + y)z u_z = 0.$$

Инварианты: $I_1 = \frac{y}{x}$ (масштабность), $I_2 = z e^{-(x+y)}$. Итог: $u = F\left(\frac{y}{x}, z e^{-(x+y)}\right)$.

Задача 3

$$(2xy)u_x + (y^2 - x^2)u_y + (x - y)u_z = 0.$$

Инварианты: $I_1 = \frac{x^2 + y^2}{x}$ (при $v = y/x$ получаем $d \ln(v^2 + 1) = -d \ln x$), и $I_2 = z + \ln |x + y|$ (так как $z' = (x - y)$ и $(x + y)' = 2xy + y^2 - x^2 = (y - x)(x + y)$). Итог: $u = F\left(\frac{x^2 + y^2}{x}, z + \ln |x + y|\right)$.