



PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A MULHER

Profa. Me. Daniele Matos de Moura Brasil



PROFESSORA DANI



CURSOMS

O CURSO QUE MAIS APROVA

CURSOMS.COM.BR



SAÚDE DA MULHER - TEORIA



CURSOMS

O CURSO QUE MAIS APROVA

CURSOMS.COM.BR



POR ONDE DEVO ESTUDAR?



CURSOMS

O CURSO QUE MAIS APROVA

CURSOMS.COM.BR



https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/politicas-para-mulheres/arquivo/central-de-conteudos/publicacoes/publicacoes/2015/pnaism_pnpm-versaoweb.pdf



MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria de Atenção à Saúde
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas

Política Nacional de Atenção Integral à
Saúde da Mulher
Princípios e Diretrizes

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nac_atencao_mulher.pdf

Série C. Projetos, Programas e Relatórios



Brasília – DF




CURSOMS

O CURSO QUE MAIS APROVA

CURSOMS.COM.BR




SAÚDE DA MULHER





SAÚDE DA MULHER





SAÚDE DA MULHER

❑ SURTIU EM 2004

Objetivos Gerais:

- Promover a melhoria das condições de vida e saúde das mulheres brasileiras, mediante a garantia de direitos legalmente constituídos e ampliação do acesso aos meios e serviços de promoção, prevenção e assistência e recuperação da saúde em todo o território brasileiro.
- Contribuir para a redução da morbidade e mortalidade feminina no Brasil, especialmente por causas evitáveis, em todos os ciclos de vida e nos diversos grupos populacionais, sem discriminação de qualquer espécie.
- Ampliar, qualificar e humanizar a atenção integral à saúde da mulher no Sistema Único de Saúde.



Objetivos Específicos:

- 1 Ampliar e qualificar a atenção clínico-ginecológica, inclusive para as portadoras de infecção pelo HIV e outras DST.**
- 2 Estimular a implantação e implementação da assistência em planejamento reprodutivo para homens e mulheres, adultos e adolescentes, no âmbito da atenção integral à saúde.**
- 3 Promover a atenção obstétrica e neonatal, qualificada e humanizada, incluindo a assistência ao abortamento em condições inseguras, para mulheres e adolescentes.**
- 4 Promover a atenção às mulheres e adolescentes em situação de violência doméstica e sexual.**
- 5 Promover, conjuntamente com o Departamento Nacional de DST/Aids, a prevenção e o controle das doenças sexualmente transmissíveis e da infecção pelo HIV/Aids na população feminina.**
- 6 Reduzir a morbimortalidade por câncer na população feminina**



SAÚDE DA MULHER

Objetivos Específicos:

- 7 Implantar um modelo de atenção à saúde mental das mulheres sob o enfoque de gênero.**
- 8 Implantar e implementar a atenção à saúde da mulheres no climatério.**
- 9 Promover a atenção à saúde das mulheres idosas.**
- 10 Promover a atenção à saúde das mulheres negras.**
- 11 Promover a atenção à saúde das trabalhadoras do campo e da cidade.**
- 12 Promover a atenção à saúde das mulheres indígenas.**
- 13 Promover a atenção à saúde das mulheres em situação de prisão.**
- 14 Fortalecer a participação e o controle sociais na definição e implementação das políticas de atenção integral à saúde das mulheres.**



VACA GOCT = VAGINOSE, CANDIDÍASE, GONORRÉIA, CLAMÍDIA E TRICOMONÍASE

IST	Agente Etiológico	Características Gerais	Aspectos Gerais	Tratamento
Vaginose Bacteriana	<i>Gardnerella vaginalis</i>	- Corrimento perolado, bolhoso, de odor desagradável (quebra de amins voláteis), que exacerba característica após coito/menstruação	- pH > 4,5 - Clue Cells no exame de lâmina a fresco Teste de Whiff + (Hidróxido de Potássio a 10%)	- Metronidazol 250mg, 2 comprimidos VO, 2x/dia, por 7 dias
Candidíase	<i>Candida albicans</i> / Fungo	- Prurido, - Ardência, - Dispaurenia de introito vaginal e - Disúria externa. - Edema e fissura vulvar - Corrimento branco e grumoso, aderido a parede vaginal.	- pH vaginal NORMAL (<4,5) - Citologia a fresco: SF 0,9% e hidróxido de potássio auxiliam na visualização de esporos e hifas	- Miconazol creme a 2% ou outros derivados imidazólicos, via vaginal, um aplicador cheio, à noite ao deitar-se, por 7 dias



VACA GOCT = VAGINOSE, CANDIDÍASE, GONORRÉIA, CLAMÍDIA E TRICOMONÍASE

IST	Agente Etiológico	Características Gerais	Aspectos Gerais	Tratamento
Gonorréia	<i>Neiseria gonorrhoeae</i>	- Geralmente não produzem corrimento vaginal, mas pode ocorrer muco-pus - Friabilidade cervical - Dor a manipulação	- Sintomáticos: Identificação em meio de cultura (Gonococo) - Detecção de material genético	- Ceftriaxona 500mg, IM, dose única MAIS - Azitromicina 500mg, 2 comprimidos, VO, dose única
Clamídia	<i>Clamídia trachomatis</i>			
Tricomoníase	<i>Trichomonas vaginallis/</i> Protozoário	- Corrimento amarelo-esverdeado, por vezes acinzentado, bolhoso, espumoso e com odor fétido. - Prurido eventual	- Microulcerações: Colo de aspecto de framboesa. - pH entre 6,7 – 7,5 - Vaginose bacteriana associada. - Exame a fresco: Protozoário e leucócitos	- Metronidazol 400mg, 5 comprimidos, VO, dose única (dose total 2g)



A lista de...

SCHDL = Sífilis, Cancro Mole, Herpes, Donovanose e Linfogranuloma Venéreo

IST	Agente Etiológico	Transmissão	Classificação Clínica	
Sífilis	<i>Treponema pallidum</i> - Bactéria	Frequentemente sexual. Também pode ser transmitida verticalmente	Recente: (primária, secundária e latente recente): até um ano de evolução;	Primária: Incubação 10-90 dias, úlcera única, rica em treponemas, indolor (cancro)
		É de maior transmissibilidade nos seus ESTÁGIOS INICIAIS .	Tardia: (latente tardia e terciária): mais de um ano de evolução	Secundária: Seis semanas a seis meses após a cicatrização do cancro. Lesões cutâneas usualmente atingindo região palmar e plantar
		A infecção fetal é influenciada pelo estágio da doença na mãe (maior nos estágios primário e secundário) e pelo tempo em que o feto foi exposto	LEMBRAR: A BASE É O 1 ANO DE DURAÇÃO	Latência: Desaparecimento de sinais e sintomas. " Cura". Exames positavam. Terciária: Doença ocasionando destruição tecidual dos grandes sistemas.



A lista de...

SCHDL = Sífilis, Cancroide, Herpes, Donovanose e Linfogranuloma Venéreo

IST	Agente Etiológico	Características Gerais	Aspectos Gerais	Tratamento
Cancroide	<i>Haemophilus ducreyi</i> / Bactéria	As lesões são dolorosas, geralmente múltiplas e devidas à autoinoculação. A borda é irregular, apresentando contornos eritemato-edematosos e fundo heterogêneo. Odor fétido	O diagnóstico diferencial é feito com cancro duro (sífilis primária), herpes genital, LGV, donovanose e erosões traumáticas infectadas	Ceftriaxona 250mg, IM, dose única
Herpes	<i>HSV 1 e 2</i> / Vírus	Podem provocar lesões em qualquer parte do corpo. Há predomínio do tipo 2 nas lesões genitais e do tipo 1 nas lesões perorais.	A primoinfecção herpética tem um período de incubação médio de seis dias. Em geral, é uma manifestação mais severa de lesões. Ascende por nervos sensoriais e entra em estado latente	Aciclovir 200mg, 2 comprimidos, VO, 3x/dia, por 7-10 dia




A lista de...

SCHDL = Sífilis, Cancroide, Herpes, Donovanose e Linfogranuloma Venéreo

IST	Agente Etiológico	Características Gerais	Aspectos Gerais	Tratamento
Donovanose	Klebsiella granulomatis / Bactéria	- É pouco frequente, ocorrendo na maioria das vezes em climas tropicais e subtropicais.	- Ulceração hipertrófica, friável, evolução lenta. Aspecto espelhado.	Doxiciclina 100mg, 1 comprimido, VO, 2x/dia, por pelo menos 21 dias, ou até o desaparecimento completo das lesões
Linfogranuloma Venéreo	Chlamydia trachomatis, sorotipos L1, L2 e L3. /Bactéria	- A manifestação clínica mais comum é a linfadenopatia inguinal e/ou femoral, já que esses sorotipos são altamente invasivos aos tecidos linfáticos	- A evolução da doença ocorre em três fases: inoculação, disseminação linfática regional e sequelas	Azitromicina 500mg, 2 comprimidos, VO, 1x/semana, por 21 dias



MÉTODOS CONTRACEPTIVOS





MÉTODOS CONTRACEPTIVOS

MÉTODOS COMPORTAMENTAIS

Quando falamos de **PERCEBER QUANDO OVULAÇÃO OCORRE**, entram os métodos contraceptivos **COMPORTAMENTAIS**. Possuem base na **PERCEPÇÃO DA FERTILIDADE**.

MÉTODOS COMPORTAMENTAIS

Para isso, torna-se necessário que a mulher aprenda a reconhecer o início e o fim de sua janela fértil, além da responsabilidade compartilhada com seu parceiro, características pelas quais são também conhecidos como métodos comportamentais de abstinência periódica ou naturais. São métodos de **BAIXO CUSTO**.

MÉTODOS COMPORTAMENTAIS

- **DIAS DO CICLO MENSTRUAL**: Método rítmico do calendário (tabelinha ou Ogino-Knaus)
- **SINAIS DE FERTILIDADE**: Secreções vaginais: método da ovulação (também conhecido como método de Billings) e Temperatura corporal basal
- **CALENDÁRIO E SINAIS**: Sintotérmico



MÉTODOS CONTRACEPTIVOS

MÉTODO RITMICO DO CALENDÁRIO

- Registrar ciclo menstrual **POR PELO MENOS, SEIS MESES**
- Início do ciclo menstrual: Dia 1 da menstruação
- Final do ciclo menstrual: Último dia antes da menstruação seguinte.
- Dessa forma ela tem a avaliação da DURAÇÃO
- A mulher subtrai 18 da duração do seu ciclo mais curto, estimando, assim, o **primeiro dia de seu período fértil**.
- Também deve subtrair 11 do seu ciclo mais longo, que corresponde **ao último dia de seu período fértil**
- Exemplo: se o ciclo menstrual variou entre 26 e 32 dias durante o registro: Ciclo mais curto: $26 - 18 = 8$. A mulher deve evitar relações sexuais sem proteção a partir do 8º dia de cada ciclo (o dia 8 é o primeiro dia de abstinência). Ciclo mais longo: $32 - 11 = 21$. **Ela pode ter relações sexuais sem proteção a partir do 22º de cada ciclo** (o dia 21 é o último dia fértil). **Portanto, o casal não deve ter relação sexual com penetração vaginal do 8º ao 21º dia do ciclo (período considerado fértil)**



MÉTODOS CONTRACEPTIVOS

MÉTODO DA TEMPERATURA CORPORAL BASAL

- Logo após a ovulação, a progesterona liberada pelo corpo lúteo causa elevação da temperatura corporal em 0,2 a 0,5 graus. Na maioria das mulheres isso ocorre no meio do ciclo menstrual.
- Para utilizar este método, a mulher precisa verificar sua temperatura diariamente, da mesma maneira, **no mesmo horário pela manhã, antes de sair da cama ou ingerir alimentos**. Após três dias da elevação da temperatura, o casal pode ter relações livremente. Portanto, o período de abstinência deverá ser desde o primeiro dia do ciclo menstrual até três dias após a elevação da temperatura basal



MÉTODOS CONTRACEPTIVOS

MÉTODO DE BILLINGS

O método Billings de ovulação é uma técnica natural que tem como objetivo identificar o período fértil da mulher a partir da observação das características do muco cervical, que pode ser percebido logo na entrada na vagina, sendo assim possível prevenir ou tentar uma gravidez.





MÉTODOS CONTRACEPTIVOS

SINTOTÉRMICO

A identificação do período fértil e não fértil é realizada com a combinação dos métodos da temperatura basal e da ovulação



MÉTODOS CONTRACEPTIVOS

MÉTODOS DE BARREIRA

Os métodos de barreira são assim denominados por bloquear a ascensão dos espermatozoides para a cavidade uterina, impedindo a fecundação. Ex: Preservativo feminino/masculino/diafragma

PRESERVATIVO MASCULINO

- O uso do preservativo é recomendado em todas as relações sexuais
- Proteção contra IST's e gestações
- Deve ser colocado com o pênis ereto e seco, antes da penetração vaginal
- São fatores de risco para ruptura/deslizamento: Más condições de armazenamento, embalagem danificada, manuseio incorreto, validade comprometida, tamanho inadequado, USO DE DOIS PRESERVATIVOS, entre outros.



MÉTODOS CONTRACEPTIVOS

PRESERVATIVO FEMININO

- O uso do preservativo é recomendado em todas as relações sexuais
- Proteção contra IST's e gestações
- Não utilizar combinado com o preservativo masculino

DIAFRAGMA

- O diafragma é um dispositivo vaginal de anticoncepção, que consiste em um capuz macio de borracha, côncavo, com borda flexível, que cobre parte da parede vaginal anterior e o colo uterino.
- Servem como uma barreira mecânica à ascensão do espermatozoide da vagina para o útero.
- É necessária a medição por profissional de saúde treinado, para determinar o tamanho adequado a cada mulher. O prazo de validade do diafragma é em média de cinco anos.
- Contra indicado no contexto do HIV/AIDS



MÉTODOS CONTRACEPTIVOS

MÉTODO LAM – LACTÂNCIA COM AMENORRÉIA

- Este método fundamenta-se na hiperprolactinemia existente em resposta ao estímulo da sucção durante a amamentação e, conseqüentemente, níveis de FSH e de LH insuficientes para estimular o desenvolvimento dos folículos ovarianos.

CRITÉRIOS:

1. O bebê deve ter até os SEIS MESES de vida;
2. A nutriz deve estar em AMENORREIA; e
3. O ALEITAMENTO deve ser EXCLUSIVO (dia e noite) ou quase.

IMPORTANTE: a ausência de um destes critérios descaracteriza o AM como método contraceptivo.



MÉTODOS CONTRACEPTIVOS

DIU DE COBRE

O dispositivo intrauterino consiste em um objeto sólido de formato variável que é inserido através do colo uterino na cavidade uterina, com o objetivo de evitar a gestação. Pode ser de cobre ou hormonal.

COBRE

- Depende de uma reação de corpo estranho para sua ação contraceptiva, trata-se de reação inflamatória estéril que produz lesão tecidual mínima, porém suficiente para ser espermicida
- A presença de um corpo estranho e de cobre na cavidade endometrial causa mudanças bioquímicas e morfológicas no endométrio, além de produzir modificações no muco cervicais
- O cobre é responsável pelo aumento da produção de prostaglandinas e pela inibição de enzimas endometriais. Estas mudanças **afetam adversamente o transporte de espermatozoides, de modo a prevenir a fertilização.** Os íons de cobre também têm um efeito direto na motilidade espermática, **reduzindo a capacidade de penetração no muco cervical**



MÉTODOS CONTRACEPTIVOS

DIU DE COBRE

Pode ser considerado para qualquer mulher que esteja procurando por um método contraceptivo de confiança, reversível, independente do coito, de longo prazo. As mulheres que têm contraindicações ao estrogênio ou mulheres que amamentam podem ser boas candidatas para o uso dos DIUS

INDICAÇÕES

Adultos Jovens e Adolescentes: Este método pode ser utilizado por mulheres jovens e adolescentes, se selecionadas cuidadosamente, principalmente se estiverem em relações monogâmicas mútuas e estáveis e, portanto, com baixo risco para DSTs

Nulíparas: As mulheres nulíparas que necessitam ou desejam métodos contraceptivos não hormonais podem beneficiar-se de um DIU de cobre de tamanho menor, porém ainda pouco estudado. A expulsão é mais comum entre as nulíparas



MÉTODOS CONTRACEPTIVOS

DIU DE COBRE

Pós Parto: Mulheres pós-parto podem ser candidatas à inserção imediata (dentro de 10 a 15 minutos depois da dequitação da placenta). Na maioria dos casos, é melhor inserir o DIU após a completa involução uterina, normalmente de quatro a seis semanas pós-parto.

Nome	Composição / Como iniciar?	O que faz?	Contraindicações	O que fazer se esquecer
Anticoncepcional ORAL combinado	Estrógeno e Progesterona Iniciar entre o 1º e o 5º dia do ciclo menstrual. Pausa entre as cartelas	Impedem a ovulação: Inibem o pico do LH. Mudança do muco cervical	• Amamentação • Enxaqueca com aura • CA de mama atual • História atual de TVP • AVC prévio ou atual	1P: Tomar imediatamente 1 ou 2P: Imediato e a seguinte no horário regular 3P: Imediato e método de barreira por 7d
Minipílula (ORAL)	Progesterona. Ingerir 1 comprimido ao dia sem intervalo entre as cartelas	Espessamento do muco, redução da motilidade tubária, inibe proliferação endometrial	• CA de mama atual	Tomar uma pílula assim que possível; continuar tomando diariamente uma pílula ao dia; abster-se de atividade sexual ou usar proteção contraceptiva adicional nos dois próximos dias
Injetável Mensal	Estrógeno e Progesterona A cada 30 dias. Pode ser adiantado ou atrasado em até 7 dias	Impedem a ovulação: Inibem o pico do LH. Mudança do muco cervical	• Amamentação • Enxaqueca com aura • CA de mama atual • História atual de TVP • AVC prévio ou atual	Administrar. > 7 dias: Método de Barreira
Injetável Trimestral	Progesterona A cada 13 semanas. Adiantado ou atrasado em até 2 semanas	Espessamento do muco, redução da motilidade tubária, inibe proliferação	• CA de mama atual	Tomar a injeção independente do atraso. >2s: Método de Barreira



MÉTODOS CONTRACEPTIVOS

ANTICONCEPÇÃO DE EMERGÊNCIA

A contracepção de emergência (CE) refere-se aos métodos que podem ser utilizados por mulheres nos dias após um intercuro sexual desprotegido e que poderia ocasionar a elas uma gestação indesejada.

Método de Yuzpe: Regime contraceptivo combinado que consiste na ingestão de duas doses de 100 mcg de etinilestradiol e 500 mcg de levonorgestrel em duas tomadas; com intervalo de 12 horas; sendo a primeira tomada a mais próxima possível da atividade sexual desprotegida e, preferencialmente, no máximo após 72 horas deste

Contraceptivo com levonorgestrel isolado: Usa-se o levonorgestrel na dose de 1,5 mg em dose única ou fracionada em duas tomadas, com intervalo de 12 horas. Uma dose única de levonorgestrel é tão eficaz quanto à dose fracionada e mostra-se mais conveniente à paciente, sem aumentar os efeitos adversos



OBRIGADA



CURSOMS

O CURSO QUE MAIS APROVA

CURSOMS.COM.BR