

Analysis I

Prof. Richard Pink
HS 2010

Michal Sudwoj

9. Mai 2011

Inhaltsverzeichnis

I	Vorlesungsnotizen	5
1	Grundlagen	6
1.1	Mengen	6
1.2	Logik	8
1.2.1	Junktoren	8
1.2.2	Quantoren	8
1.3	Polarkoordinaten	9
1.3.1	Ebene Polarkoordinaten	9
1.3.2	Zylinderkoordinaten	10
1.3.3	Kugelkoordinaten	10
1.4	(vollständige) Induktion	10
2	Funktionen	13
2.1	Beschreibung von Funktionen	14
	durch ihren Graphen	14
	Fallunterscheidung	15
2.1.1	Arten, eine Funktion anzugeben	16
	Implizite Funktionen	18
	Funktionalgleichung	19
	Differentialgleichungen	20
2.2	Eigenschaften von Funktionen	20
2.3	Spezielle Definitions- und Zielbereiche, Bedeutung von Funktionen	25
2.4	Stetigkeit	29
	Grundeigenschaften	30
2.5	Grundeigenschaften von \mathbb{R}	35
2.5.1	Supremum und Infimum	36
	Charakterisierung von $\sup X$	37
	Eigenschaften	37
	Dezimalentwicklung	43
	Vektoren	43

	Standardskalarprodukt auf \mathbb{R}^n	45
3	Grenzwerte	46
	Rechnen mit Grenzwerten	55
3.1	Asymptoten	59
4	Folgen & Reihen	65
4.1	Folgen	65
4.2	Summen	67
4.2.1	Grundregeln	67
	Anwendung	68
4.3	Reihen	69
	Umordnung von Reihen	75
	Rechenregeln	78
5	Komplexe Zahlen	81
	Fibonacci-Zahlen	83
6	Potenzreihen	84
6.0.1	Bestimmung des Konvergenzradiuses	86
	Quotientenkriterium	86
	Wurzelkriterium	89
6.0.2	Binomialkoeffizient	90
6.0.3	Rechnen mit Potenzreihen	92
	Produkt	92
6.0.4	Exponentialfunktion	92
	Additionstheorem	93
	Eigenschaften	96
6.0.5	Logarithmus	96
	Rechenregeln	97
	Grenzwerte	97
6.0.6	Potenzreihenentwicklung	100
6.1	Hyperbolische Funktionen	103
6.1.1	Umkehrfunktionen	103
6.2	"Klein-o" und "Gross-O" Notation	104
	Rechenregeln	108
7	Differenzierbarkeit	109
7.0.1	Extrema	130
7.0.2	Taylor-Approximation	138
	Wie $P(x)$ finden?	139

7.1	Kurvendiskussion	154
7.1.1	Einschub: Partialbruchzerlegung	161
7.1.2	Newton Verfahren	163
8	Integral	169
8.0.3	Inhalt einer Teilmenge von \mathbb{R}^n	169
8.0.4	Grundeigenschaften	171
	Grundeigenschaften des Integrals	173
	Hauptsatz der Infinitesimalrechnung	177
	Prinzip zur Berechnung von Integralen:	180
8.1	Integrationstechniken	181
	Partielle Integration	181
	Substitution	184
	Integration von rationalen Funktionen	190
8.1.1	Uneigentliche Integrale	193
	Majorantenkriterium	195
	Minorantenkriterium	195
	Majorantenkriterium	197
	Minorantenkriterium	198
II	Übungsnotizen	200
1	Landau-Symbole	201
III	Anhänge	202
A	Vorlesungsvorlagen	203
A.1	Alphabete	204
A.2	Körper	205
A.3	Winkel und trigonometrische Funktionen	206
A.4	Grenzwert-Baukasten	207
A.5	Umordnung von Reihen	208
A.6	Beispiel zu Fourierreihen	210
A.7	Trigonometrische und Hyperbolische Funktionen	213
A.8	Ableitungen	215
A.9	Taylorapproximation der Funktionen sin und cis	216
A.10	Beispiel zum Newton-Verfahren	237
A.11	Integralen	248
A.12	Integrationstechniken	249

INHALTSVERZEICHNIS

INHALTSVERZEICHNIS

A.13 Substitutionen	250
A.14 Partialbruchzerlegung	251
Index	252
ToDo	252

Teil I

Vorlesungsnotizen

Kapitel 1

Grundlagen

1.1 Mengen

Bsp.:

$\{1, 2, 3\} = \{3, 1, 2\} = \{1, 1, 2, 3, 2\}$ 3 Elemente

Seien $x, y, z \in \mathbb{R}$. $\{x, y, z\}$ 1-3 Elemente, eg. $x = y = z$

$$\{\} = \emptyset$$

Bsp.:

Für jede natürliche Zahl n gilt $n^2 > n$

Bew.:

Sei A die Menge aller natürlichen Zahlen mit $n^2 \leq n$.

Wenn $A \neq \emptyset$, dann enthält A ein kleinstes Element.

...

$$\forall x \in \emptyset : x > x$$

$$A \times B = \{(a, b) | a \in A, b \in B\}$$

(a, b) Paar = List mit 2 Elemente

$$\{a, b\} = \{b, a\}$$

$$(a, b) \neq (b, a) \Leftrightarrow a \neq b$$

- Paar
- Tripel
- Quardupel
- Quitupel
- n-Tupel

$$A_1 \times \dots \times A_n = \{(a_1, \dots, a_n) | a_i \in A_i\} \text{ "kartesische Produkt"}$$

\mathbb{R}^n

- \cup Vereinigung
- \cap Durchschnitt
- \in Element
- \subset Inklusion (Teilmenge oder gleich)
- \setminus Differenzmenge

$$A \setminus B = \{a \in A | a \notin B\}$$

$$\mathbb{Z}^{\geq 0} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

$$\mathbb{N} = \{(0,)1, 2, 3, \dots\}$$

1.2 Logik

1.2.1 Junktoren

\wedge	und
\vee	oder
\neg	nicht
\implies	impliziert
\iff	äquivalent

1.2.2 Quantoren

\forall	für alle
\exists	es existiert
$\exists!$	es existiert genau ein

Bsp.:

$$\forall x \in \mathbb{R} : x > x \implies 2 = 0$$

$$\forall x \in \mathbb{R} : x > x \implies 2 = 2$$

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : x > y \implies x^3 > y^3$$

Jede braune Henne legt braune Eier.
Jede rosa Henne legt rosa Eier.

$$2 > 2 \implies 2 = 2$$

" $A \implies B$ " "Wenn A , dann B ." **nicht:** "Es gilt A und daher auch B ."

A	B	$A \implies B$
gilt	gilt	gilt
gilt	gilt nicht	gilt nicht
gilt nicht	gilt	gilt
gilt nicht	gilt nicht	gilt

$$(A \implies B) \iff (\neg A \vee B)$$

$$(A \iff B) \iff ((A \implies B) \wedge (B \implies A))$$

1.3 Polarkoordinaten

1.3.1 Ebene Polarkoordinaten

$$x = r \cos \varphi$$

$$y = r \sin \varphi$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\varphi'' = \arg((x, y)) \quad \text{"Argument" wohlbestimmt bis auf } 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$$

Konvention: $\varphi \leftarrow]-\pi, \pi[$

$$\varphi = \begin{cases} \arccos \frac{x}{r} & y > 0 \\ -\arccos \frac{x}{r} & y < 0 \end{cases}$$

$$\varphi = \begin{cases} \arcsin \frac{y}{r} & x > 0 \\ \pi - \arcsin \frac{y}{r} & x < 0 \end{cases}$$

Bsp.:

Spirale

$r = \text{monotone Funktion von } \varphi$

$r = a\varphi, a > 0, \varphi \geq 0$ Spirale mit konstantem Abstand

$r = ae^{b\varphi}, a, b > 0, \varphi \in \mathbb{R}$ logarithmische Spirale

1.3.2 Zylinderkoordinaten

$$x = \rho \cos \varphi$$

$$y = \rho \sin \varphi$$

$$z = z$$

$$\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\varphi = \arg((x, y))$$

$$z = z$$

1.3.3 Kugelkoordinaten

$$x = r \cos \theta \cos \varphi$$

$$y = r \cos \theta \sin \varphi$$

$$z = r \sin \theta$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

$$\varphi = \arg((x, y))$$

$$\theta = \arcsin \frac{z}{r} \quad r \geq 0, \varphi \neq 2\pi m, n \in \mathbb{Z}, \theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$$

1.4 (vollständige) Induktion

Sei $A(n)$ eine Aussage, die von einer ganzen Zahl $n \geq 0$ abhängt.

Falls: (a) $A(0)$ gilt (Induktionsverankerung)

und: (b) $\forall n : \underbrace{A(n)}_{\text{Induktionsannahme}} \implies A(n+1)$ (Induktionsschritt)

Dann gilt: $\forall n \in \mathbb{Z}^{\geq 0} : A(n)$

Für alle $n \geq 1$ und alle $x_1, \dots, x_n \in]0, 1[$ gilt
$$\prod_{k=1}^n (1 - x_k) > 1 - \sum_{k=1}^n x_k$$

Bem.: Erinnerung:

$$a, b \in \mathbb{Z}$$

$$\sum_{k=a}^b x_k = \begin{cases} 0 & a > b \\ x_a + x_{a+1} + \dots + x_b & a \leq b \end{cases}$$

$$\prod_{k=a}^b x_k = \begin{cases} 1 & a > b \\ x_a \cdot x_{a+1} \cdot \dots \cdot x_b & a \leq b \end{cases}$$

$$a \leq b \leq c$$

$$\sum_{k=a}^c x_k = \sum_{k=a}^b x_k + \sum_{k=b+1}^c x_k$$

$$\prod_{k=a}^c x_k = \prod_{k=a}^b x_k \cdot \prod_{k=b+1}^c x_k$$

$$n! = \prod_{k=1}^n k$$

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} = \prod_{i=1}^k \frac{n-i+1}{i} \quad n \geq k \geq 0$$

Kapitel 2

Funktionen

Funktionsterm = Formel

Bsp.:

$$f(x) = \frac{1}{x+1}$$

$$g(x) = 0$$

$$f(x) - f(x) \stackrel{?}{=} g(x)$$

Definitionsbereich?

$[a, b) =$
 $[a, b[$
halb-
offenes
Inter-
vall

\mapsto
wird
abge-
bildet
auf

$\{\}$ =
 \emptyset

Def.: Funktion

Eine Funktion $f : A \rightarrow B$ besteht aus:
Definitionsbereich A ,
Zielbereich B , und
einer Zuordnung eines $f(x) \in B$ für jedes $x \in A$

Bem.:Zielbereich B nicht mit Bildmenge verwechseln!**Bsp.:**

$$f : [0, \infty[\rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 0$$

Bsp.:

$$f : \emptyset \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 0 \quad B = \emptyset$$

2.1 Beschreibung von Funktionen

durch ihren Graphen

Def.: Graph

$$\text{graph}(f) := \{(a, f(a)) | a \in A\} \subset A \times B$$

Def.: Kreuzmenge

$$A \times B := \{(a, b) | a \in A, b \in B\}$$

Fallunterscheidung

Bsp.: $\text{sgn} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$\text{sgn } x = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$$

Bsp.:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{1}{x+1}$$

Fakt:

f ist durch $A, B, \text{graph}(f)$ eindeutig bestimmt, denn
 $f(a) = \text{das einzige } b \in B \text{ mit } (a, b) \in \text{graph}(f)$
 $\implies (a, b) = (a', f(a')) | a \in A$
 $\implies a = a', b = f(a') = f(a)$

Bem.:

Eine Teilmenge $\Gamma \subset A \times B$ ist der Graph einer Funktion $A \rightarrow B$ g.d., w. für jeden $a \in A$ ein eindeutiges $b \in B$ existiert mit $(a, b) \in \Gamma$

$$\forall a \in A \exists! b \in B : (a, b) \in \Gamma$$

2.1.1 Arten, eine Funktion anzugeben

- Formel
- Graph
- Wertetabelle
- Differentialgleichung
- Fallunterscheidung
- implizit
- Funktionalgleichung (Eigenschaften)

Def.: Polynomfunktion

$$f(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$$

Def.: Gebrochenrationalefunktion

$$f(x) = \frac{\sum_{i=0}^n a_i x^i}{\sum_{k=0}^m b_k x^k}$$

Def.: Potenzfunktion

$$\begin{aligned} n \in \mathbb{Z}^{\geq 0} : & \quad f(x) = x^n \\ n = 0 : & \quad f(x) = x^0 := 1 \quad |x \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

$$0^0 = 1$$

Def.: Wurzelfunktion

$$f(x) = x^{\frac{1}{m}}$$

Def.: rationale Potenzfunktion

$$f(x) = x^{\frac{n}{m}}$$

Def.: allgemeine Potenzfunktion

$$f(x) = x^a \quad |x > 0, a \in \mathbb{R}$$

Def.: algebraische Funktion

zusammengesetzt aus rationalen Funktionen und deren Umkehrfunktionen.

Def.: elementare Funktion

zusammengesetzt aus algebraischen Funktionen, exponential Funktion, trigonometrischen Funktion und deren Umkehrfunktionen.

weitere Funktionen: Bezel, Gamma

Implizite Funktionen**Bsp.:**

$$x^2 + y^2 = 1$$

$$f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \sqrt{1 - x^2}$$

$$g : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto -\sqrt{1 - x^2}$$

Prinzip:

Gegeben eine Teilmenge $C \subset \mathbb{R}^2$.

Wähle eine Teilmenge $C' \subset C$, sodass $C' = \text{graph}(f)$ für $f : I \rightarrow \mathbb{R}, I \subset \mathbb{R}, I$ Intervall

Bsp.:

$$C : x^3 + y^3 = 3xy$$

GRAPH

Funktionen:

$$f_1 : [0, \infty[\rightarrow]-\infty, 0]$$

$$f_2 : [0, a] \rightarrow [0, a]$$

$$f_3 :] - \infty, a] \rightarrow [0, \infty[$$

nicht verwechseln mit

$$g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x^3 + y^3 - 3xy$$

$$\hookrightarrow g(x, f(x)) = 0$$

$$\hookrightarrow g(h(y), y) = 0$$

Funktionalgleichung

Bsp.:

$$e^{x+y} = e^x \cdot e^y$$

$$\exp(x + y) = \exp(x) \cdot \exp(y)$$

Fakt:

Die Exponentialfunktion $\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist die einzige stetige Funktion mit $\exp(x + y) = \exp(x) \cdot \exp(y)$ und $\exp(1) = e$

Bsp.:

$$(n + 1)! = n! \cdot (n + 1)$$

Differentialgleichungen

Gleichung zwischen $x, f(x), f'(x), \dots$
Anfangswerte, um die Funktion zu bestimmen

2.2 Eigenschaften von Funktionen

Def.: Injektivität

Eine Funktion $f : X \rightarrow Y$ heisst **injektiv**, wenn

$$\forall x, x' \in X : f(x) = f(x') \implies x = x'$$

Def.: Surjektivität

Eine Funktion $f : X \rightarrow Y$ heisst **surjektiv**, wenn

$$\forall y \in Y \exists s \in X : f(s) = y$$

Def.: Bijektivität

Eine Funktion $f : X \rightarrow Y$ heisst **bijektiv**, wenn sie sowohl injektiv als auch surjektiv ist, dh.

$$\forall y \in Y \exists! x \in X : f(x) = y$$

Definitionsbereich	von f :	$\text{dom}(f)$	(domain)
Zielbereich	von f :	$\text{range}(f)$	
Bildmenge	von f :	$\text{image}(f)$	$= \{f(x) x \in X\} \subset Y$

Bem.:

$$f \text{ surjektiv} \iff \text{image}(f) = \text{range}(f)$$

Def.: Umkehrfunktion

Ist f bijektiv, so heisst die Funktion $f^{-1} : Y \rightarrow X, y \mapsto$ (das einzige $x \in X$ mit $f(x) = y$) die **Umkehrfunktion** von f .

Bem.:

$$\forall x \in X : f^{-1}(f(x)) = x$$

$$\forall y \in Y : f(f^{-1}(y)) = y$$

Bem.:

$$\begin{aligned} \text{graph}(f^{-1}) &= \{(y, f^{-1}(y)) | y \in Y\} = \{(f(x), x) | x \in X\} \\ &\implies \text{Spiegelung an der } x = y \text{ Diagonale} \end{aligned}$$

a.)	$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$	$x \mapsto \sin x$	nicht injektiv,	nicht surjektiv
b.)	$\mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$	$x \mapsto \sin x$	nicht injektiv,	surjektiv
c.)	$[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \rightarrow \mathbb{R}$	$x \mapsto \sin x$	injektiv,	nicht surjektiv
d.)	$[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \rightarrow [-1, 1]$	$x \mapsto \sin x$	injektiv,	surjektiv
				\Rightarrow bijektiv

Def.: arcsin

Umkehrfunktion von $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \rightarrow [-1, 1], x \mapsto \sin x$ ist $\arcsin : [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$
 analog ist $\arccos : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$ die Umkehrfunktion von $[0, \pi] \rightarrow [-1, 1], x \mapsto \cos x$

Bsp.:

$$[0, \infty[\rightarrow [0, \infty[, x \mapsto x^n \quad |n \in \mathbb{R}^{>0} \quad \text{bijektiv}$$

Umkehrfunktion:

$$[0, \infty[\rightarrow [0, \infty[, y \mapsto y^{\frac{1}{n}} \quad \text{Wurzelfunktion}$$

Def.: gerade

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ heisst **gerade**, falls

$$\forall x \in \mathbb{R} : f(-x) = f(x)$$

y -Achse Symmetrie

Def.: ungerade

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ heisst **ungerade**, falls

$$\forall x \in \mathbb{R} : f(-x) = -f(x)$$

Ursprung Symmetrie

Bsp.:

$f(x) = 1, x^2, x^4, \dots, \cos x$ sind gerade

$f(x) = x, x^3, x^5, \dots, \sin x, \tan x$ sind ungerade

Bem.:

Jede Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ist die Summe einer geraden und einer ungeraden Funktion, nämlich:

$$\underbrace{\frac{f(x) + f(-x)}{2}}_{\text{gerade}} + \underbrace{\frac{f(x) - f(-x)}{2}}_{\text{ungerade}}$$

Def.: monoton

Sei $I \subseteq \mathbb{R}$ ein Intervall. Eine Funktion $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ heisst

monoton wachsend, wenn

$$\forall x, x' \in I : x < x' \implies f(x) \leq f(x')$$

streng monoton wachsend, wenn

$$\forall x, x' \in I : x < x' \implies f(x) < f(x')$$

monoton fallend, wenn

$$\forall x, x' \in I : x < x' \implies f(x) \geq f(x')$$

streng monoton fallend, wenn

$$\forall x, x' \in I : x < x' \implies f(x) > f(x')$$

Bsp.:

$[0, \infty[\rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^n \quad |n > 0$ ist streng monoton wachsend

$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$ ist nicht monoton

$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \begin{cases} x^3 & , x \geq 0 \\ 0 & , x < 0 \end{cases}$ ist monoton wachsend

Bem.: f ist streng monoton \implies injektiv**Bsp.:**

$$\text{Seien } x, x' \in [0, \infty[, x < x' \implies x' > 0 \wedge x \geq 0$$

$$x'^n - x^n = \underbrace{(x' - x)}_{>0} \underbrace{(x'^{n-1} + x'^{n-2} \cdot x + \dots + x^{n-1})}_{>0}$$

$$x'^n - x^n > 0$$

$$x'^n > x^n$$

2.3 Spezielle Definitions- und Zielbereiche, Bedeutung von Funktionen

Def.: Folge

Eine Funktion

$$\mathbb{Z}^{\geq 0} \rightarrow Y$$

$$\mathbb{Z}^{\geq 1} \rightarrow Y$$

heisst **Folge** in Y .

Bsp.:

$$\left(\frac{1}{n}\right)_{n \geq 1} = \left(1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots\right)$$

Varianten:

Def.: Aufzählung

Eine bijektive Funktion:

$\mathbb{Z}^{\geq 1} \rightarrow Y$: ist abzählbar unendlich

oder

$\{1, 2, 3, \dots, n\} \rightarrow Y$: Y hat Kardinalität n

heisst **Aufzählung** Y .

Bem.:

Vorsicht:

\mathbb{R} ist unendlich, aber nicht abzählbar.

\mathbb{Z}, \mathbb{Q} sind abzählbar unendlich

reelle Funktionen: $X \rightarrow Y$ für $X, Y \subset \mathbb{R}$.
mögliche Bedeutung:

KAPITEL 2. FUNKTIONEN

2.3. SPEZIELLE DEFINITIONS- UND ZIELBEREICHE, BEDEUTUNG VON FUNKTIONEN

Raum: Linienkoordinaten, Zeit, physikalische Grössen

Funktionen mehrerer Variablen:

$$X \subset \mathbb{R}^n, Y \subset \mathbb{R}; X \rightarrow Y$$

Bsp.:

$$\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto 0$$

Bedeutung:

- Höhe über Meeresspiegel
- Noten in Analysis als Funktion von Arbeitsaufwand und Talent
- Volumen eines von a, b abhängigen Körpers
- Beschreibung einer Fläche als $\text{graph}(f)$

($n = 2$) Visualisierung durch Höhenlinien

$\{(x, y) | f(x, y) = h\}$ für festes h .

Bsp.:

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto xy$$

GRAPH

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, \dots, x_n) | x_i \in \mathbb{R}\}$$

mögliche Bedeutungen:

- Ortsvektor
- Richtungsvektor

$$\mathbb{R} \supset I \rightarrow \mathbb{R}^n, t \mapsto (x_1(t), \dots, x_n(t)) \quad I \text{ Intervall}$$

parametrisierte Kurve in \mathbb{R}^n gibt eine Bildmenge (kein Graph!)

Bsp.: Schraubenlinie

$$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3, \varphi \mapsto \begin{pmatrix} r \cos \varphi \\ r \sin \varphi \\ \frac{h}{2\pi} \varphi \end{pmatrix}$$

$$h, r > 0$$

$$\text{Bildmenge} = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid x = r \cos \left(\frac{2\pi z}{h} \right), y = r \sin \left(\frac{2\pi z}{h} \right) \right\}$$

$$f: \mathbb{R}^2 \supset X \rightarrow \mathbb{R}^3$$

Parametrisierung einer Fläche im \mathbb{R}^3 .

Bsp.:

$$\mathbb{R} \times [0, r] \rightarrow \mathbb{R}^3, (\varphi, \rho) \mapsto \begin{pmatrix} \rho \cos \varphi \\ \rho \sin \varphi \\ \frac{h}{2\pi} \varphi \end{pmatrix}$$

$$h > 0 \text{ fest}$$

Bsp.: Kugeloberfläche mit Radius $r > 0$
Kugelkoordinaten

$$[0, 2\pi] \times \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right] \rightarrow \mathbb{R}^3, (\varphi, \theta) \mapsto \begin{pmatrix} r \cos \theta \sin \varphi \\ r \cos \theta \sin \varphi \\ r \sin \theta \end{pmatrix}$$

Bedeutung einer Funktion $\mathbb{R}^n \supset X \rightarrow \mathbb{R}^n$
 Umparametrisierung eines Bereichs

Bsp.: Kreisscheibe $\subset \mathbb{R}^2, x^2 + y^2 \leq r^2$

$$[-1, 1] \times [-1, 1] \ni (x, y) \mapsto (rx\sqrt{1-y^2}, ry)$$

$$[-1, 1] \times [-1, 1] \ni (x, y) \mapsto r \cdot (x, y) \cdot \begin{cases} 0 & (x, y) = (0, 0) \\ \frac{\max(|x|, |y|)}{\sqrt{x^2+y^2}} & \text{sonst} \end{cases}$$

Bsp.: linearer Koordinatenwechsel

Richtungsvektoren: $\mathbb{R}^2 \supset X \rightarrow \mathbb{R}^2$

Vektorfeld: jedem Punkt in X wird ein Richtungsvektor zugeordnet.

Bsp.: Geschwindigkeitsvektore einer fließenden Flüssigkeit \rightarrow Differentialgleichung

2.4 Stetigkeit

$$f : X \rightarrow Y$$

$$X \subset \mathbb{R}^m, Y \subset \mathbb{R}^n, x \mapsto f(x), x' \mapsto f(x')$$

$$\text{Abstand von } x, x' \in \mathbb{R}^m \text{ ist } |x - x'| := \sqrt{(x_1 - x'_1)^2 + \dots + (x_n - x'_n)^2}$$

$$x, x' \text{ "nahe"} \iff |x - x'| \text{ "klein"} \iff |x - x'| < \delta$$

$$f(x), f(x') \text{ "nahe"} \iff |f(x) - f(x')| < \varepsilon$$

Def.: Stetigkeit

(a) f ist stetig in $x_0 \in X$ falls gilt:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x \in X : |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

(b) f ist stetig, falls f stetig in jedem $x_0 \in X$ ist.

Fakt:

Jede Polynomfunktion ist stetig.

$\mathbb{R} \supset X \rightarrow Y$ ist stetig in x_0 g.d., w. $f|_{x \wedge [x_0, \infty[}$ und $f|_{x \wedge]-\infty, x_0]}$ stetig in x_0 sind.

Grundeigenschaften

(a)

$f : X \rightarrow Y$ stetig

$g : Y \rightarrow Z$ stetig

\implies die zusammengesetzte Funktion $g \circ f : X \rightarrow Z, x \mapsto g(f(x))$ ist stetig.

Bew.:

Sei $x_0 \in X$, sei $\varepsilon > 0$
 g stetig in $f(x_0) \rightsquigarrow \exists \delta > 0 : \forall z \in Y :$
 $|y - f(x_0)| < \delta \implies |g(y) - g(f(x_0))| < \varepsilon$
 f stetig in $x_0 \implies \gamma > 0 : \forall x \in X$
 $|x - x_0| < \gamma \implies |f(x) - f(x_0)| < \delta$
 Zusammen:
 $|x - x_0| < \gamma \implies |g(f(x)) - g(f(x_0))| < \varepsilon$
 d.h. $g \circ f$ stetig in x_0 ■

(b)

$$f = (f_1, \dots, f_n)$$

$$f_1, \dots, f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\hookrightarrow f \text{ stetig} \iff \text{jedes } f_i \text{ stetig}$$

(c)

Die Grundrechenarten sind stetig.

Bew.:

$$+ : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x + y$$

$$\text{Sei } (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2. \text{ Sei } \varepsilon > 0. \text{ Setze } \delta := \frac{\varepsilon}{2}$$

Dann gilt für alle $(x, y) \in \mathbb{R}^2$:

$$\begin{aligned} |(x, y) - (x_0, y_0)| &< \delta \\ \implies |x - x_0| &< \delta \wedge |y - y_0| < \delta \\ \implies |(x - x_0) + (y - y_0)| &\leq |x - x_0| + |y - y_0| < 2\delta = \varepsilon \\ \implies |(x + y) - (x_0 + y_0)| &< \varepsilon \end{aligned}$$

analog –

Bew.:

$$\cdot : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x \cdot y$$

Sei $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2, \varepsilon > 0$

$$|x| = |(x - x_0) + x_0| \leq |x - x_0| + |x_0| < \delta + |x_0|$$

$$\delta = \frac{\min\{\varepsilon, 1\}}{1 + |x_0| + |y_0|} \implies \delta \leq 1$$

$$\begin{aligned} |x \cdot y - x_0 \cdot y_0| &= |x \cdot (y - y_0) + (x - x_0) \cdot y_0| \\ &\leq |x \cdot (y - y_0)| + |(x - x_0) \cdot y_0| \\ &= |x| \cdot |y - y_0| + |x - x_0| \cdot |y_0| \\ &\leq |x| \cdot \delta + |y_0| \cdot \delta \\ &< ((\delta + |x_0|) + |y_0|) \cdot \delta \\ &= (\delta + |x_0| + |y_0|) \cdot \delta \\ &\leq (1 + |x_0| + |y_0|) \cdot \delta \\ &\leq \varepsilon \end{aligned}$$

Dann gilt $\forall (x, y) \text{ in } \mathbb{R}^2 : |(x, y) - (x_0, y_0)| < \delta \implies |x \cdot y - x_0 \cdot y_0| < \varepsilon$

analog :

(d)

Folge:

jede Rationale Funktion ist stetig, wo definiert.

(e)

f : Intervall \rightarrow Intervall bijektiv, stetig $\implies f^{-1}$ stetig

Bsp.:

Für $n \in \mathbb{Z}^{\geq 0} : [0, \infty[\rightarrow [0, \infty[, x \mapsto x^n$
 ist $[0, \infty[\rightarrow [0, \infty[, y \mapsto \sqrt[n]{y}$

Bsp.:

$\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, x = (x_1, \dots, x_n) \mapsto |x| := \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$ ist stetig

Bsp.:

$\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, (x_1, \dots, x_n) \mapsto \max\{x_1, \dots, x_n\}$ ist stetig

$$\underline{n=2} : \max\{x_1, x_2\} = \begin{cases} x_1 & \text{falls } x_1 \geq x_2 \\ x_2 & \text{falls } x_1 \leq x_2 \end{cases}$$

Unstetige Beispiele

Bsp.:

$$\text{sgn} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \begin{cases} 1 & \text{falls } x > 0 \\ 0 & \text{falls } x = 0 \\ -1 & \text{falls } x < 0 \end{cases}$$

ist stetig ausserhalb von 0 aber unstetig in 0.

Bsp.:

$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \lfloor x \rfloor :=$ die grösste Zahl $\leq x$
 unstetig in jedem $x_0 \in \mathbb{Z}$
 Die Funktion ist in jedem Punkt rechtseitig stetig.

Def.: rechts-/linksseitige Stetigkeit

$f : X \rightarrow Y$ mit $X \subset \mathbb{R}$ heisst im $x_0 \in X$ **rechtsseitig stetig**, falls

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x \in X : x > x_0 \wedge |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

$f : X \rightarrow Y$ mit $X \subset \mathbb{R}$ heisst im $x_0 \in X$ **linksseitig stetig**, falls

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x \in X : x < x_0 \wedge |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

f ist in x_0 stetig $\iff f$ ist in x_0 rechts- und linksseitigstetig

2.5 Grundeigenschaften von \mathbb{R}

Package hyperref Warning: Token not allowed in a PDF string (Unicode):removing \mathbb{R}
 Package hyperref Warning: Token not allowed in a PDF string (Unicode):removing \mathbb{R}
 Package hyperref Warning: Token not allowed in a PDF string (Unicode):removing \mathbb{R}
 Package hyperref Warning: Token not allowed in a PDF string (Unicode):removing \mathbb{R}
 Package hyperref Warning: Token not allowed in a PDF string (Unicode):removing \mathbb{R}

(hyperref) Package hyperref Warning: Token not allowed in a PDF string (Unicode):removing `\sl@UnexpandedMessage'#l#l\GenericWarning (hyperref)` Package hyperref Warning: Token not allowed in a PDF string (Unicode):removing `\<let>-command'#l#l\GenericWarning (hyperref)` Package hyperref Warning: Token not allowed in a PDF string (Unicode):removing `\string'#l#l\GenericWarning (hyperref)` Package hyperref Warning: Token not allowed in a PDF string (Unicode):removing `\<def>-command'#l#l\GenericWarning (hyperref)` Package hyperref Warning: Token not allowed in a PDF string (Unicode):removing `\sl@Tempa'#l#l\GenericWarning (hyperref)` Package hyperref Warning: Token not allowed in a PDF string (Unicode):removing `\global'#l#l\GenericWarning (hyperref)` Package hyperref Warning: Token not allowed in a PDF string (Unicode):removing `\sl@Message'#l#l\GenericWarning (hyperref)` Package hyperref Warning: Token not allowed in a PDF string (Unicode):removing `\math shift'#l#l\GenericWarning (hyperref)` Package hyperref Warning: Token not allowed in a PDF string (Unicode):removing `\math shift'`

Jede nichtleere endliche Teilmenge $S \subset \mathbb{R}$ hat ein eindeutiges Maximum $\max(S)$.

falls nichtleer nicht endlich: entweder $\forall a \in \mathbb{R} \exists x \in S : x > a$
oder: $\exists a \in \mathbb{R} \forall x \in S : x \leq a$

(a ist obere Schranke)

Dann gibt es eine eindeutige kleinste obere Schranke.

Def.: Supremum

$$\text{Supremum } S \subset \mathbb{R} : \sup(S) := \begin{cases} \infty & \text{falls } S \text{ keine obere Schranke hat} \\ \text{kleinste obere Schranke} & \text{falls } S \neq \emptyset \text{ und es existiert eine obere Schranke} \\ -\infty & \text{falls } S = \emptyset \end{cases}$$

2.5.1 Supremum und Infimum

- Betrachte $X \subset \mathbb{R}$
- Eine Zahl $a \in \mathbb{R}$ mit $\forall x \in X : x \leq a$ heisst **eine obere Schranke** von X .
- Falls so ein a existiert, heisst X nach oben beschränkt.
- Falls so ein a in X selbst existiert, so ist sie eindeutig, nämlich den Maximum $\max(X)$.
- Eine Zahl $a \in \mathbb{R}$ mit $\forall x \in X : x \geq a$ heisst **eine untere Schranke** von X .
- Falls so ein a existiert, heisst X **nach unten beschränkt**.
- Falls so ein a in X selbst existiert, so ist sie eindeutig, nämlich den Minimum $\min(X)$.
- Ist X nichtleer und nach oben beschränkt, so besitzt es eine eindeutige kleinste obere Schranke, genannt **Supremum** $\sup(X)$. (d.h. $\sup(X) = \min\{a \in \mathbb{R} | a \text{ ist obere Schranke von } X\}$)
- $\sup(\emptyset) := -\infty$
- $\sup(X) := +\infty$ falls X nicht nach oben beschränkt ist.
- Wenn $\max(X)$ existiert, so ist $\max(X) = \sup(X)$.
- Ist X nichtleer und nach unten beschränkt, so besitzt es eine eindeutige grösste untere Schranke, genannt **Infimum** $\inf(X)$. (d.h. $\inf(X) = \max\{a \in \mathbb{R} | a \text{ ist untere Schranke von } X\}$)
- $\inf(\emptyset) := +\infty$
- $\inf(X) := -\infty$ falls X nicht nach unten beschränkt ist.
- Wenn $\min(X)$ existiert, so ist $\min(X) = \inf(X)$.

- * $\sup(c \cdot X) = c \cdot \inf(X)$ falls $c < 0$
- $X + Y := \{x + y | x \in X, y \in Y\}$
 - * $\sup(X + Y) = \sup(X) + \sup(Y)$ falls $X, Y \neq \emptyset$
 - $a := \sup(X), b := \sup(Y)$. Dann
 $\forall x \in X \forall y \in Y : (x \leq a \wedge y \leq b) \implies x + y \leq a + b$ und
 $\forall \varepsilon > 0 : ((\exists x \in X : x > a - \varepsilon) \wedge (\exists y \in Y : y > b - \varepsilon)) \implies$
 $x + y > a + b - 2\varepsilon$

Bsp.:

$$x = \xi_r \dots \xi_2 \xi_1 \xi_0 \cdot \eta_1 \eta_2 \eta_3 \dots > 0$$

$$x_n = \xi_r \dots \xi_0 \cdot \eta_1 \dots \eta_n | x = \sup\{x_0, x_1, \dots\}$$

Bsp.:

$\pi = 3.14159 \dots$
 Umfang eines regelmässiges n -Ecks U_n eingeschrieben in
 ein Kreis mit Radius 1
 $2\pi = \sup\{U_n | n \geq 2\}$

Satz:

Für $a > 0$ existiert genau eine stetige Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^{>0}$,
 mit $f\left(\frac{m}{n}\right) = \sqrt[n]{a^m}$ für alle $m, n \in \mathbb{Z}, n > 0$.
 Bezeichnung: $a^x := f(x)$
 Denn:

Für $0 < a < 1$ setze $a^x := \left(\frac{1}{a}\right)^{-x}$.

Für $a = 1$ setze a^x .

Sei also $a > 1$.

Dann ist die Abbildung $\mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}, \xi \mapsto a^\xi$ streng monoton wachsend.

Setze $f(x) := \sup\{a^\xi \mid \xi \in \mathbb{Q}, \xi \leq x\}$ nichtleer, nach oben beschränkt durch a^η für $\eta \in \mathbb{Q}, \eta \geq x$.

Falls $x \in \mathbb{Q}$, ist $\sup = \max = a^x$

f stetig in $x_0 \in \mathbb{R}$?

Sei $\delta \in \mathbb{Q}, \delta > 0$, wähle

$$\xi \in \mathbb{Q} : x_0 - 2\delta < \xi < x_0 - \delta$$

$$\rightsquigarrow x_0 + \delta < \xi + 3\delta$$

$$\rightsquigarrow \forall x \in \mathbb{R} : |x - x_0| < \delta$$

$$\implies x \in]x - \delta, x_0 + \delta[$$

$$\implies \xi < x < \xi + 3\delta$$

$$\implies a^\xi < a^x < a^{\xi+3\delta}$$

$$\implies |a^x - a^{x_0}| < a^{\xi+3\delta} - a^{\xi} = a^\xi \cdot (a^{3\delta} - 1)$$

Zu $\varepsilon > 0$ nimm $\delta \in \mathbb{Q}, \delta > 0$ und ξ so, dass $a^\xi \cdot (a^{3\delta} - 1) < \varepsilon$.

Eindeutigkeit: nei machemer nöd :P
Eigenschaften:

$$a^{x+y} = a^x \cdot a^y$$

$$(a^x)^y = a^{xy}$$

$$(ab)^x = a^x \cdot b^x$$

Die Funktion $\mathbb{R}^{>0} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^{>0}, (a, x) \mapsto a^x$ ist stetig.

Satz: Zwischenwertsatz

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann nimmt f jeden Wert zwischen $f(a)$ und $f(b)$ an.

$$\left(\begin{array}{ll} \text{d.h.} & f(a) \leq f(b) \implies [f(a), f(b)] \subset \text{image}(f) \\ & \text{sonst} & [f(b), f(a)] \subset \text{image}(f) \end{array} \right)$$

Bew.:

Sei $f(a) \leq f(b)$; sonst ersetze f durch $-f$.

Sei $f(a) \leq y \leq f(b)$.

Setze $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto f(x) - y$

$\implies g$ stetig, $g(a) \leq 0 \leq g(b)$.

Gesucht: Nullstelle von g .

Halbierungsprinzip:

$$a_0 := a$$

$$b_0 := b$$

falls $\operatorname{sgn} \left(g \left(\frac{a_0 + b_0}{2} \right) \right) = \operatorname{sgn}(g(a_0))$ setze

$$a_1 := \frac{a_0 + b_0}{2}$$

$$b_1 := b_0$$

sonst

$$a_1 := a_0$$

$$b_1 := \frac{a_0 + b_0}{2}$$

usw.

$$b_n - a_n = \frac{b_0 - a_0}{2^n}$$


$$a_0 \leq a_1 \leq \dots$$

$$b_0 \geq b_1 \geq \dots$$

$$x := \sup\{a_0, a_1, \dots\} = \inf\{b_0, b_1, \dots\} \text{ tut's!}$$

S.122

Folge: Ist $I \subset \mathbb{R}$ ein Intervall und $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und streng monoton so induziert f eine bijektive Abbildung $I \rightarrow f(I)$.

**Bsp.:**

$a > 1 \rightsquigarrow \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^{>0}, x \mapsto a^x$ ist stetig und streng monoton wachsend. Denn:

Für $x < x'$ ist $a^x - a^{x'} = \underbrace{a^x}_{>0} \cdot (\underbrace{a^{x-x'} - 1}_{>0})$

Für $y = \frac{m}{n} > 0$ ist $a^y = \sqrt[n]{a^m} > 1$

Umkehrfunktion:

$$\mathbb{R}^{>0} \rightarrow \mathbb{R}, y \mapsto \log_a y$$

 \mathbb{R} ist ein angeordneter Körper

$$a < b \iff b - a = c^2 \text{ für ein } c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$$a \leq b \iff b - a = c^2 \text{ für ein } c \in \mathbb{R}$$

$a > 0$ positiv
 $a \geq 0$ nichtnegativ
 $a < 0$ negativ
 $a \leq 0$ nichtpositiv

Dezimalentwicklung

Jede reelle Zahl ist

$$x = \pm \xi_n \xi_{n-1} \dots \xi_0 \cdot \eta_1 \eta_2 \eta_3 \dots$$

mit $n \in \mathbb{Z}^{\geq 0}$, $\xi_i, \eta_i \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

$$x = \pm \left(\sum_{i=0}^n \xi_i \cdot 10^i + \sum_{j=1}^{\infty} \eta_j \cdot 10^{-j} \right)$$

Diese Darstellung ist eindeutig bis auf

$$\dots \eta_i 9999 \dots = \dots (\eta_i + 1)$$

x ist rational \iff Nachkommastellen werden schliesslich periodisch.

Vektoren

$$\mathbb{R}^n = \{(x_1, \dots, x_n) \mid \text{alle } x_i \in \mathbb{R}\}$$

$$|x| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2} \text{ Betrag / euklidische Norm von } x$$

Satz: Dreiecksungleichung

$$|x + y| \leq |x| + |y|$$

Def.: Norm

Eine **Norm** auf \mathbb{R}^n ist eine Funktion $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \|x\|$ so dass:

1. $\forall x \in \mathbb{R}^n : \|x\| \geq 0$ und $\|x\| = 0$ g.d., w. $x = 0$
2. $\forall x \in \mathbb{R}^n \forall \lambda \in \mathbb{R} : \|\lambda \cdot x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$

`\string'#I#I\GenericWarning (hyperref)` Package hyperref Warning: Token not allowed in a PDF string (Unicode):removing `\<def>-command'#I#I\GenericWarning (hyperref)` Package hyperref Warning: Token not allowed in a PDF string (Unicode):removing `\sl@Tempa'#I#I\GenericWarning (hyperref)` Package hyperref Warning: Token not allowed in a PDF string (Unicode):removing `\global'#I#I\GenericWarning (hyperref)` Package hyperref Warning: Token not allowed in a PDF string (Unicode):removing `\sl@Message'#I#I\GenericWarning (hyperref)` Package hyperref Warning: Token not allowed in a PDF string (Unicode):removing `\math shift'#I#I\GenericWarning (hyperref)` Package hyperref Warning: Token not allowed in a PDF string (Unicode):removing `\math shift'`

$$\langle x, y \rangle := x_1 y_1 + \dots + x_n y_n$$

$$\langle x, x \rangle = |x|^2$$

Kapitel 3

Grenzwerte

Ziel: Verhalten einer Funktion am Rand ihren Definitionsbereichs.

Def.: offener Ball

Zu $x_0 \in \mathbb{R}$ und $r > 0$ sei

$$B_r(x_0) := \{x \in \mathbb{R}^n \mid |x - x_0| < r\}$$

den **offenen Ball** mit Radius r um x_0 . (ohne Rand)

Betrachte eine Teilmenge $X \subset \mathbb{R}^n$.

Def.: Innere

$X^\circ := \{x_0 \in X \mid \exists r > 0 : B_r(x_0) \subset X\}$ heisst das **Innere von X** oder die **Menge der inneren Punkte von X**.

Def.: offen

X heisst **offen**, falls $X = X^\circ$ ist.

Def.: Abschluss

$\overline{X} := \{y \in \mathbb{R}^n \mid \forall r > 0 : B_r(y) \cap X \neq \emptyset\}$ heisst der **Abschluss von X** .

Def.: abgeschlossen

X ist **abgeschlossen**, wenn $X = \overline{X}$ ist.

Def.: Rand

$\partial X := \overline{X} \setminus X^\circ$ heisst der **Rand von X** .

Def.: dicht

Eine Teilmenge $Y \subset X$ mit $X \subset \overline{Y}$ heisst **dicht im X** .

Bem.:

- $X^\circ \subset X \subset \overline{X}$
- Jeder "offener Intervall" $]a, b[\subset \mathbb{R}$ ist offen.
- Der offene Ball $B_r(x_0)$ ist offen.
- X° ist offen.
- Jede durch endlich viele strikte Ungleichungen in stetigen Funktionen definierte Menge ist offen.
- Jeder "abgeschlossener Intervall" ist abgeschlossen.
- Jede "abgeschlossene Kugel" $\{x \in \mathbb{R}^n : |x - x_0| \leq r\}$ ist abgeschlossen.
- \overline{X} ist abgeschlossen.
- $f_i, g_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ stetig für $i = 1, \dots, r \implies \{x \in \mathbb{R}^n \mid f_1(x) \leq g_1(x), \dots, f_r(x) \leq g_r(x)\}$ ist abgeschlossen.

Bsp.:

Graph einer stetigen Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = f(x)\}$ ist abgeschlossen.

Bem.:

\emptyset, \mathbb{R}^n sind sowohl offen als auch abgeschlossen.
 $]a, b]$ ist abgeschlossen falls $a = -\infty$, sonst nicht abgeschlossen (nie offen).

Bsp.:

$$\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

$$\mathbb{Q}^\circ = \emptyset$$

$$\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$$

Bem.:

$\partial B_r(x_0) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |x - x_0| = r\}$ heisst **Sphäre**

Def.: Grenzwert

Sei $f : X \rightarrow \mathbb{R}^n$ eine Funktion, $X \subset \mathbb{R}^m$ und $x_0 \in \mathbb{R}^m$ mit $x \in X \setminus \{x_0\}$

f hat bei x_0 den **Grenzwert** $y_0 \in \mathbb{R}^n$ falls gilt:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall x \in X : 0 < |x - x_0| < \delta \implies |f(x) - y_0| < \varepsilon$$

Dann schreibt man:

$$f(x) \rightarrow y_0 \text{ f\"ur } x \rightarrow x_0$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y_0 \quad \text{limes}$$

Bem.:

Der Grenzwert ist eindeutig bestimmt, falls er existiert.

Fakt:

Für $x_0 \in X$ ist f stetig in x_0 g.d., w. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ ist.

Bsp.:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \begin{cases} \sin \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ existiert nicht!

Bsp.:

$$\delta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \begin{cases} 1 & x = 0 \\ 0 & x \neq 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \delta(x) = 0 \neq 1 = f(x)$$

Bsp.:

$$\begin{aligned} f(t) &:= \frac{t^3 - 3t^2 - 3t + 10}{t^2 - 5t + 6} && \text{rationale Funktion ; } \mathbb{R} \setminus \{2, 3\} \rightarrow \mathbb{R} \\ &= \frac{(t-2) \cdot (t^2 - t - 5)}{(t-2) \cdot (t-3)} \\ &= \frac{t^2 - t - 5}{t-3} \\ &\rightsquigarrow f \text{ hat eine stetige Fortsetzung } \mathbb{R} \setminus \{3\} \rightarrow \mathbb{R} \end{aligned}$$

Bsp.:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Geometrische Beweisidee::
BILD1

Varianten:

Bsp.:

$$F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \begin{cases} \frac{|x-2|}{x^2-4} & x \neq \pm 2 \\ 0 & x = -2 \\ \frac{1}{4} & x = 2 \end{cases}$$

F stetig in $x_0 \neq \pm 2$

F rechtsseitig stetig in $x_0 < 2$, $\lim_{x \rightarrow 2-} F(x) = \frac{1}{4} \neq F(x_0)$

$$\lim_{x \rightarrow -2+} F(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -2-} F(x) = +\infty$$

$\lim_{x \rightarrow -2} F(x)$ existiert auch nicht als uneigentlicher Grenzwert

$$\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$$

Def.: Einseitige Grenzwerte

$$\lim_{x \searrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0+} f(x) = y_0$$

$$\iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in X : 0 < x - x_0 < \delta \implies |f(x) - y_0| < \varepsilon$$

$$\lim_{x \nearrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0-} f(x) = y_0$$

$$\iff \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in X : 0 < x_0 - x < \delta \implies |f(x) - y_0| < \varepsilon$$

Bem.:

$$\begin{aligned} f \text{ rechtsstetig in } x_0 &\iff \lim_{x \rightarrow x_0+} f(x) = f(x_0) \\ f \text{ linksstetig in } x_0 &\iff \lim_{x \rightarrow x_0-} f(x) = f(x_0) \end{aligned}$$

Def.: uneigentlicher Grenzwert

$$\begin{aligned} f(x) > N &\quad \text{"nahe" } \infty \\ |f(x) - y_0| < \varepsilon &\quad \text{"nahe" } y_0 \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty, \text{ falls } \forall N > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in X : 0 < |x - x_0| < \delta \implies f(x) > N$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty, \text{ falls } \forall N > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in X : 0 < |x - x_0| < \delta \implies f(x) < -N$$

Analog: einseitige Grenzwerte

Def.:

$$\begin{aligned} |x - x_0| < \delta &\quad \text{"nahe" } x_0 \\ x > M &\quad \text{"nahe" } \infty \end{aligned}$$

Sei $X \subset \mathbb{R}$ nach oben unbeschränkt.

Dann gilt:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) &= y_0 \in \mathbb{R}^m, \text{ falls} \\ \forall \varepsilon > 0 \exists M : \forall x \in X : x > M &\implies |f(x) - y_0| < \varepsilon \end{aligned}$$

Analog:

Sei X nach unten unbeschränkt.

Dann gilt:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = y_0 \in \mathbb{R}^m, \text{ falls}$$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists M : \forall x \in X : x < -M \implies |f(x) - y_0| < \varepsilon$$

Kombination:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} = \infty \text{ falls } \forall N \exists M \forall x \in X : x > M \implies f(x) > N$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} = -\infty \text{ falls } \forall N \exists M \forall x \in X : x > M \implies f(x) < -N$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} = \infty \text{ falls } \forall N \exists M \forall x \in X : x < -M \implies f(x) > N$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} = -\infty \text{ falls } \forall N \exists M \forall x \in X : x < -M \implies f(x) < -N$$

Bsp.:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \text{ nicht definiert}$$

$$n > 0 \rightsquigarrow \lim_{x \rightarrow \infty} x^n = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^n = \begin{cases} \infty & \text{falls } n \text{ gerade} \\ -\infty & \text{falls } n \text{ ungerade} \end{cases}$$

Rechnen mit Grenzwerten

Seien $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$ und $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b \in Y$.

- Ist $b \in Y$ und g stetig in b , dann existiert $\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = g(\lim_{x \rightarrow a} f(x)) = g(b)$.

Zu $\varepsilon > 0$ existiert $\delta > 0$ mit: $\forall y \in Y : |y - b| < \delta \implies |g(y) - g(b)| < \varepsilon$
 Zu diesem δ existiert $\gamma > 0$ mit: $\forall x \in X : 0 < |x - a| < \gamma \implies$
 $|f(x) - b| < \delta$
 $\implies |g(f(x)) - g(b)| < \varepsilon$

- Ist $b \notin Y$ und $\lim_{y \rightarrow b} g(y) = c$, so gilt $\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = c$.

Bem.:

Dabei dürfen a, b, c auch $\pm\infty$ sein.

Bsp.:

$$\begin{aligned} \text{a) } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 5x + 7}{2x^2 - 3x - 5} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{5}{x} + \frac{7}{x^2}}{2 - \frac{3}{x} - \frac{5}{x^2}} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{1 + 5t + 7t^2}{2 - 3t - 5t^2} \\ &= \frac{1 + 5 \cdot 0 + 7 \cdot 0^2}{2 - 3 \cdot 0 - 5 \cdot 0^2} \\ &= \frac{1}{2} \quad \text{Da die Funktion stetig ist.} \end{aligned}$$

$$\text{b) } \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{x}} = \lim_{t \rightarrow 0+} e^t = e^0 = 1 \quad \text{Da } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0 \text{ und } \frac{1}{x} > 0$$

$$\text{c) } \lim_{x \rightarrow 0+} e^{\frac{1}{x}} = \lim_{t \rightarrow \infty} e^t = \infty \quad \text{Da } \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{1}{x} = \infty$$

$$\text{d) } \lim_{x \rightarrow 0-} e^{\frac{1}{x}} = \lim_{t \rightarrow -\infty} e^t = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{1}{e^s} = \lim_{u \rightarrow \infty} \frac{1}{u} = 0$$

$$\text{Da } \lim_{x \rightarrow 0-} \frac{1}{x} = -\infty \quad t = -s \quad e^t = e^{-s} = \frac{1}{e^s} \quad \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{1}{e^s} = 0 \quad u = e^s$$

Fakt:

Für jede vektorwertige Funktion $f = (f_1, f_2, \dots, f_n)$ gilt:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b = (b_1, b_2, \dots, b_n) \iff \forall i : \lim_{x \rightarrow a} f_i(x) = b_i$$

Bsp.:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\sin x}{\sqrt{5x^2 + x^4}} &= \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\sin x}{|x|} \cdot \frac{1}{\sqrt{5 + x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\sin x}{x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{1}{\sqrt{5 + x^2}} \\ &= 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}} \end{aligned}$$

Def.: Majorantenkriterium

Ist $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$ und $|f(x)| \leq |g(x)|$ für alle x nahe a , so gilt $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$.

Def.: Minorantenkriterium

Ist $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$ und $f(x) > g(x)$ für alle x nahe a , so gilt $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$.
Analog $-\infty$

Bsp.:

$$e^x \geq x \text{ für alle } x \geq 0 \text{ und } \lim_{x \rightarrow \infty} x = \infty \implies \lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty$$

Bsp.:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 0 \quad \text{Da } |\sin x| \leq 1 \quad \left| \frac{\sin x}{x} \right| \leq \left| \frac{1}{x} \right| \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

Bsp.:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{2 + \sin \frac{1}{x}} = \infty \quad \frac{x}{2 + \sin \frac{1}{x}} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{3} = \infty$$

Bsp.:

$$\begin{aligned} \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} \\ \left| \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} \right| &\leq |y^2| \\ \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y^2 &= \lim_{y \rightarrow 0} y^2 = 0 \end{aligned}$$

3.1 Asymptoten

Def.: Asymptote

- a) Sei $X \subset \mathbb{R}$ nach oben unbeschränkt und seien $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$. Wir nennen f, g **zueinander asymptotisch** für $x \rightarrow \infty$, falls gilt:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) - g(x) = 0$$

- b) Ist $g(x) = px + q$ eine lineare Funktion, asymptotisch zu f , dann heisst die Gerade $\text{graph}(g)$ **Asymptote von f für $x \rightarrow \infty$**

Analog $x \rightarrow -\infty$

Bestimmung

Die Asymptote ist eindeutig, falls sie existiert.

(Wären $g(x) = px + q$

$g'(x) = p'x + q'$ beide Asymptoten für $x \rightarrow \infty$

$$\implies \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) - g'(x) = 0 - 0 = 0$$

$$g(x) - g'(x) = [f(x) - g'(x)] - [f(x) - g(x)]$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (p - p')x + (q - q') = 0$$

Bsp.:

$$f(t) = \frac{t^2 - t - 5}{t - 3} = t + 2 + \frac{1}{t - 3} \quad \text{Polynomdivision}$$

$$\Rightarrow \text{Asymptote } g(t) = t + 2. \quad \left[\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{t-3} = 0 \right]$$

Bsp.:

$$f(x) = \sqrt{x(x+a)} \text{ für } x \rightarrow +\infty$$

$$= x \sqrt{1 + \frac{a}{x}}$$

$$\text{Ansatz: } g(x) = x + q$$

$$\text{Ziel: } \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x(x+a)} - (x+q)$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{x(x+a)} - (x+q))(\sqrt{x(x+a)} + (x+q))}{(\sqrt{x(x+a)} + (x+q))}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x(x+a) - (x+q)^2}{x(\sqrt{1 + \frac{a}{x}} + 1 + \frac{q}{x})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(a-2q)x - q^2}{x(\sqrt{1 + \frac{a}{x}} + 1 + \frac{q}{x})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(a-2q) - \frac{q^2}{x}}{(\sqrt{1 + \frac{a}{x}} + 1 + \frac{q}{x})}$$

$$= \frac{a-2q}{2}$$

$$\text{Asymptote } x + \frac{a}{2}$$

Anwendung:

Def.: beschränkt

Eine Teilmenge $X \subset \mathbb{R}^n$ heisst **beschränkt**, wenn die Menge $\{|x| : x \in X\}$ nach oben beschränkt ist. Äquivalent: Es existiert $r > 0$ mit $X \subset B_r(0)$.

Eine Funktion $f : X \rightarrow \mathbb{R}^n$ heisst beschränkt wenn

$$\text{image}(f) \iff \exists r > 0 : \forall x \in X : |f(x)| \leq r$$

Bem.:

$X \subset \mathbb{R}^n, f : X \rightarrow \mathbb{R}^n, f$ stetig in $x_0 \in X$.
Dann $\exists r > 0$ sodass die Einschränkung
von f auf $X \cap \overline{B_r(x_0)}$ beschränkt ist.

Bew.:

Für $\varepsilon := 1$ existiert $\delta > 0 : \forall x \in X : |x - x_0| < \delta$

$$\implies |f(x) - f(x_0)| < 1$$

$r := \frac{\delta}{2}$ tut's für alle $x \in X \cap B_r(x_0)$ ist

$$|f(x)| \leq |f(x) - f(x_0)| + |f(x_0)| \leq 1 + |f(x_0)| \quad \blacksquare$$

Def.: kompakt

X heisst **kompakt** falls es abgeschlossen und beschränkt ist.

Bsp.:

$\overline{B_r(x_0)}$ ist kompakt.
 $[a, b] \subset \mathbb{R}$

Satz:

$f : X \rightarrow \mathbb{R}^n$ stetig, $X \subset \mathbb{R}^n$ kompakt $\implies f$ beschränkt.

Folge: Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, sodass $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \in \mathbb{R} \ni \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ existieren. Dann ist f beschränkt.

Bsp.:

$$f(x) := \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$

$$\frac{x^2 + 5x}{x^2 + 1}$$

Kapitel 4

Folgen & Reihen

4.1 Folgen

$$a \in \mathbb{Z}^{\geq 0}, \mathbb{Z}^{\geq 1} \rightarrow \mathbb{R}^n, k \rightarrow a_k$$

Wende Grenzwertbegriff an auf

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = \begin{cases} \text{existiert in } \mathbb{R}^n & \text{konvergente Folge} \\ +\infty \text{ oder } -\infty & \text{divergiert gegen } \pm \infty \\ \text{existiert nicht} & \text{divergiert} \end{cases}$$

Satz:

Jede monotone beschränkte Folge ist konvergent nämlich

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = \sup\{a_k | k \geq 0\}$$

Sei $f : X \rightarrow \mathbb{R}^n$, $X \subset \mathbb{R}^m$ und $x_0 \in X$.
 Dann ist f stetig in x_0 g.d., w. für jede Folge (x_k) in X mit
 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x_0$ gilt $\lim_{k \rightarrow \infty} f(x_k) = f(x_0)$

Bsp.:

Sei $a \geq 1$, $x_0 := a$, für $k \geq 0$: $x_{k+1} := \frac{1}{2}(x_k + \frac{a}{x_k})$ eine rekursiv definierte Folge.

Bem.:

$x_0 > 0$ und $\forall k \geq 0 : x_k > 0 \implies x_{k+1} > 0 \rightsquigarrow$ wohldefiniert.

Beh. (x_k) monoton fallend, d.h. $x_{k+1} \leq x_k \iff$
 $\frac{1}{2} \left(x_k + \frac{a}{x_k} \right) \leq x_k \iff \frac{a}{x_k} \leq x_k \iff a \leq x_k^2$

$$a^2 \geq x_0^2 = a^2 \leq a$$

$$a^2 \geq x_k^2 \geq a, \text{ so ist } x_{k+1}^2 = \left(\frac{1}{2} \left(x_k + \frac{a}{x_k} \right) \right)^2 \geq \sqrt{x_k \frac{a}{x_k}}^2 = a$$

Induktion $\implies \forall k : x_k^2 \leq a$

$$\forall k : x_{k+1} \leq x_k \leq \sqrt{a}$$

Also ist (x_k) monoton fallend, nach unten beschränkt durch \sqrt{a}

$$\implies x := \lim_{k \rightarrow \infty} x_k \geq \sqrt{a}$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow x &= \lim_{k \rightarrow \infty} x_{k+1} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \left(x_k + \frac{a}{x_k} \right) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{a}{x} \right) \\ \Rightarrow x &= \sqrt{a}\end{aligned}$$

4.2 Summen

$$\sum_{i=p}^q a_i = \begin{cases} a_p + \dots + a_q & \text{falls } p \leq q \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

4.2.1 Grundregeln

$$\begin{aligned}\sum_{i=p}^q (a_i + b_i) &= \sum_{i=p}^q a_i + \sum_{i=p}^q b_i \\ \sum_{i=p}^q c \cdot a_i &= c \cdot \sum_{i=p}^q a_i = \sum_{i=p}^q a_i \cdot c = \left(\sum_{i=p}^q a_i \right) \cdot c \\ \sum_{i=p}^r a_i &= \sum_{i=p}^q a_i + \sum_{i=q+1}^r a_i = \sum_{i=p}^{q-1} a_i + \sum_{i=q}^r a_i \quad \text{für } p \leq q \leq r \\ \sum_{i=p}^q a_i &= \sum_{j=p+k}^{q+k} a_{j-k} \quad j = i + k, i = j - k \\ \sum_{i=p}^q a_i &= \sum_{j=k-q}^{k-p} a_{k-j}\end{aligned}$$

Anwendung

$$\begin{aligned}
\left(\sum_{i=p}^q a_i\right)^2 &= \left(\sum_{i=p}^q a_i\right) \cdot \left(\sum_{i=p}^q a_i\right) \\
&= \sum_{j=p}^q \sum_{i=p}^q a_i a_j \\
&= \sum_{j=p}^q \left(\sum_{i=p}^{j-1} a_i a_j + a_j^2 + \sum_{i=j+1}^q a_i a_j \right) \\
&= \sum_{j=p}^q a_j^2 + \sum_{j=p}^q \sum_{i=p}^{j-1} a_i a_j + \sum_{i=p}^q \sum_{j=i+1}^q a_i a_j \\
&= \sum_{i=p}^q a_i^2 + \sum_{j=p}^q \sum_{i=p}^{j-1} a_i a_j + \sum_{i=p}^q \sum_{j=i+1}^q a_i a_j \\
&= \sum_{p \leq i \leq q} a_i^2 + 2 \cdot \sum_{p \leq i < j \leq q} a_i a_j
\end{aligned}$$

Bsp.: Geometrische Summe

Für $x \neq 1$ und $n \in \mathbb{Z}$ ist $\sum_{i=0}^n \frac{x^{n+1}-1}{x-1}$

Denn: $(x-1) \cdot \sum_{i=0}^q x^i = \sum_{i=0}^q (x^{i+1} - x^i) = x^{n+1} - 1$

Bsp.: Teleskopsumme

$$\begin{aligned}
\sum_{i=p}^q (a_i - a_{i-1}) &= (a_p - a_{p-1}) + (a_{p+1} - a_p) + \dots + (a_q - a_{q-1}) \\
&= \sum_{i=p}^q a_i - \sum_{i=p}^q a_{i-1} \\
&= \sum_{i=p}^q a_i - \sum_{j=p-1}^{q-1} a_j
\end{aligned}$$

4.3 Reihen

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n x_k &:= x_0 + x_1 + \dots + x_n && \text{Summe} \\ \sum_{k=0}^{\infty} x_k'' &:= x_0 + x_1 + \dots'' && \text{Reihe} \end{aligned}$$

Def.: Reihe

Ein Ausdruck

$$\sum_{k=0}^{\infty} x_k$$

heisst (unendliche) **Reihe**

Def.: Partialsumme

Für $n \geq 0$ heisst

$$s_n := \sum_{k=0}^n x_k$$

die **n-te Partialsumme**.

$$s_0 = x_0; s_{n+1} = s_n + x_{n+1}$$

Die Reihe heisst konvergent bzw. divergent, falls die Folge (s_n) es ist.

Def.: Wert

$$\sum_{k=k_0}^{\infty} x_k := \lim_{n \rightarrow \infty} s_n$$

heisst der **Wert** der Reihe.

Auch wenn $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \pm\infty$ ist: "uneigentlicher Grenzwert".

Bem.:

(x_k) konvergiert $\not\Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} \Rightarrow (x_k)$ konvergiert gegen 0
 [Da $x_k = s_k - s_{k-1}$]

Bsp.:

$$q \in \mathbb{R} \rightsquigarrow \sum_{k=0}^{\infty} q^k$$

Beh. Konvergent g.d., w. $|q| < 1$, und dann ist $\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q}$

Bew.:

konvergent $\Rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} = 0 \Rightarrow |q| < 1$

$$s_k = \sum_{l=0}^k q^l = \frac{q^{k+1} - 1}{q - 1} = \frac{1}{1 - q} + \frac{q^{k+1}}{q - 1} \quad \blacksquare$$

Bsp.: Harmonische Reihe

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = \infty \quad \text{"divergiert gegen } \infty\text{"}$$

Bew.:

$$\begin{aligned} s_{2^m-1} &= \sum_{k=1}^m \left(\sum_{k=2^{l-1}}^{2^l-1} \frac{1}{k} \right) \geq \sum_{l=1}^m \left(2^{l-1} \frac{1}{2^l} \right) \\ &= \sum_{l=1}^m \frac{1}{2} = \frac{m}{2} \end{aligned}$$

$$1 \leq k \leq 2^m \implies 2^{l-1} \leq k < 2^l \text{ für ein } 1 \leq l \leq m$$

Da $\frac{1}{k} > 0$ ist, ist (s_k) streng monoton wachsend $\implies s_k \rightarrow \infty$ für $k \rightarrow \infty$

Bsp.:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^s} = \infty \text{ für } s \in]0, 1]$$

Minorantenkriterium

Bsp.:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^s} \text{ konvergiert f\"ur } s > 1$$
Bew.:

Wegen $\frac{1}{k^s} > 0$ ist (s_k) streng monoton wachsend.

Genügt zu zeigen (s_k) ist nach oben beschränkt.

$$\begin{aligned}
 s_{2^m-1} &= \sum_{l=1}^m \left(\sum_{k=2^{l-1}}^{2^l-1} \frac{1}{k^s} \right) \\
 &\leq \sum_{l=1}^m \left(2^{l-1} \cdot \frac{1}{2^{(l-1) \cdot s}} \right) \\
 &= \sum_{l=1}^m 2^{(l-1)(1-s)} \\
 &= \sum_{n=0}^{m-1} (2^{1-s})^n \leq \sum_{n=0}^{\infty} (2^{1-s})^n \\
 &= \frac{1}{1 - 2^{1-s}} < \infty \quad \blacksquare \\
 k \geq 2^{l-1} &\implies \frac{n}{k^s} \leq \frac{1}{(2^{l-1})^s}
 \end{aligned}$$

Bsp.:

$$\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k \log k} = \infty$$
$$\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k \log^2 k} < \infty$$

Bem.:

$$\zeta(s) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^s}$$

heisst die Riemannsche Zetafunktion

Bem.:

Sind alle $a_k \geq 0$ so ist s_k monoton wachsend und daher $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ existiert in \mathbb{R} oder $= \infty$

Def.: alternierende Reihe

Eine Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k c_k$ mit $c_0 \geq c_1 \geq \dots$ und $\lim_{k \rightarrow \infty} c_k = 0$ heisst **alternierende Reihe**.

Satz:

Jede alternierende Reihe konvergiert.

Bew.:

$$s_{2l} = s_{2(l-1)} + (-1)^{2l-1} \cdot c_{2l-1} + (-1)^{2l} c_{2l} \leq s_{2(l-1)}$$

$$\text{Analog: } s_{2l+1} \leq s_{2l-1}$$

$$|s_{2l} - s_{2l-1}| = c_{2l} \rightarrow 0 \text{ f\"ur } l \rightarrow \infty$$

Bsp.: Alternierende harmonische Reihe

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{1}{k} = \ln 2$$

Umordnung von Reihen

Def.: absolute Konvergenz

$\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ heisst absolut konvergent, falls $\sum_{k=0}^{\infty} |a_k|$ konvergiert.

Bsp.:

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{1}{k}$$

ist konvergent, aber nicht absolut konvergent.

Satz:

Jede absolut konvergente Reihe ist konvergent, und bleibt absolut konvergent mit demselben Grenzwert unter beliebigen Umordnung.

Bem.:

Ist $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ nicht absolut konvergent, so existiert eine Umordnung, die divergiert.

Beweisidee::

Sei $\varepsilon > 0$

Dann $\exists k_0 : \sum_{k=k_0}^{\infty} a_k \leq \varepsilon$

Sei (b_k) eine Umordnung von (a_k) .

Dann existiert k_1 so, dass alle a_k für $k < k_0$ unter den b_k für $k < k_1$ auftauchen.

Für $m \geq k_1 : \sum_{k=0}^m b_k = \sum_{k=0}^{k_0-1} a_k +$

$$\underbrace{\left(\text{Summe von endlich vielen } a_k \text{ für } k \geq k_0 \right)}_{= (\text{Summe gewisser } |a_k| \text{ für } k \geq k_0) < \varepsilon}$$

Satz: majorisierte Konvergenz

Ist $\sum_{k=k_0}^{\infty} b_k$ konvergent und gilt

$$\forall k \geq k_0 : |a_k| \leq b_k$$

so ist $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$ absolut konvergent.

Denn:

$$\sum_{k=0}^m a_k \leq \sum_{k=0}^m b_k \leq \sum_{k=0}^{\infty} b_k \quad \blacksquare$$

Sind $c, q \in \mathbb{R}, q < 1$ und $\forall k \geq k_0 : |a_k| \leq c \cdot q^k$
 so ist $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ abs. konv.
 Denn: $\sum_{k=0}^{\infty} a_k \leq c' + \sum_{k=0}^{\infty} c \cdot q^k = c' + c \cdot \sum_{k=0}^{\infty} q^k = c' + c \cdot \frac{1}{1-q} < \infty$

Bsp.:

Sind $c, s \in \mathbb{R}$ mit $s > 1$, und $\forall k \geq k_0 : |a_k| \leq \frac{c}{k^s}$
 Dann ist $\sum a_k$ absolut konvergent.

Bsp.:

$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)}$ konvergiert absolut da

$$\left| \frac{1}{k(k+1)} \right| \leq \frac{1}{k^s}$$

$$\sum_{k=1}^m \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^m \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = \frac{1}{1} - \frac{1}{m+1}$$

$$\text{Also } \sum_{k=1}^{\infty} a_k = 1$$

Rechenregeln

Falls die rechte Seite konvergiert, tut's auch die linke und es gilt "=".

$$\bullet \sum_{k=k_0}^{\infty} a_k = \sum_{k=k_0}^{k_1-1} a_k + \sum_{k=k_1}^{\infty} a_k \quad \text{für } k_0 \leq k_1$$

- $\sum_{k=k_0}^{\infty} (a_k + b_k) = \sum_{k=k_0}^{\infty} a_k + \sum_{k=k_0}^{\infty} b_k$
- $\sum_{k=k_0}^{\infty} c \cdot a_k = c \cdot \sum_{k=k_0}^{\infty} a_k$
- Wenn $\forall k : a_k \leq \sum_{k=k_0}^{\infty} b_k$ dann gilt $\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k \leq \sum_{k=k_0}^{\infty} b_k$
- $\sum_{k=k_0}^{\infty} \sum_{l=l_0}^{\infty} a_{k,l} \stackrel{?}{=} \sum_{l=l_0}^{\infty} \sum_{k=k_0}^{\infty} a_{k,l}$
 Mehrfache-Reihen heissen absolut konvergent, falls $\sum_{k=k_0}^{\infty} \sum_{l=l_0}^{\infty} |a_{k,l}| < \infty$. Dann darf man beliebig umordnen, zB. wie oben.

Bsp.:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \sum_{l=1}^{\infty} \frac{1}{k^2 + l^2} \quad \text{konvergiert absolut}$$

↑ konvergent, da $\frac{1}{k^2 + l^2} \leq \frac{1}{l^4}$ und Majorantekriterium

Speziell

$$\left(\sum_{k=k_0}^{\infty} a_k \right) \cdot \left(\sum_{l=l_0}^{\infty} b_l \right) = \sum_{k=k_0}^{\infty} \sum_{l=l_0}^{\infty} a_k \cdot b_l$$

Bsp.:

Eine Reihe der Form

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} a \cdot e^{ikx}$$

oder

$$\sum_{k=k_0} a_k \cdot \cos kx + \sum_{k=k_0}^{\infty} b_k \cdot \sin kx$$

heisst Fourierreihe.

Kapitel 5

Komplexe Zahlen

Satz: Fundamentalsatz der Algebra

Jedes Polynom $P(z) = c_0 + c_1z + \dots + c_nz^n$ mit $c_0, \dots, c_n \in \mathbb{C}$ und $c_n \neq 0$ und $n \geq 1$ hat mindestens eine Nullstelle in \mathbb{C} .

Fakt:

ζ ist Nullstelle von $P(z) \iff P(z) = (z - \zeta) \cdot Q(z)$ für ein Polynom $Q(z)$ von Grad $n - 1$.

Satz: Fundamentalsatz der Algebra 2

Jedes Polynom $P(z) \neq 0$ mit Koeffizienten in \mathbb{C} lässt sich als Produkt von linearfaktoren schreiben:

$$P(z) = (z - \zeta_1) \dots (z - \zeta_n) \cdot c \text{ mit } \zeta_1, \dots, \zeta_n, c \in \mathbb{C}; c \neq 0$$

Bem.:

Hat $P(z)$ Koeffizienten in \mathbb{R} und ist ζ eine Nullstelle von P , dann ist auch $\bar{\zeta} \in \mathbb{C}$ eine Nullstelle von P . Denn:

$$P(\bar{\zeta}) = c_0 + c_1\bar{\zeta} + \dots + c_n\bar{\zeta}^n = \overline{c_0 + c_1\zeta + \dots + c_n\zeta^n} = \overline{P(\zeta)} = \overline{0} = 0$$

Folge:

Die Nullstelle eines reellen Polynoms sind reelle oder Paare komplexer konjugierter komplexer nichtreeller Zahlen.

Bsp.:

$$z^4 - 2$$

$$\pm \sqrt[4]{2} \text{ oder } \pm \sqrt[4]{2}i$$

$$(z - \zeta)(z - \bar{\zeta}) = z^2 - (\zeta + \bar{\zeta})z + \zeta\bar{\zeta} = z^2 - 2\Re(\zeta) \cdot z + |\zeta|^2$$

hat Koeffizienten in \mathbb{R}

Folge:

Jedes Polynom mit reellen Koeffizienten ist Produkt von linearefaktoren und Faktoren von Grad 2, mit reellen Koeffizienten.

Bsp.:

$$z^4 + 3z^2 - 6z + 10 = (z^2 - 2z + 2)(z^2 + 2z + 5)$$

hat Nullstelle $1 + i$ $(z + 1)^2 + 4 = (z + 1 - 2i)(z + 1 + 2i)$
 \Rightarrow auch $1 - i$

$$(z - (i + 1))(z - (1 - i)) = (z - 1)^2 - i^2 = z^2 - 2z + 2$$

\Rightarrow alle Nullstellen: $1 \pm i, -1 \pm 2i$

Fibonacci-Zahlen

$$a_0 := 1$$

$$a_1 := 1$$

$$a_{n+2} := a_n + a_{n+1} \text{ für } n \geq 2$$

$$1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, \dots$$

$$a_n = * \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n + * \left(\frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right)^n$$

$$\text{Asymptotisch: } a_n = * \left(\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \right)^n + (\text{klein})$$

Variante:

$$a_0 := 0$$

$$a_1 := 1$$

$$a_{n+2} := 2a_{n+1} - 3a_n$$

$$0, 1, 2, 1, -4, -11, -10, 13, \dots$$

Ansatz:

$$a_n = \alpha u^n + \beta v^n$$

$$\alpha u^{n+2} + \beta v^{n+2} = 2(\alpha u^{n+1} + \beta v^{n+1}) - 3(\alpha u^n + \beta v^n)$$

$$\alpha(u^{n+2} - 2u^{n+1} + 3u^n) + \beta(v^{n+2} - 2v^{n+1} + 3v^n)$$

$$= \alpha u^n(u^2 - 2u + 3) + \beta v^n(v^2 - 2v + 3) \quad u, v = 1 \pm \sqrt{2}i$$

$$= 0$$

$$\alpha = \frac{1}{2i\sqrt{2}}(1 + i\sqrt{2})^n - \frac{1}{2i\sqrt{2}}(1 - i\sqrt{2})^n = \Im \left(\frac{(1 + i\sqrt{2})^n}{\sqrt{2}} \right)$$

$$|1 + i\sqrt{2}| = \sqrt{3}$$

Kapitel 6

Potenzreihen

Def.: Potenzreihe

Ein Ausdruck der Form

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \cdot z^k$$

heisst Potenzreihe.

(reelle P.R.: $a_k, z \in \mathbb{R}$; komplexe P.R.: $a_k, z \in \mathbb{C}$)

Fakt:

Auf der Menge U aller z , wo die Reihe konvergiert, ist dadurch eine Funktion definiert.

Ist $z \in U$ und $|z'| < |z|$, so ist $z' \in U$ und die Reihe konvergiert absolut in z' .

Bew.:

$$z \in U \implies \lim_{k \rightarrow \infty} a_k z^k = 0$$

Insbesondere $\exists c > 0 \forall k \geq 0 : |a_k z^k| \leq c$

$$\sum_{k=0}^{\infty} |a_k z^k| = \sum_{k=0}^{\infty} \left| a_k z^k \left(\frac{z'}{z} \right)^k \right| \leq \sum_{k=0}^{\infty} c \cdot \left| \frac{z'}{z} \right|^k < \infty$$

Majorantenkriterium

\implies Entweder absolute Konvergenz auf \mathbb{R}
oder $U = [-a, a]$ für $a < \infty$ und wir haben

Konvergenz auf $] -a, a[$

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \cdot z^k, a_k \in \mathbb{C}$$

Fakt:

Falls $f(\zeta)$ konvergiert für $\zeta \in \mathbb{C}$ dann konvergiert $f(\zeta')$ absolut für jedes $\zeta' \in \mathbb{C}$ mit $|\zeta'| < |\zeta|$.

Folge: Konvergenzbereich von $f := \{\zeta \in \mathbb{C} \mid f(\zeta) \text{ konvergiert}\}$

Mit $\rho := \sup\{|\zeta| : f(\zeta) \text{ konv.}\}$ gilt:

$f(\zeta)$ divergiert für $|\zeta| > \rho$

$f(\zeta)$ irgendetwas für $|\zeta| = \rho$

$f(\zeta)$ konvergiert absolut für $|\zeta| < \rho$
 \implies Konvergenzbereich ist eine Kreisscheibe mit oder ohne
 oder mit einem Teil des Randes.
 Spezialfall $\rho = \infty$ absolute Konvergenz auf \mathbb{C}

Bem.:

$\rho \geq 0$ immer

Spezialfall: $\rho = 0$: Konvergenz nur in $z = 0$

Def.: Konvergenzradius

ρ heisst **Konvergenzradius** von f .

6.0.1 Bestimmung des Konvergenzradiuses

Quotientenkriterium

Falls der Grenzwert $\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right|$ existiert oder $= \infty$, so ist er gleich ρ

Idee:

Sei $\alpha := \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right|$ und $\zeta \in \mathbb{C}$ mit $|\zeta| < \alpha$.

Wähle $\alpha' \in]|\zeta|, \alpha[$ und k_0 mit $\forall k \geq k_0 : \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right| > \alpha'$

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{\infty} |a_k \cdot \zeta^k| &= \sum_{k=0}^{\infty} |a_k| \cdot |\zeta|^k \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} |a_k| \cdot \alpha'^k \cdot \left(\frac{|\zeta|}{\alpha'} \right)^k \\ &\leq \sum_{k=0}^{k_0-1} (\text{etwas}) + \sum_{k=k_0}^{\infty} c \cdot q^k \quad \text{konvergent.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\alpha' \cdot |a_{k+1}| &\leq |a_k| \\ \alpha' \cdot |a_{k+2}| &\leq |a_{k+1}| \\ \implies \forall k \geq k_0 : \alpha'^{k-k_0} |a_k| &\leq |a_{k_0}| \\ \alpha'^k \cdot |a_k| &\leq \alpha'^{k_0} \cdot |a_{k_0}| =: c\end{aligned}$$

Double
su-
per-
script

Bsp.:

$$a \in \mathbb{C} \setminus \{0\}, \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{a^k} \quad \text{hat Konv. Radius:}$$

$$a_k = \frac{1}{a^k} \implies \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{a^k}}{\frac{1}{a^{k+1}}} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} |a| = |a|$$

Bsp.:

$$\begin{aligned}\alpha \in \mathbb{R}, \sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^k}{k^\alpha} : a_k = \frac{1}{k^\alpha} &\rightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{k^\alpha}}{\frac{1}{(k+1)^\alpha}} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\frac{k+1}{k} \right)^\alpha \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{k} \right)^\alpha \\ &= 1\end{aligned}$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} = 0$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} (1+y)^\alpha = (1+0)^\alpha = 1$$

\implies Konvergenzradius 1

$\alpha = 0 \implies$ Divergent für alle $\zeta \in \mathbb{C}$ mit $|\zeta| = 1$

$\alpha > 1 \implies$ absolut konvergent für alle $\zeta \in \mathbb{C}$ mit $|\zeta| = 1$

$0 \leq \alpha \leq 1 \implies$ Divergenz für alle $\zeta = 1$
Konvergenz für $\zeta = -1$

Bsp.:

$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}$ hat Konvergenzradius ∞ .

$$a_k = \frac{1}{k!}, \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{1}{k!}}{\frac{1}{(k+1)!}} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} (k+1) = \infty$$

Bsp.:

$$\sum_{k=0}^{\infty} k^k \cdot z^k$$

$$\begin{aligned} a_k = k^k, \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right| &= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k^k}{(k+1)^{k+1}} \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \underbrace{\left(\frac{k}{k+1} \right)^k}_{\leq 1} \cdot \underbrace{\frac{1}{k+1}}_{\rightarrow 0} \\ &= 0 \quad \text{Majorantenkriterium} \end{aligned}$$

Bsp.:

$$\sum_{k=0}^{\infty} (\sin k) \cdot z^k$$

$a_k = \sin k$; $\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{\sin k}{\sin(k+1)} \right|$ existiert nicht

$|\zeta| < 1 \implies$ konvergenz bei $\zeta : |(\sin k) \cdot z^k| \leq |z|^k$

Da $\sin k \rightarrow 0$ bei $k \rightarrow \infty$, ist $\rho = 1$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \sin \frac{k\pi}{2} \cdot z^k = \sum_{k=0}^{\infty} \begin{cases} 0 & \text{falls } k \text{ gerade} \\ 1 & \text{falls } k = 1 + 4l | l \in \mathbb{Z} \\ -1 & \text{falls } k = 3 + 4l \end{cases} \cdot z^k$$

$$\frac{\sin \frac{k\pi}{2}}{\sin \frac{(k+1)\pi}{2}}$$

$$k = 2m + 1$$

$$\sum_{m=0}^{\infty} (-1) \cdot z^{2m+1} = \left(\sum_{m=0}^{\infty} (-1) \cdot (z^2)^m \right) \cdot z \quad \text{Reihe in } z^2 = y$$

$$= z \cdot \left(\sum_{m=0}^{\infty} (-1) \cdot y^m \right) \begin{cases} \text{konvergiert f\"ur} & |y| < 1 \\ \text{divergiert} & |y| > 1 \end{cases}$$

\implies hat Konv. Radius 1

W\"urzelkriterium

$\alpha := \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[k]{|a_k|}}$ existiert,

dann ist $\alpha = \rho$

Für $k \in \mathbb{Z}^{\geq 0}$ und $\alpha \in \mathbb{C}$ sei

$$\binom{\alpha}{k} := \begin{cases} \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-k+1)}{k!} & k \geq 1 \\ 1 & k = 0 \end{cases}$$

6.0.2 Binomialkoeffizient

Für $\alpha \in \mathbb{Z}^{\geq 0}$ ist $\binom{\alpha}{k}$ = Anzahl der k -elementigen Teilmengen einer Menge mit α Elementen.

Def.: Binomische Reihe

$$\sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} \cdot z^k$$

Konvergenzradius falls $\alpha \notin \mathbb{Z}^{\geq 0}$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right| = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\left| \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-k+1)}{k!} \right|}{\left| \frac{\alpha(\alpha-1)\dots(\alpha-k)}{(k+1)!} \right|} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{k+1}{\alpha-k} \right| = 1$$

Für $\alpha, x \in \mathbb{R}, |x| < 1$, gilt

$$\sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} \cdot x^k = (1+x)^\alpha$$

Spezialfall: $\alpha = n \in \mathbb{Z}^{\geq 0}, z \in \mathbb{C}, |z| < 1$

Reihe bricht ab,

$(1+z)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot z^k$ und Konvergenzradius ∞

Spezialfall $\alpha = -n, n \in \mathbb{Z}^{>0}$

$$\begin{aligned} \frac{1}{(1+z)^n} &= \sum_{k=0}^{\infty} \binom{-n}{k} \cdot z^k \\ \binom{-n}{k} &= \frac{(-n)(-n-1)\dots(-n-k+1)}{k!} \\ &= (-1)^k \cdot \frac{(n+k-1)(n+k-2)\dots(n+1)n}{k!} \end{aligned}$$

$$\frac{1}{(1-z)^n} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n+k-1}{k} \cdot z^k$$

$$n = 1$$

$$\frac{1}{1-z} = \sum_{k=0}^{\infty} z^k$$

$$n = 2$$

$$\frac{1}{(1-z)^2} = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) \cdot z^k$$

Spezialfall: $\alpha = \frac{1}{2}$

$$\rightsquigarrow \sqrt{1+x} = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\frac{1}{2}}{k} \cdot x^k = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \dots$$

Fakt:

Jede Potenzreihe definiert in Inneren ihres Konvergenzradiuses eine stetige Funktion.

6.0.3 Rechnen mit Potenzreihen

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{1-z} \cdot \frac{1}{1-z} &= \frac{1}{(1-z)^2} \\
 &= \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) \cdot z^k \text{ für } |z| < 1 \\
 &= \left(\sum_{k=0}^{\infty} z^k \right) \left(\sum_{l=0}^{\infty} z^l \right) \\
 &= \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{l=0}^{\infty} z^{k+l} \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} |\{(k, l), k, l \in \mathbb{Z}^{\geq 0}, k+l=n\}| \cdot z^n \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) \cdot z^n
 \end{aligned}$$

Produkt

$$\left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k \cdot z^k \right) \left(\sum_{l=0}^{\infty} b_l \cdot z^l \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{l=0}^n a_l b_{n-l} \right) z^n \quad l = n - k$$

falls beide Reihen konvergieren.

Analog: Summe, Differenz, Quotient, Komposition, Umkehrfunktion sind wieder Potenzreihen.

6.0.4 Exponentialfunktion

$$\exp(z) := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}$$

Konvergenzradius = $\infty \rightsquigarrow$ stetige Funktion $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$

Additionstheorem

Für $z, w \in \mathbb{C}$ gilt

$$\exp(z + w) = \exp(z) \cdot \exp(w)$$

Bew.:

$$\begin{aligned} \exp(z + w) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z + w)^n}{n!} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} \binom{n}{k} z^k \cdot w^{n-k} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k \cdot w^{n-k}}{k! (n-k)!} \\ &= \sum_{k,l \geq 0} \frac{z^k w^l}{k! l!} \\ &= \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!} \right) \left(\sum_{l=0}^{\infty} \frac{w^l}{l!} \right) \\ &= \exp(z) \cdot \exp(w) \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Insbesondere gilt für alle $z \in \mathbb{C}$ und $n \in \mathbb{Z}$, $\exp(nz) = \exp(z)^n$

$$n \geq 1 : \exp(z + \dots + z)$$

$$n = 0 : \exp(0z) = 1 = \exp(z)^0$$

$$n < 0 : 1 = \exp(0) = \exp(nz - nz) = \exp(nz) \cdot \exp(-nz)$$

Def.: Eulersche Zahl

$$e = \exp(1) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}$$

Satz:

Für $x \in \mathbb{R}$ gilt

$$\exp(x) = e^x$$

Bew.:

$$\xi = \frac{m}{n}; m, n \in \mathbb{Z}^{>0} \text{ ist}$$

$$\exp(\xi) > 0$$

$$\exp(\xi)^n = \exp(n\xi) = \exp(m) = \exp(1)^m = e^m$$

$$\implies \exp(\xi) = \sqrt[n]{e^m} = e^{\frac{m}{n}} = e^{\xi}$$

$$\implies \exp(-\xi) = \frac{1}{\exp(\xi)} = \frac{1}{e^{\xi}} = e^{-\xi}$$

$$\stackrel{?}{=} \exp \xi = e^{\xi} \text{ für alle } \xi \text{ aus } \mathbb{Q}.$$

Da beide Seiten stetig

$$\implies \exp(x) = e^x \text{ für alle } x \in \mathbb{R} \quad \blacksquare$$

Bem.: Abkürzung

Für $z \in \mathbb{C}$

$$e^z := \exp(z)$$

Eigenschaften

a) $\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^{>0}$ ist bijektiv, stetig und streng monoton wachsend.

b) Für jedes $q \in \mathbb{Z}$ gilt

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^q} &= \infty \\ \lim_{x \rightarrow \infty} x^q \cdot e^{-x} &= 0\end{aligned}$$

Denn:

$$\frac{e^x}{x^q} = \frac{1}{x^q} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \geq \frac{1}{x^q} \frac{x^{q+1}}{(q+1)!} \frac{1}{(q+1)!} \rightarrow \text{für } x \rightarrow \infty \implies \frac{e^x}{x^q} \rightarrow \infty$$

und

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^q \cdot e^{-x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^q \cdot e^{-x}} = 0$$

Erinnerung: $\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^{>0}$ bijektiv, streng monoton wachsend.

6.0.5 Logarithmus

Def.: natürliche Logarithmus

Dir Umkehrfunktion der obigen ist der **natürliche Logarithmus** $\log : \mathbb{R}^{>0} \rightarrow \mathbb{R}$.
bijektiv, streng monoton wachsend

Historisch:

$$\log_{10} = \lg$$

$$\log_2 = \text{lb} \quad \text{binärlog.}$$

$$\log_e = \frac{\ln}{\log} \quad \text{natürlicherlog.}$$

Rechenregeln

$$e^{\log y} = y \text{ für } y > 0, y \in \mathbb{R}$$

$$\log e^x = x \text{ für } x \in \mathbb{R}$$

$$\log(xy) = \log x + \log y$$

$$\log \frac{1}{x} = -\log x$$

$$\log x^y = y \log x$$

$$a^x = e^{x \log a} = \exp(\log a \cdot x)$$

$$y = a^x$$

$$\iff x = \log_a y$$

$$\iff y = e^{\log_a x}$$

$$\iff (\log a) \cdot x = \log y \rightsquigarrow \log_a y = \frac{\log y}{\log a}$$

Komplexität:	+	:	$O(n)$	Schulemethode
	·	:	$O(n^2)$	
	·	:	$O(n \cdot \log n)$	

Grenzwerte

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \log t = \infty$$

$$\lim_{t \rightarrow 0+} \log t = -\infty$$

Für jedes $\alpha > 0$ gilt:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\log t}{t^\alpha} = 0$$
$$\lim_{t \rightarrow 0+} t^\alpha \log t = 0$$

Denn:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\log t}{e^{\alpha \log t}} = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s}{e^{\alpha s}} = \lim_{u \rightarrow \infty} \frac{\frac{u}{\alpha}}{e^u} = 0$$
$$\lim_{t \rightarrow 0+} t^\alpha \log t = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{-\log s}{s^\alpha} = 0$$

Fakt:

$$\lim_{z \rightarrow 0} \frac{e^z - 1}{z} = 1 \quad z \in \mathbb{C}$$

Bew.:

$$\frac{e^z - 1}{z} = \frac{\left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}\right) - 1}{z} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^{k-1}}{k!} \rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} \frac{0^{k-1}}{k!} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x)}{x} \quad x \in \mathbb{R}$$

Bew.:

$$y = \log(1+x)$$

$$\rightsquigarrow e^y = 1+x$$

$$e^y - 1 = x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x)}{x} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{e^y - 1} = 1$$

Fakt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = \exp(x) \quad x \in \mathbb{R}$$

Bew.:

$$x \neq 0 \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{n} = 0$$

$$\text{aber } \frac{x}{n} \neq 0$$

$$\implies \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \log \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n}{n \frac{x}{n}} = 1$$

$$\implies \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n}{x} = 1$$

$$\implies \lim_{n \rightarrow \infty} \log \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = x$$

$$\text{stetigkeit von } \exp \implies \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x \quad \blacksquare$$

Insbesondere

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

6.o.6 Potenzreihenentwicklung

$$1 + y = e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6}$$

$$y = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \dots$$

$$\text{Ansatz: } x = y + ay^2 + by^3 + \dots$$

$$\begin{aligned}
 y &= (y + ay^2 + by^3) + \frac{1}{2}(y + ay^2 + by^3)^2 + \frac{1}{6}(y + ay^2 + by^3)^3 + \dots \\
 &= y + y^2 \underbrace{\left(a + \frac{1}{2}\right)}_{a=\frac{1}{2}} + y^3 \underbrace{\left(b + \frac{1}{2}2a + \frac{1}{6}\right)}_{\substack{b+a+\frac{1}{6}=0 \\ b=\frac{1}{2}-\frac{1}{6}=\frac{1}{3}}} + O(x^4) \\
 \log(1+y) &= y - \frac{y^2}{2} + \frac{y^3}{3} + \dots
 \end{aligned}$$

Fakt:

$$\log(1+y) = y - \frac{y^2}{2} + \frac{y^3}{3} - \frac{y^4}{4} + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1} y^k}{k} \quad \text{falls } |y| < 1$$

Erinnerung:

$$\begin{aligned}
 \exp(it) &= \cos t + i \sin t = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(it)^k}{k!} = \sum_{\substack{k=0 \\ \text{gerade}}}^{\infty} \frac{(-1)^{\frac{k}{2}} t^k}{k!} + \sum_{\substack{k=1 \\ \text{ungerade}}}^{\infty} \frac{(-1)^{\frac{k-1}{2}} t^k}{k!} \\
 \Rightarrow \cos t &= \sum_{l=0}^{\infty} \frac{(-1)^l t^{2l}}{(2l)!} = 1 - \frac{t^2}{2} + \frac{t^4}{24} \mp \dots \\
 \Rightarrow \sin t &= \sum_{l=0}^{\infty} \frac{(-1)^l t^{2l+1}}{(2l+1)!} = t - \frac{t^3}{6} + \frac{t^5}{120} \mp \dots
 \end{aligned}$$

Bem.:

Durch

$$\sin t = \frac{e^{it} - e^{-it}}{2i}$$

und

$$\cos t = \frac{e^{it} + e^{-it}}{2}$$

oder der entsprechenden Potenzreihenentwicklung definieren \sin und \cos auch Funktionen $\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$.

Bem.:

π ist die kleinste reelle Zahl > 0 mit $\sin \pi = 0$

Bem.:

$$e^{x+iy} = e^x e^{iy} = e^x (\cos y + i \sin y) \quad x, y \in \mathbb{R}$$

$$e^{z+2\pi ik} = e^z \quad \text{für } z \in \mathbb{C}, k \in \mathbb{Z}$$

$$\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, z \mapsto e^z :$$

$$\text{Bild} = \mathbb{C} \setminus \{0\}$$

$$e^z = e^w \iff w = z + 2\pi ik \quad \text{für ein } k \in \mathbb{Z}$$

Satz: Pythagoras

$$\cos^2 t + \sin^2 t = 1$$

Bew.:

$$\begin{aligned} & \left(\frac{e^{it} + e^{-it}}{2} \right)^2 + \left(\frac{e^{it} - e^{-it}}{2i} \right)^2 \\ &= \frac{e^{2it} + 2 + e^{-2it}}{4} + \frac{e^{2it} - 2 + e^{-2it}}{-4} = 1 \end{aligned}$$

Analog:

$$\cos 2t = \cos^2 t - \sin^2 t$$

$$\sin 2t = 2 \cos t \sin t$$

6.1 Hyperbolische Funktionen

$$\cosh t = \frac{e^t + e^{-t}}{2} = 1 + \frac{t^2}{2} + \frac{t^4}{24} + \dots$$

$$\sinh t = \frac{e^t - e^{-t}}{2} = t + \frac{t^3}{6} + \frac{t^5}{120} + \dots$$

$$\cosh(it) = \cos(t) \iff \cosh(t) = \cos(it)$$

$$\sinh(it) = i \sin(t) \iff \sinh(t) = \frac{\sin(it)}{i} = -i \sin(it)$$

6.1.1 Umkehrfunktionen

$$x = \cosh t = \frac{e^t + e^{-t}}{2} \quad t \geq 0$$

$$e^t 2x = (e^t + e^{-t})e^t$$

$$0 = e^{2t} - 2xe^t + 1$$

$$e^t = \frac{2x \pm \sqrt{4x^2 - 4}}{2} = x \pm \sqrt{x^2 - 1} \quad \text{nur +, da } x \geq 1$$

$$t = \log(x + \sqrt{x^2 - 1}) = \operatorname{arcosh}(t)$$

Bem.:

$$\begin{aligned} \tan x &= \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} \mp \dots}{1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} \mp \dots} \\ &= x \frac{1 - \frac{x^2}{6} + \frac{x^4}{120} \mp \dots}{1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} \mp \dots} \\ &= x(a + bx^2 + cx^4 + \dots) \quad \text{Ansatz} \\ 1 - \frac{x^2}{6} + \frac{x^4}{120} &= \left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24}\right) (a + bx^2 + cx^4 + \dots) \\ &= a + \left(b - \frac{a}{2}\right) x^2 + \left(c - \frac{b}{2} + \frac{a}{24}\right) x^4 + \dots \\ \Rightarrow \quad 1 &= a & a &= 1 \\ -\frac{1}{6} &= b - \frac{a}{2} & b &= \frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{1}{3} \\ \frac{1}{120} &= c - \frac{b}{2} + \frac{a}{24} & c &= \frac{2}{15} \\ \Rightarrow \tan x &= x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \dots \end{aligned}$$

6.2 "Klein-o" und "Gross-O" Notation

Betrachte $g(x)$ für $x \rightarrow x_0$

Def.: Gross O

$O(g(x))$ bezeichnet irgendeine Funktion f mit $\left| \frac{f(x)}{g(x)} \right|$ beschränkt für $x \rightarrow x_0$

Def.: Klein o

$o(g(x))$ bezeichnet irgendeine Funktion f mit $\left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| \rightarrow 0$ für $x \rightarrow x_0$

Bsp.:

$f(x) = O(1)$ für $x \rightarrow x_0$ bedeutet $f(x)$ beschränkt für $x \rightarrow x_0$
 $\Rightarrow \frac{1}{x^n} = O(1) = o(1)$ für $x \rightarrow x_0, n > 0$

$$\left. \begin{array}{l} f(x) = O(1) \\ g(x) = O(1) \end{array} \right\} f(x) = h(x) \quad \text{BLÖDSINN}$$

Bsp.:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k \quad \text{Konvergenzradius } \rho > 0$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \left(f(x) - \sum_{k=0}^n a_k x^k \right) &= \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k x^k \\ &= \underbrace{\left(\sum_{k=0}^{\infty} a_{k+n+1} x^k \right)}_{\substack{\Rightarrow \text{hat Konvergenzradius } \rho \\ \text{stetige Funktion nahe } x=0 \\ \text{geht gegen } a_{n+1} \text{ für } x \rightarrow 0 \\ \Rightarrow \text{beschränkt nahe } x=0}} x^{n+1} \\ \Rightarrow f(x) &= \sum_{k=0}^n a_k x^k + O(x^{n+1}) \quad \text{für } x \rightarrow 0 \end{aligned}$$

Bsp.:

$$x^n = o(e^x) \text{ für jedes } n \text{ für } x \rightarrow \infty$$

Bsp.:

$$e^x \text{ ist nicht } O(x^n) \text{ für } x \rightarrow \infty$$

Bem.:

$$f \text{ ist stetig in } x_0 \iff f(x) = f(x_0) + o(1) \text{ für } x \rightarrow x_0$$

Erinnerung:

$$f(x) = O(g(x)) \text{ falls } \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| \text{ beschränkt.}$$

$$f(x) = o(g(x)) \text{ falls } \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| \rightarrow 0$$

Rechenregeln

$$\left. \begin{array}{l} f(x) = O(g(x)) \\ g(x) = O(h(x)) \end{array} \right\} f(x) = O(h(x))$$
$$\log(x) = O(x), x \rightarrow x_0$$
$$\left. \begin{array}{l} f_1(x) = O(g(x)) \\ g_2(x) = O(g(x)) \end{array} \right\} f_1(x) + f_2(x) = O(g(x))$$

Analog $o(\cdot)$

Kapitel 7

Differenzierbarkeit

$$f : X \rightarrow Y, X, Y \subset \mathbb{R}, x_0 \in X$$

$$f \text{ stetig in } x_0 \iff f(x) = f(x_0) + o(1) \text{ f\"ur } x \rightarrow x_0$$

$$f \text{ ist differenzierbar in } x_0 \text{ mit Ableitung } f'(x_0)$$

$$\iff$$

$$f(x) = f(x_0) + \underbrace{f'(x_0)}_{\text{Steigung der Tangente}} \cdot (x - x_0) + o(x - x_0)$$

$$\text{\AA}quivalent: \left| \frac{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)}{x - x_0} \right| \rightarrow 0$$

$$\left| \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \right| - f'(x_0) \rightarrow 0$$

$$\text{\AA}quivalent: f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

$$\text{Leibniz: } \frac{dy}{dx} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

Def.: differenzierbar

f ist differenzierbar, falls differenzierbar in jedem $x_0 \in X$.
Dann ist $f' : X \rightarrow \mathbb{R}, x_0 \mapsto f'(x_0)$ eine neue Funktion genannt Ableitung.

Bem.:

differenzierbar \implies stetig

differenzierbar $\not\Leftarrow$ stetig

Interpretation:

x Raumkoordinate $\rightsquigarrow f'$ Tangente / Veränderungsrate

$f(t) = \text{Ort}, t = \text{Zeit} \implies f'(t) = \text{Geschwindigkeit}, f''(t) = \text{Beschleunigung}$

Def.: differenzierbar

f heisst zweimal differenzierbar, falls f differenzierbar ist und f' differenzierbar ist.

Analog: f ist n -fach differenzierbar

f ist beliebig oft differenzierbar

Notation:

Newton: $f, f', f'', f^{IV}, f^V, f^{(n)}$

Leibniz: $\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(y), \frac{d^2 y}{dx^2} = \left(\frac{d}{dx}\right)(y)$

Bsp.:

$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto |x|$ ist differenzierbar für $x \neq 0$

$$\text{Ableitung} = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$$

$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^n, n \in \mathbb{Z}^{\geq 0}$ ist differenzierbar mit Ableitung nx^{n-1}

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x^n - x_0^n}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} (x^{n-1} + x^{n-2}x_0 + \dots + x_0^{n-1}) = nx_0^{n-1}$$

$$x = x_0 + h; h \rightarrow 0$$

$$x^n = (x_0 + h)^n = x_0^n + nx_0^{n-1}h + \underbrace{\sum_{k=2}^n \binom{n}{k} x_0^{n-k} h^k}_{O(h^2)=o(h)}$$

Satz:

Jede Potenzreihe $f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ mit Konvergenzradius $\rho > 0$ ist für $x \in]-\rho, \rho[$ differenzierbar mit Ableitung $f'(x) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k k x^{k-1}$ mit demselben Konvergenzradius ρ .
Folge: Dann ist f beliebig oft differenzierbar.

Bsp.:

$$(e^x)' = \left(\sum_{k \geq 0} \frac{x^k}{k!} \right)' = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{kx^{k-1}}{k!} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{k-1}}{(k-1)!} = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{x^l}{l!}$$

$$\left(\underbrace{\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k}}_{\rho=1} \right)' = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{kx^{k-1}}{k} = \sum_{l=0}^{\infty} x^l = \frac{1}{1-x}$$

Bsp.:

$$\begin{aligned} (\log x)' &= \frac{1}{x} \\ y = \log x &\iff x = e^y \\ \implies \frac{dx}{dy} &= (e^y)' = e^y = x \\ \implies \frac{dy}{dx} &= \left(\frac{dx}{dy} \right)^{-1} = x^{-1} \end{aligned}$$

Bsp.:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx}(x^a) &= ax^{a-1} \\ x &> 0, a \in \mathbb{R} \\ x^a &= (e^{\log x})^a = e^{a \log x} \\ y &= a \log x \end{aligned}$$

$$z = e^y$$

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}(e^{a \log x}) &= \frac{dz}{dx} = \frac{dz}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = e^y \cdot \frac{d}{dx}(a \log x) \\ &= e^{a \log x} \cdot a \cdot \frac{d}{dx}(\log x) = x^a \cdot a \cdot \frac{1}{x} = ax^{a-1}\end{aligned}$$

Bsp.:

$$\frac{d}{dx}(a^x) = \frac{d}{dx}(e^{x \log a}) = e^{x \log a} \cdot \frac{d}{dx}(x \log a) = \log a \cdot a^x$$

Satz: Mittelwertsatz (MWS)

Ist f auf $[a, b]$ stetig und auf $]a, b[$ differenzierbar, so existiert $t \in]a, b[$ mit $f'(t) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

Bew.:

Betrachte $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}x$

Dann ist g stetig, auf $]a, b[$ differenzierbar,
 $g(b) = g(a)$

MWS für g besagt: $\exists t \in]a, b[: g'(t) = 0$

Satz: Satz von Rolle

Bew.:

g kon-
stant

\Rightarrow klar!

jedes t
tut's.

Sonst:

falls $\exists t \in$
 $[a, b]$:


$g(t) >$
 $g(a)$

$\Rightarrow m =$

$\max\{g(t) | t \in$
 $[a, b]\}$ $>$

$g(a)$ da







$[a, b]$
kompakt
und g
stetig.

Sei
 $t \in [a, b]$
mit
 $g(t) = m$
 $\implies t \in]a, b[$
 g ist in t
differen-
zierbar.

$$g'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\overbrace{g(t+h) - g(t)}^{\leq 0}}{\underbrace{h}_{>0 \text{ oder } <0}}$$

$$\text{Dann } 0 = g'(t) = f'(t) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \quad \checkmark$$

Folge:

Ist $f : I \rightarrow \mathbb{R}, I \subset \mathbb{R}, I$
Intervall, differenzier-
bar und $|f'(t)| \leq M$
für alle $t_1, t_2 \in I$:
 $|f(t_2) - f(t_1)| \leq$
 $M \cdot |t_2 - t_1|$



Bew.:

oBdA

$$t_1 < t_2.$$

ZWS für

$$f|_{[t_1, t_2]} \rightarrow$$

$$\exists t_i n] t_1, t_2[:$$

$$\left| \frac{f(t_1) - f(t_2)}{t_1 - t_2} \right| =$$

$$|f'(t)| \leq$$

$$M$$

Folge:

$(M = 0)$ f differenzierbar
auf I mit $f' = 0$ überall
 $\Rightarrow f$ konstant.

Folge:

Sind $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$, I Intervall, differenzierbar und
 $f'(t) = g'(t)$ für alle $t \in I$,
dann ist $g(t) = f(t) + c$ für
eine Konstante c .

Bsp.:

$$f(x) := \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k} :]-1, 1[\rightarrow \mathbb{R} \text{ differenzierbar}$$

$$f'(x) = \frac{1}{1-x}$$

$$g(x) := -\log(1-x) :]-1, 1[\rightarrow \mathbb{R} \text{ differenzierbar}$$

$$g'(x) = \frac{1}{1-x} = f'(x)$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow f(x) &= c - \log(1-x) \text{ für alle } x \in]-1, 1[\\ 0 &= f(0) = c - \log(1-0) = c \end{aligned}$$

Fazit:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k} = -\log 1-x \text{ für alle } |x| < 1$$

$$\Rightarrow \log(1+x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k x^k}{k} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$$

Bsp.:

$$f(x) := \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \cdot \frac{x^{2k+1}}{2k+1} \text{ für } |x| < 1$$

$$g(x) := \arctan(x)$$

$$g'(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

$$f'(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^{2k} = \sum_{k=0}^{\infty} (-x^2)^k = \frac{1}{1-(-x^2)} = \frac{1}{1+x^2}$$

$$\implies f(x) = \arctan(x) + c$$

$$0 = f'(0) = \arctan(0) + c = c$$

Fazit:

$$\arctan x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \cdot \frac{x^{2k+1}}{2k+1}$$

Satz:

note = Variante des MWS Seien $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, auf $]a, b[$ differenzierbar, $a < b$. Sei $g'(t) \neq 0$ für alle $t \in]a, b[$ mit

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(t)}{g'(t)}$$

Analog für $x \rightarrow a+$

Analog für $x \rightarrow c, c \in]a, b[$

Bem.:

$$\text{MWS für } g \implies g(b) \neq g(a)$$

Satz: Regel von Bernoulli-de l'Hôpital

Seien $f, g :]a, b[\rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar mit $g'(t) \neq 0$ überall
und seien $\lim_{x \rightarrow b-} f(x) = \lim_{x \rightarrow b-} g(x) = 0$ (oder beide ∞)
Dann gilt

$$\lim_{x \rightarrow b-} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow b-} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

falls die R.S. existiert oder $= \pm\infty$ ist.

Bew.:

$$b < \infty, \lim_{x \rightarrow b-} f(x) = \lim_{x \rightarrow b-} g(x) = 0$$

$\rightsquigarrow f, g$ haben stetige Fortsetzung auf $]a, b[$

Für jedes $x \in]a, b[$ anwende MWS auf $[x, b]$

\rightsquigarrow existiert $t \in]x, b[$ mit

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(b) - f(x)}{g(b) - g(x)} = \frac{f'(t)}{g'(t)}$$

Für $x \rightarrow b-$ gilt auch $t \rightarrow b-$ und ...✓

Für $b = \infty$ sei oBdA $a > 0$

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{f(t)}{g(t)} &= \lim_{s \rightarrow 0+} \frac{f\left(\frac{1}{s}\right)}{g\left(\frac{1}{s}\right)} = \lim_{s \rightarrow 0+} \frac{\frac{d}{ds} f\left(\frac{1}{s}\right)}{\frac{d}{ds} g\left(\frac{1}{s}\right)} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0+} \frac{f'\left(\frac{1}{s}\right) \frac{1}{s^2}}{g'\left(\frac{1}{s}\right) \frac{1}{s^2}} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{f'(t)}{g'(t)} \end{aligned}$$

$$\lim_{s \rightarrow 0+} f\left(\frac{1}{s}\right) = \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = 0$$

$$\lim_{s \rightarrow 0+} g\left(\frac{1}{s}\right) = \lim_{t \rightarrow \infty} g(t) = 0$$

Fall $\lim_{x \rightarrow b-} f(x) = \lim_{x \rightarrow b-} g(x) = \infty$
weggelassen.

Bsp.1:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1} = \cos 0 = 1$$

Bsp.2:

$$a, b > 0$$

$$b \neq 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{b^x - 1} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\log a)a^x}{(\log b)b^x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\log a)a^0}{(\log b)b^0} = \frac{\log a}{\log b}$$

Bsp.3:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\log x)^2}{x} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2(\log x) \frac{1}{x}}{1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 \log x}{x} \stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2 \frac{1}{x}}{1} = 0$$

Bsp.4:

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x \sin x} \\
 &\stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{1 \sin x + x \cos x} \\
 &\stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{\cos x + 1 \cos x + x(-\sin x)} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{2 \cos x - x \sin x} = \frac{-\sin 0}{2 \cos 0 - 0 \sin 0} \\
 &= \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

Bsp.5:

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log \cos x}{1 - \sqrt{1 - x^2}} &\stackrel{H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\cos x}(-\sin x)}{-\frac{1}{2}(1 - x^2)^{-\frac{1}{2}}(-2x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{\sin x}{\cos x}}{\frac{x}{\sqrt{1 - x^2}}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1 - x^2} \sin x}{-\cos x} \cdot \frac{1}{x} = \frac{\sqrt{1 - 0^2}}{-\cos 0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = -1 \cdot 1 \\
 &= -1
 \end{aligned}$$

Erinnerung:

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k \quad \text{mit Konvergenzradius } \rho > 0 \\
 \Rightarrow f'(x) &= \sum_{k=0}^{\infty} a_k k x^{k-1} \quad \text{für } |x| < \rho \\
 \Rightarrow f^{(n)}(x) &= \sum_{k=n}^{\infty} a_k k(k-1) \dots (k-n+1) x^{k-n} \\
 \Rightarrow f^{(n)}(0) &= (\text{Term für } k = n) = a_n n!
 \end{aligned}$$

Folge: Für jedes $n \in \mathbb{Z}^{\geq 0}$ ist

$$a_n = \frac{f^{(n)}(0)}{n!}$$

Folge: Die Koeffizienten einer Potenzreihe mit Konvergenzradius > 0 sind durch die dargestellte Funktion eindeutig bestimmt.

Satz: Potenzreihen Identitätssatz

Folge:

Stellen zwei Potenzreihen für $|x| < \varepsilon$ dieselbe Funktion dar, so sind sie bereits gliedweise gleich.

7.0.1 Extrema

Sei $A \subset \mathbb{R}$ eine Teilmenge.

$\sup(A)$, $\max(A)$, obere Schranke

$\inf(A)$, $\min(A)$, untere Schranke

Def.: Extremalstelle

Sei $f : B \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion.

- a) Eine obere Schranke, Maximum, Supremum, untere Schranke, Minimum, Infimum von $f(B) = \text{image}(f)$ heisst auch ...von f . (global)
- b) Ein $b \in B$ mit $f(b) = \max f$ heisst Maximalstelle von f .

Ein $b \in B$ mit $f(b) = \min f$ heisst Minimalstelle von f .
Beide solche b heissen **Extremalstellen** von f

Def.: Extremum

Extremum = Maximum oder Minimum

Satz:

Ist $B \subset \mathbb{R}^n$ kompakt (d.h. abgeschlossen und beschränkt),
und $f : B \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, dann existieren $\max f$ und $\min f$

Bsp.:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$$

$\max f = 1$, einzige Maximalstelle ist $x = 0$

$\min f$ existiert nicht $\inf f = 0$

Def.: lokales Maximum

f hat in $b_0 \in B \subset \mathbb{R}^n$ ein lokales Maximum, wenn

$$\exists \delta > 0 : \forall b \in B : |b - b_0| < \delta \implies f(b) \leq f(b_0)$$

Def.: lokales Minimum

f hat in $b_0 \in B \subset \mathbb{R}^n$ ein lokales Minimum, wenn

$$\exists \delta > 0 : \forall b \in B : |b - b_0| < \delta \implies f(b) \geq f(b_0)$$

Fakt:

Jedes globale Maximum von f ist ein lokales Maximum von f (analog Min., Extr.)

Def.: kritischer Punkt

Jetzt sei $B \subset \mathbb{R}$ und $f : B \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar. Eine b'_0 in B mit $f'(b_0) = 0$ heisst **kritischer Punkt** von f .

Proposition: Jede lokale Extremstelle von f in B° ist ein kritischer Punkt von f .

Bew.:

$$\begin{aligned} \exists \delta > 0 \forall b \in B : |b - b_0| < \delta &\implies f(b) \leq f(b_0) \\ \frac{f(b) - f(b_0)}{b - b_0} \text{ ist } \begin{cases} \leq 0 & b > b_0 \\ \geq 0 & b < b_0 \end{cases} &\text{ und } \rightarrow f'(b) \text{ f\"ur } b \rightarrow b_0 \\ \implies f'(b) = 0 &\blacksquare \end{aligned}$$

Folge:

Ist $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und auf $]a, b[$ differenzierbar, so besitzt f ein Maximum und ein Minimum, und zwar auf der Teilmenge $\{a, b\} \cup \{\text{kritische Punkte von } f \text{ auf }]a, b[\}$

Bsp.1:

Bestimme die Extrema von $f : [-3, 3] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^3 - 3x^2 + 2$

Lösung: f differenzierbar

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$$

$$\implies \text{kritische Punkte } \{0, 2\} \subset]-3, 3[$$

Kandidaten $\{-3, 3, 0, 2\}$

x	-3	3	0	2
$f(x)$	-52	2	2	-2

Fazit:

f hat Min. -52 nur an $x = -3$

f hat Max. 2 genau an $x = 0, 3$

Bsp.2:

Bestimme die Extrema von $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, t \mapsto 2 \sin t + \sin 2t$
 Lösung: f differenzierbar.

$$f(t + 2\pi) = f(t)$$

$$\implies f(\mathbb{R}) = f([0, 2\pi])$$

f stetig $\implies \exists$ Max., Min.

$$\begin{aligned} f'(t) &= 2 \cos t + 2 \cos 2t = 2 \cos t + 2(\cos^2 t - \sin^2 t) \\ &= 2 \cos t + 2(2 \cos^2 t - 1) = 4 \cos^2 t + 2 \cos t - 2 = 0 \end{aligned}$$

$$\cos t = \frac{-2 \pm \sqrt{4 + 4 \cdot 8}}{2 \cdot 4} = \frac{-2 \pm 6}{8} = \left\{ \frac{1}{2}, -1 \right\}$$

$$\iff t = \left\{ \begin{array}{c} \pi \\ \frac{\pi}{3} \\ -\frac{\pi}{3} \end{array} \right\} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$$

t	π	$\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{3}$
$f(t)$	0	$\frac{3\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{3\sqrt{3}}{2}$

Ergebnis:

$$\text{Max } f = \frac{3\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{Maximalstellen } \frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{Min } f = -\frac{3\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{Min. Stellen} = -\frac{\pi}{3} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z}$$

Bsp.3:

Bestimme den Abstand des Punkts $(a, 0)$ von der Hyperbel
 $y^2 - x^2 = 1$

Bem.:

$d(P, Q)$ = Abstand von P zu Q

A Menge, $d(P, A) := \inf \{d(P, Q) | Q \in A\}$

$d(P, Q = \sqrt{(x-a)^2 + 1 + x^2}$ minimal

$\iff d(P, Q)^2 = (x-a)^2 + 1 + x^2 = 2x^2 - 2ax + a^2 + 1$

Da quadratisch $\implies \exists!$ Minimum \implies kritischer Punkt

$$x = \frac{a}{2}$$

$$\implies Q = \left(\frac{a}{2}, \sqrt{1 + \frac{a^2}{4}}\right)$$

$$\text{Abstand} = \sqrt{\frac{a^2}{4} + 1}$$

Erinnerung:

$I \subset \mathbb{R}$ kompakter Intervall, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, $I = [a, b] \implies \exists \min f, \exists \max f$.

Satz:

$I \subset \mathbb{R}$ Intervall, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. $x_0 \in [a, b] \subset I$ so, dass für alle $x \in I \setminus [a, b] : f(x) \leq f(x_0)$. Dann ist das Maximum von $f|_{[a, b]}$ schon ein Maximum von f .

Bem.:

Falls $\forall x \in I \setminus [a, b] : f(x) < f(x_0)$, dann nimmt f ihr Max. nur auf $[a, b]$ an.

Analog: Minimum

Bsp.4:

Für welche $c \in \mathbb{R}$ besitzt $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{x^2+c}{x^4+1}$ ein Minimum?

Lösung: f stetig

$\lim_{k \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{k \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ und für $|x| > \sqrt{|c|}$ ist $f(x) > 0$

Ist $c \leq 0$, folgt mit $x_0 = 0, [a, b] = [-\sqrt{|c|}, +\sqrt{|c|}]$, dann hat f ein Min.

Ist $c > 0$, so ist $f(x) > 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow \inf(f) = 0$, und $\min f$ existiert nicht.

7.0.2 Taylor-Approximation

Sei $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion, und $x_0 \in X \subset \mathbb{R}$.

f stetig in $x_0 \iff f(x) = f(x_0) + o(1)$.

f differenzierbar in $x_0 \iff f(x) = f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0) + o(x - x_0)$ für $x \rightarrow x_0$

Allgemein: Gesucht $P(x)$ Polynom von Grad $\leq n$, sodass $f(x) = P(x) + o((x - x_0)^n)$

Wie $P(x)$ finden?

Package hyperref Warning: Token not allowed in a PDF string (Unicode): removing `math shift'`

(hyperref) Package hyperref Warning: Token not allowed in a PDF string
(Unicode):removing `math shift'

$$\begin{aligned}
 P(x) &= a_0 + a_1(x - x_0) + \dots + a_n(x - x_0)^n \\
 \implies P^{(k)}(x) &= a_k k(k-1) \dots 1(x - x_0)^0 + \dots \\
 \text{für } 0 \leq k \leq n \implies P^{(k)}(x_0) &= k! a_k \\
 \implies a_k &= \frac{P^{(k)}(x_0)}{k!}
 \end{aligned}$$

Bem.:

$$f(x) - P(x) = (x - x_0)^n \cdot g(x)$$

mit $g(x) \rightarrow 0 = g(x_0)$ für $x \rightarrow x_0 \implies$ Ist f n -fach differenzierbar, so ist $f^{(k)}(x_0) = P^{(k)}(x_0)$ für alle $k \leq n$.

Def.: Taylor Polynom

Ist f mindestens n -fach differenzierbar nahe x_0 , so heisst

$$j_{x_0}^n f(x) := \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

das n -te **Taylor Polynom** von f an x_0

Durch

$$f(x) = j_{x_0}^n f(x) + R(x)$$

ist das n -te **Restglied** definiert.

Ab jetzt sei f beliebig oft differenzierbar.

Satz: (Taylor)

Für jedes $x \in X$ existiert t zwischen x und x_0 so, dass

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(t)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$$

Folge:

$$R_n(x) = O((x - x_0)^{n+1})$$

$$R_n(x) = o((x - x_0)^n)$$

für $x \rightarrow x_0$

$$n = 0 : R_n(x) = f(x) - f(x_0) \stackrel{?}{=} f'(t) \cdot (x - x_0)$$

Das ist der MWS!

Bsp.1:

Berechne $\sqrt[5]{1023}$ näherungsweise mittels Taylorapproximation von Grad 1 und schätze den Fehler ab. $\sqrt[5]{1024} = 4$. Sei $f(x) = x^{\frac{1}{5}}$ und $x_0 = 1024$

$$f'(x) = \frac{1}{5} x^{-\frac{4}{5}} \implies f(x_0) = 4, f'(x_0) = \frac{1}{5} 4^{-4} = \frac{1}{5 \cdot 2^8}$$

$$f''(x) = \frac{1}{5} \cdot \frac{-4}{5} x^{-\frac{9}{5}}$$

$$\text{Taylor} \implies f(1023) = 4 + \frac{1}{5 \cdot 2^8} (1023 - 1024) + R_1(t)$$

$$R_1(t) = \frac{\frac{-4}{25} t^{-\frac{3}{5}}}{2} (1023 - 1024)^2 \quad \text{für } t \in [1023, 1024]$$

$$|R_1(t)| \leq \frac{4}{25} \frac{1}{2} (1023)^{-\frac{9}{5}} \leq \frac{1}{10 \cdot 2^{18}} < 10^{-6}$$

$$\Rightarrow \sqrt[5]{1023} = 3.99921875 \dots$$

\Rightarrow Ergebnis bis auf 6 Nachkommastellen genau

Bsp.2:

Berechne $\log 1.2$ näherungsweise durch Taylor vom Grad 3.

Lösung: $x_0 = 1$

$$\begin{array}{l|l|l} f(t) & \log(1+t) & t=0 \\ f'(t) & \frac{1}{1+t} & 1 \\ f''(t) & -\frac{1}{(1+t)^2} & -1 \\ f'''(t) & 2\frac{1}{(1+t)^3} & 2 \\ f^{IV} & -6\frac{1}{(1+t)^4} & -6 \end{array}$$

$$\log(1+t) = \sum_{k=0}^3 \frac{f^{(k)}(t_0)}{k!} (t-t_0)^k + \frac{f^{(4)}(\tau)}{4!} (t-t_0)^4$$

$$t_0 = 0 \leq \tau \leq t = 0.2$$

$$\begin{aligned} &= \underbrace{t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3}}_{0.2 - 0.02 + 0.002\bar{6}} + \underbrace{\frac{-6}{24} \cdot \frac{1}{(1+\tau)^4} t^4}_{-\frac{1}{4} \cdot 0.2^4 \cdot (\text{etwas} \in]0,1])} \\ &\quad \underbrace{\hspace{10em}}_{-0.0004} \end{aligned}$$

$$\text{mit } |\text{Fehler}| \leq 0.0004$$

\Rightarrow Ergebnis ist bis auf 3 Nachkommastellen richtig

Def.: Taylorreihe

Sei f beliebig oft differenzierbar in x_0 .

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

heißt die **Taylor-Reihe** von f in x_0 . Ihre n -te Partialsumme ist $j_{x_0}^n f$. Sie ist eine Potenzreihe in $x - x_0$

Fakt:

Falls f als Potenzreihe in $x - x_0$ dargestellt werden kann, mit Konvergenzradius $\rho > 0$, dann hat auch die Taylorreihe Konvergenzradius $\rho > 0$ und stellt im Konvergenzbereich die Funktion f dar.

Bem.:

Die Taylorreihe könnte Konvergenzradius 0 haben.

Bem.:

Selbst wenn sie Konvergenzradius > 0 hat, stellt sie nicht notwendigerweise die Funktion f dar.

Bsp.:

Die Funktion

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

ist beliebig oft differenzierbar. Ihre Taylorreihe bei x_0 ist identisch 0 und stellt in keiner Umgebung von 0 die Funktion f dar.

Bem.:

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} 0(x - x_0)^k \quad \text{für } x, x_0 < 0$$

$x_0 > 0$:

$$\left. \begin{array}{l} x = x_0 + t > 0 \\ x_0 > 0 \end{array} \right\} \rightarrow f(x) = e^{\frac{-1}{x_0+t}} = \exp\left(-\frac{1}{x_0+t}\right)$$

$$= \exp\left(-\underbrace{\frac{1}{x_0}}_{\text{konst. Faktor}} \cdot \underbrace{\frac{1}{1+\frac{t}{x_0}}}_{\text{geometrische Reihe für } |t| < x_0}\right)$$

$$\Rightarrow f(x) = \text{Potenzreihe in } x - x_0 \text{ für } |x - x_0| < x_0$$



Bem.:









KAPITEL 7. DIFFERENZIERBARKEIT



KAPITEL 7. DIFFERENZIERBARKEIT



Für jeden
 $n \geq 0$
 existiert
 $f^{(n)}$ und
 ist

$$f^{(n)} = \begin{cases} (\text{Polynom in } \frac{1}{x}) \cdot e^{-\frac{1}{x}} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

$n = 0$: klar

$n \mapsto n + 1$

$$\text{IA: } f^{(n)}(x) = \begin{cases} P_n\left(\frac{1}{x}\right) \cdot e^{-\frac{1}{x}} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

zu Zeigen: $f^{(n+1)}(x)$ existiert und ist

$$f^{(n+1)}(x) = \begin{cases} P_{n+1}\left(\frac{1}{x}\right) \cdot e^{-\frac{1}{x}} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

$x < 0$: klar!

$x > 0$:

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dx} \left(P_n\left(\frac{1}{x}\right) \cdot e^{-\frac{1}{x}} \right) \\ &= \frac{d}{dx} \left(P_n\left(\frac{1}{x}\right) \right) \cdot e^{-\frac{1}{x}} \\ &+ P_n\left(\frac{1}{x}\right) \cdot \frac{d}{dx} \left(e^{-\frac{1}{x}} \right) \\ &= P'_n\left(\frac{1}{x}\right) \cdot \frac{-1}{x^2} \cdot e^{-\frac{1}{x}} \\ &+ P_n\left(\frac{1}{x}\right) \cdot e^{-\frac{1}{x}} \cdot \frac{1}{x^2} \\ &= \underbrace{\left(P'_n\left(\frac{1}{x}\right) - P_n\left(\frac{1}{x}\right) \right)}_{P_{n+1}\left(\frac{1}{x}\right)} \cdot \frac{1}{x^2} \cdot e^{-\frac{1}{x}} \quad \checkmark \end{aligned}$$



Bew.:

$$x_0 = 0 :$$

$$\frac{f^{(n)}(x) - f^{(n)}(x)}{x - 0}$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{x} \cdot P_n\left(\frac{1}{x}\right) \cdot e^{-\frac{1}{x}} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

$$\rightarrow 0 \text{ für } x \rightarrow 0$$

Für $x \rightarrow 0$ – ist das klar

$$\text{Für } x \rightarrow 0+ : \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{1}{x} \cdot P_n\left(\frac{1}{x}\right) \cdot e^{-\frac{1}{x}}$$

$$= \lim_{t \rightarrow \infty} t P_n(t) e^{-t} = 0 \quad \checkmark$$

 \Rightarrow Taylorreihe bei 0

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k = 0$$

7.1 Kurvendiskussion

Sei $I \subset \mathbb{R}$ ein Intervall und $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar.

Beh.:

f monoton wachsend (fallend) $\iff \forall t \in I : f'(t) \geq 0$ (≤ 0)

Bew.:

Für $a < b; a, b \in I$:

$$\text{MWS: } \exists t \in]a, b[: f(b) - f(a) = f'(t) \cdot \underbrace{(b - a)}_{>0}$$

Daraus folgt " \Rightarrow "

Für " \Leftarrow "

$$f'(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(t+h) - f(t)}{h}$$

$$h > 0 \implies f(t+h) - f(t) \geq 0$$

$$\implies \frac{f(t+h) - f(t)}{h} \geq 0$$

$$h < 0 \implies f(t+h) - f(t) \leq 0$$

$$\implies \frac{f(t+h) - f(t)}{h} \geq 0$$

$$\implies \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(t+h) - f(t)}{h} \geq 0 \quad \blacksquare$$

Beh.:

f ist streng monoton wachsend $\iff \forall t \in I : f'(t) \geq 0$
 und f' hat auf keinem Teilintervall positiver Länge identisch 0
 (und die Nullstellenmenge von f' enthält kein Intervall der Länge > 0)

Bew.:

" \Rightarrow "

streng monoton wachsend $\nearrow \implies$ monoton $\nearrow \implies \forall t : f'(t) \geq 0$.

Wäre $f' = 0$ für $t \in]a, b[; a < b$ dann wäre nach MWS $f(b) - f(a) = \underbrace{f'(t)}_{=0} \cdot (b - a) = 0$

für ein solchen t ✓

" \Leftarrow "

f ist monoton \nearrow

Sei $a, b \in I; a < b$ Falls $f(a) = f(b)$, dann ist $f|_{[a,b]}$ konstant und $f'|_{[a,b]} = 0$ ■

Bsp.:

$$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^3$$

Bsp.:

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{1}{1+x^2}$$

$$f'(x) = \frac{-2}{(1+x^2)^2}$$

$$\operatorname{sgn} f'(x) = \begin{cases} -1 & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ 1 & x < 0 \end{cases}$$

$$\max f = 1 \text{ bei } x = 0$$

$$f(x) > 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$$

Def.: konvex

f heisst (nach unten) **konvex**, falls $\operatorname{graph}(f)$ auf jedem Teilintervall $[a, b]$ unterhalb der Sekante liegt.

Für alle $a, b \in I; a < b; t \in [a, b]$:

$$\frac{f(b) - f(t)}{b - a} \geq \frac{f(t) - f(a)}{t - a}$$

Def.: konkav

f heisst **konkav** (nach oben konvex), falls $\operatorname{graph}(f)$ auf jedem Teilintervall $[a, b]$ oberhalb der Sekante liegt.

Beh.:

Für f zweimal differenzierbar, f'' stetig sind äquivalent:

- f ist konvex
- f' ist monoton wachsend
- $f'' \geq 0$
- $\text{graph}(f)$ liegt oberhalb jeder Tangente

Bsp.: cont.

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

$$f'(x) = \frac{-2}{(1+x^2)^2} = -2 \cdot (1+x^2)^{-2}$$

$$f''(x) = -2(1+x^2)^{-2} - 2x(-2)(1+x^2)^{-3}2x = \frac{6(x^2 - \frac{1}{3})}{(1+x^2)^{\frac{5}{3}}}$$

$$\text{sgn } f''(x) = \begin{cases} 1 & |x| > \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & |x| = \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -1 & |x| < \frac{1}{\sqrt{3}} \end{cases}$$

$$\Rightarrow f' \text{ ist streng monoton } \begin{cases} \text{wachsend} & |x| \geq \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \text{fallend} & |x| \leq \frac{1}{\sqrt{3}} \end{cases}$$

$$f \begin{cases} \text{konvex} & |x| \geq \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \text{konkav} & |x| \leq \frac{1}{\sqrt{3}} \end{cases}$$

Def.: Wendepunkt

Ein Punkt, in dem f von konkav zu konvex wechselt (oder umgekehrt), heisst **Wendepunkt**.

Bsp.:

$$\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto |x|$$

konvex

Beh.:

Sei $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ beliebig oft differenzierbar. Sei $x_0 \in I, n \geq 2$, mit $f'(x_0) = \dots f^{(n-1)}(x_0) = 0$, und $f^{(n)}(x_0) \neq 0$.

Ist n gerade und $f^{(n)} > 0$, so hat f in x_0 ein lokales Minimum.

Ist n gerade und $f^{(n)} < 0$, so hat f in x_0 ein lokales Maximum.

Ist n ungerade, so hat f in x_0 einen Sattelpunkt.

Wieso::

Taylor:

$$\begin{aligned}
 f(x) &= j_{x_0}^n f(x) + R_n f(x) \\
 &= \left[f(x_0) + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n \right] \\
 &\quad + \frac{f^{(n+1)}(x_0)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1} \\
 &= f(x_0) + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n \\
 &\quad \cdot \left[1 + \frac{f^{(n+1)}(x_0)(t)}{(n+1)f^{(n)}(x_0)} (x - x_0) \right] \\
 &= f(x_0) + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n [1 + O(x - x_0)] \\
 &\Rightarrow \text{Fallunterscheidung}
 \end{aligned}$$

7.1.1 Einschub: Partialbruchzerlegung

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}$$

Ziel: Schreibe

$$\frac{e}{bd} = \frac{a}{b} + \frac{c}{d}$$

Das geht, wenn b, d teilerfremd sind.

Polynome
teiler-
fremd
=
keine
ge-
mein-
same
Null-
stelle

Fakt:

Jede rationale Funktion $\frac{f(x)}{g_1(x) \dots g_r(x)}$ mit f, g_1, \dots, g_r Polynome ; g_1, \dots, g_r paarweise teilerfremd, lässt sich eindeutig schreiben als

$$h(x) + \frac{k_1(x)}{g_1(x)} + \dots + \frac{k_r(x)}{g_r(x)}$$

für Polynome h, k_1, \dots, k_r ; mit $\text{grad}(k_i) < \text{grad}(g_i)$ und $\text{grad}(h) \leq \text{grad}(f) - \text{grad}(g_1) - \dots - \text{grad}(g_r)$

Bsp.:

$$\frac{x^3}{1-x^2} = \frac{x^3}{(1-x)(1+x)} = c + dx + \frac{a}{1-x} + \frac{b}{1+x}$$

Multipliziere mit Nenner:

$$\begin{aligned} x^3 &= (c + dx)(1 - x^2) + a(1 + x) + b(1 - x) \\ &= (c + a + b) + (d + a - b)x - cx^2 - dx^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow d &= -1 \\
 c &= 0 \\
 b &= -a \\
 0 &= -1 + a + a \\
 a &= \frac{1}{2} \\
 b &= -\frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

7.1.2 Newton Verfahren

Erinnerung: binäre Suche, Länge des Intervalls nach n Schritten: 2^{-n} . (Anfangslänge)

Idee:

$$\begin{aligned}
 f'(x_n) &= \frac{f(x_n) - 0}{x_n - x_{n+1}} \\
 x_n - x_{n+1} &= \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \\
 x_{n+1} &= x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad \text{Rekursionsschritt}
 \end{aligned}$$

Probleme:

$$f'(x_n) = 0$$

$f'(x_n)$ sehr klein

x_{n+1} nicht mehr im Definitionsbereich

$\therefore \Rightarrow$ Muss nicht konvergieren!

Beh.:

Falls (x_n) gegen x konvergiert mit $x \in I$ und $f'(x) \neq 0$, dann ist $f(x) = 0$ ($f : I \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar, I Intervall, f' stetig)

Bew.:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Im $\lim_{n \rightarrow \infty}$ liefert dies: $x = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$
 $\implies f(x) = 0 \quad \blacksquare$

Ab jetzt sei f zweimal differenzierbar und f'' stetig

Beh.:

Sei $[a, b] \subset I$ mit $f(a) < 0 < f(b)$ und f' und $f'' > 0$ auf $[a, b]$.
Dann konvergiert das Newton-Verfahren mit den Startwert $x_0 = b$ gegen eine Nullstelle in $]a, b[$.

Bew.:Sei $\xi \in]a, b[$ mit $f(\xi) = 0$

$$x_0 > x_1 > x_2 > \dots > \xi$$

 \implies konvergiert und $x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ ist Nullstelle. ■

- $f' < 0$ und $f'' < 0$, $(f(a) > 0 > f(b))$
 \rightsquigarrow Anwenden auf $-f(x)$, $x_0 = b$
- $f' < 0$ und $f'' > 0$, $(f(a) > 0 > f(b))$
 \rightsquigarrow Anwenden auf $f(-x)$, $x_0 = a$
- $f' > 0$ und $f'' < 0$
 \rightsquigarrow Anwenden auf $-f(-x)$, $x_0 = a$

Def.: Quadratische Konvergenz

Eine Folge (x_n) konvergiert quadratisch gegen ξ wenn sie gegen ξ konvergiert und

$$\exists n_0 \exists C \forall n \geq n_0 : |x_{n+1} - \xi| \leq C \cdot |x_n - \xi|^2$$

Beh.:

Falls (x_n) gegen ξ konvergiert und $f'(\xi) \neq 0$ ist, dann ist die konvergenz quadratisch.

Bew.:

Nach Konstruktion ist

$$0 = f(x_n) + f'(x_n)(x_{n+1} - x_n)$$

$$0 = f(\xi)$$

$$= f(x_n) + f'(x_n) \cdot (\xi - x_n) + \frac{f''(t)}{2}(\xi - x_n)^2$$

$$x_n < t < n$$

Differenz:

$$0 = \underbrace{f'(x_n)}_{\neq 0 \forall n \geq n_0} (\xi - x_{n+1}) + \frac{f''(t)}{2}(\xi - x_n)^2$$

$$\xi - x_{n+1} = -\frac{f''(t)}{2f'(x_n)}(\xi - x_n)^2$$

$$|\xi - x_{n+1}| = \left| \frac{f''(t)}{2f'(x_n)} \right| \cdot |(\xi - x_n)|^2$$

Wähle n_0 so, dass $\forall n \geq n_0$

$$|f'(x_n)| \geq \frac{1}{2} |f'(\xi)|$$

$$\exists [a, b] \subset I : \text{alle } x_n, \xi \in [a, b]$$

$$\implies t \in [a, b] \quad n \geq n_0$$

und $M = \max |f''|_{[a,b]}$ existiert

$$\implies |\xi - x_{n+1}| \leq \underbrace{\frac{M}{2 \frac{1}{2} |f'(\xi)|}}_{=C} \cdot |\xi - x_n|^2 \quad \blacksquare$$

Bsp.:Finde $\sqrt{a}, a > 0 \iff$ Finde Nullstellen von $f(x) = x^2 - a$ auf $[0, \infty[$

$$f'(x) = 2x$$

$$\begin{aligned}x_{n+1} &= x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \\&= x_n - \frac{x_n^2 - a}{2x_n} \\&= x_n - \frac{x_n}{2} + \frac{a}{2x_n} \\&= \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right)\end{aligned}$$

Integral

#I#I\GenericWarning (hyperref) Package hyperref Warning: Token not allowed in a PDF string (Unicode):removing `math shift'#I#I\GenericWarning (hyperref) Package hyperref Warning: Token not allowed in a PDF string (Unicode):removing `math shift'#I#I\GenericWarning (hyperref) Package hyperref Warning: Token not allowed in a PDF string (Unicode):removing `<def>-command'#I#I\GenericWarning (hyperref) Package hyperref Warning: Token not allowed in a PDF string (Unicode):removing `sl@PackageName'#I#I\GenericWarning (hyperref) Package hyperref Warning: Token not allowed in a PDF string (Unicode):removing `sl@UnexpandedMessage'#I#I\GenericWarning (hyperref) Package hyperref Warning: Token not allowed in a PDF string (Unicode):removing `let>-command'#I#I\GenericWarning (hyperref) Package hyperref Warning: Token not allowed in a PDF string (Unicode):removing `string'#I#I\GenericWarning (hyperref) Package hyperref Warning: Token not allowed in a PDF string (Unicode):removing `<def>-command'#I#I\GenericWarning (hyperref) Package hyperref Warning: Token not allowed in a PDF string (Unicode):removing `sl@Tempa'#I#I\GenericWarning (hyperref) Package hyperref Warning: Token not allowed in a PDF string (Unicode):removing `global'#I#I\GenericWarning (hyperref) Package hyperref Warning: Token not allowed in a PDF string (Unicode):removing `sl@Message'#I#I\GenericWarning (hyperref) Package hyperref Warning: Token not allowed in a PDF string (Unicode):removing `math shift'#I#I\GenericWarning (hyperref) Package hyperref Warning: Token not allowed in a PDF string (Unicode):removing `math shift'

Michał Sudwoj
Stand: 9. Mai 2011

Bem.:

Nicht jede Teilmenge hat einen Inhalt

Sei f eine Funktion auf $[a, b]$.

Eine **Zerlegung** \mathcal{Z} von $[a, b]$ besteht aus endlich vielen Zwischenpunkten

$$a = b_0 < b_1 < \dots < b_r = b$$

sowie "Stützpunkten"

$$x_i \in [b_{i-1}, b_i] \quad \text{für alle } 1 \leq i \leq r$$

Die **Feinheit** von \mathcal{Z} ist $\delta(\mathcal{Z}) := \max\{b_i - b_{i-1} \mid 1 \leq i \leq r\}$ Die zugehörige Riemann-Summe:

$$S_f(\mathcal{Z}) := \sum_{i=1}^r f(x_i) \cdot (b_i - b_{i-1})$$

Bem.:

Ist $f \geq 0$, so ist dies der Flächeninhalt der Treppenfläche

Def.: Riemann-Integral

Wenn $\lim_{\delta(\mathcal{Z}) \rightarrow 0} S_f(\mathcal{Z})$ existiert, so heisst f **Riemann-integrierbar**, und der Grenzwert heisst das **Riemann-**

Integral

$$\int_a^b f(x)dx$$

D.h.

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta \forall \mathcal{Z} \text{ Zerlegung} : \delta(\mathcal{Z}) < \delta \implies \left| S_f(\mathcal{Z}) - \int_a^b f(x)dx \right| < \varepsilon$$

Satz:

Jede stetige Funktion ist Riemann-integrierbar

Fakt:

Ist $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^{\geq 0}$ stetig, so ist $\int_a^b f(x)dx$ der Flächeninhalt der von $\text{graph}(f)$; $y = 0$; $x = a$; $x = b$ begrenzten Fläche.

8.0.4 Grundeigenschaften

- Falls $f = \begin{pmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_n \end{pmatrix}$ vektorwertig, so ist f integrierbar g.d., w. jedes f_i integrierbar ist, und dann gilt

$$\int_a^b f(x)dx = \left(\int_a^b f_i(x)dx \right)_{i=1, \dots, n}$$

- Speziell: $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$ ist integrierbar g.d., w. $\Re(f)$ und $\Im(f)$ integrierbar sind, und dann ist

$$\Re \left(\int_a^b f(x) dx \right) = \int_a^b \Re(f(x)) dx$$

$$\Im \left(\int_a^b f(x) dx \right) = \int_a^b \Im(f(x)) dx$$

- f, g integrierbar $\implies f + g$ integrierbar, und

$$\int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$$

Bew.:

$$\begin{aligned} S_{f+g}(\mathcal{Z}) &\stackrel{\text{def.}}{=} \sum_{i=1}^r [f(x_i) + g(x_i)] \cdot (b_i - b_{i-1}) \\ &= \sum_{i=1}^r f(x_i) \cdot (b_i - b_{i-1}) + \sum_{i=1}^r g(x_i) \cdot (b_i - b_{i-1}) \\ &\stackrel{\text{def.}}{=} S_f(\mathcal{Z}) + S_g(\mathcal{Z}) \end{aligned}$$

Für $\varepsilon > 0$ sei $\delta > 0$ sodass

$$\begin{aligned} \forall \mathcal{Z} : \delta(\mathcal{Z}) < \delta &\implies \left| S_f(\mathcal{Z}) - \int_a^b f(x) dx \right| < \varepsilon \\ &\quad \text{und} \quad \left| S_g(\mathcal{Z}) - \int_a^b g(x) dx \right| < \varepsilon \\ \implies \left| S_{f+g}(\mathcal{Z}) - \left[\int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx \right] \right| &\leq \\ \left| S_f(\mathcal{Z}) - \int_a^b f(x) dx \right| + \left| S_g(\mathcal{Z}) - \int_a^b g(x) dx \right| &< \varepsilon + \varepsilon < 2\varepsilon \\ \implies \lim_{\delta(\mathcal{Z}) \rightarrow 0} S_{f+g} &= \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Grundeigenschaften des Integrals

- falls die rechte Seite existiert, existiert auch die linke Seite

(a)

$$\int_a^b [f(x) + g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$$

(b)

$$\int_a^b \lambda \cdot f(x) dx = \lambda \cdot \int_a^b f(x) dx$$

- falls beide Seiten existieren

(c)

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

(d)

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx \text{ falls } f \leq g \text{ auf } [a, b]$$

Bem.: zu (c)

Integral zählt Flächenteile oberhalb der x-Achse positive, unterhalb der x-Achse negativ.

Bem.: zu (d)

$$\int_a^b [g(x) - f(x)] dx$$

Flächeninhalt des von $\text{graph}(f)$, $\text{graph}(g)$, $x = a$, $x = b$ umgrenzten Bereichs.

(e)

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

falls $a \leq c \leq b$

Bem.:

$$\int_a^b f(x) dx = 0$$

ist definiert!

Bsp.1:

$f(x) = c$ konstant

\mathcal{Z} Zerlegung: $a = b_0 < b_1 < \dots < b_r = b; x_i \in [b_{i-1}, b_i]$

$$\begin{aligned} \rightsquigarrow S_{\mathcal{Z}}(f) &\stackrel{\text{def.}}{=} \sum_{i=1}^r \underbrace{f(x_i)}_{=c} (b_i - b_{i-1}) \\ &= c \cdot \sum_{i=1}^r (b_i - b_{i-1}) \\ &= c \cdot (b_r - b_0) = c(b - a) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \int_a^b c dx = c(b - a)$$

Bsp.2:

$$f(x) = \frac{c}{b} \cdot x$$

Für $r \geq 1$ wähle $b_i := \frac{ib}{r}$, $x_i = b_i$ für die Zerlegung \mathcal{Z}_r

$$\begin{aligned} S_{\mathcal{Z}_r}(f) &= \sum_{i=1}^r \left(\frac{c}{b} \cdot \frac{ib}{r} \right) \cdot \underbrace{\left(\frac{ib}{r} - \frac{(i-1)b}{r} \right)}_{=\frac{b}{r}} \\ &= \frac{c}{b} \cdot \frac{b}{r} \cdot \frac{b}{r} \cdot \sum_{i=1}^r i \\ &= \frac{cb}{r^2} \cdot \frac{r(r+1)}{2} \\ &= \frac{cb}{2} \cdot \left(1 + \frac{1}{r} \right) \rightarrow \frac{cb}{2} \text{ für } r \rightarrow \infty \end{aligned}$$

Folge:

$$\int_0^b \left(\frac{c}{b} x \right) dx = \frac{cb}{2}$$

= Fläche eines rechtwinkligen Dreiecks mit Katheten b, c

Bsp.3:

$f(x) = \frac{1}{x}$ auf $[1, b]$

Für $r \geq 1$ sei \mathcal{Z}_r die Zerlegung mit $b_i = b^{\frac{i}{r}}$ und $x_i = b_{i-1}$

$$\begin{aligned}\delta(\mathcal{Z}_r) &= \max\{b^{\frac{i}{r}} - b^{\frac{i-1}{r}} \mid 1 \leq i \leq r\} \\ &= \max\{b^{\frac{i}{r}} \cdot (1 - b^{\frac{-1}{r}}) \mid 1 \leq i \leq r\} \\ &= b \cdot (1 - b^{\frac{-1}{r}}) \rightarrow 0 \text{ für } r \rightarrow \infty\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}S_{\mathcal{Z}_r}(f) &= \sum_{i=1}^r \frac{1}{b^{\frac{i-1}{r}}} \cdot (b^{\frac{i}{r}} - b^{\frac{i-1}{r}}) \\ &= \sum_{i=1}^r (b^{\frac{1}{r}} - 1) \\ &= r(b^{\frac{1}{r}} - 1)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\lim_{r \rightarrow \infty} r(b^{\frac{1}{r}} - 1) &= \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{b^x - 1}{x} \\ &\stackrel{\text{BH}}{=} \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{(\log b) \cdot b^x}{1} \\ &= \log b\end{aligned}$$

Antwort:

$$\int_1^b \frac{1}{x} dx = \log b \text{ für alle } b \geq 1$$

Bem.:

Für $a > b$ sei

$$\int_a^b f(x) dx := - \int_b^a f(x) dx$$

und f auf $[b, a]$

Dann gilt (e) für alle $a, b, c \in \mathbb{R}$, sofern alle Integrale definiert sind.

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

Bem.:

Jede stückweise stetige Funktion ist Riemann-integrierbar, dh.

\exists Zerlegung $[a, b] = [a_0, a_1] \cup [a_2, a_i] \cup \dots \cup [a_{n-1}, a_n]$ sodass $f|_{[a_{i-1}, a_i]}$

die Einschränkung einer stetigen Funktion auf $[a_{i-1}, a_i]$ ist, für alle i . Dann ist

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{i=1}^n \int_{a_{i-1}}^{a_i} f(x)dx$$

Fakt:

Falls für alle bis auf endlich viele $x \in [a, b]$ gilt $f(x) = g(x)$, und $\int_a^b g(x)dx$ existiert, so existiert $\int_a^b f(x)dx$ und sie sind gleich.

Hauptsatz der Infinitesimalrechnung

Satz: Hauptsatz der Infinitesimalrechnung (Version A)

Sei f auf $[a, b]$ stetig. Dann ist

$$[a, b] \ni t \mapsto F(x) := \int_a^t f(x) dx$$

differenzierbar mit Ableitung $F' = f$.

Begründung:

Für t fest sei $t' > t; t, t' \in [a, b]$

$$\implies F(t') - F(t) = \int_t^{t'} f(x) dx$$

Erinnerrung:

f stetig in t heisst

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in [a, b] : |x - t| < \delta \implies |f(x) - f(t)| < \varepsilon$$

$$\begin{aligned} \underbrace{|F(t') - [F(t) + (t' - t) \cdot f(t)]|}_{\stackrel{\text{Soll}}{=} o(t' - t)} &= \left| \int_t^{t'} f(x) dx - \int_t^{t'} f(t) dx \right| \\ &= \left| \int_t^{t'} [f(x) - f(t)] dx \right| \\ &\leq \int_t^{t'} \underbrace{|f(x) - f(t)|}_{\substack{< \varepsilon \\ \text{falls } |t' - t| < \varepsilon}} dx \\ &\leq \int_t^{t'} \varepsilon dx \\ &= (t' - t) \cdot \varepsilon \end{aligned}$$

$$\frac{\text{linke Seite}}{t' - t} \leq \varepsilon \text{ falls } |t' - t| < \delta$$

$$\text{dh. } \lim_{t' \rightarrow t+} \frac{\text{linke Seite}}{t' - t} = 0 \quad \forall \varepsilon > 0 \exists \delta$$

Def.: Stammfunktion

Sei f eine auf einem Intervall I definierte Funktion. Dann heisst jede auf I definierte differenzierbare Funktion F mit $F' = f$ eine **Stammfunktion** von f .

Bem.:

Mit F ist auch $F + c$ eine Stammfunktion von f für jede Konstante c ;
und jede weitere Stammfunktion von f hat diese Gestalt.

Satz: Hauptsatz der Infinitesimalrechnung (Version B)

Sei f auf $[a, b]$ stetig und F eine Stammfunktion von f . Dann gilt:

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

Bew.:

Mit $F_0(t) := \int_a^t f(x)dx$ gilt

$F = F_0 + c$ für c konstant. Dann ist $F_0(a) = \int_a^a f(x)dx = 0$

$\implies \int_a^b f(x)dx = F_0(b) - F_0(a) = F(b) - F(a)$ ■

Prinzip zur Berechnung von Integralen:

- (a) Errate eine Stammfunktion F
- (b) Werte aus $F(b) - F(a) =: F(x)|_{x=a}^{x=b}$

Bsp.4:

$$\int_a^b x^s dx = \begin{cases} s \in \mathbb{R}, 0 < a < b \\ s \in \mathbb{Z}^{<0}, a < b < 0 \\ s \in \mathbb{Z}^{\geq 0}, a < b \end{cases}$$

Für $s \neq -1$ ist $\frac{x^{s+1}}{s+1}$ eine Stammfunktion von x^s

$$\Rightarrow \int_a^b x^s dx = \frac{x^{s+1}}{s+1} \Big|_{x=a}^{x=b} = \frac{b^{s+1} - a^{s+1}}{s+1}$$

Für $s = -1$ ist $\log |x|$ eine Stammfunktion

$$\Rightarrow \int_a^b \frac{1}{x} dx = \log |x| \Big|_a^b = \log |b| - \log |a|$$

Bsp.:

$$\int_a^b \frac{1}{x^2 + 1} dx = \arctan x \Big|_a^b = \arctan b - \arctan a$$

8.1 Integrationstechniken

Bezeichnung: $\int f(x)dx$ steht für irgendeine Stammfunktion von f . "unbestimmtes Integral"

Bem.:

$$\underbrace{\int_a^b f(x)dx}_{\text{bestimmtes Integral}} = \left[\int f(x)dx \right]_a^b$$

Bem.: Konvention

$$\int f(x)dx = \text{Formel} + \text{Konstante}$$

Partielle Integration

Produktregel: $(fg)' = fg' + f'g$

dh. fg ist Stammfunktion von $f'g + fg'$

$$\int (fg' + f'g)dx = fg + c$$

$$\int f(x)g'(x)dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx$$

Das funktioniert gut, wenn f' einfacher ist als f und g nicht komplizierter als g'

$$\int \underbrace{x}_{\downarrow} \underbrace{e^x}_{\uparrow} dx = xe^x - \int 1e^x dx = xe^x - e^x + c$$

$$\begin{array}{ll} f(x) = x & f'(x) = 1 \\ g'(x) = e^x & g(x) = e^x \end{array}$$

Bsp.:

$$n \in \mathbb{Z}^{\geq 0}, \lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$$

$$I_n := \int \underbrace{t^n}_{\downarrow} \underbrace{e^{\lambda t}}_{\uparrow} dt = t^n \frac{e^{\lambda t}}{\lambda} - \int nt^{n-1} \frac{e^{\lambda t}}{\lambda} = \frac{t^n e^{\lambda t}}{\lambda} - \frac{n}{\lambda} I_{n-1}$$

Induktion \rightsquigarrow

$$I_n = (-1)^n \frac{n!}{\lambda^{n+1}} \left(\sum_{k=0}^n \frac{(-\lambda t)^k}{k!} \right) e^{\lambda t}$$

Bsp.:

$$\begin{aligned} \int \log t dt &= \int \underbrace{(\log t)}_{\downarrow} \cdot \underbrace{1}_{\uparrow} \\ &= (\log t)t - \int \underbrace{\frac{1}{t}}_{=1} dt \\ &= (\log t)t - t + c \end{aligned}$$

Bsp.:

$$\begin{aligned}
 \int (\log t)^2 dt &= \int (\log t)^2 \cdot 1 dt \\
 &= (\log t)t - \int 2(\log t) \frac{1}{t} t dt \\
 &= (\log t)^2 t - 2 \int \log t dt \\
 &= (\log t)^2 t - 2(\log t)t + 2t + c
 \end{aligned}$$

Bsp.:

$$\begin{aligned}
 I &= \int \underbrace{e^{\alpha t}}_{\uparrow} \underbrace{\cos \beta t}_{\downarrow} dt \\
 &= \frac{e^{\alpha t}}{\alpha} \cos \beta t - \int \frac{e^{\alpha t}}{\alpha} (-\beta \sin \beta t) dt \\
 &= \frac{e^{\alpha t}}{\alpha} \cos \beta t + \frac{\beta}{\alpha} \int \underbrace{e^{\alpha t}}_{\uparrow} \underbrace{\sin \beta t}_{\downarrow} dt \\
 &= \frac{e^{\alpha t}}{\alpha} \cos \beta t + \frac{\beta}{\alpha} \left(\frac{e^{\alpha t}}{\alpha} \sin \beta t - \int \frac{e^{\alpha t}}{\alpha} \beta \cos \beta t dt \right) \\
 &= \frac{e^{\alpha t}}{\alpha} \cos \beta t + \frac{\beta e^{\alpha t}}{\alpha^2} \sin \beta t - \frac{\beta^2}{\alpha^2} \underbrace{\int e^{\alpha t} \cos \beta t dt}_{=I}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\left(1 + \frac{\alpha^2}{\beta^2}\right) I &= \frac{e^{\alpha t}}{\alpha} \cos \beta t + \frac{\beta e^{\alpha t}}{\alpha^2} \sin \beta t + c \\
I &= \int e^{\alpha t} \cos \beta t dt = \frac{\alpha^2}{\alpha^2 + \beta^2} \left(\frac{e^{\alpha t}}{\alpha} \cos \beta t + \frac{\beta e^{\alpha t}}{\alpha^2} \sin \beta t + c \right) \\
\int e^{\alpha t} \cos \beta t dt &= \int e^{\alpha t} \cdot \frac{e^{i\beta t} + e^{-i\beta t}}{2} dt \\
&= \int \frac{e^{(\alpha+i\beta)t} + e^{(\alpha-i\beta)t}}{2} dt \\
&= \frac{\frac{e^{(\alpha+i\beta)t}}{\alpha+i\beta} + \frac{e^{(\alpha-i\beta)t}}{\alpha-i\beta}}{2} + c \\
&= \frac{e^{\alpha t}}{\alpha^2 + \beta^2} (\alpha \cos \beta t + \beta \sin \beta t) + c
\end{aligned}$$

Substitution

Sei $f' = f$: Kettenregel: $(F(\varphi(y)))' = F'(\varphi(y)) \cdot \varphi'(y) = f(\varphi(y)) \cdot \varphi'(y)$
 $y \mapsto F(\varphi(y))$ ist Stammfunktion von $y \mapsto f(\varphi(y)) \cdot \varphi'(y)$

$$\int f(\varphi(y)) \cdot \varphi'(y) dy = \left(\int f(x) dx \right) \Big|_{x=\varphi(y)}$$

Anwendung in zwei Richtungen:

1. Fall; Integrand hat die Form $f(\varphi(y)) \cdot \varphi'(y)$

Bsp.:

$$\int \sin^3 y \cdot \cos y dy = \left| \begin{array}{l} x = \sin y \\ \frac{dx}{dy} = \cos y \end{array} \right| = \int x^3 dx = \frac{x^4}{4} + c = \frac{\sin^4 y}{4} + c$$

Bem.:

$$\begin{aligned}x &= \varphi(y) \\ \frac{dx}{dy} &= \varphi'(y) \\ \implies dx &= \varphi'(y)dy \\ \implies dx &= \frac{dx}{dy} \cdot dy\end{aligned}$$

Bsp.:

$$\begin{aligned}\int \tan t dt &= \int \frac{\sin t}{\cos t} dt \\ &= - \int \frac{1}{\cos t} (-\sin t) dt \\ u &= \cos t \\ \frac{du}{dt} &= -\sin t \\ du &= -\sin t dt \\ &= - \int \frac{1}{u} du \\ &= -\log |u| + c \\ &= -\log |\cos t| + c\end{aligned}$$

2. Fall:

$$\begin{aligned} \int \frac{x}{\sqrt{2x-3}} dx &= \left| \begin{array}{l} y = \sqrt{2x-3} \\ y^2 = 2x-3 \\ x = \frac{y^2+3}{2} \\ \frac{dx}{dy} = y \\ dx = y \cdot dy \end{array} \right| \\ &= \int \frac{\frac{y^2+3}{2}}{y} \cdot y dy \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} y^3 + 3y \right) + c \\ &= \frac{y}{6} (y^2 + 9) + c \\ &= \frac{\sqrt{2x-3}}{6} (2x + 6) + c \end{aligned}$$

Bsp.:

$$\begin{aligned}
 \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{1-x^2}} &= \left| \begin{array}{l} x = \sin t \\ dx = \cos t dt \\ 1-x^2 = \cos^2 t \\ t \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[\end{array} \right| \\
 &= \int \frac{\sin^2 t}{\cos t} \cdot \cos t dt \\
 &= \int \sin^2 t dt \\
 \cos 2t &= 1 - 2 \sin^2 t \\
 \sin^2 t &= \frac{1 - \cos 2t}{2} \\
 &= \int \frac{1 - \cos 2t}{2} dt \\
 &= \frac{t}{2} - \frac{1}{2} \frac{\sin 2t}{2} + c \\
 &= \frac{t}{2} - \frac{1}{2} \sin t \cos t + c \\
 &= \frac{\arcsin x}{2} - \frac{x}{2} \sqrt{1-x^2} + c
 \end{aligned}$$

Bsp.:

$$\begin{aligned}\int \frac{dx}{\sqrt{1+e^x}} &= \left| \begin{array}{l} y = e^x \\ dz = e^x dx = y dx \\ dx = \frac{1}{y} dy \end{array} \right| \\ &= \int \frac{dy}{y \cdot \sqrt{1+y}} \\ &= \left| \begin{array}{l} u = \sqrt{1+y} \\ y = u^2 - 1 \\ dy = 2u du \end{array} \right| \\ &= \int \frac{2u du}{(u^2 - 1)u} \\ &= \int \frac{2}{u^2 - 1} du \\ &= \int \left(\frac{-1}{u+1} + \frac{1}{u-1} \right) du \\ &= -\log |u+1| + \log |u-1| + c \\ &= \log \left| \frac{u-1}{u+1} \right| + c \\ &= \log \left| \frac{\sqrt{1+e^x} - 1}{\sqrt{1+e^x} + 1} \right| + c\end{aligned}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{(b-x)(x-a)}} \quad , x \in]a, b[$$

$$(b-x)(x-a) = -x^2 + (a+b)x - ab$$

$$= -\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2 + \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 - ab$$

$$= \left(\frac{b-a}{2}\right)^2 - \left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2$$

$$= \left(\frac{b-a}{2}\right)^2 \left(1 - \left(\frac{2x-a-b}{b-a}\right)^2\right)$$

$$y = \frac{2x-a-b}{b-a}$$

$$dy = \frac{2dx}{b-a}$$

$$dx = \frac{b-a}{2} dy$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{(b-x)(x-a)}} = \int \frac{\frac{b-a}{2} dy}{\frac{b-a}{2} \sqrt{1-y^2}}$$

$$= \int \frac{dy}{\sqrt{1-y^2}}$$

$$= \arcsin y + c$$

$$= \arcsin \frac{2x-a-b}{b-a} + c$$

Vereinfachung von $\sqrt{ax^2 + bx + c}$ kann führen zu:

•

$$\sqrt{1-y^2} : \begin{cases} y = \sin x \\ y = \cos x \end{cases}$$

•

$$\sqrt{1+y^2} : y = \sinh x$$

•

$$\sqrt{y^2 - 1} : y = \cosh x$$

Integration von rationalen Funktionen

Bsp.:

$$\int \frac{1-x^6}{x(x^2+1)^2} dx$$

$$\text{Ansatz: } \frac{1-x^6}{x(x^2+1)^2} = \frac{a}{x} + \frac{b+cx+dx^2+e^3}{(x^2+1)^2} + f+gx$$

$$\begin{aligned} 1-x^6 &= a(x^2+1)^2 + (b+cx+dx^2+e^3)x \\ &\quad + (f+gx)x(x^2+1)^2 \\ &= a(x^4+2x^2+1) + (bx+cx^2+dx^3+e^4)x \\ &\quad + f(x^5+2x^3+x) + g(x^6+2x^4+x^2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \quad g &= -1 \\ f &= 0 \quad b+f=0 \\ a &= 1 \quad a+e+2g=0 \\ b &= 0 \\ e &= 1 \\ c &= -1 \\ d &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \dots &= \int \left(\frac{1}{x} + \frac{x^3-x}{(x^2+1)^2} - x \right) dx \\ &= \log|x| - \frac{x^2}{2} + \int \frac{x^3-x}{(x^2+1)^2} dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int \frac{x^3-x}{(x^2+1)^2} dx &= \left| \begin{array}{l} y = x^2+1 \\ dy = 2xdx \\ x^3-x = x(x^2-1) = \frac{2x}{2}(y-2) \end{array} \right| \\ &= \int \frac{\frac{y-2}{2}}{y^2} dy \\ &= \int \left(\frac{1}{2y} - \frac{1}{y^2} \right) dy \\ &= \frac{1}{2} \log|y| + \frac{1}{y} + c \\ &= \frac{1}{2} \log(x^2+1) + \frac{1}{x^2+1} + c \end{aligned}$$

Gesamtresultat

$$\log|x| - \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2}\log(x^2 + 1) + \frac{1}{x^2 + 1} + c$$

Bsp.:

$$\int \frac{x^2 - 1}{(x^2 + 1)^2} dx$$

$$\frac{x^2 - 1}{(x^2 + 1)^2} = \frac{ax^2}{(x^2 + 1)^2} + \frac{b}{(x^2 + 1)}$$

$$x^2 - 1 = ax^2 + b(x^2 + 1)$$

$$b = -1$$

$$1 = a + b \implies a = 2$$

$$\int \frac{x^2 - 1}{(x^2 + 1)^2} dx = \frac{2x^2 dx}{(x^2 + 1)^2} - \underbrace{\int \frac{dx}{x^2 + 1}}_{=\arctan x + c}$$

$$\int \underbrace{\frac{2x}{(x^2 + 1)^2}}_{\uparrow} \underbrace{x}_{\downarrow} dx \quad \left(\frac{1}{x^2 + 1} \right)' = \frac{-2x}{(x^2 + 1)^2}$$

$$= \frac{-1}{x^2 + 1} x - \int \frac{-1}{x^2 + 1} \cdot 1 dx$$

$$= \frac{-x}{x^2 + 1} + \arctan x + c$$

$$\int \frac{x^2 - 1}{(x^2 + 1)^2} dx = \frac{-x}{x^2 + 1} + c$$

Methode:

(1) Faktorisiere Nenner

(2) Partialbruchzerlegung

(3) $\int \frac{\text{Polynom}}{(x-a)^n} dx \rightsquigarrow$ Substituiere $y = x - a \rightsquigarrow \int \frac{\text{Polynom}(y)}{y^n} dy$ bekannt.

(4) $\int \frac{\text{Polynom}}{\text{quad}(x)^n} dx \rightsquigarrow$ Substituiere $y = ax + b$ sodass Nenner $(y^2 + 1)^n$ wird

(5) $\int \frac{(\text{Polynom in } y^2) \cdot y}{(y^2+1)^n} dy \rightsquigarrow$ Substituiere $y^2 + 1 = z$

(6) $\int \frac{\text{Polynom in } y^2}{(y^2+1)^n} dy$
 $n = 1$: $\arctan y$
 $n > 1$: $\int \frac{dy}{(y^2+1)^n} = \frac{2n-3}{2n-2} \int \frac{dy}{(y^2+1)^{n-1}} + \frac{1}{2n-2} \cdot \frac{y}{(y^2+1)^{n-1}}$

8.1.1 Uneigentliche Integrale

Bisher:	Integral einer Funktion auf	$[a, b]$
Jetzt:	" - "	$[a, b[$
	" - "	$]a, b]$
	" - "	$]a, b[$

$$\int_a^b = \int_a^c + \int_c^b \text{ für } a < c < b$$

Def.: uneigentlicher Grenzwert

Sei f auf $[a, b[$ definiert, so dass für jedes $c \in [a, b[$ $\int_a^c f(x) dx$ existiert. Dann heisst

$$\int_a^b f(x) dx := \lim_{c \rightarrow b-} \int_a^c f(x) dx$$

das **uneigentliche Integral** von f über $[a, b[$, falls der limes existiert. Falls nicht, sagt man, dass das uneigentliche Interval divergiert.

Bem.:

Dies gilt wenn f stetig ist. Denn dann ist $f|_{[a,c]}$ stetig.

Analog: f auf $]a, b]$ definiert, $f|_{[c,b]}$ integrierbar für alle $a < c < b$

$$\rightsquigarrow \int_a^b f(x) dx := \lim_{c \rightarrow a+} \int_c^b f(x) dx$$

Analog: f auf $]a, b[$ definiert, $f|_{[c,d]}$ integrierbar für alle $a < c < d < b$

$$\rightsquigarrow \int_a^b f(x) dx := \lim_{c \rightarrow a+} \lim_{d \rightarrow b-} \int_c^d f(x) dx$$

Bsp.1:

$$\begin{aligned} \int_a^\infty \frac{dx}{x^s} \quad a > 0 \quad x \mapsto \frac{1}{x^s} \text{ stetig auf } [a, \infty[\\ \int_a^\infty \frac{dx}{x^s} \stackrel{\text{def.}}{=} \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b \frac{dx}{x^s} \\ = \begin{cases} \lim_{b \rightarrow \infty} \left(\frac{x^{1-s}}{1-s} \Big|_a^b \right) = \lim_{b \rightarrow \infty} \left(\frac{b^{1-s} - a^{1-s}}{1-s} \right) = \begin{cases} \frac{a^{1-s}}{s-1} & s > 1 \\ \infty & s < 1 \end{cases} & s \neq 1 \\ \lim_{b \rightarrow \infty} (\log x \Big|_a^b) = \lim_{b \rightarrow \infty} (\log b - \log a) = \infty & s = 1 \end{cases} \end{aligned}$$

Anwendung 1: Ist f auf $[a, \infty[$ stetig, und $|f(x)| \leq \frac{c}{x^s}$ mit konstanten $s > 1$ und c , dann konvergiert $\int_a^\infty f(x) dx$

Anwendung 2: Ist f auf $[a, \infty[$ stetig und $f(x) \geq \frac{c}{x^s}$ mit konstanten $s \leq 1$

und $c > 0$, dann divergiert $\int_a^\infty f(x)dx$ gegen ∞

Majorantenkriterium

f auf $], a\infty[$ definiert auf jedem $[a, b]$ integrierbar, und $|f(x)| \leq \frac{c}{x^s}$ mit Konstanten c und $s > 1 \implies \int_a^\infty f(x)dx$ existiert.

Minorantenkriterium

f auf $], a\infty[$ definiert auf jedem $[a, b]$ integrierbar, und $f(x) \geq \frac{c}{x^s}$ mit Konstanten $c > 0$ und $s \leq 1 \implies \int_a^\infty f(x)dx$ divergiert gegen ∞ .

Bsp.:

$$\int_0^\infty \frac{t^2 + 4}{(1 + 4t^2)^{\frac{3}{2}}} dt$$

Nur Problem bei ∞

$$\frac{t^2 + 4}{(1 + 4t^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{t^2(1 + \frac{4}{t^2})}{t^3(\frac{1}{t^2} + 4)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{t} \frac{1 + \frac{4}{t^2}}{(\frac{1}{t^2} + 4)^{\frac{3}{2}}} \rightarrow \frac{1}{8} \text{ für } t \rightarrow \infty \implies = \infty$$

Bsp.:

$$\begin{aligned} & \int_2^\infty \frac{dx}{x(\log x)^s} \quad s > 0 \\ &= \int_{\log 2}^\infty \frac{dy}{y^s} \begin{cases} \text{konvergent} & s > 1 \\ \text{divergent} & s \leq 1 \end{cases} \end{aligned}$$

Bsp.:

$$\int_{10}^{\infty} \frac{dx}{x \cdot \log x \cdot \log \log x} \text{ divergent}$$

Bsp.:

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dt}{1+t^2} &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \lim_{b \rightarrow \infty} \arctan t \Big|_a^b \\ &= \lim_{a \rightarrow -\infty} \lim_{b \rightarrow \infty} (\arctan b - \arctan a) \\ &= \frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right) \\ &= \pi \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \int_{-b}^b \frac{dt}{1+t^2} \end{aligned}$$

Bsp.:

Vorsicht!

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx$$

Kein Problem bei 0, da stetige Fortsetzung =1

$$\int_1^t \underbrace{\sin x}_{\uparrow} \underbrace{\frac{1}{x}}_{\downarrow} dx = \underbrace{-\cos x \cdot \frac{1}{x} \Big|_1^t}_{\frac{\cos 1}{1} - \frac{\cos t}{t}} - \underbrace{\int_1^t \cos x \cdot \frac{-1}{x^2} dx}_{\text{konvergiert f\"ur } t \rightarrow \infty \text{ nach Majorantenkriterium!}} = \text{konvergiert f\"ur } t \rightarrow \infty$$

$$\int_0^t = \int_0^1 + \int_1^t \Rightarrow \int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx \text{ konvergiert}$$

Analog f\"ur $\int_{-\infty}^\cdot \dots$

Bsp.:

$$a < b$$

$$\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^s} = \lim_{c \rightarrow a+} \int_c^b \frac{dx}{(x-a)^s}$$

$$s < 1 \Rightarrow \lim_{c \rightarrow a+} \frac{(x-a)^{1-s} \Big|_c^b}{1-s} = \lim_{c \rightarrow a+} \frac{(b-a)^{1-s} - (c-a)^{1-s}}{1-s} \text{ konvergiert}$$

$$s > 1 \text{ divergiert}$$

$$s = 1 : \lim_{c \rightarrow a+} \log(x-a) \Big|_c^b = \lim_{c \rightarrow a+} [\log(b-a) - \log(c-a)] \text{ divergiert}$$

Majorantenkriterium

f auf $]a, b]$ definiert, auf jedem $[c, b]$ integrierbar, und $|f(x)| \leq \frac{c}{(x-a)^s}$ f\"ur Konstanten c und $s < 1$. Dann konvergiert $\int_a^b f(x) dx$

Minorantenkriterium

f auf $]a, b]$ definiert, auf jedem $[c, b]$ integrierbar, und $|f(x)| \geq \frac{c}{(x-a)^s}$ für Konstanten $c > 0$ und $s \geq 1$. Dann divergiert $\int_a^b f(x)dx$

Bsp.:

$$\int_0^\infty \frac{dx}{\sqrt{\tan x}}$$

Kein Problem bei $\frac{\pi}{2}$, stetig fortsezbar = o

$$\text{bei } 0 : \frac{1}{\sqrt{\tan x}} = \frac{1}{\sqrt{x \frac{\sin x}{x} \frac{1}{\cos x}}} = \frac{1}{x^{\frac{1}{2}}} \sqrt{\frac{\cos x}{\frac{\sin x}{x}}} \rightarrow 1 \text{ für } x \rightarrow 0$$

$$\Rightarrow \exists \delta > 0 : \forall x > 0 : x < \delta \Rightarrow \sqrt{\frac{\cos x}{\frac{\sin x}{x}}} \leq 2$$

$$\text{Majorantenkriterium: } \frac{1}{\sqrt{\tan x}} \leq \frac{2}{x^{\frac{1}{2}}}$$

$$\Rightarrow \int_0^\delta \frac{dx}{\sqrt{\tan x}} \text{ konvergiert}$$

$$\Rightarrow \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sqrt{\tan x}} \text{ konvergiert}$$

Bsp.:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sin x} \text{ divergent}$$

$$\frac{1}{\sin x} = \frac{x}{\underbrace{\sin x}_{\geq \frac{1}{2}}} \frac{1}{x} \Rightarrow \int_0^\delta \frac{dx}{\sin x} = \infty$$

Bsp.:

$$\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^3} = \int_{-1}^1 x^{-3} dx = \left. \frac{x^{-2}}{-2} \right|_{-1}^1 = \frac{1^{-2}}{-2} - \frac{(-1)^{-2}}{-2} = 0 \text{ FALSCH}$$
$$\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^3} = \underbrace{\int_{-1}^0 \frac{dx}{x^3}}_{\infty} - \underbrace{\int_0^1 \frac{dx}{x^3}}_{-\infty}$$

Teil II

Übungsnotizen

Kapitel 1

Landau-Symbole

$O(\cdot)$ -Notation

Bsp.:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + O(x^3)$$

Bsp.: Mergesort

$$k = \log_2 n$$

$$\begin{aligned} \text{Laufzeit } T(n) &= T(2^k) \\ &= 1 + (k - 1)2^k \\ &= 1 + (\log_2 n - 1)n \\ &= 1 + n \log_2 n - n \\ &= O(n \log_2 n) \end{aligned}$$

$o(\cdot)$ -Notation

Restterm vernachlässigbar klein

Teil III

Anhänge

Anhang A

Vorlesungsvorlagen

Druck		Schrift	Deutsch		Griechisch	
A	a	Α	α	α	A	α Alpha
B	b	Β	β	β	B	β Beta
C	c	Γ	γ	γ	Γ	γ Gamma
D	d	Δ	δ	δ	Δ	δ Delta
E	e	Ε	ε	ε	Ε	ε Epsilon
F	f	Ζ	ζ	ζ	Ζ	ζ Zeta
G	g	Η	η	η	Η	η Eta
H	h	Θ	θ	θ	Θ	θ Theta
I	i	Ι	ι	ι	Ι	ι Iota
J	j	Ј	ј	ј	Κ	κ Kappa
K	k	Κ	κ	κ	Λ	λ Lambda
L	l	Λ	λ	λ	Μ	μ My
M	m	Μ	μ	μ	Ν	ν Ny
N	n	Ν	ν	ν	Ξ	ξ Xi
O	o	Ο	ο	ο	Ο	ο Omikron
P	p	Ρ	ρ	ρ	Π	π Pi
Q	q	Ϟ	ϙ	ϙ	Ρ	ρ Rho
R	r	Ϛ	ϛ	ϛ	Σ	σ Sigma
S	s	Ϝ	ϝ	ϝ	Τ	τ Tau
T	t	Ϟ	ϙ	ϙ	Υ	υ Ypsilon
U	u	Ϡ	ϡ	ϡ	Φ	φ Phi
V	v	Ϣ	ϣ	ϣ	Χ	χ Chi
W	w	Ϥ	ϥ	ϥ	Ψ	ψ Psi
X	x	Ϧ	ϧ	ϧ	Ω	ω Omega
Y	y	Ϩ	ϩ	ϩ		
Z	z	Ϫ	ϫ	ϫ		

Körper

Körper-Axiome	
Ein Körper ist eine Menge K zusammen mit zwei binären Operationen $+$ und \cdot sowie zwei ausgezeichneten Elementen 0 und 1 , so dass folgendes gilt:	
$\forall x \forall y: x + y = y + x$	Kommutativität der Addition
$\forall x \forall y \forall z: x + (y + z) = (x + y) + z$	Assoziativität der Addition
$\forall x: 0 + x = x$	Neutrales Element der Addition
$\forall x \exists x': x + x' = 0$	Inverses Element der Addition
$\forall x \forall y: x \cdot y = y \cdot x$	Kommutativität der Multiplikation
$\forall x \forall y \forall z: x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$	Assoziativität der Multiplikation
$\forall x: 1 \cdot x = x$	Neutrales Element der Multiplikation
$\forall x \neq 0 \exists x': x \cdot x' = 1$	Inverses Element der Multiplikation
$\forall x \forall y \forall z: x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$	Distributivität
$1 \neq 0$	Nichttrivialität

Das inverse Element der Addition zu x ist eindeutig bestimmt und wird auch mit $-x$ bezeichnet. Für $x + (-y)$ schreibt man auch $x - y$.

Das inverse Element der Multiplikation zu $x \neq 0$ ist eindeutig bestimmt und wird auch mit $\frac{1}{x}$ bezeichnet. Für $x \cdot \frac{1}{y}$ schreibt man auch $\frac{x}{y}$.

Beispiele von Körpern
Die Menge \mathbb{Q} der rationalen Zahlen
Die Menge \mathbb{R} der reellen Zahlen
Die Menge \mathbb{C} der komplexen Zahlen
Die Menge \mathbb{F}_2 der binären Zahlen

Binäre Zahlen: $\mathbb{F}_2 = \{0, 1\}$ mit den folgenden Operationen:

+	0	1
0	0	1
1	1	0

\cdot	0	1
0	0	0
1	0	1

Winkel und trigonometrische Funktionen


Bedeutung einiger Winkel			
Grad	φ	$\sin \varphi$	Bedeutung
360°	2π	0	Vollkreis
180°	π	0	Halbkreis
90°	$\frac{\pi}{2}$	1	rechter Winkel
60°	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	Gleichseitiges Dreieck
45°	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	Diagonale im Quadrat
30°	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	Halbes gleichseitiges Dreieck

Einige wichtige trigonometrische Formeln	
$\cos \varphi = \sin\left(\varphi + \frac{\pi}{2}\right)$	
$\sin(-\varphi) = -\sin \varphi$	
$\cos(-\varphi) = \cos \varphi$	
$\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi = 1$ (Pythagoras)	
$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$	
$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$	
$\sin(2\varphi) = 2 \sin \varphi \cos \varphi$	
$\cos(2\varphi) = \cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi$	
$\tan \varphi = \begin{cases} \frac{\sin \varphi}{\cos \varphi} & \text{falls } \cos \varphi \neq 0, \\ \text{undefiniert} & \text{sonst} \end{cases}$	
$\cot \varphi = \begin{cases} \frac{\cos \varphi}{\sin \varphi} & \text{falls } \sin \varphi \neq 0, \\ \text{undefiniert} & \text{sonst} \end{cases}$	
$\varphi = \arcsin x \iff \sin \varphi = x \wedge \varphi \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$	
$\varphi = \arccos x \iff \cos \varphi = x \wedge \varphi \in [0, \pi]$	
$\varphi = \arctan x \iff \tan \varphi = x \wedge \varphi \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$	
$\varphi = \operatorname{arccot} x \iff \cot \varphi = x \wedge \varphi \in]0, \pi[$	

Viele weitere Formeln lassen sich aus diesen herleiten.

Grenzwert-Baukasten

Seien $X \subset \mathbb{R}^m$ eine Teilmenge und $f : X \rightarrow \mathbb{R}^n$ eine Funktion, und seien $x_0 \in \mathbb{R}^m$ und $y_0 \in \mathbb{R}^n$. Die Abwandlung des üblichen Grenzwertbegriffs $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = y_0$ liefert insgesamt $3 \times 5 = 15$ Varianten, wobei eine beliebige Zeile der oberen Tabelle mit einer beliebigen Zeile der unteren Tabelle kombiniert werden darf:



Umordnung von Reihen (Maple worksheet)

Diese Rechnung illustriert, wie man durch Umordnen einer konvergenten, aber nicht absolut konvergenten, Reihe den Grenzwert verändern kann. Grundlage ist die alternierende harmonische Reihe, welche bekanntlich konvergiert, aber nicht absolut konvergiert. Um die Rechnung zu beschleunigen, fassen wir je zwei aufeinanderfolgende Terme zusammen; da dabei keine Umordnung stattfindet, bleibt der Grenzwert derselbe:

```
> seriesterm := '1/(2*k-1) - 1/(2*k)';  
seriesterm :=  $\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k}$   
  
> evalf(sum(seriesterm, 'k'=1..100000000));  
0.6931471806
```

Nun ändern wir die Reihenfolge, indem wir jeweils zwei positive Reihenglieder (ungerader Nenner) und ein negatives Reihenglied (gerader Nenner) aufsummieren. Diese Umordnung "bevorzugt" die positiven Glieder und "benachteiligt" die negativen Glieder. Das negative Reihenglied, das vorher an der 2k-ten Stelle stand, steht nunmehr an der 3k-ten Stelle; diese Glieder werden also immer stärker nach hinten verschoben. Die resultierende Reihe ist immer noch konvergent, hat aber einen grösseren Grenzwert:

```
> seriesterm := '1/(4*k-3) + 1/(4*k-1) - 1/(2*k)';  
seriesterm :=  $\frac{1}{4k-3} + \frac{1}{4k-1} - \frac{1}{2k}$   
  
> evalf(sum(seriesterm, 'k'=1..100000000));  
1.039720771
```

Nehmen wir jeweils drei, bzw. vier, statt zwei positive Reihenglieder, so wächst der Grenzwert noch stärker:

```
> seriesterm := '1/(6*k-5) + 1/(6*k-3) + 1/(6*k-1) - 1/(2*k)';  
seriesterm :=  $\frac{1}{6k-5} + \frac{1}{6k-3} + \frac{1}{6k-1} - \frac{1}{2k}$   
  
> evalf(sum(seriesterm, 'k'=1..100000000));  
1.242453328  
  
> seriesterm := '1/(8*k-7) + 1/(8*k-5) + 1/(8*k-3) + 1/(8*k-1) - 1/(2*k)';  
seriesterm :=  $\frac{1}{8k-7} + \frac{1}{8k-5} + \frac{1}{8k-3} + \frac{1}{8k-1} - \frac{1}{2k}$   
  
> evalf(sum(seriesterm, 'k'=1..100000000));  
1.386294362
```

Wir können auch eine wachsende Anzahl positiver Reihenglieder zwischen je zwei negative Reihenglieder schieben. Zum Beispiel jeweils 1, 2, 3, 4, usw. Das liefert die Reihe mit den Gliedern:

```
> seriesterm := 'sum(1/(k^2+k+1-2*i), i=1..k) - 1/(2*k)';  
seriesterm :=  $\sum_{i=1}^k \frac{1}{k^2 + k + 1 - 2i} - \frac{1}{2k}$  (1)
```

Man kann beweisen, dass diese Reihe gegen unendlich divergiert. Das Computeralgebrasystem weiss das aber nicht von sich aus, und da die Divergenz so langsam ist, kann es auch so weitgehende

Partialsummen nicht mehr berechnen. Man sieht nur, dass die Partialsummen langsam wachsen:

```
> evalf(sum(seriesterm, 'k'=1..100));
```

$$2.651638016 \quad (2)$$

```
> evalf(sum(seriesterm, 'k'=1..1000));
```

$$3.800701023 \quad (3)$$

```
> evalf(sum(seriesterm, 'k'=1..10000));
```

$$4.951768775 \quad (4)$$

```
> evalf(sum(seriesterm, 'k'=1..100000));
```

$$6.103038828 \quad (5)$$

Das Umgekehrte passiert, wenn wir nach jedem positiven Reihenglied zwei, drei, bzw. vier negative Reihenglieder aufsummieren. Diese Umordnung "bevorzugt" die negativen Glieder und "benachteiligt" die positiven; die letzteren werden immer stärker nach hinten verschoben. Die resultierenden Reihen sind immer noch konvergent, ihr Grenzwert wird aber immer kleiner:

```
> seriesterm := '1/(2*k-1) - 1/(4*k-2) - 1/(4*k)';
```

$$\text{seriesterm} := \frac{1}{2k-1} - \frac{1}{4k-2} - \frac{1}{4k}$$

```
> evalf(sum(seriesterm, 'k'=1..1000000000));
```

$$0.3465735903$$

```
> seriesterm := '1/(2*k-1) - 1/(6*k-4) - 1/(6*k-2) - 1/(6*k)';
```

$$\text{seriesterm} := \frac{1}{2k-1} - \frac{1}{6k-4} - \frac{1}{6k-2} - \frac{1}{6k}$$

```
> evalf(sum(seriesterm, 'k'=1..1000000000));
```

$$0.1438410331$$

```
> seriesterm := '1/(2*k-1) - 1/(8*k-6) - 1/(8*k-4) - 1/(8*k-2) - 1/(8*k)';
```

$$\text{seriesterm} := \frac{1}{2k-1} - \frac{1}{8k-6} - \frac{1}{8k-4} - \frac{1}{8k-2} - \frac{1}{8k}$$

```
> evalf(sum(seriesterm, 'k'=1..1000000000));
```

$$0.$$

Der Wert der Reihe ist in diesem Fall nicht nur näherungsweise, sondern exakt gleich Null, wie man durch eine geeignete Umformung beweisen kann.

```
> seriesterm := '1/(2*k-1) - 1/(10*k-8) - 1/(10*k-6) - 1/(10*k-4) - 1/(10*k-2) - 1/(10*k)';
```

$$\text{seriesterm} := \frac{1}{2k-1} - \frac{1}{10k-8} - \frac{1}{10k-6} - \frac{1}{10k-4} - \frac{1}{10k-2} - \frac{1}{10k}$$

```
> evalf(sum(seriesterm, 'k'=1..1000000000));
```


$$-0.1115717757$$

Natürlich kann man so weiter machen. Dabei kann man durch geeignete Umordnung jeden beliebigen Grenzwert erreichen, einschliesslich unendlich oder minus unendlich; und man kann auch erreichen, dass die Reihe gar nicht konvergiert.

Beispiel zu Fourierreihen (Maple Worksheet)


Wir betrachten die Überlagerung von Cosinuswellen der Frequenzen $2k$ für alle ungeraden $k > 0$ mit den Amplituden $1/k^2$. Die ersten sechs Komponenten sind:

```
> plot( [cos(Pi*x) ,
>         cos(3*Pi*x)/9 ,
>         cos(5*Pi*x)/25 ,
>         cos(7*Pi*x)/49 ,
>         cos(9*Pi*x)/81 ,
>         cos(11*Pi*x)/121 ]
> , x=-2.5..2.5 , y=-1..1.2 , xtickmarks=[-2,-1,0,1,2] ,
> ytickmarks=0 );
```



Um sie besser sehen zu können, sind sie hier vertikal auseinander gerückt:


```
> plot( [cos(Pi*x) ,
>         cos(3*Pi*x)/9 + .18 ,
>         cos(5*Pi*x)/25 + .36 ,
>         cos(7*Pi*x)/49 + .54 ,
>         cos(9*Pi*x)/81 + .72 ,
>         cos(11*Pi*x)/121 + .9 ]
> , x=-2.5..2.5 , y=-1.2..1.3 , xtickmarks=[-2,-1,0,1,2] ,
> ytickmarks=0 );
```



Die ersten Partialsummen sind Funktionen mit den folgenden Graphen (wieder der Übersichtlichkeit wegen vertikal verschoben):


```
> plot( [cos(Pi*x) ,
>         cos(Pi*x) + cos(3*Pi*x)/9 + .3 ,
>         cos(Pi*x) + cos(3*Pi*x)/9 + cos(5*Pi*x)/25 + .6 ,
>         cos(Pi*x) + cos(3*Pi*x)/9 + cos(5*Pi*x)/25 + cos(7*Pi*x)
>         /49 + .9 ,
>         cos(Pi*x) + cos(3*Pi*x)/9 + cos(5*Pi*x)/25 + cos(7*Pi*x)
>         /49 + cos(9*Pi*x)/81 + 1.2 ,
>         cos(Pi*x) + cos(3*Pi*x)/9 + cos(5*Pi*x)/25 + cos(7*Pi*x)
>         /49 + cos(9*Pi*x)/81 + cos(11*Pi*x)/121 + 1.5 ]
> , x=-2.5..2.5 , y=-1.2..1.3 , xtickmarks=[-2,-1,0,1,2] ,
> ytickmarks=0 );
```

```
> , x=-2.5..2.5 , y=-1.2..3 , xtickmarks=[-2,-1,0,1,2] ,
ytickmarks=0 );
```




Da die Reihe $\sum 1/k^2$ eine konvergente Majorante ist, konvergiert die Fourierreihe absolut für jede reelle Zahl x . Die Grenzfunktion ist zwischen je zwei aufeinanderfolgenden ganzen Zahlen linear, und ihr Graph hat tatsächlich die Sägezahnform, die man aus dem obigen Bild erraten kann:

```
> plot( sum( cos((2*k-1)*Pi*x)/(2*k-1)^2 , k=1..infinity)
> , x=-2.5..2.5 , y=-1.5..1.5 , xtickmarks=[-2,-1,0,1,2] ,
ytickmarks=0 );
```




Wenn wir mit denselben Frequenzen und Amplituden jeweils den cosinus durch sinus ersetzen, so bedeutet dies, dass wir auf die einzelnen Komponenten verschiedene Phasenverschiebungen anwenden. Die Komponenten behalten dabei bis auf Verschiebung ihre Form:

```
> plot( [sin(Pi*x) ,
>         sin(3*Pi*x)/9 + .18 ,
>         sin(5*Pi*x)/25 + .36 ,
>         sin(7*Pi*x)/49 + .54 ,
>         sin(9*Pi*x)/81 + .72 ,
>         sin(11*Pi*x)/121 + .9]
> , x=-2.5..2.5 , y=-1.2..1.3 , xtickmarks=[-2,-1,0,1,2] ,
ytickmarks=0 );
```




Die Überlagerung dieser Wellen sieht nun aber völlig anders aus:

```
> plot( [sin(Pi*x) ,
>        sin(Pi*x) + sin(3*Pi*x)/9 + .3 ,
>        sin(Pi*x) + sin(3*Pi*x)/9 + sin(5*Pi*x)/25 + .6 ,
>        sin(Pi*x) + sin(3*Pi*x)/9 + sin(5*Pi*x)/25 + sin(7*Pi*x)
>        /49 + .9 ,
>        sin(Pi*x) + sin(3*Pi*x)/9 + sin(5*Pi*x)/25 + sin(7*Pi*x)
>        /49 + sin(9*Pi*x)/81 + 1.2 ,
>        sin(Pi*x) + sin(3*Pi*x)/9 + sin(5*Pi*x)/25 + sin(7*Pi*x)
>        /49 + sin(9*Pi*x)/81 + sin(11*Pi*x)/121 + 1.5 ]
> , x=-2.5..2.5 , y=-1.2..2.8 , xtickmarks=[-2,-1,0,1,2] ,
> ytickmarks=0 );
```



Die neue Fourierreihe ist aus demselben Grund wie vorher absolut konvergent. Der Graph ihrer Grenzfunktion hat die folgende Form. Sie hat aber keine einfache Beschreibung durch elementare Funktionen (sondern hängt mit der sogenannten Dilogarithmus-Funktion zusammen).

```
> plot( sum( sin((2*k-1)*Pi*x)/(2*k-1)^2 , k=1..infinity)
> , x=-2.5..2.5 , y=-1.2..1.2 , xtickmarks=[-2,-1,0,1,2] ,
> ytickmarks=0 );
```



Fazit: Die Form einer zusammengesetzten Welle hängt nicht nur von den Amplituden der einzelnen Frequenzen, sondern wesentlich auch von deren Phasen ab.


Trigonometrische und Hyperbolische Funktionen

Beziehung zur Exponentialfunktion		
$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$	$\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$	$\operatorname{arcosh} y = \log(y + \sqrt{y^2 - 1})$
$\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$	$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$	$\operatorname{arsinh} y = \log(y + \sqrt{y^2 + 1})$
$\tan x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{e^{ix} + e^{-ix}} \cdot \frac{1}{i}$	$\tanh x = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$	$\operatorname{artanh} y = \frac{1}{2} \log \frac{1+y}{1-y}$


Reihenentwicklungen	
$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \dots$	$= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$
$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \dots$	$= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \cdot \frac{x^{2k}}{(2k)!}$
$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \dots$	$= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \cdot \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$
$\cosh x = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + \dots$	$= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k}}{(2k)!}$
$\sinh x = x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \dots$	$= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$
$\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$	$= \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \cdot \frac{x^k}{k}$
$\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots$	$= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \cdot \frac{x^{2k+1}}{2k+1}$
$\operatorname{artanh} x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots$	$= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{2k+1}$

Additionstheoreme, Pythagoras	
$e^{x+y} = e^x \cdot e^y$	$\log xy = \log x + \log y$
$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y$	$\sinh(x+y) = \sinh x \cosh y + \cosh x \sinh y$
$\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$	$\cosh(x+y) = \cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y$
$\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$	$\sinh(2x) = 2 \sinh x \cosh x$
$\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$	$\cosh(2x) = \cosh^2 x + \sinh^2 x$
$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$	$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$

Definitions- und Zielbereiche	Bezeichnung
$\log y :]0, \infty[\rightarrow]-\infty, \infty[$	Natürlicher Logarithmus
$\arcsin y : [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$	Arcus Sinus
$\arccos y : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]$	Arcus Cosinus
$\arctan y :]-\infty, \infty[\rightarrow]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$	Arcus Tangens
$\operatorname{arsinh} y :]-\infty, \infty[\rightarrow]-\infty, \infty[$	Area Sinus hyperbolicus
$\operatorname{arcosh} y : [1, \infty[\rightarrow [0, \infty[$	Area Cosinus hyperbolicus
$\operatorname{artanh} y :]-1, 1[\rightarrow]-\infty, \infty[$	Area Tangens hyperbolicus



\sin, \cos, \tan



\sinh, \cosh, \tanh

Ableitung

Definition
Betrachte $f : X \rightarrow Y$ mit $X, Y \subset \mathbb{R}$ und $x_0 \in X$
f ist differenzierbar im Punkt x_0 mit Ableitung $f'(x_0)$
$\Leftrightarrow f(x) = f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0) + o(x - x_0)$ für $x \rightarrow x_0$
$\Leftrightarrow f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$
(Zum Vergleich:) f ist stetig im Punkt x_0
$\Leftrightarrow f(x) = f(x_0) + o(1)$ für $x \rightarrow x_0$
$\Leftrightarrow f(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$

Potenzen und Logarithmus		
$f(x)$	$f'(x)$	Bedingungen
const	0	
x^n	nx^{n-1}	$n \in \mathbb{Z}$ und $x \neq 0$ wenn $n < 0$
x^a	ax^{a-1}	$a \in \mathbb{R}$ und $x > 0$
$\log x$	$\frac{1}{x}$	$x > 0$
e^x	e^x	
a^x	$a^x \cdot \log a$	$a > 0$

Grundregeln		
Summe	$(f + g)' = f' + g'$	
konstanter Faktor	$(\lambda f)' = \lambda f'$	
Produktregel	$(fg)' = f'g + fg'$	
Quotientenregel	$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$	
Kettenregel	$(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$	$\frac{dz}{dx} = \frac{dz}{dy} \cdot \frac{dy}{dx}$
Umkehrfunktion	$g'(y) = \frac{1}{f'(g(y))}$	$\frac{dx}{dy} = \left(\frac{dy}{dx}\right)^{-1}$

Kreisfunktionen	
$f(x)$	$f'(x)$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$\frac{1}{\cos^2 x}$
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arccos x$	$\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$


Hyperbelfunktionen	
$f(x)$	$f'(x)$
$\sinh x$	$\cosh x$
$\cosh x$	$\sinh x$
$\tanh x$	$\frac{1}{\cosh^2 x}$
$\operatorname{arsinh} x$	$\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$
$\operatorname{arcosh} x$	$\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$
$\operatorname{artanh} x$	$\frac{1}{1-x^2}$


```

> mylist := [ sin(x) ]:
> for n from 2 by 2 to 20 do
>   mylist := [ op(mylist), convert(series(sin(x),x,n), polynom) ]
> end do:
> plot( mylist, x=0..11, y=-2..2, xtickmarks=[], ytickmarks=[],
>   labels=["", ""] ,
>   title="\n Taylor-Approximationen für sin(x) bei x=0 bis zum Grad
>   20",
>   titlefont=[Helvetica,14] );

```

Taylor-Approximationen für $\sin(x)$ bei $x=0$ bis zum Grad 20




```


> DrawCisApprox := proc(n)
> plot( [ [cos(t),sin(t),t=0..7],
>   [convert(series(cos(t),t,n+1), polynom),
>   convert(series(sin(t),t,n+1), polynom), t=0..10] ],
>   x=-2..2, y=-2..2, xtickmarks=[], ytickmarks=[], labels=["",
>   ""],
>   title=cat("\n Taylor-Approximation für cis(t) bei t=0 vom
>   Grad ",convert(n,string) ),
>   titlefont=[Helvetica,14] )
> end proc:
> for n from 1 by 1 to 20 do DrawCisApprox(n) end do;

```


Taylor-Approximation für $\text{cis}(t)$ bei $t=0$ vom Grad 1




Taylor-Approximation für $\text{cis}(t)$ bei $t=0$ vom Grad 2




Taylor-Approximation für $\text{cis}(t)$ bei $t=0$ vom Grad 3




Taylor-Approximation für $\text{cis}(t)$ bei $t=0$ vom Grad 4




Taylor-Approximation für $\text{cis}(t)$ bei $t=0$ vom Grad 5




Taylor-Approximation für $\text{cis}(t)$ bei $t=0$ vom Grad 6




Taylor-Approximation für $\text{cis}(t)$ bei $t=0$ vom Grad 7




Taylor-Approximation für $\text{cis}(t)$ bei $t=0$ vom Grad 8




Taylor-Approximation für $\text{cis}(t)$ bei $t=0$ vom Grad 9




Taylor-Approximation für $\text{cis}(t)$ bei $t=0$ vom Grad 10




Taylor-Approximation für $\text{cis}(t)$ bei $t=0$ vom Grad 11




Taylor-Approximation für $\text{cis}(t)$ bei $t=0$ vom Grad 12




Taylor-Approximation für $\text{cis}(t)$ bei $t=0$ vom Grad 13




Taylor-Approximation für $\text{cis}(t)$ bei $t=0$ vom Grad 14




Taylor-Approximation für $\text{cis}(t)$ bei $t=0$ vom Grad 15




Taylor-Approximation für $\text{cis}(t)$ bei $t=0$ vom Grad 16




Taylor-Approximation für $\text{cis}(t)$ bei $t=0$ vom Grad 17




Taylor-Approximation für $\text{cis}(t)$ bei $t=0$ vom Grad 18



Taylor-Approximation für $\text{cis}(t)$ bei $t=0$ vom Grad 19



Taylor-Approximation für $\text{cis}(t)$ bei $t=0$ vom Grad 20



Aufgabe: Bestimme die Lösung der Gleichung

```
> x^x=2;
```

$$x^x = 2$$

(1)

Dafür betrachten wir die Funktion:


```
> f(x) := x^x-2;
```

$$f(x) := x^x - 2$$

(2)

Hier ist eine Skizze:

```
> plot(x^x-2, x=0.001..3, -3..10);
```



Die ersten beiden Ableitungen

```
> f1(x) := diff(f(x), x);
```

```
> f2(x) := diff(f1(x), x);
```

sind offensichtlich positiv für $x > 1$. Darum ist die Funktion streng monoton wachsend und konvex. Insbesondere hat sie genau eine Nullstelle $x > 1$. Wir bestimmen diese Nullstelle näherungsweise mit dem Newton-Verfahren.

$$f1(x) := x^x (\ln(x) + 1)$$

$$f2(x) := x^x (\ln(x) + 1)^2 + \frac{x^x}{x}$$

(3)

Wir beginnen mit der standardmässig eingestellten Rechengenauigkeit von 10 floating point Dezimalstellen:

```
> Digits := 10;
```

Digits := 10

(4)

Wir beginnen mit dem Anfangswert


```
> t:=2;
```

t := 2

(5)

Der jeweils nächste Wert ergibt sich aus der Tangente in dem Punkt $(t, f(t))$ durch Schneiden mit der x-Achse:

```
> plot([x^x-2, subs(x=t, f(x))+subs(x=t, f1(x))*(x-t)], x=0.5..2.5, -2.  
.6);
```



```
> t := evalf(t-subs(x=t, f(x)/f1(x)));  
t := 1.704691946
```

(6)

```
> t := evalf(t-subs(x=t, f(x)/f1(x)));  
t := 1.577944558
```

(7)

```
> t := evalf(t-subs(x=t, f(x)/f1(x)));  
t := 1.559924538
```

(8)

```
> t := evalf(t-subs(x=t, f(x)/f1(x)));
```

(9)

```
t := 1.559610563 (9)
```

```
> t := evalf(t-subs(x=t,f(x)/f1(x)));  
t := 1.559610470 (10)
```

```
> t := evalf(t-subs(x=t,f(x)/f1(x)));  
t := 1.559610469 (11)
```

```
> t := evalf(t-subs(x=t,f(x)/f1(x)));  
t := 1.559610469 (12)
```

```
> t := evalf(t-subs(x=t,f(x)/f1(x)));  
t := 1.559610469 (13)
```

Offensichtlich hat sich der Wert schon nach 6 Schritten stabilisiert in den ersten 9 Nachkommastellen.

Versuchen wir es noch einmal mit grösserer Rechengenauigkeit:

```
> Digits := 100;  
Digits := 100 (14)
```

```
> t:=2;  
t := 2 (15)
```

```
> t := evalf(t-subs(x=t,f(x)/f1(x)));  
t := (16)
```

```
1.70469194542517937512809654533837422144167347556305996627986039903908\  
7533122771362372782388029075581
```

```
> t := evalf(t-subs(x=t,f(x)/f1(x)));  
t := (17)
```

```
1.57794455747627044569220823373823215106864236086675276070613595024266\  
1730542372044851155168774370367
```

```
> t := evalf(t-subs(x=t,f(x)/f1(x)));  
t := (18)
```

```
1.55992453751707899242823044435245682392182514852486060058220214991352\  
5561157015656308576730552209549
```

```
> t := evalf(t-subs(x=t,f(x)/f1(x)));  
t := (19)
```

```
1.55961056257717667811411825090521591061446411465339074078530052555994\  
4740804412284512773465544519861
```

```
> t := evalf(t-subs(x=t,f(x)/f1(x)));  
t := (20)
```

```
1.55961046946237753625543253382371872673415175680679883477515124483111\  
0373310340996164917744233643803
```

```
> t := evalf(t-subs(x=t,f(x)/f1(x)));  
t := (21)
```



```
1.55961046946236934997038876882827667607543672778874886831407192682295\
4299412641408046093730399283014
```

```
> t := evalf(t-subs(x=t, f(x)/f1(x)));
t:= (22)
```

```
1.55961046946236934997038876876500299328488351184309142472337460260886\
4936778072034298057463948346187
```

```
> t := evalf(t-subs(x=t, f(x)/f1(x)));
t:= (23)
```

```
1.55961046946236934997038876876500299328488351184309142471959456941397\
3034549590587105413444691283974
```

```
> t := evalf(t-subs(x=t, f(x)/f1(x)));
t:= (24)
```

```
1.55961046946236934997038876876500299328488351184309142471959456941397\
3034549590587105413444691283974
```

```
> t := evalf(t-subs(x=t, f(x)/f1(x)));
t:= (25)
```

```
1.55961046946236934997038876876500299328488351184309142471959456941397\
3034549590587105413444691283974
```


Hier haben bereits 8 Schritte genügt, um den Wert auf 99 Nachkommastellen genau zu berechnen! Dies illustriert die Stärke des Verfahrens.

Bei einem ungünstigeren Startwert

```
> t:=10;
t:= 10 (26)
```

geschieht zum Beispiel folgendes. Da die Tangente fast vertikal ist, ändert sich der Wert von t in einem Schritt relativ wenig:

```
> plot([x^x-2, subs(x=t, f(x))+subs(x=t, f1(x))*(x-t)], x=0.1..10, -10.
.10000000000);
```



```
> Digits := 10;
                               Digits := 10
```

```
> t := evalf(t-subs(x=t,f(x)/f1(x)));
                               t := 9.697206894
```

```
> t := evalf(t-subs(x=t,f(x)/f1(x)));
                               t := 9.391568280
```

```
> t := evalf(t-subs(x=t,f(x)/f1(x)));
                               t := 9.082908423
```

```
> t := evalf(t-subs(x=t,f(x)/f1(x)));
                               t := 8.771031637
```

```
> t := evalf(t-subs(x=t,f(x)/f1(x)));
                               t := 8.455718896
```

```
> t := evalf(t-subs(x=t,f(x)/f1(x)));
                               t := 8.136723664
```

```
> t := evalf(t-subs(x=t,f(x)/f1(x)));
                               t := 7.813766706
```

$$\begin{aligned} &> t := \text{evalf}(t - \text{subs}(x=t, f(x)/f1(x))); \\ &\quad t := 7.486529559 \end{aligned} \tag{35}$$

$$\begin{aligned} &> t := \text{evalf}(t - \text{subs}(x=t, f(x)/f1(x))); \\ &\quad t := 7.154646231 \end{aligned} \tag{36}$$

$$\begin{aligned} &> t := \text{evalf}(t - \text{subs}(x=t, f(x)/f1(x))); \\ &\quad t := 6.817692502 \end{aligned} \tag{37}$$

$$\begin{aligned} &> t := \text{evalf}(t - \text{subs}(x=t, f(x)/f1(x))); \\ &\quad t := 6.475171989 \end{aligned} \tag{38}$$

$$\begin{aligned} &> t := \text{evalf}(t - \text{subs}(x=t, f(x)/f1(x))); \\ &\quad t := 6.126497830 \end{aligned} \tag{39}$$

$$\begin{aligned} &> t := \text{evalf}(t - \text{subs}(x=t, f(x)/f1(x))); \\ &\quad t := 5.770968550 \end{aligned} \tag{40}$$

$$\begin{aligned} &> t := \text{evalf}(t - \text{subs}(x=t, f(x)/f1(x))); \\ &\quad t := 5.407736710 \end{aligned} \tag{41}$$

$$\begin{aligned} &> t := \text{evalf}(t - \text{subs}(x=t, f(x)/f1(x))); \\ &\quad t := 5.035770310 \end{aligned} \tag{42}$$

$$\begin{aligned} &> t := \text{evalf}(t - \text{subs}(x=t, f(x)/f1(x))); \\ &\quad t := 4.653812845 \end{aligned} \tag{43}$$

$$\begin{aligned} &> t := \text{evalf}(t - \text{subs}(x=t, f(x)/f1(x))); \\ &\quad t := 4.260367992 \end{aligned} \tag{44}$$

$$\begin{aligned} &> t := \text{evalf}(t - \text{subs}(x=t, f(x)/f1(x))); \\ &\quad t := 3.853796758 \end{aligned} \tag{45}$$

$$\begin{aligned} &> t := \text{evalf}(t - \text{subs}(x=t, f(x)/f1(x))); \\ &\quad t := 3.432795886 \end{aligned} \tag{46}$$

$$\begin{aligned} &> t := \text{evalf}(t - \text{subs}(x=t, f(x)/f1(x))); \\ &\quad t := 2.998023758 \end{aligned} \tag{47}$$

$$\begin{aligned} &> t := \text{evalf}(t - \text{subs}(x=t, f(x)/f1(x))); \\ &\quad t := 2.556823225 \end{aligned} \tag{48}$$

$$\begin{aligned} &> t := \text{evalf}(t - \text{subs}(x=t, f(x)/f1(x))); \\ &\quad t := 2.134590212 \end{aligned} \tag{49}$$

$$\begin{aligned} &> t := \text{evalf}(t - \text{subs}(x=t, f(x)/f1(x))); \\ &\quad t := 1.791270495 \end{aligned} \tag{50}$$

$$\begin{aligned} &> t := \text{evalf}(t - \text{subs}(x=t, f(x)/f1(x))); \\ &\quad t := 1.604251568 \end{aligned} \tag{51}$$

$$\begin{aligned} &> t := \text{evalf}(t - \text{subs}(x=t, f(x)/f1(x))); \\ &\quad t := 1.561444976 \end{aligned} \tag{52}$$

$$\begin{aligned} &> t := \text{evalf}(t - \text{subs}(x=t, f(x)/f1(x))); \\ &\quad t := 1.559613644 \end{aligned} \tag{53}$$

$$\begin{aligned} &> t := \text{evalf}(t - \text{subs}(x=t, f(x)/f1(x))); \\ &\quad t := 1.559610469 \end{aligned} \tag{54}$$

```
> t := evalf(t-subs(x=t,f(x)/f1(x)));
t:=1.559610469 (55)
```


```
> t := evalf(t-subs(x=t,f(x)/f1(x)));
t:=1.559610469 (56)
```

Hier haben wir 27 Schritte gebraucht, um 9 Nachkommastellen genau zu berechnen. Ab dann konvergiert das Verfahren natürlich wieder rasant, wie oben.

Ein zu kleiner Startwert wird zuerst nach rechts geworfen und konvergiert danach von rechts gegen die gesuchte Nullstelle:

```
> t:=1;
t:=1 (57)
```

```
> plot([x^x-2,subs(x=t,f(x))+subs(x=t,f1(x))*(x-t)],x=0.1..3,-2..10)
;
```



```
> t := evalf(t-subs(x=t,f(x)/f1(x)));
t:=2. (58)
```

```
> t := evalf(t-subs(x=t,f(x)/f1(x)));
t:=1.704691946 (59)
```

```
> t := evalf(t-subs(x=t,f(x)/f1(x)));
t:=1.60 (60)
```

```
t:=1.577944558 (60)
```

```
> t := evalf(t-subs(x=t,f(x)/f1(x)));  
t:=1.559924538 (61)
```

```
> t := evalf(t-subs(x=t,f(x)/f1(x)));  
t:=1.559610563 (62)
```

```
> t := evalf(t-subs(x=t,f(x)/f1(x)));  
t:=1.559610470 (63)
```

```
> t := evalf(t-subs(x=t,f(x)/f1(x)));  
t:=1.559610469 (64)
```


```
> t := evalf(t-subs(x=t,f(x)/f1(x)));  
t:=1.559610469 (65)
```

```
> t := evalf(t-subs(x=t,f(x)/f1(x)));  
t:=1.559610469 (66)
```

Das kann möglicherweise auch eine Weile dauern:

```
> t:=0.5;  
t:=0.5 (67)
```

```
> plot([x^x-2,subs(x=t,f(x))+subs(x=t,f1(x))*(x-t)],x=0.1..8,-2..10)  
;
```



```
> t := evalf(t-subs(x=t,f(x)/f1(x)));
t := 6.458645349
```

(68)

```
> t := evalf(t-subs(x=t,f(x)/f1(x)));
t := 6.109660408
```

(69)

```
> t := evalf(t-subs(x=t,f(x)/f1(x)));
t := 5.753783430
```

(70)

```
> t := evalf(t-subs(x=t,f(x)/f1(x)));
t := 5.390159079
```

(71)

```
> t := evalf(t-subs(x=t,f(x)/f1(x)));
t := 5.017745485
```

(72)

```
> t := evalf(t-subs(x=t,f(x)/f1(x)));
t := 4.635274627
```

(73)

```
> t := evalf(t-subs(x=t,f(x)/f1(x)));
t := 4.241239606
```

(74)

```
> t := evalf(t-subs(x=t,f(x)/f1(x)));
t := 3.834001634
```

(75)

```
> t := evalf(t-subs(x=t,f(x)/f1(x)));
t := 3.412299812 (76)
```

```
> t := evalf(t-subs(x=t,f(x)/f1(x)));
t := 2.976967560 (77)
```

```
> t := evalf(t-subs(x=t,f(x)/f1(x)));
t := 2.535883754 (78)
```

```
> t := evalf(t-subs(x=t,f(x)/f1(x)));
t := 2.115736636 (79)
```

```
> t := evalf(t-subs(x=t,f(x)/f1(x)));
t := 1.778292681 (80)
```

```
> t := evalf(t-subs(x=t,f(x)/f1(x)));
t := 1.599662181 (81)
```

```
> t := evalf(t-subs(x=t,f(x)/f1(x)));
t := 1.561090984 (82)
```

```
> t := evalf(t-subs(x=t,f(x)/f1(x)));
t := 1.559612537 (83)
```

```
> t := evalf(t-subs(x=t,f(x)/f1(x)));
t := 1.559610469 (84)
```

```
> t := evalf(t-subs(x=t,f(x)/f1(x)));
t := 1.559610469 (85)
```


```
> t := evalf(t-subs(x=t,f(x)/f1(x)));
t := 1.559610469 (86)
```

Dafür waren 17 Schritte nötig.

Schliesslich kann ein noch kleinerer Startwert den folgenden Effekt haben:

```
> t:=0.2;
t := 0.2 (87)
```

```
> plot([x^x-2,subs(x=t,f(x))+subs(x=t,f1(x))*(x-t)],x=-4..3,-2..10);
```



```
> t := evalf(t-subs(x=t,f(x)/f1(x)));
t := -2.687019806 (88)
```

```
> t := evalf(t-subs(x=t,f(x)/f1(x)));
t := 0.285025338 + 7.223969321 I (89)
```

Hier hat t den Definitionsbereich von $f(x)$ verlassen. Das Programm interpretiert den Logarithmus einer negativen Zahl als komplexe Zahl, was für die vorliegende Aufgabe aber nutzlos ist.

```
>
```


Einige unbestimmte Integrale

$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + \text{const}$	für $x \in (-\infty, \infty)$, $n \in \mathbb{Z}$, $n \geq 0$
$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + \text{const}$	für $x \in (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$, $n \in \mathbb{Z}$, $n \leq -2$
$\int x^s dx = \frac{x^{s+1}}{s+1} + \text{const}$	für $x \in (0, \infty)$, $s \in \mathbb{C}$, $s \neq -1$
$\int \frac{1}{x} dx = \log x + \text{const}$	für $x \in (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$
$\int e^x dx = e^x + \text{const}$	für $x \in (-\infty, \infty)$
$\int \log x dx = x \log x - x + \text{const}$	für $x \in (0, \infty)$
$\int \sin x dx = -\cos x + \text{const}$	für $x \in (-\infty, \infty)$
$\int \cos x dx = \sin x + \text{const}$	für $x \in (-\infty, \infty)$
$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + \text{const}$	für $x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} (k\pi - \frac{\pi}{2}, k\pi + \frac{\pi}{2})$
$\int \tan x dx = -\log \cos x + \text{const}$	für $x \in \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} (k\pi - \frac{\pi}{2}, k\pi + \frac{\pi}{2})$
$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + \text{const}$	für $x \in (-1, 1)$
$\int \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arccos x + \text{const}$	für $x \in (-1, 1)$
$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + \text{const}$	für $x \in (-\infty, \infty)$
$\int \sinh x dx = \cosh x + \text{const}$	für $x \in (-\infty, \infty)$
$\int \cosh x dx = \sinh x + \text{const}$	für $x \in (-\infty, \infty)$
$\int \frac{1}{\cosh^2 x} dx = \tanh x + \text{const}$	für $x \in (-\infty, \infty)$
$\int \tanh x dx = \log \cosh x + \text{const}$	für $x \in (-\infty, \infty)$
$\int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx = \operatorname{arsinh} x + \text{const}$	für $x \in (-\infty, \infty)$
$\int \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} dx = \operatorname{arcosh} x + \text{const}$	für $x \in (1, \infty)$
$\int \frac{1}{1-x^2} dx = \operatorname{artanh} x + \text{const}$	für $x \in (-1, 1)$
$\int \frac{1}{1-x^2} dx = \operatorname{artanh} \frac{1}{x} + \text{const}$	für $x \in (-\infty, -1) \cup (1, \infty)$
$\int \frac{1}{1-x^2} dx = \frac{1}{2} \cdot \log \left \frac{x+1}{x-1} \right + \text{const}$	für $x \in (-\infty, -1) \cup (-1, 1) \cup (1, \infty)$

Integrationstechniken

für das unbestimmte Integral

Ableitungsregel	Integrationsregel
Addition: $(f + g)' = f' + g'$	Addition: $\int (f(x) + g(x)) dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$
Skalare Multiplikation: $(\lambda f)' = \lambda \cdot f'$	Skalare Multiplikation: $\int \lambda \cdot f(x) dx = \lambda \cdot \int f(x) dx$
Produktformel: $(fg)' = f'g + fg'$	Partielle Integration: $\int f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x) dx$
Kettenregel: $(f(\varphi(y)))' = f'(\varphi(y)) \cdot \varphi'(y)$	Substitution: $\left(\int f(x) dx \right)_{x=\varphi(y)} = \int f(\varphi(y)) \varphi'(y) dy$
Partialbruchzerlegung (zur Integration rationaler Funktionen): Für teilerfremde Polynome $g_1(x), \dots, g_n(x)$ und ein weiteres Polynom $f(x)$ existieren Polynome $f_i(x)$ vom Grad kleiner als der von $g_i(x)$ sowie ein Polynom $h(x)$, so dass gilt: $\frac{f(x)}{g_1(x) \cdots g_n(x)} = \frac{f_1(x)}{g_1(x)} + \dots + \frac{f_n(x)}{g_n(x)} + h(x)$	

Standard-Substitutionen zur Integralberechnung

Integral	Substitution	Differential	Bemerkungen
$\int f(x, \sqrt{ax+b}) dx$	$x = \frac{t^2 - b}{a}$	$dx = \frac{2t dt}{a}$	$t \geq 0$
$\int f(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx$	$x = \alpha t + \beta$	$dx = \alpha dt$	wähle $\alpha, \gamma > 0$ und β so, dass gilt $ax^2 + bx + c = \gamma^2 \cdot (1 - t^2)$ oder $= \gamma^2 \cdot (1 + t^2)$ oder $= \gamma^2 \cdot (t^2 - 1)$
$\int f(x, \sqrt{1-x^2}) dx$	$x = \sin t$	$dx = \cos t dt$	$-\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$
$\int f(x, \sqrt{1+x^2}) dx$	$x = \sinh t$	$dx = \cosh t dt$	$t \in \mathbb{R}$
$\int f(x, \sqrt{x^2-1}) dx$	$x = \cosh t$	$dx = \sinh t dt$	$t \geq 0$
$\int f(e^x, \sinh x, \cosh x) dx$	$e^x = t$	$dx = \frac{dt}{t}$	$t > 0$, und dabei gilt $\sinh x = \frac{t^2 - 1}{2t}, \quad \cosh x = \frac{t^2 + 1}{2t}$
$\int f(\sin x, \cos x) dx$	$\tan \frac{x}{2} = t$	$dx = \frac{2 dt}{1+t^2}$	$-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$, und dabei gilt $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$

In vielen Fällen wird das Integral nach der Substitution einfachere Gestalt haben. Ist insbesondere f eine rationale Funktion, so hat man nach der Substitution ein Integral der Form $\int R(t) dt$ mit einer rationalen Funktion $R(t)$. Dieses behandelt man durch Partialbruchzerlegung.

Wenn sich ein Integral mit diesen Hinweisen nicht lösen lässt, so sollte man es mit einer anderen Substitution oder mit partieller Integration versuchen. Im Zweifelsfall hilft nur Erfahrung.

Berechnung von $\int \frac{f(x)}{g(x)} dx$ mit Partialbruchzerlegung

Seien $f(x)$ und $g(x)$ zwei Polynome.

1) Faktorisiere $g(x)$ über \mathbb{R} soweit wie möglich, das heisst, schreibe $g(x) = g_1(x) \cdots g_n(x)$ mit teilerfremden Polynomen $g_i(x)$, deren jedes eine Potenz eines irreduziblen Polynoms vom Grad 1 oder 2 ist. Dabei entsprechen die irreduziblen Faktoren vom Grad 1 den reellen Nullstellen von $g(x)$, die irreduziblen Faktoren vom Grad 2 den Paaren konjugiert komplexer nicht-reeller Nullstellen.

2) Finde die Partialbruchzerlegung von $\frac{f(x)}{g(x)}$, das heisst, finde weitere Polynome $g_i(x)$ sowie $h(x)$ mit $\deg f_i(x) < \deg g_i(x)$ und $\deg h(x) \leq \deg f(x) - \deg g(x)$, so dass gilt:

$$\frac{f(x)}{g_1(x) \cdots g_n(x)} = \frac{f_1(x)}{g_1(x)} + \cdots + \frac{f_n(x)}{g_n(x)} + h(x)$$

Die Polynome $g_i(x)$ und $h(x)$ findet man durch Ansatz mit noch zu bestimmenden Koeffizienten, durch Multiplizieren mit $g_1(x) \cdots g_n(x)$, sowie mit Koeffizientenvergleich.

Danach ist das Problem reduziert auf die folgenden Fälle:

3) $g(x) = (ax + b)^n$: Die Substitution $t = ax + b$ überführt das Integral in eines der Form $\int \frac{f(t)}{t^n} dt$. Dieses löst man durch Zerlegen von $f(t)$ in Monome und Einsetzen der bekannten Formeln für $\int t^s dt$.

4) $g(x) = (ax^2 + bx + c)^n$: Eine Substitution der Form $t = \alpha x + \beta$ für geeignete α, β normiert $g(x)$ auf die Gestalt $(1 + t^2)^n$. Danach schreibt man den Zähler in der Form $f(t) = f_0(1 + t^2) + t \cdot f_1(1 + t^2)$ und zerlegt f_0 und f_1 in Monome. Dies reduziert die Frage auf die Fälle $f(t) = 1$ und $f(t) = t$.

5) $g(x) = (1 + t^2)^n$: Das Integral $\int \frac{t dt}{(1 + t^2)^n}$ berechnet man mit Hilfe der Substitution $1 + t^2 = u$. Andererseits hat man

$$\int \frac{dt}{1 + t^2} = \arctan t + \text{const},$$

und für $n > 1$ beweist man mit partieller Integration die Induktionsformel

$$\int \frac{dt}{(1 + t^2)^n} = \frac{2n - 3}{2n - 2} \cdot \int \frac{dt}{(1 + t^2)^{n-1}} + \frac{1}{2n - 2} \cdot \frac{t}{(1 + t^2)^{n-1}} + \text{const}.$$

Index

- abgeschlossen, 47
- Abschluss, 47
- \arccos , 22
- \arcsin , 22
- Asymptote, 59
- Aufzählung, 26
- Bernoulli-de l'Hôpital
 Regel von, 127
- beschränkt, 61, 62
- Bijektivität, 20
- Binomische Reihe, 90
- dicht, 47
- differenzierbar, 109, 110
- Eulersche Zahl, 93
- Extremalstelle, 130
- Extremum, 131
- Folge, 25
- Fundamentalsatz der Algebra, 81
- Funktion, 13
 - algebraische, 17
 - elementare, 18
 - Gebrochenrationale-, 16
 - Polynom-, 16
 - Potenz-, 17
 - allgemeine, 17
 - rationale, 17
 - Wurzel-, 17
- gerade, 22
- Graph, 14
- Grenzwert, 49, 50
 - einseitiger, 52
 - uneigentlicher, 54
- gross O , 105
- Hauptsatz der Infinitesimalrechnung, 178, 179
- Injektivität, 20
- Innere, 46
- klein o , 106
- kompakt, 63
- konkav, 158
- Konvergenz
 - absolute, 76
 - quadratische, 165
- Konvergenzradius, 86
- konvex, 158
- Kreuzmenge, 14
- kritischer Punkt, 132
- Logarithmus
 - natürliche, 96
- Majorantenkriterium, 57
- Maximum
 - lokales, 132
- Minimum
 - lokales, 131
- Mittelwertsatz, 113--115, 120, 123
- monoton, 24
- Norm, 43

offen, 46
offener Ball, 46

Partialsumme, 69
Potenzreihe, 84
Pythagoras
 Satz von, 102, 103

Rand, 47
Reihe, 69
 alternierend, 74
 Wert, 70
Riemann-Integral, 170

Sphäre, 49
Stammfunktion, 179
Stetigkeit, 30, 34
 linksseitig, 34
 rechtsseitig, 34
Supremum, 35
Surjektivität, 20

Taylor Polynom, 139
Taylorreihe, 142

Umkehrfunktion, 21
uneigentlicher Grenzwert, 193, 194
ungerade, 23

Wendepunkt, 160

Todo list

Fix 14

Double Superscript 25

Use \norm 44

What? Why? 68

Fix 76

Double superscript 87

Fix 140