
5A

```
clear all; % clears all previous activity
close all;

func1 = @(y) (.65*(y-((y.^2)./5.4)))-((1.2*(y.^2))./(1+(y.^2))); %
    defines f(y) as an anonymous function with L=5.4
func2 = @(y) (.65*(y-((y.^2)./8.1)))-((1.2*(y.^2))./(1+(y.^2))); %
    defines f(y) as an anonymous function with L=8.1
func3 = @(y) (.65*(y-((y.^2)./16.3)))-((1.2*(y.^2))./(1+(y.^2))); %
    defines f(y) as an anonymous function with L=16.3
y = 0:.1:7;

figure(2); % sets figure 2
hold on; % allows all plots to be on the same figure
    plot(y,func1(y),'blue'); % plots f(y) with L=5.4
    plot(y,func2(y),'yellow'); % plots f(y) with L=8.1
    plot(y,func3(y),'red'); % plots f(y) with L=16.3

    % sets axes labels and title/legend
    ylabel('Hundreds of Fish/day');
    xlabel('Hundreds of Fish');
    legend('rainbow','brown','brook');
    title('f(y)');
hold off; % ends graphical hold

root1 = fzero(func1,.7) % finds roots of f(y)(equilibrium points)
root2 = fzero(func2,.8) % finds roots of f(y)(equilibrium points)
root3 = fzero(func2,1.9) % finds roots of f(y)(equilibrium points)
root4 = fzero(func2,5.4) % finds roots of f(y)(equilibrium points)
root5 = fzero(func3,14.3) % finds roots of f(y)(equilibrium points)

root1 =

    0.7050

root2 =

    0.8018

root3 =


    1.8564

root4 =

    5.4418
```

`root5 =`

`14.1898`



Published with MATLAB® R2020a