

1 Весовые характеристики функции. Сбалансированная функция. Теорема о связи множества всех отображений декартовой степени конечного множества с множеством всех систем координатных функций, следствие. Система весовых характеристик системы функций. Нормальное весовое строение системы функций. Критерий сбалансированности системы функций, следствие.

Функция $f : X \rightarrow Y$ сбалансирована, если

$$|\{x \in X \mid f(x) = y\}| = |\{x \in X \mid f(x) = z\}| \quad \forall y, z \in Y. \quad (1)$$

Теорема:

$$\varphi : X^n \rightarrow X^m \iff F_{m,n} = \{f_1(x_1, \dots, x_n), \dots, f_m(x_1, \dots, x_n)\} \quad (2)$$

где $F_{m,n}$ - система координатных функций.

Следствие: Множество всех отображений $V_n \rightarrow V_m$ взаимно однозначно соответствует множеству всех систем из m б.ф. от n переменных.

Весовые характеристики:

$$N_{r_1, \dots, r_s}^{i_1, \dots, i_s} = |\{(x_1, \dots, x_n) \in X^n \mid f_{i_1}(x_1, \dots, x_n) = r_1, \dots, f_{i_s}(x_1, \dots, x_n) = r_s\}| \quad (3)$$

где $\{i_1, \dots, i_s\} \subseteq \{1 \dots m\}$, $(r_1, \dots, r_s) \in X^s$. Множество весовых характеристик функции образуют систему весовых характеристик этой функции.

Функция имеет нормальное весовое строение (н.в.с.), если $(X = E_k - \text{числа от } 0 \text{ до } k-1 \text{ (типа } \mathbb{Z}_k))$:

$$N_{r_1, \dots, r_s}^{i_1, \dots, i_s} = k^{n-s} \quad (4)$$

Теорема: Отображение $F_{m,n}$ сбалансировано $\iff F_{m,n}$ имеет н.в.с.

Следствие 1: Отображение, заданное системой б.ф. $F_{m,n}$, сбалансировано \iff для любого непустого подмножества $\{i_1, \dots, i_s\}$ мн-ва $\{1, \dots, m\}$:

$$|f_{i_1}(x_1, \dots, x_n) \cdot \dots \cdot f_{i_s}(x_1, \dots, x_n)| = 2^{n-s} \quad (5)$$

Следствие 2: Если $F_{m,n}$ сбалансировано, то все его координатные ф-ции тоже сбалансированы.

2 Алгебраически зависимая система функций. Критерий алгебраической зависимости системы функций, следствие (без доказательства). Линейные, аффинные, нелинейные функции векторных пространств, замечания. Критерий сбалансированности линейного отображения векторных пространств (без доказательства).

Система ф-ций $F_{m,n}$ является АЗ, если $\exists b \in X$ и $\exists \psi : X^m \rightarrow X$, отличная от константы, для которых

$$\psi(f_1(x_1, \dots, x_n), \dots, f_m(x_1, \dots, x_n)) \equiv b \quad (6)$$

Теорема: Отображение φ , определяемое системой $F_{m,n}$, сюръективно $\iff F_{m,n}$ - АНЗ

Следствие: Преобразование g множества X^n биективно \iff АНЗ система его координатных ф-ций.

Пусть P - некоторое поле. Ф-ция $\varphi : P^n \rightarrow P^m$ линейная, если:

$$\forall x, y \in P^n \quad \forall a, b \in P : \varphi(a \cdot x + b \cdot y) = a \cdot \varphi(x) + b \cdot \varphi(y) \quad (7)$$

Ф-ция $\varphi : P^n \rightarrow P^m$ аффинная, если:

$$\varphi(x) = \psi(x) + a \quad (8)$$

где ψ - линейная функция, $a \in P^m$

Ф-ция, отличная от аффинной, называется нелинейной.

Утверждение: Между мн-вом линейных функций из P^n в P^m φ и мн-вом матриц $m \times n$ M_φ существует биекция. При этом коэф-ты линейного полинома i -й координатной функции соответствуют i -й строке матрицы M_φ . Верно следующее: φ сбалансирована $\iff \text{rang} M_\varphi = m$.

3 Треугольное преобразование декартовой степени конечно-го множества. Критерий биективности треугольного преобразования, следствие. Отображение неавтономного (преобразование автономного) регистра сдвига над конечным множеством. Линейные регистры сдвига. Критерий биективности преобразования автономного регистра сдвига, следствие.

Преобразование g_n множества X^n называется треугольным, если $g_n = F_{\Delta,n} = \{f_1(x_1), f_2(x_1, x_2), \dots, f_n(x_1, \dots, x_n)\}$, иначе если $S(f_i) \subseteq 1, \dots, i$ для $i = 1, \dots, n$, где $S(f)$ — множество номеров существенных переменных функции f .

Теорема: Треугольное преобразование g_n множества X^n биективно \iff функция $f_i(x_1, \dots, x_i)$ биективна по последней переменной x_i , $i = 1, \dots, n$.

Пусть $\tau(y_1, y_2)$ — внутренняя бинарная операция на X . Отображение $f\varphi : X^{n+1} \rightarrow X^n$ называется **отображением неавтономного регистра левого сдвига над X с обратной связью** $f : X^n \rightarrow X$, если

$$f\varphi(x_1, \dots, x_n, x_{n+1}) = (x_2, \dots, x_n, \tau(f(x_1, \dots, x_n), x_{n+1})). \quad (9)$$

То есть, x_{n+1} нам приходит извне. Мы считаем значение функции τ от текущих элементов регистра и от новой пришедшей переменной, и ставим его на последнее (самое правое, т.к. регистр левого сдвига \Rightarrow всё сдвигается влево) место.

- Число n — длина регистра.
- Отображение f — функция обратной связи.
- Переменные x_1, \dots, x_n — внутренние переменные.
- Переменная x_{n+1} — входная переменная.




Рис. 1: Неавтономный регистр правого сдвига длины n .

Обычно X — кольцо или поле, а τ биективна по обоим переменным и реализует сложение.

Отображение регистра сдвига над кольцом X является линейным, если линейна функция обратной связи. Соответствующие регистры называются **линейными регистрами сдвига (ЛРС)** над кольцом X .

Теорема: Преобразование fg автономного регистра левого сдвига множества X^n биективно \iff функция обратной связи $f : X^n \rightarrow X$ биективна по переменной x_1 (по выталкиваемой переменной).

Следствие: Преобразование fg регистра левого сдвига над $GF(2)$ с обратной связью $f : X^n \rightarrow X$ биективно \iff f линейна по переменной x_1 :

$$f(x_1, \dots, x_n) = x_1 \oplus \psi(x_2, \dots, x_n), \quad (10)$$

где ψ — произвольная б.ф. от $n - 1$ переменной.

4 Последовательность. Подпоследовательность, отрезок, мультиграмма. Функция перестановки, замены, сопряжения. Период и предпериод последовательности. Чисто периодическая последовательность. Утверждение о длинах предпериода и периода последовательности; об изменении длин периода и предпериода при замене членов последовательности.

Пусть $X_{\rightarrow} = \{x_1, \dots, x_i, \dots\}$ - бесконечная последовательность на мн-вом X порядка k .

Последовательность $\{x_{j_1}, x_{j_2}, \dots, x_{j_i}, \dots\}$ при $1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_i < \dots$ называется подпоследовательностью пос-ти X_{\rightarrow} .

Подпоследовательность $\{x_r, x_{r+1}, \dots, x_{r+s-1}\}$ называется s -граммой пос-ти X_{\rightarrow} (или $[r, r+s-1]$ -отрезком X_{\rightarrow}). При $s > 1$ она называется мультиграммой.

Пос-ть X_{\rightarrow} называется периодической, если $x_i = x_{i+\tau}$ при $i > \mu$, где $\tau \in \mathbb{N}, \mu \in \mathbb{N}_0$ (в X_{\rightarrow} имеются совпадения на расстоянии τ , начиная с $\mu + 1$). Наименьшее такое τ называется длиной периода последовательности и обозначается через $t(X_{\rightarrow})$. Длиной предпериода пос-ти ($\nu(X_{\rightarrow})$) называется наименьшее $\nu \in \mathbb{N}_0$, при котором имеются совпадения на расстоянии $t(X_{\rightarrow})$, начиная с номера $\nu + 1$.

Предпериодом называется $[1, \nu]$ -отрезок, а периодом - $[\nu + i, \nu + i + t - 1]$ -отрезок, $i \in \mathbb{N}$.

Чисто периодической последовательностью называется пос-ть X_{\rightarrow} , для которой $\nu(X_{\rightarrow}) = 0$.

Утверждение:

1. Если в X_{\rightarrow} имеются совпадения на расстоянии τ , начиная с номера $\mu + 1$, то $t \mid \tau$ и $\nu = \mu$.
2. Если пос-ть $Y_{\rightarrow} = f^*(X_{\rightarrow}) = \{f(x_i)\}$, где $X_{\rightarrow} = \{x_i\}$ - периодическая, а $f : X \rightarrow Y$, то Y_{\rightarrow} - тоже периодическая, при этом: $\nu(Y_{\rightarrow}) \leq \nu(X_{\rightarrow})$ и $t(X_{\rightarrow}) \mid t(Y_{\rightarrow})$. При этом если f - биекция, то $\nu(Y_{\rightarrow}) = \nu(X_{\rightarrow})$ и $t(X_{\rightarrow}) = t(Y_{\rightarrow})$.

5 Теорема о связи длин периода и предпериода последовательностей специального вида над конечной аддитивной группой (без доказательства). Утверждение о длинах предпериода и периода сопряжения последовательностей, следствие (без доказательства). Усложненная последовательность. Верхние и нижние оценки длины периода усложненной последовательности (без доказательства).

Теорема: Для пос-тей X_{\rightarrow} и Y_{\rightarrow} над конечной аддитивной группой X , где $y_i = \sum_{j=1}^i x_j$, выполнено:

1. Если X_{\rightarrow} - периодическая с длиной предпериода $\nu > 0$ и длиной периода t , то Y_{\rightarrow} - периодическая с длиной предпериода $\nu - 1$ и длиной периода t' , где $t' \mid d \cdot t$, где d - порядок эл-та $y_{\nu+t} - y_{\nu}$ группы X .

2. Если X_{\rightarrow} - чисто периодическая с длиной периода t , то Y_{\rightarrow} - чисто периодическая с длиной периода t' , где $t' \mid d \cdot t$, где d - порядок эл-та y_t группы X

Утверждение:

1. X_{\rightarrow} - пос-ть над $X = X_1 \times \dots \times X_n$ периодическая $\iff X_{\rightarrow}^{(j)}$ - периодическая $j = \overline{1, n}$. При этом верно:

$$\nu(X_{\rightarrow}) = \max\{\nu(X_{\rightarrow}^{(1)}), \dots, \nu(X_{\rightarrow}^{(n)})\} \quad (11)$$

$$t(X_{\rightarrow}) = [t(X_{\rightarrow}^{(1)}), \dots, t(X_{\rightarrow}^{(n)})] \quad (12)$$

2. Если пос-ть $X_{\rightarrow}^{(j)}$ отличается от $X_{\rightarrow}^{(1)}$ лишь сдвигом на $j - 1$ знак, то верно:

$$\nu(X_{\rightarrow}) = \nu(X_{\rightarrow}^{(1)}) \quad (13)$$

$$t(X_{\rightarrow}) = t(X_{\rightarrow}^{(1)}) = \dots = t(X_{\rightarrow}^{(n)}) \quad (14)$$

Следствие: Если X_{\rightarrow} - периодическая последовательность над $X = X_1 \times \dots \times X_n$ и $t(X_{\rightarrow}) = p^m$, p - простое, $m \in \mathbb{N}$, то $t(X_{\rightarrow}^{(j)}) = p^{m_j}$, $j = \overline{1, n}$, где $0 \leq m_j \leq m$ и $\max\{m_1, \dots, m_n\} = m$

Последовательность $Y_{\rightarrow} = \{f(x_{i,1}, \dots, x_{i,n})\}, i \geq 0$, полученную из пос-ти $X_{\rightarrow} = \{x_{i,1}, \dots, x_{i,n}\}$ над $X = X_1 \times \dots \times X_n$ с помощью ф-ции усложнения $f : X \rightarrow Y$, называются усложненной последовательностью по отношению к исходным пос-тям $X_{\rightarrow}^{(j)}, j = \overline{1, n}$.

Верхняя оценка периода Y_{\rightarrow} :

$$t_Y \mid [t_1, \dots, t_n] \quad (15)$$

Нижние оценки:

Если $X_{1\rightarrow}$ и $X_{2\rightarrow}$ - пос-ти над аддитивной группой X с периодами t_1, t_2 соответственно, а $f(x_1, x_2) = x_1 + x_2$, то верно:

$$\frac{[t_1, t_2]}{(t_1, t_2)} \leq t_Y \quad (16)$$

Если $f : X_1 \times \dots \times X_n \rightarrow Y$ биективна по переменным с номерами j_1, \dots, j_b ($\{j_1, \dots, j_b\} \subseteq \{1, \dots, n\}$), то верна оценка:

$$t_Y \geq \prod_{l=1}^b \frac{\Theta}{\Theta_{j_l}} \quad (17)$$

где $\Theta = [t_1, \dots, t_n]$, $\Theta_j = [t_1, \dots, t_{j-1}, t_{j+1}, \dots, t_n]$, $j = \overline{1, n}$

Следствие: Если f биективна по каждой переменной, а $(t_1, \dots, t_n) = 1$, то длина периода Y_{\rightarrow} максимальна: $t_Y = t_1 \cdot \dots \cdot t_n$

6 Период и предпериод элемента относительно преобразования, свойства. Утверждение о связи длин периода и предпериода элемента относительно преобразования с графом преобразования, замечание (без доказательства). Период и предпериод преобразования. Утверждение о связи длин периода и предпериода преобразования с графом преобразования, замечание (без доказательства).

Пусть $g \in \Pi(X)$. $g_{\rightarrow} = \{g^i\}, i = 1, 2, \dots$ - пос-ть над моноидом $\Pi(X)$, $g_{\rightarrow}(x) = \{g^i(x)\}$ - пос-ть над X .

Периодом (предпериодом) элемента x относительно преобразования g называется период (предпериод) пос-ти $g_{\rightarrow}(x)$. Их длины обозначаются через $t_{x,g}, \nu_{x,g}$ или t_x, ν_x .

Утверждение: $\forall g \in \Pi(X), x \in X$:

$$t_{x,g} + \nu_{x,g} \leq |X| \quad (18)$$

Если x - циклическая вершина графа $\Gamma(g)$, то $\nu_{x,g} = 0$, $t_{x,g}$ равна длине цикла, которому принадлежит вершина x

Если x - ациклическая вершина графа $\Gamma(g)$, то $\nu_{x,g}$ равна длине подхода из x к циклу C , а $t_{x,g}$ - длина этого цикла

(Замечание ???)

Периодом (пердпериодом) преобразования g называется период (предпериод) пос-ти g_{\rightarrow} (обозначение: t_g, ν_g)

Утверждение: величины t_g, ν_g - период и циклическая глубина эл-та g моноида $\Pi(X)$ $\forall g \in \Pi(X)$: $t_g = [l_1, \dots, l_n]$, l_1, \dots, l_n - длины циклов графа $\Gamma(X)$.

Если g - обратимое преобразование, то $\nu_g = 0$, иначе ν_g - наибольшая из длин подходов в графе $\Gamma(g)$

(Замечание ???)

7 Полноцикловое преобразование. Теорема о количестве различных полноцикловых преобразований. Линейный конгруэнтный генератор (ЛКГ). ЛКГ полного периода. Критерий максимальности длины периода ЛКГ (без доказательства). Критерий полноцикловости треугольного преобразования с координатными функциями специального вида (без доказательства).

Преобразование $g \in \Pi(X)$ называется полноцикловым, если $\Gamma(g)$ представляет из себя один цикл длины n , где $n = |X|$.

Теорема: Всего различных п.ц. преобразований ровно $(n - 1)!$

Преобразование $g \in \Pi(\mathbb{Z}_k)$ называется ЛКГ, если:

$$\forall x \in \mathbb{Z}_k : g(x) = (a \cdot x + b) \bmod k \quad (19)$$

где a, b, k - множитель, сдвиг и модуль соответственно.

Для любого k найдутся такие a, b , что ЛКГ будет преобразованием максимального периода. При этом длина периода не превышает k .

Теорема: Длина периода ЛКГ равна $k \iff$ выполнены условия:

1. $(b, k) = 1$
2. $a - 1$ делит любой простой делитель k
3. $a - 1$ делит 4, если k делит 4

В частности: $t_g = k$ при $k = 2^r \iff b$ - нечетное и $a \equiv 1 \pmod{4}$

Пусть g_i - треугольная подстановка мн-ва X^i задана системой координатный ф-ций:

$$g_i = \{f_1(x_1), \dots, f_i(x_1, \dots, x_i)\} \quad (20)$$

Критерий: Пусть $f_i(x_1, \dots, x_i) = h(x_1, \dots, x_{i-1}) \oplus x_i, i = \overline{1, n}$. Треугольная подстановка g_n мн-ва X^n является полноциклового $\iff h_1 = 1, ||h_i||$ нечетен $i = \overline{2, n}$

8 Принцип склеивания-расклеивания, основополагающая теорема. Линейные преобразования максимального периода. Сопровождающая матрица и характеристический многочлен линейного регистра сдвига (ЛРС). Критерий максимальной длины периода ЛРС (без доказательства). Свойства примитивных многочленов.

Теорема (принцип склеивания-расклеивания): Пусть g, h - подстановки двоичных регистров сдвига (автономных) длины $n > 1$ и функциями обратной связи $f(x_1, \dots, x_n)$ и $f(x_1, \dots, x_n) \oplus x_2^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot x_n^{\alpha_n}$ соответственно, где $\alpha_2, \dots, \alpha_n \in \{0, 1\}$. Тогда граф $\Gamma(g)$ отличается от графа $\Gamma(h)$ тем, что либо один цикл из $\Gamma(g)$ распадается на два цикла в $\Gamma(h)$, либо два цикла в $\Gamma(g)$ объединяются в один цикл в $\Gamma(h)$

Линейное преобразование пространства P^n , где P - поле, не может быть полноцикловым, так как нулевой элемент поля является его неподвижной точкой. Однако длина цикла в графе преобразования может составлять $k^n - 1$, где $k = |P|$. Такие преобразования называют преобразованиями максимального периода.

Рассмотрим преобразование g ЛРС (линейного регистра сдвига) с ф-цией обратной связи $a_{n-1}x^n + \dots + a_1x_2 + a_0x_1$, где $a_{n-1}, \dots, a_0 \in P$. Сопровождающей матрицей данного преобразования называется матрица:

$$A_g = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 & a_0 \\ 1 & 0 & \dots & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & \dots & 0 & a_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & a_{n-1} \end{pmatrix} \quad (21)$$

Для реализации преобразования вектор (x_1, \dots, x_n) умножается на A_g слева. Характеристическим полиномом ЛРС называется полином:

$$F(\lambda) = \lambda^n - a_{n-1}\lambda^{n-1} - \dots - a_1\lambda - a_0 \quad (22)$$

A_g является корнем $F(\lambda)$. Если $F(\lambda)$ неприводим над P , то порядок матрицы совпадает с порядком полинома.

Критерий: g имеет максимальный период $\iff F(\lambda)$ примитивен.

$F(\lambda)$ является неприводимым, если:

- $F(\lambda)$ неприводим над P
- $F(\lambda)$ делит полином $\lambda^{k^n-1} - 1$ и не делит ни один из следующих: $\lambda^d - 1, d \mid k^n - 1 \wedge d \neq k^n - 1$

Для полиномов над $GF(2)$ верны следующие свойства:

- Если $F(\lambda)$ степени $n > 1$ неприводим над $GF(2)$, а $2^n - 1$ - простое число, то преобразование ЛРС мн-ва V_n имеет максимальный период
- Примитивный полином над $GF(2)$ содержит нечетное число членов
- Если $F(\lambda)$ примитивен над $GF(2)$, то примитивен над $GF(2)$ и $\lambda^n \cdot F(1/\lambda)$

9 Равномерно распределенные случайные последовательности, свойства. Псевдослучайные последовательности. Рекуррентные последовательности (РП), линейные рекуррентные последовательности (ЛРП). Замечание о длине периода РП. Замечание о связи множества РП и множества регистров сдвига. Замечание о связи множества ЛРП и множества ЛРС.

Случайная идеальная последовательность является реализацией последовательности независимых равномерно распределенных случайных величин. Такие последовательности называются РРСП (равномерно распределенными случайными пос-тями).

РРСП (на мн-ве X мощности k) - пос-ть $\{\zeta_1, \dots, \zeta_t, \dots\}$ случайных величин, принимающих значения на мн-ве X . Два требования к такой последовательности:

1. $\forall n \forall t_1, \dots, t_n : 1 \leq t_1 < \dots < t_n$ случайные величины $\zeta_{t_1}, \dots, \zeta_{t_n}$ независимы в совокупности
2. $\forall t \in \mathbb{N}$ случайная величина ζ_t равномерно распределена на X

При выполнении требований справедливы свойства:

1. $\forall n \forall t_1, \dots, t_n : 1 \leq t_1 < \dots < t_n$ случайный вектор $(\zeta_{t_1}, \dots, \zeta_{t_n})$ равномерно распределена на X^n
2. Воспроизводимость при прореживании: для $1 \leq t_1 < \dots < t_n < \dots$ соответствующая подпоследовательность $\zeta_{t_1}, \dots, \zeta_{t_n}, \dots$ также является РРСП
3. Воспроизводимость при суммировании: если X - аддитивная группа, а $\{\eta_t\}$ - произвольная неслучайная или произвольная случайная пос-ть над X , не зависящая от $\{\zeta_t\}$, то пос-ть $\{\zeta_t + \eta_t\}$ является РРСП.
4. $\forall t \in \mathbb{N}$ предсказание значения ζ_t по $\zeta_1, \dots, \zeta_{t-1}$ невозможно, т.е. $Pr[\zeta_t = x_t \mid \zeta_1 = x_1, \dots, \zeta_{t-1} = x_{t-1}] = Pr[\zeta_t = x_t] = 1/k$ для любого набора (x_1, \dots, x_t)

Псевдослучайная последовательность (ПСП) имитирует РРСП, генерируется программным генератором (техническим устройством или программой).

Пос-ть X_{\rightarrow} называется рекуррентной пос-тью (РП) порядка $n > 0$, если $\exists f : X^n \rightarrow X$

$$x_{i+n} = f(x_i, \dots, x_{i+n-1}) \quad (23)$$

Равенство (23) называется законом рекурсии, f - генератором РП, а (x_0, \dots, x_{n-1}) - начальным вектором РП. При $|X| = k$ РП порядка n обозначается как $\text{РП}(k, n)$ Длина периода РП не превышает k^n .

Между мн-вом $\text{РП}(k, n)$ и мн-вом регистров сдвига длины n над X существует биекция. Если генератор $\text{РП}(k, n)$ совпадает с ф-цией обратной связи регистра сдвига, то $\text{РП}(k, n)$ с начальным вектором (x_0, \dots, x_{n-1}) есть первая координатная подпос-ть $X_{1\rightarrow}$ пос-ти $fg(x_0, \dots, x_{n-1})$, где fg является преобразованием X^n , реализуемое регистром

$\text{РП}(k, n)$ над полем P называется линейной рекуррентной пос-тью ($\text{ЛРП}(k, n)$), если для некоторых констант a_0, \dots, a_{n-1} (не всех нулей) верно:

$$x_{i+n} = \sum_{j=0}^{n-1} a_j \cdot x_{i+j} \quad (24)$$

Характеристический полином $\text{ЛРП}(k, n)$:

$$F(\lambda) = \lambda^n - a_{n-1}\lambda^{n-1} - \dots - a_1\lambda - a_0 \quad (25)$$

Между мн-вом $\text{ЛРП}(k, n)$ и мн-вом ЛРС длины n над P существует биекция. Если характеристические полиномы $\text{ЛРП}(k, n)$ и ЛРС совпадают и равны $F(\lambda)$, то $\text{ЛРП}(k, n)$ есть первая координатная подпос-ть пос-ти $fg(x_0, \dots, x_{n-1})$, где при $a_0 \neq 0$ fg является линейной подстановкой на P^n , реализуемая ЛРС с ф-цией обратной связи f , соответствующей характеристическому полиному $F(\lambda)$

10 ЛРП максимального периода. Характеристический многочлен ЛРП. Утверждение о количестве мультиграмм на периоде ЛРП максимального периода. Замечание о низкой стойкости ЛРП. Аннулирующий и минимальный многочлены последовательности, свойства (без доказательства). Линейная сложность последовательности. Профиль линейной сложности последовательности.

ЛРП максимального периода порождается от ненулевого начального вектора тогда и только тогда, когда ее характеристический полином примитивен

Утверждение: на периоде ЛРП длины n максимального периода над полем P порядка k всякая ненулевая s -грамма встречается k^{n-s} раз, а нулевая s -грамма встречается $k^{n-s} - 1$ раз ($1 \leq s \leq n$)

Замечание: В ЛРП(k, n) имеется простая межнаковая зависимость, позволяющая по любой n -грамме ЛРП(k, n) определить начальный вектор, решив СЛАУ.

Пусть X_{\rightarrow} - пос-ть над P^m - векторны пространством над полем P . Ненулевой полином $F(\lambda)$ называется аннулирующим полиномом пос-ти X_{\rightarrow} , если:

$$\forall j \geq n : x_j - a_{n-1}x_{j-1} - \dots - a_1x_{j-n+1} - a_0x_{j-n} = u \quad (26)$$

где u - нулевой элемент P^m

Минимальным полиномом ($m_{X_{\rightarrow}}(\lambda)$) называется аннулирующий полином наименьшей степени. Свойства:

1. Если $f(\lambda) \in Ann(X_{\rightarrow})$, то $f(\lambda) \cdot g(\lambda) \in Ann(X_{\rightarrow})$ для любого ненулевого полинома $g(\lambda)$
2. Если $f_1(\lambda), \dots, f_r(\lambda) \in Ann(X_{\rightarrow})$, то любая нетривиальная линейная комбинация этих полиномов над P также является аннулирующим полиномом
3. $m_{X_{\rightarrow}}(\lambda)$ определен однозначно и делит любой аннулирующий полином
4. Чисто периодическая пос-ть X_{\rightarrow} с длиной периода t аннулируется полиномом $\lambda^t - 1$ и $m_{X_{\rightarrow}}(\lambda) \mid \lambda^t - 1$

Линейная сложность пос-ти X_{\rightarrow} :

$$\Lambda(X_{\rightarrow}) = \deg m_{X_{\rightarrow}}(\lambda) \quad (27)$$

Еще линейную сложность можно определить как порядок самой короткой ЛРП, способной породить X_{\rightarrow} при некотором начальном векторе (x_1, \dots, x_{n-1})

Профиль линейной сложности - последовательность $\{\Lambda_t\}$, где Λ_t - линейная сложность отрезка $\{x_0, \dots, x_t\}$. Известно, что для случайной идеальной пос-ти: $E[\Lambda_t] \sim t/2$, $D[\Lambda_t]$ ограничена константой, убывающей с ростом порядка поля.

11 Утверждения о минимальном многочлене сопряжения и линейной комбинации последовательностей. Замечания о линейной сложности суммы и почленного произведения последовательностей (без доказательства). Нормальная рекуррентная последовательность. Компенсированная последовательность. Теорема о минимальном многочлене чисто периодической последовательности (без доказательства), следствие. Замечание о линейной сложности НРП (2, n) (без доказательства).

Утверждение: Пусть $X_{\rightarrow} = X_{1\rightarrow} \circ \dots \circ X_{n\rightarrow}$, тогда:

$$m_{X_{\rightarrow}}(\lambda) = [m_1(\lambda), \dots, m_n(\lambda)] \quad (28)$$

где $m_j(\lambda)$ - минимальный полином пос-ти $X_{j\rightarrow}$

Утверждение: Пусть $X_{\rightarrow} = a_1 \cdot X_{1\rightarrow} + \dots + a_n \cdot X_{n\rightarrow}$ ($a_j \in P, i\overline{1}, n, P$ - поле), тогда:

$$m_{X_{\rightarrow}}(\lambda) \mid [m_1(\lambda), \dots, m_n(\lambda)] \quad (29)$$

Замечание: Нижняя граница линейной сложности суммы X_{\rightarrow} пос-тей $X_{1\rightarrow}, X_{2\rightarrow}$:

$$\deg m_{X_{\rightarrow}}(\lambda) \geq \deg m_1(\lambda) + \deg m_2(\lambda) - 2(t_1, t_2) \quad (30)$$

где t_1, t_2 - периоды $X_{1\rightarrow}, X_{2\rightarrow}$ соответственно. В частности, когда $(t_1, t_2) = 1$ и $\lambda - 1 \mid m_1(\lambda) \cdot m_2(\lambda)$: $\Lambda(X_{\rightarrow}) = \Lambda(X_{1\rightarrow}) + \Lambda(X_{2\rightarrow})$

Замечание: Верхняя граница линейной сложности произведения X_{\rightarrow} пос-тей $X_{j\rightarrow}, j = \overline{1}, n$:

$$\Lambda(X_{\rightarrow}) = \prod_{j=1}^n \Lambda(X_{j\rightarrow}) \quad (31)$$

Граница достигается при условии, что поле P имеет простой порядок, а $m_j(\lambda)$ примитивны над ним и имеют попарно взаимнопростые степени

Чисто перриодическую РП(k, n) над мн-вом X называют нормальной рекуррентной пос-тью (НРП(k, n)), если длина ее периода равна k^n . Генератором НРП(k, n) является ф-ция $f : X^n \rightarrow X$, реализующая обратную связь полноциклового регистра сдвига длины n . При этом для регистра левого сдвига f биективна по первой переменной.

НРП(k, n) над полем P может быть получена из ЛРП максимального периода вставкой нуля в цикл. Каждая s -грамма тогда будет на цикле встречаться ровно k^{n-s} раз. Линейная сложность НРП выше, чем у ЛРП.

Пос-ть X_{\rightarrow} над P^m называется компенсированной, если при длине периода, равной t , верно:

$$x_1 + \dots + x_n = u \quad (32)$$

где u - нулевой элемент P^m

Теорема: Пусть X_{\rightarrow} - чисто периодическая последовательность над P^m с длиной периода k^r . Тогда:

$$m_{X_{\rightarrow}}(\lambda) = (\lambda - 1)^s \quad (33)$$

где $k^{r-1} < s < k^r - \zeta(X_{\rightarrow})$, и

$$\zeta(X_{\rightarrow}) = \begin{cases} 0 & \text{если } X_{\rightarrow} \text{ не компенсированная} \\ 1 & \text{иначе} \end{cases} \quad (34)$$

при этом $s = k^{r-1} + 1$, если $x_{i+k^{r-1}} - x_i \neq u, i = \overline{1}, k^r$

Замечание: для НРП($2, n$) X_{\rightarrow} при $n \geq 3$:

$$2^{n-1} + n \leq \Lambda(X_{\rightarrow}) \quad (35)$$

12 Поточные шифры. Синхронные поточные шифры (СПШ). Устройство СПШ. Общая и базовая схемы СПШ. Классификация СПШ по способу построения генератора гаммы. Свойства СПШ. Атака вставкой. Необходимые условия криптографически стойкого СПШ, требования к управляющей гамме. Слабый ключ СПШ.

Поточный шифр - шифр замены, преобразующий открытый текст в шифртекст посимвольно. Поточный шифр преобразуется символ открытого текста x_i в символ шифртекста y_i путем применения меняющихся от такта к такту шифрующих отображений $\varphi_i : X \rightarrow Y$

СПШ состоит из управляющего блока, который генерирует гамму, и шифрующего блока, который накладывает гамму на открытый текст или шифртекст при зашифровании и расшифровании соответственно (рис. 2).




Рис. 2: Схема СПШ.

СПШ делятся по способу построения УБ на два класса:

1. С генератором типа счетчика. В таких генераторах от ключа зависит только функция выхода
2. С генератором с внутренней обратной связью. В таких генераторах от ключа зависит внутренняя функция переходов или начальное заполнение генератора. При этом функция выхода от ключа не зависит

Свойства СПШ:

1. Может возникнуть рассинхронизация. Способы борьбы: перешифровать сообщение на заново инициализированном ключе или разбить сообщения на блоки, вставляя после каждого блока специальные маркеры
2. Ошибки не распространяются, так как генератор гаммы автономен
3. "Защита" от несанкционированных вставок и удалений. Рассинхронизация будет замечена (возможно)
4. Отсутствует защита от подмены отрезка сообщения на отрезок той же длины
5. Уязвимость к атаке вставкой

Атака вставкой:

1. Перехват криптограммы:

$$\begin{array}{cccc}
 x_1 & x_2 & x_3 & \dots \\
 \downarrow & \downarrow & \downarrow & \dots \\
 \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma_3 & \dots \\
 \hline
 y_1 & y_2 & y_3 & \dots
 \end{array}$$

2. Вставка:

$$\begin{array}{cccc}
 x_1 & \alpha & x_2 & \dots \\
 y_1 & \dots & \dots & \dots \leftarrow \text{рассинхронизация}
 \end{array}$$

α является известным значением, а его местоположение определяется просто

3. Решение системы:

$$\begin{array}{ll}
 \gamma_2 = \alpha \oplus y'_2 & \gamma_3 = x_2 \oplus y'_3 \\
 x_2 = \gamma_2 \oplus y_2 & x_3 = \gamma_3 \oplus y_3
 \end{array}$$

Совершенно стойкий шифр - шифр, для которого шифртекст и открытый текст статистически независимы.

Идеально стойкий шифр - шифр, для которого невозможно однозначно определить открытый текст по известному шифртексту сколь угодно большой длины.

Необходимые условия криптографически стойкого СПШ следуют из того, что наилучшей имитацией идеального шифра является шифр, в котором пос-ть шифрующих отображений имитирует пос-ть независимых случайных отображений. Сами условия:

1. При каждом фиксированном $x \in X$ отображение $f(\gamma, x)$ является сбалансированным (как следствие: $|Y| \mid |\Gamma|, |X| \mid |\Gamma|$)
2. При случайном равновероятном выборе ключа управляющая гамма наиболее хорошо имитирует идеальную случайную пос-ть (РРСП на Γ)

Из второго условия вытекают требования к гамме:

1. Гамма должна иметь большую длину периода и не содержать длинных повторяющихся отрезков
2. Гамма должна быть равновероятной
3. Восстановление гаммы по ее отрезку должно быть трудной задачей. В частности нужна высокая линейная сложность.
4. Система уравнений гаммообразования должна иметь высокую сложность решения

Слабый ключ СПШ - ключ, при котором гамма не удовлетворяет хотя бы одному из условий 1-3

- 13 Самосинхронизирующиеся поточные шифры (ССПШ). Сходства и отличия СПШ и ССПШ. Общая схема ССПШ. Атака повторной передачи, способы защиты. Свойства ССПШ. Шифры гаммирования. Групповые шифры гаммирования, шифры модульного гаммирования. Схема алгоритма поточного шифрования А5/1.
- 14 Симметричные блочные шифры (СБШ). Уравнения зашифрования в режиме простой замены. Принципы построения подстановки итеративного СБШ. Раундовые ключи, раундовые функции, входное и выходное отображения, ключевое расписание. Теорема об обратимости итеративного СБШ. Замечание об «отбеливании».
- 15 Шифры Фейстеля, схема реализации цикловой функции. Замечание об отличии шифров Фейстеля. Замечание о биективности шифра Фейстеля. Теорема об инволютивности шифра Фейстеля, вспомогательная лемма.
- 16 Построение раундовой функции СБШ. Функциональное назначение конструктивных слоев цикловой функции СБШ. Условия, которым должна удовлетворять раундовая функция, s-боксы. Алгоритмы блочного шифрования DES, ГОСТ 28147-89: схема работы, ключевое расписание, основные количественные характеристики.
- 17 Слабый ключ итеративного СБШ, μ -слабый ключ итеративного СБШ. Теорема о количестве раундов СБШ со слабым ключом, следствие. Теорема об особенностях подстановки шифра Фейстеля при использовании слабого ключа. Количество слабых ключей алгоритмов DES и ГОСТ 28147-89.
- 18 Режимы шифрования и их особенности: проста замена, сцепление блоков шифртекста, гаммирование с обратной связью по шифртексту, гаммирование с внутренней обратной связью. Замечание об использовании режима простой