Particle spectrograph

Wave operator and propagator

Quadratic (free) action

$$\mathcal{S}_{\mathsf{F}} == \int\int\int\int (\mathcal{B}^{\alpha\beta}\ \mathcal{T}_{\alpha\beta} + \frac{1}{3}\,\alpha\,(-2\,\partial_\beta \mathcal{B}_{\alpha\chi} + \partial_\chi \mathcal{B}_{\alpha\beta})\,\partial^\chi \mathcal{B}^{\alpha\beta})[t, x, y, z]\,dz\,dy\,dx\,dt$$

Source constraints/gauge generators

SO(3) irreps	Multiplicities
$\mathcal{T}^{\#1\,\alpha}_{1^-} == 0$	3
Total constraints:	3

	$\mathcal{T}^{\#1}_{1^-\,\alpha}$	$\mathcal{T}^{\#1}_{1^+\,\alpha\beta}$
$\mathcal{T}^{\#1}_{1^-\,\alpha}$	0	$\frac{3}{\alpha k^2}$
$\mathcal{T}^{\#1}_{1^+\,\alpha\beta}$	0	0

	$\mathcal{B}^{\#1}_{1^-\,\alpha}$	$\mathcal{B}^{\#1}_{1^+\,\alpha\beta}$
$\mathcal{B}^{\#1}_{1^-\,\alpha}$	0	$\frac{\alpha k^2}{3}$
$\mathcal{B}^{\#1}_{1^+\,\alpha\beta}$	0	0

Massive and massless spectra



Quadratic pole

Pole residue:	$\frac{1}{\alpha} > 0$
Polarisations:	1

(No massive particles)

Unitarity conditions

$\alpha > 0$