

Lagrangian density

$$\beta h_{\alpha\beta} h^{\alpha\beta} - \beta h^\alpha_\alpha h^\beta_\beta +$$

$$\frac{1}{2} \alpha \partial_\beta h^\chi_\chi \partial^\beta h^\alpha_\alpha + \alpha \partial_\alpha h^{\alpha\beta} \partial_\chi h^\chi_\beta -$$

$$\alpha \partial^\beta h^\alpha_\alpha \partial_\chi h^\chi_\beta - \frac{1}{2} \alpha \partial_\chi h_{\alpha\beta} \partial^\chi h^{\alpha\beta}$$

Added source term: $h^{\alpha\beta} \mathcal{T}_{\alpha\beta}$

$$h_{0+}^{\#1} \quad h_{0+}^{\#2}$$

$h_{0+}^{\#1} \dagger$	$-2\beta + \alpha k^2$	$-\sqrt{3}\beta$
$h_{0+}^{\#2} \dagger$	$-\sqrt{3}\beta$	0

$$\mathcal{T}_{2+}^{\#1} \quad \mathcal{T}_{2+}^{\#1\alpha\beta}$$

$\mathcal{T}_{2+}^{\#1} \dagger^{\alpha\beta}$	$\frac{1}{\beta - \frac{\alpha k^2}{2}}$
--	--

$$h_{2+}^{\#1} \quad h_{2+}^{\#1\alpha\beta}$$

$h_{2+}^{\#1} \dagger^{\alpha\beta}$	$\beta - \frac{\alpha k^2}{2}$
--------------------------------------	--------------------------------

$$\mathcal{T}_{0+}^{\#1} \quad \mathcal{T}_{0+}^{\#2}$$

$\mathcal{T}_{0+}^{\#1} \dagger$	0	$-\frac{1}{\sqrt{3}\beta}$
$\mathcal{T}_{0+}^{\#2} \dagger$	$-\frac{1}{\sqrt{3}\beta}$	$\frac{2\beta - \alpha k^2}{3\beta^2}$

$$h_{1-}^{\#1} \quad h_{1-}^{\#1\alpha}$$

$h_{1-}^{\#1} \dagger^\alpha$	β
-------------------------------	---------

(No source constraints)

(No massless particles)

Massive particle

Pole residue:	$-\frac{2}{\alpha} > 0$
---------------	-------------------------

Polarisations:	5
----------------	-----

Square mass:	$\frac{2\beta}{\alpha} > 0$
--------------	-----------------------------

Spin:	2
-------	-----

Parity:	Even
---------	------

Unitarity conditions
 $\alpha < 0 \ \&\& \ \beta < 0$

