Lagrangian density

$$-\frac{2}{3}\,\alpha\,\partial_\beta \mathcal{B}_{\alpha\chi}\,\partial^\chi \mathcal{B}^{\alpha\beta} + \frac{1}{3}\,\alpha\,\partial_\chi \mathcal{B}_{\alpha\beta}\,\partial^\chi \mathcal{B}^{\alpha\beta}$$

Added source term:	$\mathcal{B}^{\alpha\beta}\ \mathcal{T}_{\alpha\beta}$

$\mathcal{T}^{\#1}_{1^+}{}^\dagger{}^{\alpha\beta}$	$\frac{3}{\alpha k^2}$	0
$\mathcal{T}^{\#1}_{1^-}{}^\dagger{}^{\alpha}$	0	0

$\mathcal{B}^{\#1}_{1^+}{}^\dagger{}^{\alpha\beta}$	$\frac{\alpha k^2}{3}$	0
$\mathcal{B}^{\#1}_{1^-}{}^\dagger{}^{\alpha}$	0	0

Source constraints

SO(3) irreps	#
$\mathcal{T}^{\#1}_{1^-}{}^{\alpha} == 0$	3
Total #:	3



Quadratic pole

Pole residue:	$\frac{1}{\alpha} > 0$
Polarisations:	1

Unitarity conditions

$\alpha < 0$

(No massive particles)