

Particle spectrograph

Wave operator and propagator

Quadratic (free) action

$$S = \iiint (\mathcal{B}^\alpha \mathcal{J}_\alpha + \beta \partial_\alpha \mathcal{B}^\alpha \partial_\beta \mathcal{B}^\beta + \alpha \partial_\beta \mathcal{B}_\alpha \partial^\beta \mathcal{B}^\alpha) [t, x, y, z] dz dy dx dt$$

(No source constraints)



$\mathcal{J}_{0+}^{\#1} + \boxed{\frac{1}{(\alpha+\beta)k^2}}$

$\mathcal{J}_{1-}^{\#1} + \boxed{\frac{1}{\alpha k^2}}$

$\mathcal{B}_{0+}^{\#1} + \boxed{(\alpha+\beta)k^2}$

$\mathcal{B}_{1-}^{\#1} + \boxed{\alpha k^2}$

Massive and massless spectra




Quadratic pole

Pole residue:	$\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\alpha+\beta} > 0$
---------------	---

Polarisations:	1
----------------	---

(No massive particles)


Quartic pole	
Pole residue:	$0 < -\frac{\beta}{\alpha(\alpha+\beta)} \&\& -\frac{\beta}{\alpha(\alpha+\beta)} > 0$
Polarisations:	1



Quadratic pole

Pole residue:	$-\frac{1}{\alpha} - \frac{1}{\alpha+\beta} > 0$
---------------	--

Polarisations:	1
----------------	---



Quadratic pole

Pole residue:	$-\frac{1}{\alpha} > 0$
---------------	-------------------------

Polarisations:	2
----------------	---

Unitarity conditions

(Unitarity is demonstrably impossible)