


# Particle spectrograph

# Wave operator and propagator


Source constraints		
SO(3) irreps	Fundamental fields	Multiplicities
$\sigma_0^{\#1} == 0$	$\epsilon \eta_{\alpha\beta\chi\delta} \partial^\delta \sigma^{\alpha\beta\chi} == 0$	1
$\sigma_{0+}^{\#1} == 0$	$\partial_\beta \sigma^{\alpha\beta}{}_\alpha == 0$	1
$\sigma_1^{\#2\alpha} == 0$	$\partial_\chi \partial_\beta \sigma^{\alpha\beta\chi} == 0$	3
$\sigma_{1+}^{\#2\alpha\beta} == 0$	$\partial_\delta \partial_\chi \partial^\alpha \sigma^{\beta\chi\delta} + \partial_\delta \partial^\delta \partial_\chi \sigma^{\alpha\beta\chi} == \partial_\delta \partial_\chi \partial^\beta \sigma^{\alpha\chi\delta}$	3
$\sigma_2^{\#1\alpha\beta\chi} == 0$	$3 \partial_\epsilon \partial_\delta \partial^\chi \partial^\alpha \sigma^{\beta\delta\epsilon} + 3 \partial_\epsilon \partial^\epsilon \partial^\chi \partial^\alpha \sigma^{\beta\delta}{}_\delta +$ $2 \partial_\epsilon \partial^\epsilon \partial_\delta \partial^\beta \sigma^{\alpha\chi\delta} + 4 \partial_\epsilon \partial^\epsilon \partial_\delta \partial^\beta \sigma^{\alpha\delta\chi} +$ $2 \partial_\epsilon \partial^\epsilon \partial_\delta \partial^\beta \sigma^{\chi\delta\alpha} + 4 \partial_\epsilon \partial^\epsilon \partial_\delta \partial^\chi \sigma^{\alpha\beta\delta} +$ $2 \partial_\epsilon \partial^\epsilon \partial_\delta \partial^\chi \sigma^{\alpha\delta\beta} + 2 \partial_\epsilon \partial^\epsilon \partial_\delta \partial^\delta \sigma^{\beta\chi\alpha} +$ $3 \eta^{\beta\chi} \partial_\phi \partial^\phi \partial_\epsilon \partial^\alpha \sigma^{\delta\epsilon}{}_\delta + 3 \eta^{\alpha\chi} \partial_\phi \partial^\phi \partial_\epsilon \partial_\delta \sigma^{\beta\delta\epsilon} +$ $3 \eta^{\beta\chi} \partial_\phi \partial^\phi \partial_\epsilon \partial^\epsilon \sigma^{\alpha\delta}{}_\delta == 3 \partial_\epsilon \partial_\delta \partial^\chi \partial^\beta \sigma^{\alpha\delta\epsilon} +$ $3 \partial_\epsilon \partial^\epsilon \partial^\chi \partial^\beta \sigma^{\alpha\delta}{}_\delta + 2 \partial_\epsilon \partial^\epsilon \partial_\delta \partial^\alpha \sigma^{\beta\chi\delta} +$ $4 \partial_\epsilon \partial^\epsilon \partial_\delta \partial^\alpha \sigma^{\beta\delta\chi} + 2 \partial_\epsilon \partial^\epsilon \partial_\delta \partial^\alpha \sigma^{\chi\delta\beta} +$ $2 \partial_\epsilon \partial^\epsilon \partial_\delta \partial^\chi \sigma^{\beta\delta\alpha} + 4 \partial_\epsilon \partial^\epsilon \partial_\delta \partial^\delta \sigma^{\alpha\beta\chi} +$ $2 \partial_\epsilon \partial^\epsilon \partial_\delta \partial^\delta \sigma^{\alpha\chi\beta} + 3 \eta^{\alpha\chi} \partial_\phi \partial^\phi \partial_\epsilon \partial^\beta \sigma^{\delta\epsilon}{}_\delta +$ $3 \eta^{\beta\chi} \partial_\phi \partial^\phi \partial_\epsilon \partial_\delta \sigma^{\alpha\delta\epsilon} + 3 \eta^{\alpha\chi} \partial_\phi \partial^\phi \partial_\epsilon \partial^\epsilon \sigma^{\beta\delta}{}_\delta$	5
Total constraints/gauge generators:		13

## Quadratic (free) action

$$S = \iiint (\omega^{\alpha\beta\chi} \sigma_{\alpha\beta\chi} - \frac{1}{2} r_3 (\partial_\beta \omega_{,\theta}^\theta \partial' \omega_{\alpha}^{\alpha\beta} + \partial_i \omega_{\beta}^\theta \partial' \omega_{\theta}^{\alpha\beta} + \partial_\alpha \omega^{\alpha\beta i} \partial_\theta \omega_{\beta}^\theta - 2 \partial' \omega_{\beta}^\theta \partial_\alpha \omega_{\theta}^{\alpha\beta} + \partial_\alpha \omega^{\alpha\beta i} \partial_\theta \omega_{\beta}^\theta + \partial_\alpha \omega^{\alpha\beta i} \partial_\theta \omega_{\theta}^{\alpha\beta}) + 2 \partial' \omega_{\alpha}^{\alpha\beta} \partial_\theta \omega_{,\beta}^\theta + 8 \partial_\beta \omega_{,\theta\alpha}^\theta \partial^\theta \omega^{\alpha\beta i}) + r_5 (\partial_i \omega_{\theta}^\kappa \partial^\theta \omega_{\alpha}^{\alpha i} - \partial_\theta \omega_{,\kappa}^\kappa \partial^\theta \omega_{\alpha}^{\alpha i} - (\partial_\alpha \omega^{\alpha i \theta} - 2 \partial^\theta \omega_{\alpha}^{\alpha i}) (\partial_\kappa \omega_{,\theta}^\kappa - \partial_\kappa \omega_{\theta}^{\kappa})) [t, x, y, z] dz dy dx dt$$



# Massive and massless spectra



Quadratic pole	
Pole residue:	$-\frac{1}{r_3(2r_3+r_5)(r_3+2r_5)} > 0$
Polarisations:	2

(No massive particles)

# Unitarity conditions

$$r_3 < 0 \&\& (r_5 < -\frac{r_3}{2} \parallel r_5 > -2r_3) \parallel r_3 > 0 \&\& -2r_3 < r_5 < -\frac{r_3}{2}$$