

Particle spectrograph

Wave operator and propagator


Quadratic (free) action

$$S = \int \int \int \int (\mathcal{B}^\alpha \mathcal{T}_\alpha + 2 \alpha (-\partial_\alpha \mathcal{B}_\beta + \partial_\beta \mathcal{B}_\alpha) \partial^\beta \mathcal{B}^\alpha) [t, x, y, z] dz dy dx dt$$

Source constraints		
SO(3) irreps	Fundamental fields	Multiplicities
$\mathcal{T}_0^{#1} == 0$	$\partial_\alpha \mathcal{T}^\alpha == 0$	1
Total constraints/gauge generators: 1		

$$\mathcal{T}_{1^-}^{#1} \dagger^\alpha \boxed{\frac{1}{2 \alpha k^2}} \mathcal{B}_{1^-}^{#1} \dagger^\alpha \boxed{2 \alpha k^2} \mathcal{T}_{0^+}^{#1} \dagger \boxed{0} \mathcal{B}_{0^+}^{#1} \dagger \boxed{0}$$

Massive and massless spectra



Quadratic pole	
Pole residue:	$-\frac{1}{\alpha} > 0$
Polarisations:	2

(No massive particles)

Unitarity conditions

$$\alpha < 0$$