

Lagrangian density

$$\alpha \partial_\beta h^\chi_\chi \partial^\beta h^\alpha_\alpha - 2 \alpha \partial_\beta h_{\alpha\chi} \partial^\chi h^{\alpha\beta} + \alpha \partial_\chi h_{\alpha\beta} \partial^\chi h^{\alpha\beta}$$

Added source term: $| h^{\alpha\beta} \tau_{\alpha\beta}$

	$\tau_{0+}^{\#1}$	$\tau_{0+}^{\#2}$
$\tau_{0+}^{\#1} +$	0	$\frac{1}{\sqrt{3} \alpha k^2}$
$\tau_{0+}^{\#2} +$	$\frac{1}{\sqrt{3} \alpha k^2}$	$-\frac{4}{3 \alpha k^2}$

	$h_{0+}^{\#1}$	$h_{0+}^{\#2}$
$h_{0+}^{\#1} +$	$4 \alpha k^2$	$\sqrt{3} \alpha k^2$
$h_{0+}^{\#2} +$	$\sqrt{3} \alpha k^2$	0

Source constraints	
SO(3) irreps	#
$\tau_{1-}^{\#1\alpha} == 0$	3
Total #:	3

$\tau_{2+}^{\#1} \alpha_\beta$

$\tau_{2+}^{\#1} + \alpha_\beta$	$\frac{1}{\alpha k^2}$
----------------------------------	------------------------

$h_{2+}^{\#1} + \alpha_\beta$


$h_{2+}^{\#1} + \alpha_\beta$	αk^2
-------------------------------	--------------

$\tau_{1-}^{\#1\alpha}$

$\tau_{1-}^{\#1} + \alpha$	0
----------------------------	---

$h_{1-}^{\#1\alpha}$

$h_{1-}^{\#1} + \alpha$	0
-------------------------	---



Quadratic pole

Pole residue:	$\frac{1}{\alpha} > 0$
---------------	------------------------

Polarisations:	3
----------------	---

Unitarity conditions

$\alpha > 0$

(No massive particles)