

Particle spectrograph

Wave operator and propagator

Quadratic (free) action

$$S = \iiint \int (\gamma \mathcal{B}_\alpha \mathcal{B}^\alpha + \mathcal{B}^\alpha \mathcal{J}_\alpha + 2 \alpha (-\partial_\alpha \mathcal{B}_\beta + \partial_\beta \mathcal{B}_\alpha) \partial^\beta \mathcal{B}^\alpha) [t, x, y, z] dz dy dx dt$$

$\mathcal{B}_{1-}^{\#1} +^\alpha$

$\mathcal{B}_{1-}^{\#1} \alpha$

$\gamma + 2 \alpha k^2$

(No source constraints)

$\mathcal{J}_{1-}^{\#1} +^\alpha$

$\mathcal{J}_{1-}^{\#1} \alpha$

$\frac{1}{\gamma + 2 \alpha k^2}$

$\mathcal{J}_{0+}^{\#1} +$

$\mathcal{J}_{0+}^{\#1}$

γ

$\mathcal{B}_{0+}^{\#1} +$

$\mathcal{B}_{0+}^{\#1}$

γ

Massive and massless spectra

Massive particle	
Pole residue:	$-\frac{1}{2 \alpha} > 0$
Polarisations:	3
Square mass:	$-\frac{\gamma}{2 \alpha} > 0$
Spin:	1
Parity:	Odd

(No massless particles)

Unitarity conditions

$\alpha < 0 \ \&\& \ \gamma > 0$