

Particle spectrograph

Wave operator and propagator

	$\mathcal{A}_{2^{+}\alpha\beta}^{\#1}$	$f_{2^{+}\alpha\beta}^{\#1}$	$\mathcal{A}_{2^{-}\alpha\beta\chi}^{\#1}$
$\mathcal{A}_{2^{+}}^{\#1}\dagger^{\alpha\beta}$	$\frac{t_1}{2}$	$-\frac{ik t_1}{\sqrt{2}}$	0
$f_{2^{+}}^{\#1}\dagger^{\alpha\beta}$	$\frac{ik t_1}{\sqrt{2}}$	$k^2 t_1$	0
$\mathcal{A}_{2^{-}}^{\#1}\dagger^{\alpha\beta\chi}$	0	0	$k^2 r_1 + \frac{t_1}{2}$

Source constraints		
SO(3) irreps	Fundamental fields	Multiplicities
$\tau_{0^{+}}^{\#2} == 0$	$\partial_\beta \partial_\alpha \tau^{\alpha\beta} == 0$	1
$\tau_{0^{+}}^{\#1} == 0$	$\partial_\beta \partial_\alpha \tau^{\alpha\beta} == \partial_\beta \partial^\beta \tau^\alpha_\alpha$	1
$\tau_{1^{+}}^{\#2\alpha} + 2\,i\,k\,\sigma_{1^{+}}^{\#2\alpha} == 0$	$\partial_\chi \partial_\beta \partial^\alpha \tau^{\beta\chi} == \partial_\chi \partial^\chi \partial_\beta \tau^{\alpha\beta} + 2\,\partial_\delta \partial^\delta \partial_\chi \partial_\beta \sigma^{\alpha\beta\chi}$	3
$\tau_{1^{+}}^{\#1\alpha} == 0$	$\partial_\chi \partial_\beta \partial^\alpha \tau^{\beta\chi} == \partial_\chi \partial^\chi \partial_\beta \tau^{\beta\alpha}$	3
$\tau_{1^{+}}^{\#1\alpha\beta} + i\,k\,\sigma_{1^{+}}^{\#2\alpha\beta} == 0$	$\partial_\chi \partial^\alpha \tau^{\beta\chi} + \partial_\chi \partial^\beta \tau^{\chi\alpha} + \partial_\chi \partial^\chi \tau^{\alpha\beta} +$ $2\,\partial_\delta \partial_\chi \partial^\alpha \sigma^{\beta\chi\delta} + 2\,\partial_\delta \partial^\delta \partial_\chi \sigma^{\alpha\beta\chi} ==$ $\partial_\chi \partial^\alpha \tau^{\chi\beta} + \partial_\chi \partial^\beta \tau^{\alpha\chi} +$ $\partial_\chi \partial^\chi \tau^{\beta\alpha} + 2\,\partial_\delta \partial_\chi \partial^\beta \sigma^{\alpha\chi\delta}$	3
$\tau_{2^{+}}^{\#1\alpha\beta} - 2\,i\,k\,\sigma_{2^{+}}^{\#1\alpha\beta} == 0$	$-i\,(4\,\partial_\delta \partial_\chi \partial^\beta \partial^\alpha \tau^{\chi\delta} + 2\,\partial_\delta \partial^\delta \partial^\beta \partial^\alpha \tau^\chi_\chi -$ $3\,\partial_\delta \partial^\delta \partial_\chi \partial^\alpha \tau^{\beta\chi} - 3\,\partial_\delta \partial^\delta \partial_\chi \partial^\alpha \tau^{\chi\beta} -$ $3\,\partial_\delta \partial^\delta \partial_\chi \partial^\beta \tau^{\alpha\chi} - 3\,\partial_\delta \partial^\delta \partial_\chi \partial^\beta \tau^{\chi\alpha} +$ $3\,\partial_\delta \partial^\delta \partial_\chi \partial^\chi \tau^{\alpha\beta} + 3\,\partial_\delta \partial^\delta \partial_\chi \partial^\chi \tau^{\beta\alpha} +$ $4\,i\,k^\chi\,\partial_\epsilon \partial_\chi \partial^\beta \partial^\alpha \sigma^{\delta\epsilon}_\delta -$ $6\,i\,k^\chi\,\partial_\epsilon \partial_\delta \partial_\chi \partial^\alpha \sigma^{\beta\delta\epsilon} -$ $6\,i\,k^\chi\,\partial_\epsilon \partial_\delta \partial_\chi \partial^\beta \sigma^{\alpha\delta\epsilon} +$ $2\,\eta^{\alpha\beta}\,\partial_\epsilon \partial^\epsilon \partial_\delta \partial_\chi \tau^{\chi\delta} +$ $6\,i\,k^\chi\,\partial_\epsilon \partial^\epsilon \partial_\delta \partial_\chi \sigma^{\alpha\delta\beta} +$ $6\,i\,k^\chi\,\partial_\epsilon \partial^\epsilon \partial_\delta \partial_\chi \sigma^{\beta\delta\alpha} -$ $2\,\eta^{\alpha\beta}\,\partial_\epsilon \partial^\epsilon \partial_\delta \partial^\delta \tau^\chi_\chi -$ $4\,i\,\eta^{\alpha\beta}\,k^\chi\,\partial_\phi \partial^\phi \partial_\epsilon \partial_\chi \sigma^{\delta\epsilon}_\delta) == 0$	5
Total constraints/gauge generators:		16

	$\mathcal{A}_{1^{+}\alpha\beta}^{\#1}$	$\mathcal{A}_{1^{+}\alpha\beta}^{\#2}$	$f_{1^{+}\alpha\beta}^{\#1}$	$\mathcal{A}_{1^{-}\alpha}^{\#1}$	$\mathcal{A}_{1^{-}\alpha}^{\#2}$	$f_{1^{-}\alpha}^{\#1}$	$f_{1^{-}\alpha}^{\#2}$
$\mathcal{A}_{1^{+}}^{\#1}\dagger^{\alpha\beta}$	$k^2\,(2\,r_3 + r_5) - \frac{t_1}{2}$	$-\frac{t_1}{\sqrt{2}}$	$-\frac{ik t_1}{\sqrt{2}}$	0	0	0	0
$\mathcal{A}_{1^{+}}^{\#2}\dagger^{\alpha\beta}$	$-\frac{t_1}{\sqrt{2}}$	0	0	0	0	0	0
$f_{1^{+}}^{\#1}\dagger^{\alpha\beta}$	$\frac{ik t_1}{\sqrt{2}}$	0	0	0	0	0	0
$\mathcal{A}_{1^{-}}^{\#1}\dagger^\alpha$	0	0	0	$k^2\,(-r_1 + 2\,r_3 + r_5) + \frac{t_1}{6}$	$\frac{t_1}{3\,\sqrt{2}}$	0	$\frac{ik t_1}{3}$
$\mathcal{A}_{1^{-}}^{\#2}\dagger^\alpha$	0	0	0	$\frac{t_1}{3\,\sqrt{2}}$	$\frac{t_1}{3}$	0	$\frac{1}{3}\,i\,\sqrt{2}\,k\,t_1$
$f_{1^{-}}^{\#1}\dagger^\alpha$	0	0	0	0	0	0	0
$f_{1^{-}}^{\#2}\dagger^\alpha$	0	0	0	$-\frac{1}{3}\,i\,k\,t_1$	$-\frac{1}{3}\,i\,\sqrt{2}\,k\,t_1$	0	$\frac{2\,k^2 t_1}{3}$

Quadratic (free) action

$$S == \int\int\int\int (f^{a\beta} \tau_{a\beta} + \mathcal{A}^{a\beta\chi} \sigma_{a\beta\chi} +$$
$$\frac{1}{6} t_1 (2 \mathcal{A}^\chi_\alpha \mathcal{A}_{,\theta}^\theta - 4 \mathcal{A}^\theta_\alpha \mathcal{A}_{,\theta}^\theta \partial f^\alpha_{,\theta} + 4 \mathcal{A}_{,\theta}^\theta \partial f^\alpha_\alpha - 2 \partial_\theta f^\theta_\alpha -$$
$$\partial f^\alpha_\alpha - 2 \partial_\theta f^{\alpha\theta} \partial_\theta f^\theta_\alpha + 4 \partial f^\alpha_\alpha \partial_\theta f^\theta_\alpha - 6 \partial_\theta f_{,\theta}^\theta \partial^\theta f^{\alpha\theta} -$$
$$3 \partial_\theta f_{,\theta}^\theta \partial^\theta f^{\alpha\theta} + 3 \partial_\theta f_{\alpha\theta} \partial^\theta f^{\alpha\theta} + 3 \partial_\theta f_{\alpha\theta} \partial^\theta f^{\alpha\theta} +$$
$$3 \partial_\theta f_{,\alpha}^\theta \partial^\theta f^{\alpha\theta} + 6 \mathcal{A}_{a\theta\theta} (\mathcal{A}^{a\theta\theta} + 2 \partial^\theta f^{\alpha\theta}) -$$
$$2 r_3 (\partial_\beta \mathcal{A}_{,\theta}^\theta \partial' \mathcal{A}^{\alpha\beta}_\alpha + \partial_\theta \mathcal{A}_{\beta}^\theta \partial' \mathcal{A}^{\alpha\beta}_\alpha + \partial_\alpha \mathcal{A}^{\alpha\beta\theta} \partial_\theta \mathcal{A}_{\beta,\theta}^\theta -$$
$$2 \partial' \mathcal{A}^{\alpha\beta}_\alpha \partial_\theta \mathcal{A}_{\beta,\theta}^\theta + \partial_\alpha \mathcal{A}^{\alpha\beta\theta} \partial_\theta \mathcal{A}_{\beta,\theta}^\theta -$$
$$2 \partial' \mathcal{A}^{\alpha\beta}_\alpha \partial_\theta \mathcal{A}_{\beta,\theta}^\theta + 2 \partial_\beta \mathcal{A}_{,\theta\alpha}^\theta \partial^\theta \mathcal{A}^{\alpha\beta\theta}) +$$
$$\frac{2}{3} r_1 (3 \partial_\beta \mathcal{A}_{,\theta}^\theta \partial' \mathcal{A}^{\alpha\beta}_\alpha + 3 \partial_\theta \mathcal{A}_{\beta}^\theta \partial' \mathcal{A}^{\alpha\beta}_\alpha +$$
$$3 \partial_\alpha \mathcal{A}^{\alpha\beta\theta} \partial_\theta \mathcal{A}_{\beta,\theta}^\theta - 6 \partial' \mathcal{A}^{\alpha\beta}_\alpha \partial_\theta \mathcal{A}_{\beta,\theta}^\theta +$$
$$3 \partial_\alpha \mathcal{A}^{\alpha\beta\theta} \partial_\theta \mathcal{A}_{\beta,\theta}^\theta - 6 \partial' \mathcal{A}^{\alpha\beta}_\alpha \partial_\theta \mathcal{A}_{\beta,\theta}^\theta - 2 \partial_\beta \mathcal{A}_{a\theta\theta}$$
$$\partial^\theta \mathcal{A}^{\alpha\beta\theta} + \partial_\beta \mathcal{A}_{a\theta\theta} \partial^\theta \mathcal{A}^{\alpha\beta\theta} + 2 \partial_\beta \mathcal{A}_{,\theta\alpha}^\theta \partial^\theta \mathcal{A}^{\alpha\beta\theta} -$$
$$\partial_\theta \mathcal{A}_{a\beta\theta} \partial^\theta \mathcal{A}^{\alpha\beta\theta} + \partial_\theta \mathcal{A}_{a\beta\theta} \partial^\theta \mathcal{A}^{\alpha\beta\theta} + \partial_\theta \mathcal{A}_{a\beta\theta} \partial^\theta \mathcal{A}^{\alpha\beta\theta}) +$$
$$r_5 (\partial_\theta \mathcal{A}_{\theta,\kappa}^\kappa \partial^\theta \mathcal{A}^{\alpha\theta}_\alpha - \partial_\theta \mathcal{A}_{,\kappa}^\kappa \partial^\theta \mathcal{A}^{\alpha\theta}_\alpha - (\partial_\alpha \mathcal{A}^{\alpha\theta\theta} - 2 \partial^\theta \mathcal{A}^{\alpha\theta}_\alpha)$$
$$(\partial_\kappa \mathcal{A}_{,\theta}^\kappa - \partial_\kappa \mathcal{A}_{\theta,\theta}^\kappa))) [t, x, y, z] dz dy dx dt$$


	$\sigma_{1^{+}\alpha\beta}^{\#1}$	$\sigma_{1^{+}\alpha\beta}^{\#2}$	$\tau_{1^{+}\alpha\beta}^{\#1}$	$\sigma_{1^{-}\alpha}^{\#1}$	$\sigma_{1^{-}\alpha}^{\#2}$	$\tau_{1^{-}\alpha}^{\#1}$	$\tau_{1^{-}\alpha}^{\#2}$
$\sigma_{1^{+}}^{\#1}\dagger^{\alpha\beta}$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{t_1 + k^2 t_1}$	$-\frac{i\sqrt{2}k}{t_1 + k^2 t_1}$	0	0	0	0
$\sigma_{1^{+}}^{\#2}\dagger^{\alpha\beta}$	$-\frac{\sqrt{2}}{t_1 + k^2 t_1}$	$\frac{-2k^2(2r_3+r_5)+t_1}{(1+k^2)^2 t_1^2}$	$\frac{-2ik^3(2r_3+r_5)+ik t_1}{(1+k^2)^2 t_1^2}$	0	0	0	0
$\tau_{1^{+}}^{\#1}\dagger^{\alpha\beta}$	$\frac{i\sqrt{2}k}{t_1 + k^2 t_1}$	$\frac{i(2k^3(2r_3+r_5)+k^2 t_1)}{(1+k^2)^2 t_1^2}$	$\frac{-2k^4(2r_3+r_5)+k^2 t_1}{(1+k^2)^2 t_1^2}$	0	0	0	0
$\sigma_{1^{-}}^{\#1}\dagger^\alpha$	0	0	0	$\frac{1}{k^2(-r_1+2r_3+r_5)}$	$\frac{1}{\sqrt{2}(k^2+2k^4)(r_1-2r_3+r_5)}$	0	$\frac{i}{k(1+2k^2)(r_1-2r_3+r_5)}$
$\sigma_{1^{-}}^{\#2}\dagger^\alpha$	0	0	0	$\frac{1}{\sqrt{2}(k^2+2k^4)(r_1-2r_3+r_5)}$	$\frac{1}{\sqrt{2}(k^2+2k^4)(r_1-2r_3+r_5)} + \frac{6k^2}{-r_1+2r_3+r_5} \frac{t_1}{2(k+2k^3)^2}$	0	0
$\tau_{1^{-}}^{\#1}\dagger^\alpha$	0	0	0	0	0	0	0
$\tau_{1^{-}}^{\#2}\dagger^\alpha$	0	0	0	$\frac{i}{k(1+2k^2)(-r_1+2r_3+r_5)}$	$-\frac{i(6k^2(r_1-2r_3+r_5)t_1)}{\sqrt{2}k(1+2k^2)^2(r_1-2r_3+r_5)t_1}$	0	$\frac{1}{-r_1+2r_3+r_5} + \frac{6k^2}{(1+2k^2)^2} \frac{t_1}{t_1}$

	$\sigma_{0^{+}}^{\#1}$	$\tau_{0^{+}}^{\#1}$	$\tau_{0^{+}}^{\#2}$	$\sigma_0^{\#1}$
$\sigma_{0^{+}}^{\#1}\dagger$	$\frac{1}{6k^2(-r_1+r_3)}$	0	0	0
$\tau_{0^{+}}^{\#1}\dagger$	0	0	0	0
$\tau_{0^{+}}^{\#2}\dagger$	0	0	0	0
$\sigma_0^{\#1}\dagger$	0	0	0	$-\frac{1}{t_1}$

	$\mathcal{A}_{0^{+}}^{\#1}$	$f_{0^{+}}^{\#1}$	$f_{0^{+}}^{\#2}$	$\mathcal{A}_0^{\#1}$
$\mathcal{A}_{0^{+}}^{\#1}\dagger$	$6k^2(-r_1+r_3)$	0	0	0
$f_{0^{+}}^{\#1}\dagger$	0	0	0	0
$f_{0^{+}}^{\#2}\dagger$	0	0	0	0
$\mathcal{A}_0^{\#1}\dagger$	0	0	0	$-t_1$


	$\sigma_{2^{+}\alpha\beta}^{\#1}$	$\tau_{2^{+}\alpha\beta}^{\#1}$	$\sigma_{2^{-}\alpha\beta\chi}^{\#1}$
$\sigma_{2^{+}}^{\#1}\dagger^{\alpha\beta}$	$\frac{2}{(1+2k^2)^2 t_1}$	$-\frac{2i\sqrt{2}k}{(1+2k^2)^2 t_1}$	0
$\tau_{2^{+}}^{\#1}\dagger^{\alpha\beta}$	$\frac{2i\sqrt{2}k}{(1+2k^2)^2 t_1}$	$\frac{4k^2}{(1+2k^2)^2 t_1}$	0
$\sigma_{2^{-}}^{\#1}\dagger^{\alpha\beta\chi}$	0	0	$\frac{2}{2k^2 r_1 + t_1}$

Massive and massless spectra



Massive particle

Pole residue:	$-\frac{1}{r_1} > 0$
Polarisations:	5
Square mass:	$-\frac{t_1}{2r_1} > 0$
Spin:	2
Parity:	Odd



Quadratic pole

Pole residue:	$\frac{1}{(r_1-2r_3-r_5)t_1^2} > 0$
Polarisations:	2

Unitarity conditions

$r_1 < 0 \ \&\& \ r_5 < r_1 - 2\,r_3 \ \&\& \ t_1 > 0$