

Lagrangian density

$$\beta \partial_\alpha \mathcal{B}^\alpha \partial_\beta \mathcal{B}^\beta + \alpha \partial_\beta \mathcal{B}_\alpha \partial^\beta \mathcal{B}^\alpha$$

Added source term: $\mathcal{B}^\alpha \mathcal{J}_\alpha$


$$\mathcal{J}_{1^-}^{\#1} + \alpha \boxed{\frac{1}{\alpha k^2}}$$

$$\mathcal{B}_{0^+}^{\#1} + \boxed{(\alpha + \beta) k^2}$$

$$\mathcal{J}_{0^+}^{\#1} + \boxed{\frac{1}{(\alpha + \beta) k^2}}$$

$$\mathcal{B}_{1^-}^{\#1} + \alpha \boxed{\alpha k^2} \mathcal{B}_{1^-}^{\#1}$$


(No source constraints)



Quartic pole

Pole residue:	$0 < -\frac{\beta}{\alpha(\alpha+\beta)} \ \&\& \ -\frac{\beta}{\alpha(\alpha+\beta)} > 0$
---------------	--


Polarisations:	1
----------------	---



Quadratic pole

Pole residue:	$-\frac{1}{\alpha} > 0$
---------------	-------------------------


Polarisations:	2
----------------	---



Quadratic pole

Pole residue:	$\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\alpha+\beta} > 0$
---------------	---

Polarisations:	1
----------------	---



Quadratic pole

Pole residue:	$-\frac{1}{\alpha} - \frac{1}{\alpha+\beta} > 0$
---------------	--

Polarisations:	1
----------------	---

Unitarity conditions
(Unitarity is demonstrably impossible)

(No massive particles)