成	绩:	
指导	教师:	

论文标题

数学与应用数学 (师范) 专业 2015100013 张三

指导教师: 李四 依托课程: 实变函数

摘要: 摘要主要是说明研究工作的目的、方法、结果和结论. 语句要合乎逻辑关系, 结构要严谨, 表达要简明, 语义要确切. 数学专业的论文, 用简明的几句话说清楚论文的主要内容和结果即可, 不要有其他废话, 不需要按学校文件规定写 200-300 字.

关键词: 甲乙丙丁戊

1 引言

引言可分为三部分来写.

第一部分阐述研究背景, 总结前人的工作和结果. 在文献 [3](注意这里对参考文献的交叉引用方法) 中, 作者研究了......

第二部分详细阐述本文研究的核心工作,用了哪些技巧和理论工具,研究了哪个问题,得到了什么结果.与前人的结果比较,本文的创新点在哪里.

第三部分阐述本文的主要结构. 在第2节做了什么, 在第3节做了什么.

- 2 一个一级标题,自动编号
- 2.1 一个二级标题, 自动编号
- 2.1.1 一个三级标题, 自动编号

下面是一个定义. 将对应的 LATEX 环境命令里的 definition 换成 theorem, lemma, proposition, corollary, example, remark, 就得到定理、引理、命题、推论、例、注等)

定义 2.1 ([3]). n 阶实对称矩阵 A 为正定的,如果它所对应的二次型 X^TAX 是正定的,即对任意非零的 n 维列向量 X, 有 $X^TAX > 0$.

根据定义2.1 (注意这里的交叉引用方法), 我们有.....

下面是性质,还有一个列表的使用例子,注意列表编号的格式。

性质 2.1. 如果 A和 B都是正定矩阵,则有:

- (1) A + B 是正定矩阵;
- (ii) kA(k>0) 是正定矩阵;
- (bla) blablabla;
 - 1.
 - i.
 - A.

以下是一个引理。

引理 2.1. 设 $E: \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}^+$ ($\mathbb{R}^+ = [0, +\infty)$) 是一个单调递减的函数且存在常数 T>0,使得

$$\int_{t}^{\infty} E(s) \, \mathrm{d}s \le TE(t), \quad \forall t \in \mathbb{R}^{+},$$

则

$$E(t) \le E(0)e^{1-\frac{t}{T}}, \quad \forall t \ge T.$$

下面是一个定理及证明, 注意不等式 (2.1) 的交叉引用方法.

定理 2.1. 设 E 是定义在 $[0,\infty)$ 上的非负递减函数. 如果

$$\int_{S}^{\infty} E(t) \, \mathrm{d}t \le CE(S), \quad \forall S \ge S_0, \tag{2.1}$$

其中 S_0 , C 为固定常数, 则

$$E(t) \le E(0)e^{1-\frac{t}{S_0+C}}, \quad \forall t \ge 0.$$

证明 若 $0 < S < S_0$, 由 (2.1) 式可知

$$\int_{S}^{\infty} E(t) dt = \int_{S}^{S_0} E(t) dt + \int_{S_0}^{\infty} E(t) dt$$

$$\leq (S_0 - S)E(S) + CE(S_0)$$

$$= S_0 E(S) + CE(S)$$

因此, 对 $\forall S \geq 0$, 有

$$\int_{S}^{\infty} E(t) dt \le (S_0 + C)E(S).$$

由引理3得

$$E(t) \le E(0)e^{1-\frac{t}{S_0+C}}, \quad \forall t \ge 0.$$

注 2.1. 这里是一个注。

定理 2.2 (局部存在性与唯一性, [3]). 假设条件成立,则存在依赖于初始二次能量 $\mathcal{E}(0)$ 的 T>0 使得问题在时间区间 $(-\infty,T]$ 上有弱解. 另外, 我们有下面的能量恒等式成立:

$$\mathcal{E} + \int_0^t \int_{\Omega} |u_t|^{m+1} dx d\tau - \frac{1}{2} \int_0^t \int_0^{-\infty} |\nabla w(\tau, s)|_2^2 \mu'(s) ds d\tau$$

$$= \mathcal{E}(0) + \int_0^t \int_{\Omega} |u|^{p-1} u u_t dx d\tau, \qquad (2.2)$$

2.2 数学公式、符号的例子

行列式的例子

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & -a_{13} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & -a_{23} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & -a_{n3} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix}$$

矩阵的例子

$$A = (a_{ij})_{n \times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

方程组的例子

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u + |u_t|^{m-1} u_t = |u|^{p-1} u, & (x,t) \in \mathbb{R}^n \times (0,\infty), \\ u(0,x) = u_0(x), & u_t(x,0) = u_1(x), \end{cases}$$

$$\begin{cases} -x & \text{if } x < 0, \\ 0 & \text{if } x = 0, \\ x & \text{if } x > 0. \end{cases}$$

长公式

$$J(\psi_t(v);t) = \frac{p-2}{2p} (|\nabla \psi_t(v)|_2^2 + b|\psi_t(v)|_2^2) + \frac{1}{p} I(\psi_t(v);t)$$

$$= \frac{p-2}{2p} s^2(v;t) ||v||^2$$

$$= \frac{p-2}{2p} (k(t))^{-\frac{2}{p-2}} ||v||^{\frac{2p}{p-2}}.$$

$$\begin{split} &\frac{\gamma_a^p \left(2\rho(0)\right)^{1-\frac{p}{2}}}{\left(p-2\right) k(T_3)} \leq T^* \\ &\leq &T_3 := \frac{8(p-1)(a\lambda_1+1)\rho(0)}{(p-2)^2 [(p-2)(b+\lambda_1)\rho(0)-p(a\lambda_1+1)J(u_0;0)]}; \end{split}$$

一个具有斜线表头的表格

X	a	b
c	1	0
d	0	1

3 又一个一级标题 下面是一个例.

例 3.1. 这是一个例子.

致谢

本文的写作过程中,得到了李四老师的悉心指导与修改,在此表示感谢,

参考文献

- [1] 姜国. 正定矩阵的判定及性质 [J]. 湖北师范学院学报 (自然科学版), 2006(01): 97-100.
- [2] 李立群. 正定矩阵及其应用 [J]. 山东农业工程学院学报, 2017, 34(07): 28-30.
- [3] Xiao Liang, JuanJuan Xu. Control for networked control systems with remote and local controllers over unreliable communication channel[J]. Automatica, 2018, 98(2018): 86-94.