


2019-2020 学年第 1 学期
数学分析作业

目录

5 第 5 周	1
6 第 6 周	7
7 第 7 周	7
8 第 8 周	14

第 5 周

 **作业题 5.1** 设 A, B 为非空有界数集, 并且 $A \subset B$, 证明

$$\inf B \leq \inf A \leq \sup A \leq \sup B.$$

证明 显然, $\inf A \leq \sup A$. 下证 $\inf B \leq \inf A$ 并且 $\sup A \leq \sup B$.

假设 $\inf B > \inf A$, 则 $\inf B$ 不是集合 A 的下界, 从而存在 $x_0 \in A$ 使得 $\inf B > x_0$. 另一方面, 由于 $A \subset B$, 从而也有 $x_0 \in B$, 于是

$$\inf B > x_0 \geq \inf B,$$


矛盾.

假设 $\sup A > \sup B$, 则 $\sup B$ 不是集合 A 的上界, 从而存在 $x_1 \in A$ 使得 $\sup B < x_1$. 另一方面, 由于 $A \subset B$, 从而也有 $x_1 \in B$, 于是

$$\sup B < x_1 \leq \sup B,$$

矛盾.

综上, $\inf B \leq \inf A \leq \sup A \leq \sup B$. □

 **作业题 5.2** 设 S 为非空有下界 (不一定有上界) 的数集, 并且 $\inf S > 0$, 证明集合

$$S^{-1} = \{x^{-1} \mid x \in S\}$$

有界并且

$$\sup S^{-1} > 0, \quad \inf S^{-1} \geq 0, \quad \sup S^{-1} = \frac{1}{\inf S}.$$

证明 Step1. 任取 $y \in S^{-1}$, 令 $x = y^{-1}$, 则 $x \in S$,

$$x \geq \inf S > 0,$$

从而

$$0 < y \leq \frac{1}{\inf S}, \quad \forall y \in S^{-1}. \quad (5.1)$$

所以 0 是 S^{-1} 的一个下界, $\frac{1}{\inf S}$ 是 S^{-1} 的一个上界, 并且

$$\sup S^{-1} > 0, \quad \inf S^{-1} \geq 0.$$

Step2. 由 Step1 可知 $\sup S^{-1} \leq \frac{1}{\inf S}$. 下面排除 $\sup S^{-1} < \frac{1}{\inf S}$ 的情况.
反证法, 假设 $\sup S^{-1} < \frac{1}{\inf S}$ 成立, 由于 $\sup S^{-1} > 0$, 则

$$0 < \inf S < \frac{1}{\sup S^{-1}}.$$

所以 $\frac{1}{\sup S^{-1}}$ 不是 S 的下界, 存在 $x \in S$ 使得

$$0 < \inf S \leq x < \frac{1}{\sup S^{-1}}.$$

令 $y = x^{-1}$, 则 $y \in S^{-1}$,

$$0 < \frac{1}{y} = x < \frac{1}{\sup S^{-1}},$$

从而

$$\sup S^{-1} < y.$$


但是另一方面, 由于 $y \in S^{-1}$, 则一定有

$$y \leq \sup S^{-1},$$

矛盾. 所以

$$\sup S^{-1} = \frac{1}{\inf S}.$$

□

 **作业题 5.3** 证明以下等式和不等式:

(1) 设 $a, b \in \mathbb{R}$, 则

$$||a| - |b|| \leq |a - b|, \quad \frac{|a + b|}{1 + |a + b|} \leq \frac{|a|}{1 + |a|} + \frac{|b|}{1 + |b|}.$$

(2) 设 $a, b \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}_+$ 且 $n \geq 2$, 则

$$a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \cdots + ab^{n-2} + b^{n-1}),$$

(3) Bernoulli(伯努利) 不等式: 设 $h \geq -1$, $n \in \mathbb{N}_+$, 则

$$(1 + h)^n \geq 1 + nh.$$

特别地, 如果还有 $h \geq 0$ 并且 $n \geq 2$, 则还成立

$$(1 + h)^n > \frac{n(n-1)}{2}h^2 \geq \frac{n^2h^2}{4}.$$

(4) 算术-几何平均值不等式: 设 a_1, a_2, \dots, a_n 是 n 个非负实数, 则


$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n}.$$

如果 a_1, a_2, \dots, a_n 都是正实数, 还成立几何-调和平均值不等式:

$$\sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n} \geq \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}}.$$

(5)

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n k^2 &= 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}. \\ \sum_{k=1}^n k^3 &= 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2 \end{aligned}$$

 **注意** $\sum_{k=1}^n s_k$ 表示对 s_1, s_2, \dots, s_n 按下标 k 从 1 到 n 求和, 即 $\sum_{k=1}^n s_k = s_1 + s_2 + \dots + s_n$.

(6) 若 $0 < x < \frac{\pi}{2}$, 则 $\sin x < x < \tan x$. 若 $x \in \mathbb{R}$, 则 $|\sin x| \leq |x|$.

证明 (1) 对任意 $a, b \in \mathbb{R}$, 由绝对值不等式可得

$$\begin{aligned} |a - b| &\geq |a| - |b|, \\ |a - b| &= |b - a| \geq |b| - |a|, \end{aligned}$$

综合上述两式可得

$$-|a - b| \leq |a| - |b| \leq |a - b|,$$

所以

$$||a| - |b|| \leq |a - b|.$$

由于

$$f(t) = \frac{t}{1+t}, \quad t > 0$$

是严格增函数, 并且

$$|a + b| \leq |a| + |b|,$$

则 $f(|a + b|) \leq f(|a| + |b|)$, 从而

$$\begin{aligned} \frac{|a + b|}{1 + |a + b|} &\leq \frac{|a| + |b|}{1 + |a| + |b|} \\ &= \frac{|a|}{1 + |a| + |b|} + \frac{|b|}{1 + |a| + |b|} \\ &\leq \frac{|a|}{1 + |a|} + \frac{|b|}{1 + |b|}. \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} &(a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1}) \\ &= (a^n + a^{n-1}b + \dots + a^2b^{n-2} + ab^{n-1}) \\ &\quad - (a^{n-1}b + a^{n-2}b^2 + \dots + ab^{n-1} + b^n) \\ &= a^n - b^n. \end{aligned}$$

(3) 当 $n = 1$ 时, $(1 + h)^1 = 1 + 1 \cdot h$, 结论成立.

假设当 $n = k$ 时, 成立

$$(1 + h)^k \geq 1 + kh.$$

由于 $h \geq -1$, 则当 $n = k + 1$ 时,

$$\begin{aligned} (1 + h)^{k+1} &= (1 + h)^k \cdot (1 + h) \geq (1 + kh) \cdot (1 + h) \\ &= 1 + (k + 1)h + kh^2 \geq 1 + (k + 1)h. \end{aligned}$$

综上, 对任意 $n \in \mathbb{N}_+$ 以及任意 $h \geq -1$ 都有

$$(1 + h)^n \geq 1 + nh.$$

当 $n \geq 2$ 时, 有

$$\frac{n(n-1)}{2} \geq \frac{n^2}{4},$$

从而对任意 $h \geq 0$ 都有

$$\begin{aligned} (1 + h)^n &= 1 + nh + \frac{n(n-1)}{2}h^2 + \cdots + h^n \\ &> \frac{n(n-1)}{2}h^2 \geq \frac{n^2h^2}{4}. \end{aligned}$$

(4) 如果 a_1, a_2, \cdots, a_n 中有一个是 0, 则算术-几何平均值不等式成立. 下设 a_1, a_2, \cdots, a_n 都是正的实数.

当 $n = 1$ 时, 两个不等式显然都成立.

假设当 $n = k$ 时, 有

$$\frac{a_1 + \cdots + a_k}{k} \geq \sqrt[k]{a_1 \cdots a_k}.$$

当 $n = k + 1$ 时,

$$\begin{aligned} &\frac{a_1 + \cdots + a_k + a_{k+1}}{k+1} \\ &= \frac{a_1 + \cdots + a_k}{k} + \left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k} \right) (a_1 + \cdots + a_k) + \frac{a_{k+1}}{k+1} \\ &= \frac{a_1 + \cdots + a_k}{k} + \frac{ka_{k+1} - (a_1 + \cdots + a_k)}{k(k+1)}. \end{aligned}$$

令

$$A = \frac{a_1 + \cdots + a_k}{k}, \quad B = \frac{ka_{k+1} - (a_1 + \cdots + a_k)}{k(k+1)},$$

则 $A > 0$, $A + B > 0$. 再令 $h = \frac{B}{A}$, 则 $1 + h > 0$, $h > -1$, 利用 Bernoulli 不等式可得

$$\begin{aligned} &\left(\frac{a_1 + \cdots + a_k + a_{k+1}}{k+1} \right)^{k+1} \\ &= (A + B)^{k+1} = A^{k+1} \left(1 + \frac{B}{A} \right)^{k+1} = A^{k+1} (1 + h)^{k+1} \\ &\geq A^{k+1} [1 + (k+1)h] = A^{k+1} \left[1 + \frac{(k+1)B}{A} \right] = A^k [A + (k+1)B] \\ &= A^k \cdot a_{k+1}. \end{aligned}$$

根据 $n = k$ 时的假设条件, 有

$$A^k = \left(\frac{a_1 + \cdots + a_k}{k} \right)^k \geq a_1 \cdots a_k,$$

从而

$$\frac{a_1 + \cdots + a_k + a_{k+1}}{k+1} \geq a_1 \cdots a_k \cdot a_{k+1}.$$

综上, 算术-几何平均值不等式

$$\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdots a_n}$$

成立.

利用算术-几何平均值不等式可得

$$\frac{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}}{n} \geq \sqrt[n]{\frac{1}{a_1 \cdot a_2 \cdots a_n}} > 0,$$

对上式取倒数, 就得到几何-调和平均值不等式:

$$\sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdots a_n} \geq \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n}}.$$

(5) 当 $n = 1$ 时, 两不等式显然都成立.

假设当 $n = l$ 时,

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^l k^2 &= \frac{l(l+1)(2l+1)}{6}, \\ \sum_{k=1}^l k^3 &= \left(\frac{l(l+1)}{2}\right)^2. \end{aligned}$$


当 $n = l + 1$ 时就有

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{l+1} k^2 &= \sum_{k=1}^l k^2 + (l+1)^2 \\ &= \frac{l(l+1)(2l+1)}{6} + \frac{6(l+1)^2}{6} \\ &= \frac{(l+1)[(l+1)+1][2(l+1)+1]}{6}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{l+1} k^3 &= \sum_{k=1}^l k^3 + (l+1)^3 \\ &= \left(\frac{l(l+1)}{2}\right)^2 + (l+1)^3 \\ &= \left[\frac{(l+1)(l+2)}{2}\right]^2. \end{aligned}$$

综上, 两等式恒成立.

(6)



在以上单位圆周中, 角的弧度 x 满足 $0 < x < \frac{\pi}{2}$, 三角形 OAB 的面积

$$S_1 = \frac{1}{2} \cdot OA \cdot OB \cdot \sin x = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 \cdot \sin x = \frac{1}{2} \sin x,$$

扇形 \widehat{OAB} 的面积

$$S_2 = \frac{1}{2} \cdot OA \cdot OB \cdot x = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1 \cdot x = \frac{1}{2} x,$$

直角三角形 OAC 的两条直角边的长度分别为

$$OA = 1, \quad AC = \tan x,$$

所以直角三角形 OAC 的面积为

$$S_3 = \frac{1}{2} \cdot OA \cdot AC = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \tan x = \frac{1}{2} \tan x.$$

显然, $S_1 < S_2 < S_3$, 从而

$$0 < \sin x < x < \tan x.$$

当 $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ 时, 由上述结论可知

$$|\sin x| \leq |x|.$$

当 $x > 1$ 时, 总有

$$|\sin x| \leq 1 < x = |x|.$$

于是,

$$|\sin x| \leq |x|, \quad \forall x \in [0, +\infty).$$

当 $x < 0$ 时, $-x \in (0, +\infty)$, 由以上结论可得

$$|\sin x| = |\sin(-x)| \leq |-x| = |x|.$$

综上,

$$|\sin x| \leq |x|, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

□


总结:

1. 作业不要抄袭. 字迹要清楚.
2. 以上参考答案保证正确, 但是不一定是最优的.
3. 确界相关的题目, 一定要紧扣确界的定义, 不要想当然的用一些错误结论. 上确界、下确界不一定是集合的最大值、最小值, 上确界、下确界也不一定属于集合. 大家自行总结课堂上、教材和作业中和确界有关的结论和题目, 分为**一般集合的确界问题**和**函数相关的确界问题**. 这些结论我们今后会用到.
4. 不了解数学归纳法的同学, 请自学.
5. 本次作业完成的比较好的同学: **王芹**.
6. 各位同学要在学习上多花时间, 多动笔练习, 勤于思考, 多与其它同学讨论. 课前一定要预习教材内容, 课后及时复习.
7. 各位同学要积极找我答疑. 请提前通过 qq 联系我预约时间, 原则上我只当面答疑, 不接受在线答疑. 我的办公室是系楼 303 办公室后门 A 格, 走西面的门 (前门), 直接推门进入, 不要敲门.

第 6 周

欢度国庆!

第 7 周

 **作业题 7.1** 证明: 对任意 $p > 0$ 以及任意 $a > 1$, 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^p}{a^n} = 0.$$

证明 方法 1. 令 $k = [p] + 1$, $h = a - 1 > 0$, 则当 $n > k$ 时,

$$\begin{aligned} a^n &= (1+h)^n \\ &= 1 + nh + \frac{n(n-1)}{2}h^2 + \cdots + C_n^k h^k + \cdots + h^n \\ &\geq C_n^k h^k = \left(\frac{n}{k} \cdot \frac{n-1}{k-1} \cdots \frac{n-k+1}{1} \right) h^k. \end{aligned}$$

由于 $n > k$, 则易证

$$\frac{n}{k}, \frac{n-1}{k-1}, \cdots, \frac{n-k+1}{1} \geq \frac{n}{k},$$

从而

$$\begin{aligned} a^n &= (1+h)^n \\ &\geq \left(\frac{n}{k} \cdot \frac{n-1}{k-1} \cdots \frac{n-k+1}{1} \right) h^k \\ &\geq \frac{n^k}{k^k} h^k. \end{aligned}$$

于是当 $n > k = [p] + 1$ 时,

$$0 \leq \frac{n^p}{a^n} \leq \frac{k^k}{h^k} \cdot \frac{1}{n^{k-p}}.$$

由于 $k - p > 0$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{k-p}} = 0,$$

由数列极限的迫敛性可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^p}{a^n} = 0.$$

方法 2. 令 $b = a^{\frac{1}{p}}$, 则 $b > 1$, $b^p = a$ 并且

$$\frac{n^p}{a^n} = \left(\frac{n}{b^n} \right)^p.$$

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{b^n} = 0$, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 使得对任意 $n > N$, 都有

$$\left| \frac{n}{b^n} \right| < \varepsilon^{\frac{1}{p}},$$


从而

$$\left| \frac{n^p}{a^n} - 0 \right| = \left| \frac{n}{b^n} \right|^p < \varepsilon, \quad \forall n > N,$$

于是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^p}{a^n} = 0.$$

□

 **作业题 7.2** 证明: 当 $a > 0$ 且 $a \neq 1$ 时, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_a n}{n} = 0.$$

证明 当 $a > 1$, 对任意 $\varepsilon \in (0, 1)$, 有

$$a^{-\varepsilon} < 1 < a^{\varepsilon}.$$

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$, 则根据数列极限的保号性, 存在正整数 N , 使得对任意 $n > N$, 都有

$$a^{-\varepsilon} < (n)^{\frac{1}{n}} < a^{\varepsilon},$$

对上式取底数为 a 的对数可得

$$-\varepsilon < \frac{\log_a n}{n} < \varepsilon,$$

即

$$\left| \frac{\log_a n}{n} \right| < \varepsilon.$$

根据数列极限的 $\varepsilon - N$ 定义可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_a n}{n} = 0.$$

当 $0 < a < 1$ 时, 对任意 $\varepsilon \in (0, 1)$, 有

$$a^{\varepsilon} < 1 < a^{-\varepsilon}.$$

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$, 则根据数列极限的保号性, 存在正整数 N , 使得对任意 $n > N$, 都有

$$a^{\varepsilon} < (n)^{\frac{1}{n}} < a^{-\varepsilon},$$

对上式取底数为 a 的对数可得

$$-\varepsilon < \frac{\log_a n}{n} < \varepsilon,$$


即

$$\left| \frac{\log_a n}{n} \right| < \varepsilon.$$

根据数列极限的 $\varepsilon - N$ 定义可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log_a n}{n} = 0.$$

□

 **作业题 7.3** 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3]{a_n} = \sqrt[3]{a}$.

证明 若 $a = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 使得对任意 $n > N$, 有 $|a_n| < \varepsilon^3$, 从而

$$|\sqrt[3]{a_n} - 0| = |\sqrt[3]{a_n}| < \varepsilon.$$

根据数列极限的 $\varepsilon - N$ 定义就有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3]{a_n} = 0 = \sqrt[3]{a}.$$

若 $a > 0$, 则根据数列极限的保号性, 存在正整数 N 使得对任意 $n > N$ 都有 $a_n > 0$, 此时

$$0 \leq |\sqrt[3]{a_n} - \sqrt[3]{a}| = \frac{|a_n - a|}{(\sqrt[3]{a_n})^2 + \sqrt[3]{a_n} \cdot \sqrt[3]{a} + (\sqrt[3]{a})^2} < \frac{|a_n - a|}{(\sqrt[3]{a})^2}.$$

由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_n - a|}{(\sqrt[3]{a})^2} = 0,$$

根据迫敛性可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |\sqrt[3]{a_n} - \sqrt[3]{a}| = 0,$$


从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3]{a_n} = \sqrt[3]{a}$.

若 $a < 0$, 则根据数列极限的保号性, 存在正整数 N 使得对任意 $n > N$ 都有 $a_n < 0$, 此时仍有

$$0 \leq |\sqrt[3]{a_n} - \sqrt[3]{a}| = \frac{|a_n - a|}{(\sqrt[3]{a_n})^2 + \sqrt[3]{a_n} \cdot \sqrt[3]{a} + (\sqrt[3]{a})^2} < \frac{|a_n - a|}{(\sqrt[3]{a})^2}.$$

根据之前的讨论可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[3]{a_n} = \sqrt[3]{a}$.

□

 **作业题 7.4** 设 $\{a_n\}$ 为正数数列并且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a > 0$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1$ (提示: 用保号性和迫敛性).

证明 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a > 0$, 根据数列极限的保号性, 存在正整数 N , 使得对任意 $n > N$ 都有

$$0 < \frac{1}{2}a < a_n < \frac{3}{2}a,$$

从而

$$0 < \sqrt[n]{\frac{1}{2}a} < \sqrt[n]{a_n} < \sqrt[n]{\frac{3}{2}a}, \quad \forall n > N.$$


由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{2}a} = 1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{3}{2}a},$$

根据迫敛性, 就有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1.$$

□

 **作业题 7.5** 在某些情况下, 非正常极限也具有类似于正常极限的一些性质. 利用 (正、负) 无穷大数列的严格定义证明以下结论

1. (类似于绝对值性质) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = +\infty$.
2. (类似于保号性) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$, 则对任何实数 $c \in \mathbb{R}$, 存在正整数 N , 使得对任何 $n > N$, 都有

$$a_n < c < b_n.$$

3. (类似于加法、乘法法则) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = +\infty.$$

4. (类似于减法、乘法法则) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = -\infty$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = -\infty.$$

5. (类似迫敛性) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, 数列 $\{b_n\}$ 满足

$$a_n \leq b_n, \quad \forall n \in \mathbb{N}_+,$$

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$.

6. (类似于子列性质) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, 则 $\{a_n\}$ 的任何子列 $\{a_{n_k}\}$ 都满足

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = +\infty.$$

证明

1. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$, 则对任意 $M > 0$, 存在正整数 N , 使得对任意 $n > N$, 都有

$$a_n < -M < 0,$$

从而

$$|a_n| > M,$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = +\infty$.

2. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$, 则对任意 $c \in \mathbb{R}$, 存在正整数 N_1, N_2 , 使得对任意 $n > N_1$ 都有 $a_n < c$; 对任意 $n > N_2$ 都有 $b_n > c$. 令 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 则对任意 $n > N$ 就有

$$a_n < c < b_n.$$

3. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$.

(1) 对任意 $M > 0$, 存在正整数 N_1, N_2 , 使得对任意 $n > N_1$, 都有 $a_n > \frac{1}{2}M$; 对任意 $n > N_2$, 都有 $b_n > \frac{1}{2}M$. 令 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 则对任意 $n > N$ 就有

$$a_n + b_n > \frac{1}{2}M + \frac{1}{2}M = M,$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = +\infty$.

(2) 对任意 $M > 0$, 存在正整数 N_1, N_2 , 使得对任意 $n > N_1$, 都有 $a_n > \sqrt{M}$; 对任意 $n > N_2$, 都有 $b_n > \sqrt{M}$. 令 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 则对任意 $n > N$ 就有

$$a_n b_n > \sqrt{M} \cdot \sqrt{M} = M,$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) = +\infty$.

4. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = -\infty$.

(1) 对任意 $M > 0$, 存在正整数 N_1, N_2 , 使得对任意 $n > N_1$, 都有 $a_n > \frac{1}{2}M$; 对任意 $n > N_2$, 都有 $b_n < -\frac{1}{2}M$. 令 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 则对任意 $n > N$ 就有

$$a_n - b_n > \frac{1}{2}M - \left(-\frac{1}{2}M\right) = M,$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = +\infty$.

- (2) 对任意 $M < 0$, 存在正整数 N_1, N_2 , 使得对任意 $n > N_1$, 都有 $a_n > \sqrt{-M}$; 对任意 $n > N_2$, 都有 $b_n < -\sqrt{-M}$. 令 $N = \max\{N_1, N_2\}$, 则对任意 $n > N$ 就有

$$a_n b_n < \sqrt{-M} \cdot (-\sqrt{-M}) = M,$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n b_n) = -\infty$.

5. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, 则对任意 $M > 0$, 存在正整数 N , 使得对任意 $n > N$, 都有 $a_n > M$, 再根据条件可得

$$b_n \geq a_n > M, \quad \forall n > N.$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$.

6. 设 $\{a_{n_k}\}$ 是 $\{a_n\}$ 的任意一个子列, $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, 则对任意 $M > 0$, 存在正整数 N , 使得对任意 $n > N$ 都有 $a_n > M$. 对任意 $k > n_N$, 都有 $n_k \geq k > n_N \geq N$, 从而 $a_{n_k} > M$, 于是

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = +\infty.$$

□

作业题 7.6 计算以下数列的极限.

- $\{\sqrt[n]{n^2 + 1}\}$.
- $a_n = \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{n}}$.
- $\{(n!)^{\frac{1}{n^2}}\}$ (提示: 利用增长速度的顺序和迫敛性).
- $\left\{\frac{\sqrt[3]{n^2 \sin n!}}{n+1}\right\}$.
- $\left\{\frac{1^2}{n^3} + \frac{3^2}{n^3} + \cdots + \frac{(2n-1)^2}{n^3}\right\}$ (提示: 利用第 5 周作业题中的平方和公式).
- $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{1^3+2^3+\cdots+k^3}}$ (提示: 利用第 5 周作业题中的立方和公式).

解

1. 对任意 $n \in \mathbb{N}_+$, 都有

$$1 < \sqrt[n]{n^2 + 1} \leq \sqrt[n]{n^2 + n^2} = \sqrt[n]{2} \cdot \sqrt[n]{n} \cdot \sqrt[n]{n}.$$

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2} = 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sqrt[n]{2} \cdot \sqrt[n]{n} \cdot \sqrt[n]{n} \right) = 1,$$

再根据数列极限的迫敛性可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^2 + 1} = 1.$$

2. 对任意 $n \in \mathbb{N}_+$, 都有

$$1 \leq a_n = \left(1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{n}} \leq \underbrace{\left(1 + 1 + \cdots + 1\right)^{\frac{1}{n}}}_{n \text{ 项}} = \sqrt[n]{n}.$$

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$, 则根据数列极限的迫敛性可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$.

3. 由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 0,$$

根据数列极限的保号性, 存在正整数 N , 使得对任意 $n > N$ 都有

$$0 < \frac{n!}{n^n} < 1,$$

从而

$$1 \leq n! < n^n, \quad \forall n > N,$$

$$1 \leq (n!)^{\frac{1}{n^2}} < (n^n)^{\frac{1}{n^2}} = \sqrt[n]{n}, \quad \forall n > N.$$

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$, 则根据数列极限的迫敛性可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n!)^{\frac{1}{n^2}} = 1.$$

4. 对任意 $n \in \mathbb{N}_+$, 都有

$$0 \leq \left| \frac{\sqrt[3]{n^2} \sin n!}{n+1} \right| \leq \frac{\sqrt[3]{n^2}}{n+1} = \frac{n^{\frac{2}{3}}}{n+1} = \frac{\frac{1}{n^{\frac{1}{3}}}}{1 + \frac{1}{n}}.$$

由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n^{\frac{1}{3}}}}{1 + \frac{1}{n}} = \frac{0}{1+0} = 0,$$

根据数列极限的迫敛性可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\sqrt[3]{n^2} \sin n!}{n+1} \right| = 0,$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{n^2} \sin n!}{n+1} = 0.$$

5. 设

$$S_n = 1^2 + 2^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6},$$

则

$$\begin{aligned} & 1^2 + 3^2 + \cdots + (2n-1)^2 \\ &= [1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + (2n)^2] \\ &\quad - [2^2 + 4^2 + \cdots + (2n)^2] \\ &= S_{2n} - 2^2 (1^2 + 2^2 + \cdots + n^2) \\ &= S_{2n} - 4S_n \\ &= \frac{4n^3 - n}{3}, \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1^2}{n^3} + \frac{3^2}{n^3} + \cdots + \frac{(2n-1)^2}{n^3} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^3 - n}{3n^3} \\ &= \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

6. 由于

$$\begin{aligned}
 a_n &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{1^3 + 2^3 + \cdots + k^3}} \\
 &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{k(k+1)}{2}\right)^2}} \\
 &= \sum_{k=1}^n \frac{2}{k(k+1)} \\
 &= 2 \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\
 &= 2 \left(1 - \frac{1}{n+1} \right),
 \end{aligned}$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \left(1 - \frac{1}{n+1} \right) = 2.$$

□

总结:

1. 我们已经验证过许多极限等式: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^\alpha} = 0$ ($\alpha > 0$), $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$ ($a > 0$) 等, 这些可以直接用, 不需要再重复证明. 除非考试的时候要求你重新验证一遍.
2. 之前没有验证的极限等式, 一定要详细证明出来后才能使用. 如果你不确定是否验证过, 不妨重新验证一遍.
3. 用 $\varepsilon - N$ 定义验证极限时, 正整数 N 只能依赖于 ε , 不能依赖 n .
4. 我们课上讲的数列收敛的性质有一个大前提: $\{a_n\}, \{b_n\}$ 都收敛于实数. 在这个前提下才能使用收敛数列的性质, 例如四则运算法则. 某些特殊情况下, 无穷大数列也具有类似于收敛数列的性质, 例如本周作业第 5 大题. 但是这只是形式上类似, 并不能实质等同, 不要随便使用四则运算法则. 严格来讲, $0 \cdot \infty, \infty \cdot \infty$ 等都是没有意义的.
5. 除了第 5 大题给出的结论外, 还有其它涉及无穷大数列的类似结论, 各位同学自行总结和证明. 当然, 也要总结不成立的情况, 例如:
若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = +\infty$, 则不一定有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = +\infty, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = +\infty.$$

反例: $a_n = n = b_n$.

6. 学过的内容和题目要花大量时间反复看反复练习. 熟练之后, 原先很难的题目都会变成套路题, 就像你们现在已经熟悉的

$$\frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \cdots + \frac{2n-1}{2^n}$$

求和这种.

7. 本次作业完成的比较好的同学, 一个也没有.

第 8 周

作业题 8.1 证明

(1) 设 $\{a_n\}$ 是一列递增数列并且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 则

$$a = \sup_n \{a_n\}.$$

特别地, 若 $\{a_n\}$ 还是一个严格增数列, 则

$$a_n < a, \quad \forall n \in \mathbb{N}_+.$$

(2) 设 $\{a_n\}$ 是一列递减数列并且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 则

$$a = \inf_n \{a_n\}.$$

特别地, 若 $\{a_n\}$ 还是一个严格减数列, 则

$$a_n > a, \quad \forall n \in \mathbb{N}_+.$$

证明 (1) 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 则 $\{a_n\}$ 是有界数列. 又因为 $\{a_n\}$ 单调递增, 根据单调有界定理, 就有 (第一个等号就是单调有界定理的结论)

$$\sup_n \{a_n\} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a.$$

若 $\{a_n\}$ 还是严格增数列, 下证

$$a_n < a, \quad \forall n \in \mathbb{N}_+.$$

反证法, 假设存在 $n_0 \in \mathbb{N}_+$ 使得 $a_{n_0} \geq a$, 则根据严格增性, 就有

$$a_{n_0+1} > a_{n_0} \geq a,$$

这与 $a = \sup_n \{a_n\}$ 矛盾.

(2) 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 则 $\{a_n\}$ 是有界数列. 又因为 $\{a_n\}$ 单调递减, 根据单调有界定理, 就有

$$\inf_n \{a_n\} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a.$$

若 $\{a_n\}$ 还是严格减数列, 下证

$$a_n > a, \quad \forall n \in \mathbb{N}_+.$$

反证法, 假设存在 $n_0 \in \mathbb{N}_+$ 使得 $a_{n_0} \leq a$, 则根据严格减性, 就有

$$a_{n_0+1} < a_{n_0} \leq a,$$

这与 $a = \inf_n \{a_n\}$ 矛盾. □

作业题 8.2 Cauchy 数列的几种等价形式:

(i) 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 使得对任意 $m, n > N$, 都有

$$|a_m - a_n| < \varepsilon.$$

(ii) 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 使得对任意 $n > N$ 以及任意 $m \geq n$, 都有

$$|a_m - a_n| < \varepsilon.$$

(iii) 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 使得对任意 $n > N$ 以及任意 $p \in \mathbb{N}$, 都有

$$|a_{n+p} - a_n| < \varepsilon.$$

证明上述三种形式的等价性:

(1) 若数列 $\{a_n\}$ 满足条件 (i), 则也满足 (ii);

(2) 若数列 $\{a_n\}$ 满足条件 (ii), 则也满足 (iii);

(3) 若数列 $\{a_n\}$ 满足条件 (iii), 则也满足条件 (i).

证明 (1) 设数列 $\{a_n\}$ 满足条件 (i), 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 使得对任意 $m, n > N$, 都有

$$|a_m - a_n| < \varepsilon.$$

于是对任意 $n > N$ 以及任意 $m' \geq n$, 有 $m', n > N$, 从而

$$|a_{m'} - a_n| < \varepsilon.$$

所以 $\{a_n\}$ 也满足条件 (ii).

(2) 设数列 $\{a_n\}$ 满足条件 (ii), 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 使得对任意 $n > N$ 以及任意 $m \geq n$, 都有

$$|a_m - a_n| < \varepsilon.$$

于是, 对任意 $p \in \mathbb{N}$ 以及任意 $n > N$, 有 $n + p \geq n > N$, 从而

$$|a_{n+p} - a_n| < \varepsilon.$$

所以 $\{a_n\}$ 也满足条件 (iii).

(3) 设数列 $\{a_n\}$ 满足条件 (iii), 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 使得对任意 $n > N$ 以及任意 $p \in \mathbb{N}$, 都有

$$|a_{n+p} - a_n| < \varepsilon.$$

对任意 $m, n > N$, 要么有 $m \geq n > N$, 要么有 $n > m > N$. 若 $m \geq n > N$, 令 $p = m - n$, 则 $p \in \mathbb{N}$, 从而


$$|a_m - a_n| = |a_{n+p} - a_n| < \varepsilon.$$

若 $n > m > N$, 令 $p = n - m$, 则 $p \in \mathbb{N}$, 从而

$$|a_n - a_m| = |a_{m+p} - a_m| < \varepsilon.$$

所以 $\{a_n\}$ 也满足条件 (i).

□

 **作业题 8.3** 设 $\{a_n\}$ 是一个数列. 若存在正整数 N_0 , 使得对任意 $m, n > N_0$, 都有

$$|a_m - a_n| \leq b_n,$$

其中 $\{b_n\}$ 是一个无穷小数列, 证明 $\{a_n\}$ 是 Cauchy 数列.

证明 由条件可知 $b_n \geq 0, \forall n \in \mathbb{N}_+$. 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N_1 , 使得对任意 $n > N_1$, 都有

$$0 \leq b_n < \varepsilon.$$

令 $N = \max\{N_0, N_1\}$, 则对任意 $m, n > N$, 就有

$$|a_m - a_n| \leq b_n < \varepsilon,$$

所以 $\{a_n\}$ 是 Cauchy 数列. □

 **作业题 8.4** 设 $c > 0$ 是一个正数, 数列 $\{a_n\}$ 满足:

$$a_1 \in \left(0, \frac{1}{c}\right), \quad a_{n+1} = a_n(2 - ca_n).$$

证明 $\{a_n\}$ 收敛, 并求出 $\{a_n\}$ 的极限.

(提示: 先让 a_1 取某个特定值, 例如 $a_1 = \frac{1}{2c}$, 据此寻找规律.)

证明 Step1. 先证

$$0 < a_n < \frac{1}{c}, \quad \forall n \in \mathbb{N}_+.$$

当 $n = 1$ 时, 显然 $0 < a_1 < \frac{1}{c}$.

假设当 $n = k$ 时, $0 < a_k < \frac{1}{c}$, 则

$$0 < \left|a_k - \frac{1}{c}\right| < \frac{1}{c},$$

于是当 $n = k + 1$ 时, 有

$$\begin{aligned} a_{k+1} &= a_k(2 - ca_k) \\ &= 2a_k - ca_k^2 \\ &= -c\left(a_k - \frac{1}{c}\right)^2 + \frac{1}{c} \\ &\in \left(0, \frac{1}{c}\right). \end{aligned}$$

结论得证.

Step2. 根据 Step1 的结论, 对任意 $n \in \mathbb{N}_+$, 就有

$$a_{n+1} = a_n(2 - ca_n) > a_n\left(2 - c \cdot \frac{1}{c}\right) = a_n,$$

所以 $\{a_n\}$ 严格增. 根据单调有界定理, $\{a_n\}$ 收敛, 存在 $a \in \mathbb{R}$ 使得

$$a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \sup_n a_n > 0.$$

Step3. 在等式

$$a_{n+1} = a_n(2 - ca_n)$$

两端取极限可得

$$a = a(2 - ca),$$

解得 $a = \frac{1}{c}$. 所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1}{c}.$$

□

注 该题提供了计算给定正数 c 的倒数的一种迭代算法.

 **作业题 8.5**


(1) 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n > 0$ 并且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{a_n}\right)^{a_n} = e.$$

(提示: $[a_n] \leq a_n < [a_n] + 1$, $\{[a_n]\}$ 是 \mathbb{N}_+ 的子列, 用两个与 $[a_n]$ 有关的数列把 $\left(1 + \frac{1}{a_n}\right)^{a_n}$ “包”起来.)

(2) 设数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_n < -1$ 并且 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = -\infty$, 证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{b_n}\right)^{b_n} = e.$$

 **注意** 虽然 $\{[a_n]\}$ 是正整数构成的数列, 但是它的单调性未知, $\{[a_n]\}$ 不一定是 \mathbb{N}_+ 的子列. 若 $\{[a_n]\}$ 是严格增的数列, 则 $\{[a_n]\}$ 才是 \mathbb{N}_+ 的子列.

证明 (1) Step1. 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, 则存在正整数 N_0 , 使得

$$a_n > 1, \quad \forall n > N_0,$$

从而

$$1 \leq [a_n] \leq a_n < [a_n] + 1, \quad \forall n > N_0, \quad (8.1)$$

进而

$$\begin{aligned} 1 + \frac{1}{[a_n] + 1} &< 1 + \frac{1}{a_n} \leq 1 + \frac{1}{[a_n]}, \quad \forall n > N_0, \\ \left(1 + \frac{1}{[a_n] + 1}\right)^{[a_n]} &\leq \left(1 + \frac{1}{[a_n] + 1}\right)^{a_n} \\ &< \left(1 + \frac{1}{a_n}\right)^{a_n} \\ &\leq \left(1 + \frac{1}{[a_n]}\right)^{a_n} < \left(1 + \frac{1}{[a_n]}\right)^{[a_n] + 1}, \quad \forall n > N_0. \end{aligned} \quad (8.2)$$

Step2. 下证以下一般性命题.

命题 8.1

设 f 是定义在 \mathbb{R} 上的函数, 则 $\{f(n)\}$ 是一个数列. 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = A,$$

则对任意一列无穷大正整数数列 $\{a_n\}$, 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = A.$$

事实上, 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = A$, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N_0 , 使得对任意 $m > N_0$, 都有

$$|f(m) - A| < \varepsilon. \quad (8.3)$$

又因为 $\{a_n\}$ 是无穷大正整数数列, 则存在正整数 N , 使得对任意 $n > N$, 都有 $a_n > N_0$, 此时, 令 $m = a_n$ 并代入(8.3)式便得到

$$|f(a_n) - A| < \varepsilon, \quad \forall n > N.$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = A.$$

命题得证.

Step3. 由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$, 根据(8.1)式可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} [a_n] = +\infty.$$

又因为

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n &= e, \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} &= e, \end{aligned}$$

由 Step2 的结论可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{[a_n] + 1}\right)^{[a_n]} = e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{[a_n]}\right)^{[a_n] + 1}.$$

根据(8.2)式以及数列极限的迫敛性可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{a_n}\right)^{a_n} = e.$$

(2) 设 $a_n = -b_n$, 由条件可知 $a_n > 1$ 并且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + 1) = +\infty.$$

另一方面,

$$\begin{aligned} &\left(1 + \frac{1}{b_n}\right)^{b_n} \\ &= \left(1 - \frac{1}{a_n}\right)^{-a_n} \\ &= \left(\frac{a_n}{a_n - 1}\right)^{a_n} \\ &= \left(1 + \frac{1}{a_n - 1}\right)^{a_n - 1} \cdot \left(1 + \frac{1}{a_n - 1}\right). \end{aligned}$$

由本题 (1) 部分的结果可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{a_n - 1}\right)^{a_n - 1} = e.$$

又因为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{a_n - 1}\right) = 1 + 0 = 1,$$

所以

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{b_n}\right)^{b_n} = e \cdot 1 = e.$$

□

注 Step2 中的命题提供了计算数列极限时一种常用技巧——变量代换技巧. 事实上, 还有其他类型的变量代换技巧: 命题中的 A 也可以是 $+\infty$, $-\infty$ 和 ∞ (证明方法同学们自己总结).

总结:

1. 各位同学在写题目的证明过程或者解答过程时, 字迹和逻辑务必清晰, 让别人知道你到底在写什么.
2. 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 N 使得 $\forall n > N$, 有 $a_n < a + \varepsilon$, 这并不能得出 $a_n \leq a$, 因为 a_n 并不是固定的数. 反例 $a_n = \frac{1}{n}$, $a = 0$.
3. 第 2 题, 大家一定要清楚到底要证明什么, 仔细看一下我给出的参考答案的逻辑和思路.
4. 本次作业同学们的完成状况都非常差. 有些同学连极限的 $\varepsilon - N$ 定义都没有掌握, 存在符号 \exists 写成 E , “ $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}_+$ ” 写成 “ $\exists \varepsilon > 0, \forall N \in \mathbb{N}_+$ ”. 第 1 题里面, 根据收敛数列的有界性, $\{a_n\}$ 是有界数列. 这样一句话就得出 $\{a_n\}$ 有上界, 许多同学却没用这个结论, 自己去证明又是错误百出.
5. 有一些同学, 5 道题目只做了第 1 题 (还做错了), 其他题都空着. 有时间参加这个活动那个活动, 就没时间做做作业, 复习一下学过的内容吗?