

TALG. Techniques algébriques

QCOP TALG.1

3. a) Résultat. $\text{Card}(\mathcal{P}(E)) = 2^{\text{Card}(E)}$.

Il s'agit de la somme des coefficients binomiaux :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^k 1^{n-k} = (1+1)^n = 2^n.$$

- b) Résultat. $\text{Card}(\mathcal{P}(E \times F)) = 2^{\text{Card}(E) \times \text{Card}(F)}$ car $\text{Card}(E \times F) = \text{Card}(E) \times \text{Card}(F)$.

Remarquons que, en général, $\text{Card}(\mathcal{P}(E \times F)) \neq \text{Card}(\mathcal{P}(E)) \times \text{Card}(\mathcal{P}(F))$.

QCOP TALG.2

3. Résultat. $\frac{\binom{n}{k}}{\binom{n}{k+1}} = \frac{k+1}{n-k}$.

QCOP TALG.3

2. Résultat. $S_n = \binom{p+n+1}{p+1}$.

Cet exercice est fait dans le Cahier de calcul en Terminale.

Dans la version 1.5.0, il s'agit de l'énoncé 22.20 de la fiche Term-DENO-01.

QCOP TALG.4

1. Résultat. $a^n - b^n = (a-b) \sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{n-1-k}$.

On pourra procéder par télescope.

2. Remarquer que $P(x) = P(x) - \underbrace{P(c)}_{=0}$ et utiliser la formule précédente.

Exercice : écrire et démontrer un résultat analogue pour $n \in \mathbb{N}^*$ quelconque (ici, c'est le cas $n = 3$).