

## Colle 5 • INDICATIONS

### Nombres complexes

#### Exercice 5.1

Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Soit  $t \in \mathbb{R}$  tel que  $e^{it} \neq 1$ .

Calculer la somme :

$$\sum_{k=1}^n \sin\left(kt + \frac{\pi}{4}\right).$$

*indication*

$$\text{Calculer } \sum_{k=1}^n e^{i\left(kt + \frac{\pi}{4}\right)} = e^{i\frac{\pi}{4}} \sum_{k=1}^n e^{ikt}.$$

*résultat*

$$\sum_{k=1}^n \sin\left(kt + \frac{\pi}{4}\right) = \sin\left((n+1)\frac{t}{2} + \frac{\pi}{4}\right) \frac{\sin\left(n\frac{t}{2}\right)}{\sin\left(\frac{t}{2}\right)}.$$

#### Exercice 5.2

Soit  $z \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$ .

Déterminer une condition nécessaire et suffisante sur  $|z|$  pour que

$$\frac{1+z}{1-z} \in i\mathbb{R}.$$

*indication*

$$\text{On a, pour } u \in \mathbb{C}, u \in i\mathbb{R} \iff \bar{u} = -u.$$

*résultat*

$$\frac{1+z}{1-z} \in i\mathbb{R} \iff |z| = 1.$$

#### Exercice 5.3

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ .

Déterminer les solutions dans  $\mathbb{C}$  de l'équation

$$(z+1)^n = (z-1)^n.$$

### Exercice 5.4

Soient  $x, y, z \in \mathbb{R}$ . On définit :

$$a := e^{ix}, \quad b := e^{iy} \quad \text{et} \quad c := e^{iz}.$$

Exprimer, en fonction de  $x, y$  et  $z$  le module et un argument du nombre complexe

$$\frac{c^2 + ab}{ab}.$$

#### indication

Commencer par montrer que :

$$\frac{c^2 + ab}{2} = 2 \cos\left(z - \frac{x+y}{2}\right) e^{i\left(z - \frac{x+y}{2}\right)}.$$

On distingue ensuite deux cas selon le signe de  $\cos\left(z - \frac{x+y}{2}\right)$ .

#### résultat

$\exists k \in \mathbb{Z} : -\frac{\pi}{2} + 2k\pi \leq z - \frac{x+y}{2} \leq \frac{\pi}{2} + 2k\pi$	module $2 \cos\left(z - \frac{x+y}{2}\right)$	un argument $z - \frac{x+y}{2}$
$\exists k \in \mathbb{Z} : \frac{\pi}{2} + 2k\pi < z - \frac{x+y}{2} < \frac{3\pi}{2} + 2k\pi$	$-2 \cos\left(z - \frac{x+y}{2}\right)$	$\pi + z - \frac{x+y}{2}$

### Exercice 5.5

Pour  $z \in \mathbb{C} \setminus \{2\}$ , on pose

$$h(z) := \frac{z+1}{z-2}.$$

Déterminer l'ensemble des nombres complexes  $z \in \mathbb{C}$  pour lesquels :

1.  $|h(z)| = 1$  ;
2.  $\Re(h(z)) = 0$ .

#### résultat

1. Droite d'équation  $x = \frac{1}{2}$ .
2. Cercle de centre  $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$  et de rayon  $\frac{3}{2}$ , sans le point  $(2, 0)$ .

### Exercice 5.6

Soient  $a, b \in \mathbb{C}$ .

1. Montrer que

$$|a - b|^2 \leq (1 + |a|^2)(1 + |b|^2).$$

2. Étudier le cas d'égalité.

*indication*

1. L'inégalité triangulaire donne  $|a - b|^2 \leq |a|^2 + |b|^2 + 2|ab|$  et on utilise l'inégalité arithmético-géométrique pour obtenir

$$2|ab| \leq 1 + |ab|^2,$$

et conclure.

2. Il suffit d'avoir égalité dans les deux majorations faites ci-dessus.

*résultat*

$$|a - b|^2 \leq (1 + |a|^2)(1 + |b|^2) \iff \exists \theta \in \mathbb{R}, R \in \mathbb{R}_+^* : a = Re^{i\theta} \text{ et } b = \frac{-1}{R}e^{i\theta}.$$

### Exercice 5.7 Noyaux de Dirichlet et de Féjer.

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$ . On pose, pour  $t \in \mathbb{R}$ ,

$$D_n(t) := \sum_{k=-n}^n e^{ikt} \quad \text{et} \quad K_n(t) := \frac{1}{n} \sum_{m=0}^{n-1} D_m(t).$$

1. Soit  $t \in \mathbb{R}$  tel que  $t \equiv 0 \pmod{2\pi}$ . Calculer  $D_n(t)$  et  $K_n(t)$ .  
2. Soit  $t \in \mathbb{R}$  tel que  $t \not\equiv 0 \pmod{2\pi}$ . Montrer que

$$D_n(t) = \frac{\sin\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)t\right)}{\sin\left(\frac{t}{2}\right)}.$$

3. Soit  $t \in \mathbb{R}$  tel que  $t \not\equiv 0 \pmod{2\pi}$ .

(a) Calculer  $\sum_{m=0}^{n-1} e^{i\left(n + \frac{1}{2}\right)mt}$ .

(b) En déduire  $K_n(t)$ .

*résultat*

Si  $t \equiv 0 \pmod{2\pi}$ ,

$$D_n(t) = 2n + 1 \quad \text{et} \quad K_n(t) = n.$$

Si  $t \not\equiv 0 \pmod{2\pi}$ ,

$$D_n(t) = \frac{\sin\left(\left(n + \frac{1}{2}\right)t\right)}{\sin\left(\frac{t}{2}\right)},$$

$$\sum_{m=0}^{n-1} e^{i\left(n + \frac{1}{2}\right)mt} = e^{i\frac{n}{2}t} \frac{\sin\left(\frac{nt}{2}\right)}{\sin\left(\frac{t}{2}\right)} \quad \text{et} \quad K_n(t) = \frac{1}{n} \left( \frac{\sin\left(\frac{nt}{2}\right)}{\sin\left(\frac{t}{2}\right)} \right)^2.$$

### Exercice 5.8

Soit  $\theta \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ . On définit

$$\Delta_\theta := \left\{ z \in \mathbb{C} \mid \begin{cases} |z| < 1 \\ \exists \rho \in ]0, \cos(\theta)[, \exists \varphi \in ]-\theta, \theta[ : z = 1 - \rho e^{i\varphi} \end{cases} \right\}.$$

1. Dessiner  $\Delta_\theta$  dans le plan complexe.

2. Montrer que

$$\forall z \in \mathbb{C}, \quad |z| < 1 \implies \frac{1}{1 - |z|} \leq \frac{2}{1 - |z|^2}.$$

3. Montrer que

$$\forall z \in \Delta_\theta, \quad \frac{|1 - z|}{1 - |z|} \leq \frac{2}{\cos(\theta)}.$$

#### indication

3. Si  $z = 1 - \rho e^{i\varphi} \in \Delta_\theta$ ,  $|1 - z| = \rho$  et appliquer la question précédente, en développant le dénominateur pour faire apparaître  $\cos(\varphi)$ , puis, par monotonie de  $\cos$ ,  $\cos(\theta)$ .