

# Formules de Taylor

## QCOP TAYL.1

- ☰ Énoncer la formule de Taylor avec reste intégral.
- ✍ Énoncer et démontrer l'inégalité de Taylor-Lagrange.
- ✂ Soit  $x \in \mathbb{R}$ .

(a) Soit  $n \in \mathbb{N}$ . Montrer que

$$\left| e^x - \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} \right| \leq \max(e^x, 1) \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

(b) En déduire que

$$e^x = \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=0}^N \frac{x^n}{n!}.$$

## QCOP TAYL.2

- ✍ Énoncer et démontrer la formule de Taylor avec reste intégral.
- ✂ Soit  $x \in \mathbb{R}_+$ . Soit  $n \in \mathbb{N}$ .

(a) Montrer que

$$e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + \int_0^x e^t \frac{(x-t)^n}{n!} dt.$$

(b) En déduire que

$$e^x \geq 1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^n}{n!}.$$

## QCOP TAYL.3

- ✍ Énoncer et démontrer la formule de Taylor avec reste intégral.
- ✂ Soit  $g : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $\mathcal{C}^2$ .  
Montrer que

$$\forall x \geq 0, \quad g(x) = g(1) + g'(1)(x-1) + (x-1)^2 \int_0^1 g''(1+(x-1)u)(1-u) du.$$

## QCOP TAYL.4

- ✍ Énoncer et démontrer la formule de Taylor pour les polynômes.
- ✂ Soit  $n \in \mathbb{N}$  tel que  $n \geq 2$ . Soit  $P \in \mathbb{R}_n[X]$ .  
Soit  $a \in \mathbb{R}$ . Montrer que

$$\left( \exists Q \in \mathbb{R}_{n-2}[X] : \begin{cases} Q(a) \neq 0 \\ P = (X-a)^2 Q \end{cases} \right) \iff \begin{cases} P(a) = P'(a) = 0 \\ P''(a) \neq 0. \end{cases}$$