

力降低造成的。苗龄较大，前期产量较低，但中后期产量高，生育期相对地延长。所以日光温室冬春茬果菜类栽培，苗龄不宜太大，而温室大棚春茬果菜类栽培以尽量争取提早采收期，需要培育较大的秧苗。

表 21 定植时的蔬菜秧苗苗龄

蔬菜种类	栽培方式	苗 龄				其它性状说明
		叶片数	茎 粗 (厘米)	茎 高 (厘米)	现蕾情况	
番 茄	保护地早熟栽培	8~9	>0.5	20~25	现大蕾	苗干重 1.5 克左右
	露地早熟栽培	8~9	≥0.5	20~25	现大蕾	苗干重 1.5 克左右
辣 椒	保护地早熟栽培	12~14		20 左右	现大蕾	苗干重 0.6 克左右
	露地早熟栽培	9~12		18 左右	现蕾	苗干重 0.5 克左右
茄 子	早熟栽培	8~9	≥0.5	18~25	现大蕾	苗干重 1 克左右
黄 瓜	温 室	4~5	0.6~0.7	17~20	初见雌花	无花打顶
	大 棚	4~6	0.6~0.7	17~22	瓜 组 明显见雌	无花打顶
	露 地	3~4			花 瓜 组	
美洲南瓜	小 拱	5~6	≥0.7			
	露 地	5	≥0.6			
西 瓜	露 地	3~4				
冬 瓜	露 地	3~4				
甜 瓜	露 地	4				
结球甘蓝	露地早熟栽培	6~8				未春化，下胚轴和节间宜短