

# Entrega 6 - GRAFOS

Enzo Giannotta

9 de junio de 2023

## Entrega 5 - Viernes 16/05/2023

**Ejercicio 0.1.** 1. Para todo  $n \geq 2$ , encuentre un grafo bipartito en  $2n$  vértices tal que estos se pueden ordenar de modo que el algoritmo glotón use  $n$  colores en lugar de 2.

2. Un grafo  $G$  con  $\chi(G) = k$  es llamado  $k$ -**crítico** si  $\chi(G \setminus \{v\}) < k$  para todo vértice  $v \in G$ . Determine los grafos 3-críticos.

*Solución.* 1. Construiremos una familia de grafos bipartitos  $\mathbf{B}_n, n \geq 2$  de  $2n$  vértices con los vértices ordenados de cierta manera que el algoritmo glotón use  $n$  colores. Llamamos  $A_n, B_n$  a una partición de los vértices de manera que cada partición tiene sus vértices independientes, con  $|A_n| = n = |B_n|$ . Cuando  $n = 2$ , consideramos  $A_2 = a_1, a_2, B_2 = \{b_1, b_2\}$  y agregamos una arista para cada par  $a, b$  con  $a \in A_2, b \in B_2$ . Por último ordenamos,  $v_1 = a_1, v_2 = b_1, v_3 = a_2, v_4 = b_2$ . Luego el algoritmo glotón pinta a los vértices  $v_i$  con dos colores: 1, 2, 1, 2. Notar que este orden hace que el algoritmo glotón pinte con 2 colores tanto  $A_2$  como  $B_2$ .

Supongamos ahora que hemos construido  $\mathbf{B}_n$  y ordenado sus vértices como  $v_1, \dots, v_{2n}$  y más aún, que el algoritmo glotón pintó con  $n$  colores distintos  $A_n$  y lo mismo para  $B_n$ . Construimos  $\mathbf{B}_{n+1}$  agregando a  $\mathbf{B}_n$  dos vértices  $a_{n+1}$  y  $b_{n+1}$ , más específicamente:  $A_{n+1} := A_n \cup \{a_{n+1}\}$  y  $B_{n+1} := B_n \cup \{b_{n+1}\}$ . Por último, agregamos aristas  $a_{n+1}b$  para todo  $b \in B_n$  y  $ab_{n+1}$  para todo  $a \in A_n$ . Ahora, ordenamos  $v_1, \dots, v_{2n}$  como el orden de los vértices de  $\mathbf{B}_n$  y luego tomamos  $v_{2n+1} := a_{n+1}, v_{2n+2} := b_{n+1}$ . Notar que este orden pinta cada conjunto de la partición  $A_{n+1}, B_{n+1}$  con  $n + 1$  colores, en efecto, por hipótesis inductiva el algoritmo glotón pinta  $v_1, \dots, v_{2n}$  de tal manera que  $A_n$  y  $B_n$  usan  $n$  colores, luego  $v_{2n+1} = a_{n+1}$  lo pinta de color  $n + 1$  porque es adyacente a todos los vértices de  $B_n$  y análogamente para  $v_{2n+2} = b_{n+1}$  (notar que  $b_{n+1}$  no es adyacente a  $a_{n+1}$ ).

2. Veamos que los grafos 3-críticos son los ciclos impares. Claramente los ciclos impares son 3-coloreables y si sacamos cualquier vértice, tiene número cromático a lo más 2, por ser camino.

Recíprocamente, supongamos que  $G$  es un grafo 3-crítico.  $G$  tiene un ciclo impar porque si no sería bipartito, i.e. 2-coloreable. Más aún, todo vértice tiene que ser un vértice de este ciclo, de lo contrario quitarlo nos daría un grafo a lo más 2-coloreable, pero ese coloreo serviría para colorear un ciclo impar,

imposible. En otras palabras,  $G$  es un grafo generado por un ciclo impar  $C$ , veamos a su vez que  $G[C] = C$ . En efecto, si hubiera una cuerda  $xy$  de  $C$  en  $G$ , entonces la cuerda forma dos subciclos  $C_1, C_2 \subsetneq G$  tales que  $V(C_1) \cup V(C_2) = V(C)$  (ver la siguiente ilustración). Como  $C$  tiene orden impar, alguno de los subciclos  $C_1$  o  $C_2$  también tiene que tener orden impar, digamos  $C_1$ ; con lo cual,  $G \setminus \{w\}$  para cualquier  $w \in V(G) \setminus V(C_1)$ , no puede tener un 1,2-coloreo porque contiene un subciclo impar:  $C_1$ , absurdo.




Figura 1: Ilustración de una cuerda  $xy$  en un grafo  $G$  generado por un ciclo impar.

□