

קורס אבחנות ב' אבחנת ילדים (ג'וליאן סקוט)

• התבוננות

• פנים ו – shen

• תנועתיות הגוף

• פתחים

• וריד האצבע

• הפרשות

התבוננות

- אבחנה זו היא החשובה ביותר בילדים מבין 4 השיטות.
- הדבר החשוב ביותר לאבחן הוא מצב עודף או חוסר ומהי רמת הצ'י הכללית בגוף.
- אצל מבוגרים, הדבר הכי חשוב לאבחן הוא מיקום המחלה – באיזה איבר מדובר.
- האבחנה המדויקת בילד תיעשה ע"י תשאול ההורים (לרוב, האם).
- רמת הצ'י הכללית נבחנת ע"י התבוננות. לרוב, זה נעשה במשך מספר שניות בלבד – אלו השניות החשובות ביותר באבחנה...
- ע"י התבוננות ראשונית, ניתן לקבוע את הפרוגנוזה (הצלחת הטיפול). הילד בריא יותר, ככל שהאנרגיה שלו טובה יותר, העיניים בוהקות יותר וצבע הפנים פחות עמום.

פנים ו – Shen

- ▶ התבוננות בפנים הינה החשובה ביותר מבין כל השיטות. זה מתחיל בהתבוננות כללית בפני הילד, על מנת לאבחן את המצב הכללי של הילד עם התבוננות מיוחדת בעיניים, המשקפות את מצב ה – Shen.
- ▶ עיניים בוהקות ותגובה מהירה מעידות על ילד פעיל עם Shen טובה. כל מחלה תהיה מתונה.
- ▶ ילד פסיבי, עייף וישנוני עם Shen עייפה, עיניים ללא הבעה ותגובה מועטה לאנשים ולסימולציה או ללא תגובה כלל מעידים על מחלה קשה.
- ▶ צבע הפנים של הילד יכול להשתנות במהירות ומשקף את מצב בריאותו של הילד. אבחנה זו טובה יותר מאבחנת לשון, כיוון שזו משתנה באיטיות ולעיתים קשה להתבונן בה. אבחנה זו עדיפה גם על אבחנת דופק, אשר קשה לאבחון בגיל צעיר וגם משתנה במהירות עקב מחשבות ורגשות של הילד.

תנועתיות הגוף


- כולל גדילה והתפתחות, תנועות גוף, יציבה ופעילות.
- לעיתים מדדים אלו (תנועות, יציבה ופעילות) יכולים להוביל אותנו לאבחנה, אך קשה לתאר זאת בטבלאות. יש מקום לאינטואיציה.



פתחים

➤ חשוב לאבחנה.

➤ כולל את הלשון, חלל הפה, אוזניים, אף, עיניים ואת הפתחים התחתונים (פתחי יין – שופכה ואנוס).



וריד האצבע (ורידון = Venule)

■ אבחנה זו הייתה נחשבת ביותר בסוף תקופת שושלת מינג (1368-1644) ואף תיעדו ותיארו את האבחנה הזו על גבי 10 עמודים בספר Acupuncture & Moxibation. כיום, לוקחים בחשבון רק חלק קטן מאבחנה זו.

■ הוריד נמצא בין LI2 ל- LI3.

■ 3 שערות: וריד שעבר את שער הצ'י משקף מחלה קלה/מתונה, וריד שעבר את שער הצ'י משקף מחלה חמורה, וריד שעבר את שער החיים משקף סכנת חיים.

■ לפי ג'וליאן סקוט, נוכחות הוריד הינה אינדיקציה לפתוגן (פתוגן אלים כמו במחלות אקוטיות או פתוגן מתון כמו ב- LPF). לא תמיד הוריד נראה. היעדרותו של הוריד אינה מעידה על היעדרות פתוגן.

אבחנת וריד האצבע בילדים




Fig. 53 The "Three Gates" on an infant's index finger