

אבחנה מבדלת - צ'י, דם ונוזלים

זיהוי התבניות על פי צ'י, דם ונוזלי גוף מבוסס על השינויים הפתולוגיים של חומרים חיוניים אלה. תבניות אלו מתארות את הביטויים הקליניים המתעוררים כאשר הצ'י, הדם או נוזלי הגוף נמצאים במצב פתולוגי. ישנה חפיפה מסוימת בין תבניות אלו לבין התבניות על פי שמונה העקרונות והאיברים הפנימיים. התבניות על פי צ'י, דם ונוזלי גוף חשובות מכיוון שהן משלימות את התמונה הקלינית העולה מתבניות שמונה העקרונות והאיברים הפנימיים.

זיהוי דפוס נוזלי גוף

- חוסר בנוזלי גוף
- בצקת
- ליחה

זיהוי דפוסים בדם

- מחסור בדם
- סטזיס בדם
- חום בדם
- איבוד דם

זיהוי דפוסים של צ'י

- חוסר בצ'י
- צ'י שוקע
- סטגנציה של צ'י
- צ'י סורר

זיהוי דפוסים של צ'י

הדפוסים הפתולוגיים של חוסר איזון בצ'י מתחלקים לארבעה סוגים עיקריים. כל דפוס מציג תמונה קלינית ייחודית ודורש גישת טיפול שונה.

1

חוסר צ'י

קוצר נשימה קל, קול חלש, הזעה ספונטנית, תיאבון ירוד, צואה רכה, עייפות, דופק חלש. שכיח בריאות ובטחול.

נקודות טיפול: ST-36 (Zusanli)-I Ren-6 (Qihai)

2

צ'י שוקע

תחושת כובד, עייפות, אדישות, דיכאון נפשי, צניחה של איברים (קיבה, רחם, מעיים, פי הטבעת, נרתיק או שלפוחית השתן), דופק חלש.

נקודות טיפול: Du-20 Baihui עם מוקסה

3

קיפאון צ'י

תחושת נפיחות, כאב מתפשט המשתנה ממקום למקום, דיכאון, עצבנות, תחושה קודרת, תנודות מצב רוח, אנחות תכופות, דופק מתוח.

הכבד הוא האיבר העיקרי המושפע מחסימת צ'י.

4

צ'י סורר

מתרחש כאשר הצ'י זורם בכיוון הלא נכון. בדרך כלל מתאר זרימה לא תקינה כלפי מעלה.

נקודות טיפול: KI-1 Yongquan לריסון הצ'י הסורר

כיווני זרימת הצ'י לפי איברים

הכיוון הנורמלי של הצ'י משתנה מאיבר לאיבר. הבנת כיוון הזרימה הפיזיולוגי חיונית לאבחון צ'י סורר.

זרימה כלפי מעלה ולכל הכיוונים

→ צ'י הטחול

כלפי מעלה - הכיוון הייחודי

→ צ'י הכבד

לכל הכיוונים וכלפי מעלה



זיהוי צ'י סורר חשוב מבחינת הטיפול, שכן קיימים צמחי מרפא ונקודות דיקור ספציפיות לריסון הצ'י הסורר. נקודת KI-1 Yongquan היא ההפך מ-Du-20 Baihui.

זרימה כלפי מטה

→ צ'י הקיבה

כלפי מטה

→ צ'י הריאות

כלפי מטה

→ צ'י הלב

כלפי מטה

→ צ'י המעיין

כלפי מטה

→ צ'י הכליות

כלפי מטה (ובמידה מסוימת גם כלפי מעלה)

→ צ'י שלפוחית השתן

כלפי מטה

זיהוי דפוסים דם

הדפוסים הפתולוגיים של הדם מתחלקים לארבעה סוגים עיקריים. מספר איברים מעורבים בייצור הדם, ובראשם הטחול, הכליות והכבד.



סטזיס של הדם

גוון עור כהה, שפתיים סגולות, כאב קבוע ודוקרני, גושי בטן שאינם זזים, ציפורניים סגולות, דימום עם דם כהה וקרשי דם, לשון סגולה, דופק מיתרי נוקשה.



מחסור בדם

גוון עור חיוור-לבן-דהוי, סחרחורות, זיכרון לקוי, חוסר תחושה או עקצוץ, ראייה מטושטשת, נדודי שינה, שפתיים חיוורות, מחזור דל, דיכאון, חרדה קלה, לשון חיוורת ויבשה, דופק מחוספס או דק.



איבוד דם

דימום מהאף, הקאת דם, שיעול דם, צואה דמית, דימום וסת מוגבר, דימום רחמי, דם בשתן. נגרם מחסר צ'י או מחוסר בדם.



חום בדם

תחושת חום, מחלות עור עם פריחות אדומות, צמא, דימום, לשון אדומה, דופק מהיר. תסמינים נוספים בהתאם לאיבר המעורב.

מחסור בדם - פתוגנזה ותסמינים

גורמים ותוצאות של מחסור בדם

מחסור בדם בכבד הוא הנפוץ ביותר, ושכיח במיוחד בקרב נשים. כאשר מתפתח מחסור בדם הכבד, הדבר עלול להשפיע על הלב.

גורמים עיקריים


חסר בטחול, כבד וכליות - שלושת האיברים המרכזיים בייצור הדם.

השלכות על הכבד

חסר בדם הכבד עלול לגרום לעליית יאנג הכבד, לרוח פנימית המתבטאת בסחרחורות, טיקים ורעידות קלות.

יובש ומחסור בנוזלים

במקרים חמורים, מחסור בדם עלול להוביל ליובש נוסף - עור יבש, שיער יבש, ציפורניים דקיקות. יובש מתמשך עלול לגרום לרוח בעור ולמחלות עור.




סטזיס של הדם - השוואה וטיפול

אחד התסמינים הבולטים ביותר של סטזיס של הדם הוא כאב המקובע במקום אחד, בעל תחושה של כאב משעמם או דוקרני. האיבר המושפע בתדירות הגבוהה ביותר הוא הכבד.

מאפיין	קיפאון צ'י	סטזיס של הדם
כאב/נפיחות	נפיחות יותר מכאב	כאב יותר מנפיחות
מיקום	כאב נודד	כאב קבוע
אופי הכאב	כאב מתנפח	כאב משעמם או דוקרני
גושי בטן	מופיעים ונעלמים	קבועים
עור	ללא שינוי	כתמים סגולים או חבורות
פנים	ללא שינוי	צבע כהה או ירקרק-כחלחל
לשון	צבע רגיל או אדמדם קלות	סגולה בצדדים
דופק	מתוח	מתוח, נוקשה או מחוספס

גורמים לסטגנציית דם



נקודות טיפול לפי איבר

01	כבד	טאי-צ'ונג 3-LIV
02	לב	טונג-לי 5-HE
03	ריאות	צ'י-זה 5-LU
04	קובה	ליאנג-צ'י 34-ST
05	מעיים	שאנג-ג'ו-שו 37-ST
06	רחם	טאי-צ'ונג 3-LIV-סי-מן 14-IA

חום בדם ואיבוד דם

איבוד דם - הבחנה בין סוגים

איבוד דם עלול להיגרם מחסר צ'י שאינו מסוגל להחזיק את הדם, או מחום הדם הדוחף את הדם אל מחוץ לכלי הדם.

גורם	צבע	כמות
חום בדם	אדום בהיר או כהה	איבוד רב
סטזיס של הדם	כהה מאוד עם קרישי דם	איבוד מועט
חסר צ'י	חיוור	איבוד רב, ממושך
חסר יין	אדום בוהק	מועט

חום בדם - תסמינים וטיפול

תחושת חום, מחלות עור עם פריחות אדומות, צמא, דימום, לשון אדומה, דופק מהיר. תסמינים נוספים עשויים להופיע בהתאם לאיבר המעורב.

חום בדם הכבד

מחלות עור עם גרד, חום ואדמומיות - מהנפוצים ביותר

חום בדם הלב

חרדה, חוסר מנוחה נפשי ופצעים בפה

חום בדם הרחם

דימום מוגבר בזמן הווסת



נקודות 2-10 שינג-ג'אן ו-10-SP יכולות לקרר את הדם. שילוב נוסף: 3-10 טאי-צ'ונג עם -וא 2 רנגו.

אבחנה מבדלת נוזלים - מחסור ובצקת


הדפוסים הפתולוגיים של נוזלי הגוף כוללים מחסור בנוזלי גוף, בצקת וליחה. נוזלי הגוף הם חלק מהיין, ומחסור בהם גורם תמיד למצב של יובש.

ריאות	קִיבָּה
עור יבש ושיעול יבש הם התסמינים העיקריים של מחסור בנוזלי גוף בריאות.	לשון יבשה עם סדקים אופקיים, פה יבש ללא רצון לשתות, או עם רצון לשתות בלגימות קטנות.
כליות	מעי גס
מתן שתן מועט, יובש בפה בלילה ויובש בגרון.	קשור לקיבה בתוך היאנג הבהיר. התסמין העיקרי הוא צואה יבשה.

במקרה של מחסור בנוזלי גוף, כדאי לטפל בראש ובראשונה ביין הקיבה באמצעות נקודות Ren-12 (Zhongwan), SP-6 (Sanyinjiao)-I ST-36 (Zusanli).

בצקת - גורמים ומיקומים

בצקת נובעת מחוסר יאנג בטחול, בריאות או בכליות. הריאות, הטחול והכליות הם שלושת האיברים המעורבים בעיקר בהמרה ובהובלה של נוזלים.



חסר יאנג ריאות
בצקת בחלק העליון של הגוף - פנים וידיים. יכולה להיגרם גם מפלישת רוח-קור חיצונית.
חסר יאנג טחול
בצקת בחלק האמצעי - בטן (מיימת) וגפיים.
חסר יאנג כליות
בצקת בחלק התחתון - רגליים וקרסוליים. הסוג הנפוץ ביותר.
נקודות עיקריות לטיפול בבצקת: BL-22, SP-9, CV-9, CV-5

ליחה – סיווג וסוגים

המושג "ליחה" הוא רחב היקף וחשוב ברפואה הסינית. ליחה היא בו-זמנית מצב פתולוגי וגורם אטיולוגי. הגורם העיקרי להיווצרות ליחה הוא חוסר בטחול.

ליחה מוצקה




ליחה לא מוצקה



חום-ליחה

ליחה צהובה ודביקה, פנים אדומות, יובש בפה, חוסר מנוחה, לשון אדומה ונפוחה עם ציפוי צהוב, דופק מהיר. משפיעה על ריאות, קיבה או לב.



ליחה לחה

ליחה לבנה ודביקה, תחושת לחץ בחזה, בחילה, טעם דביק, היעדר צמא, לשון נפוחה עם ציפוי דביק, דופק חלקלק. נראית בדפוס הריאה.



ליחה-רוח

סחרחורת, בחילה, הקאות, חוסר תחושה בגפיים, שיעול עם ליחה, צליל חרקתי בגרון, אפזיה. נראית במצבי שבץ רוח.




ליחה קרה

ליחה מימית לבנה, גפיים קרות, בחילות, לשון חיוורת ונפוחה עם ציפוי לבן ורטוב, דופק עמוק ואיטי. קשורה לקיבה או לריאות.



ליחה-נוזלים

ליחה לבנה, מימית מאוד ודלילה. לעיתים ניתן לשמוע אותה מתזזה בתוך הגוף. מכונה "טאן יין" בסינית.



ליחה-צ'י

תחושת נפיחות בגרון ללא נפיחות ממשית, קושי בבליעה, עצבנות, דיכאון. "תסמונת גרעין השזיף". קשורה לסטגנציה של צ'י הכבד.

ארבעה סוגי נוזלי ליחה וסיכום טיפול

ישנם ארבעה סוגים של נוזלי ליחה, המאופיינים לפי מיקומם בגוף. כל סוג מציג תמונה קלינית ייחודית.



נקודות עיקריות לטיפול בליחה: BL-22-I CV-9, CV-5, SP-9, ST-40

סוג הליחה	האזור המושפע
ליחה לחה בריאות	איברים פנימיים
אש-ליחה בקיבה	איברים פנימיים
ליחה המערפלת את הלב	איברים פנימיים
ליחה החוסמת את המרידיאנים	גפיים
ליחה מתחת לעור	עור
ליחה במפרקים	מפרקים